

Тесты с вопросами по специальности «Травматология и ортопедия» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/travma/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Травматология и ортопедия» для аккредитации и других экзаменов (2600 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/travmatologiya/

2) Травматология и ортопедия (ситуационные задачи)

→ medik-otvet.ru/product/travmatolog/

3) Тесты для аккредитации «Хирургия» (3700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/hirurgiya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Рентгенографическое исследование дает возможность установить

- А. наличия костных переломов
- Б. характера смещения отломков
- В. изменения структуры костной ткани
- Г. степени консолидации переломов

Оптимальным методом лечения застарелых повреждений ахиллова сухожилия

- А. открытый способ - сшивание "конец в конец" или "конец в бок"
- Б. открытый способ - ахиллопластика по В.А.Чернавскому
- В. пластика дефекта широкой фасции бедра
- Г. пластика дефекта с помощью лавсановой ленты, вшитой в концы разошедшегося ахиллова сухожилия
- Д. пластика апоневрозом стопы дефекта ахиллова сухожилия

Укажите наиболее эффективный метод лечения при ганглии:

- А. раздавливание
- Б. многократные пункции
- В. склерозирование
- Г. иссечение
- Д. консервативное

Профилактика бешенства при укусах животными включает

- А. промывание раны мыльной водой и раствором 3% р-ром перекиси водорода
- Б. хирургической обработке раны без наложения кожных швов
- В. антирабической прививки
- Г. хирургической обработки раны с иссечением краев раны и наложением швов

При сгибательном типе повреждения Монтеджа головка луча вывихивается:

- А. кпереди
- Б. кзади
- В. кнутри
- Г. кнаружи
- Д. кверху

Наибольший удельный вес в структуре политравмы составляют травмы, полученные в результате

- А. дорожно-транспортных происшествий
- Б. падения с высоты
- В. сдавления тяжелыми предметами
- Г. различных криминальных ситуаций
- Д. занятие спортом

Болезнь Клипеля - Фейля - это

- А. врожденный синостоз шейных и верхне-грудных позвонков с незаращением дужек
- Б. наличие шейных ребер
- В. приобретенный подвывих I шейного позвонка воспалительной этиологии
- Г. высокое стояние лопатки
- Д. крыловидная шея

В классификации переломов проксимального отдела бедра различают

- А. субкапитальные
- Б. базальные
- В. межвертельных и чрезвертельных
- Г. подвертельных

Для перелома ключицы характерно

- А. наличие гематомы
- Б. над ключицей деформация и припухлость
- В. надключичная ямка сглажена
- Г. верхняя конечность приподнята вверх и смещена кзади

Клиника ожоговой болезни включает период

- А. ожогового шока
- Б. ожоговой интоксикации
- В. ожогового истощения
- Г. реконвалесценции

Рентгеноконтрастное исследование свищей дает возможность выявить все перечисленное, кроме:

- А. связи мягкотканых свищей с костным органом
- Б. характера и топографии свищевого хода в мягких тканях и кости
- В. наличия абсцессов и полостей в тканях
- Г. наличия секвестров и инородных тел в мягких тканях и кости
- Д. причины и механизм образования свищевого хода

Среди переломов таза носит название «перелома Мальгенья»

- А. двойной перелом переднего полукольца
- Б. отрывной перелом передне-нижней кости
- В. односторонний перелом лонной и седалищной кости спереди и подвздошной кости сзади
- Г. перелом вертлужной впадины
- Д. перелом крыла подвздошной кости

Ведущими симптомами раневого сепсиса являются:

- А. тяжелая интоксикация
- Б. гиповолемия, нарушение водно-электролитного баланса, ацидоз
- В. ухудшение микроциркуляции
- Г. анемия, гипопротейнемия
- Д. все перечисленное

Закрытый пневмоторакс возникает вследствие всего перечисленного, исключая:

- А. повреждение ткани легкого сломанным ребром
- Б. разрыв бронха
- В. констрикционный ателектаз
- Г. разрыв легкого при нарушении плевральных спаек
- Д. отрыв бронха

Ведущим симптомом дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка является

- А. укорочение конечности
- Б. асимметрия кожных складок
- В. симптом "щелчка"
- Г. ограничение отведения бедер
- Д. наружная ротация конечности

При повреждении грудной клетки включают

- А. лечение острой дыхательной недостаточности
- Б. интубация трахеи
- В. снятие болевого симптома
- Г. лечение острой кровопотери

Основные симптомы косолапости

- А. эквинус стопы
- Б. супинация пятки
- В. варус стопы
- Г. приведение переднего отдела стопы

К непроникающим ранениям живота относятся все перечисленные, кроме:

- А. ранений в пределах кожи и подкожной клетчатки
- Б. ранений в пределах брюшины
- В. ранений в пределах кожи, подкожной клетчатки, мышечных слоев ткани
- Г. в пределах кожи
- Д. верно а) и в)

Среди поражений холодом различают

- А. замерзание
- Б. отморожение
- В. ознобление
- Г. холодový нейроваскулит

Максимальное отведение и сгибание проксимального фрагмента наблюдается при переломах бедра в области:

- А. верхней трети диафиза
- Б. средней трети диафиза
- В. нижней трети диафиза
- Г. надмыщелков
- Д. средней и нижней трети диафиза

Основное преимущество артроскопии над открытыми методиками хирургического лечения заключается в

- А. снижение риска развития осложнений
- Б. малоинвазивность
- В. снижен риск развития кровотечений
- Г. короче койко-день
- Д. меньшая продолжительность операции

Показания к оперативному вмешательству на поврежденном нерве, если нет признаков его анатомического перерыва, при закрытых переломах костей конечностей должны ставиться после так называемого периода оправданного выжидания, который продолжается:

- А. 2-3 недели
- Б. 4-6 недель
- В. 2-2,5 месяца
- Г. 3-4 месяца
- Д. 6-8 месяцев

Создание сетчатого кожного трансплантата целесообразно для

- А. лучшего прилегания его к раневой поверхности
- Б. профилактики образования подтрансплантационных гематом
- В. восстановления циркуляции лимфы в ране
- Г. увеличения площади трансплантата

Наиболее точно дисплазию тазобедренного сустава выявляет рентгенологическая схема, разработанная

- А. С.А. Рейнбергом
- Б. Радулеску
- В. Хильгенрейнером
- Г. Омбреданом
- Д. Вибергом

Установите, чем проявляются заболевания

А. Врожденный вывих

Б. Синовит

В. Болезнь Пертеса

1. Боль

2. Хромота

3. Асимметрия складок

4. Укорочение конечности

5. Симптом щелчка

6. Ограничение отведения

А. А-1,4,5,6 Б-3,6 В-4,5

Б. А-1,2,3, Б-3,4,6 В-5,6

В. А-2,3,4,5,6 Б-1,2,6 В-1,2,4,6

Г. А-2,6 Б-3,5 В-1,5,6

Длительный период сращения переломов шейки бедра у лиц пожилого и старческого возраста обусловлено

А. резким нарушением кровоснабжения головки и шейки бедра

Б. снижением репаративной способности костной ткани

В. сахарным диабетом

Г. сопутствующей сердечно-сосудистой патологией

При болезни Олье эмбриональная ткань представлена

А. хрящевой тканью

Б. фиброзно-хрящевой тканью

В. фиброзной тканью

Г. воспалительной тканью

Д. костной тканью

Рентгенологическая картина дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка определяется по

А. изменению величин h и d (уменьшение, увеличение, без перемен)

Б. отношению диафиза бедра к линии Омбредана (проходит линия через диафиз бедра, кнутри, кнаружи от него)

В. изменению ацетабулярного угла (увеличение, уменьшение, без перемен)

Г. позднее появление ядра окостенения головки

Причина развития травматического шока

А. потеря большого объема плазмы

Б. потеря большого объема крови

В. сильное болевое раздражение

Г. повреждение подкорковых структур головного мозга

Среди всех видов травм по количеству преобладают:

- А. раны и ссадины
- Б. ушибы и растяжения
- В. переломы и вывихи
- Г. ожоги и отморожения
- Д. инородные тела

Показанием к эндопротезированию при переломах шейки бедра и ложных суставов у старых людей является все перечисленное, кроме:

- А. вколоченного перелома шейки бедра
- Б. субкапитального перелома шейки бедра
- В. несросшегося перелома (ложный сустав) шейки бедра
- Г. асептического некроза головки и шейки бедра
- Д. нарушения кровоснабжения головки бедра

Суммарная длина верхней конечности измеряется от акромиального отростка

- А. до середины проекции головки плеча
- Б. до наружного мыщелка
- В. до шиловидного отростка лучевой кости
- Г. конца пятого пальца
- Д. до конца третьего пальца

Переливание несовместимой крови вызывает

- А. отек легких
- Б. тромбоз клубочков почек
- В. гемолитическую анемию
- Г. диссеминированное внутрисосудистое свертывание

Установите, что характерно для перелома лучевой кости в типичном месте

- А. Разгибательный перелом (Коллиса)
- Б. Сгибательный перелом (Смита)

1. Боль
2. Угол, открытый в тыльную сторону
3. Угол, открытый в ладонную сторону
4. Нарушение функции сустава

5. Припухлость

- А. А-1,5 Б-4,5
- Б. А-2,3 Б-1,2
- В. А-3,5 Б-2,4,5
- Г.)А-1,2,4,5 Б-1,3,4,5

Среди линейных переломов костей свода черепа выделяют все перечисленные, кроме:

- А. полного перелома
- Б. неполного перелома
- В. вдавленного перелома
- Г. перелома с переходом на основание черепа
- Д. перелома без перехода на основание черепа

Во время проведения спинно-мозговой анестезии и после нее возможны следующие осложнения:

- А. снижение артериального давления на 30-50 мм и коллапс
- Б. головная боль, рвота
- В. мозговая гипертензия
- Г. г) правильно а) и б)
- Д. все перечисленное

Капсулу плечевого сустава укрепляет:

- А. плечевая мышца
- Б. надостная мышца
- В. подостная мышца
- Г. подлопаточная мышца
- Д. дельтовидная мышца

Ведущим симптомом дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка является:

- А. укорочение конечности
- Б. асимметрия кожных складок
- В. симптом "щелчка"
- Г. ограничение отведения бедер
- Д. наружная ротация конечности

Укажите оптимальную лечебную тактику при ущемлении внутреннего мениска коленного сустава у детей:

- А. операция менискэктомии на 2-3 сутки после травмы
- Б. под общим обезболиванием устранение блокады сустава и иммобилизация гипсовой лонгетой на 3 недели
- В. гипсовый тугор на 4 недели
- Г. артротомия и менискэктомия в экстренном порядке
- Д. артроскопия и парциальная менискэктомия

Вывихом чаще всего сопровождается:

- А. внутрисуставной перелом дистальной головки пястной кости
- Б. перелом типа Беннета - основание 1-й пястной кости
- В. околосуставной перелом дистального отдела 5-й пястной кости
- Г. околосуставной перелом проксимального отдела 5-й пястной кости
- Д. перелом диафиза 5-й пястной кости

При плевральной пункции возможны все перечисленные осложнения, кроме

- А. коллапса
- Б. ранения легкого
- В. ранения селезенки
- Г. ранения бронха с образованием напряженного пневмоторакса
- Д. ранения сосудисто-нервного пучка межреберья

Для подкожного разрыва ахиллова сухожилия типично

- А. разрыв сухожилия происходит на фоне дегенеративно-трофических изменений
- Б. разрыв сухожилия происходит после некоординированного резкого сокращения трехглавой мышцы голени
- В. западение мягких тканей в области разрыва сухожилия
- Г. разрыв чаще локализуется в месте перехода мышцы в сухожилие

Правила наложения кровоостанавливающего жгута на конечность при артериальном кровотечении включают

- А. наложение жгута ближе к ране и проксимальнее ее
- Б. давление жгута - до исчезновения периферического пульса и прекращения кровотечения
- В. наложение жгута на одежду
- Г. приложение бирки с указанием времени наложения жгута (час и минута)

УЗИ (ультразвуковое исследование) дает возможность выявить различные повреждения, кроме:

- А. разрыва хрящевой губы суставной поверхности лопатки
- Б. кальцификации дельтовидной мышцы
- В. частичного разрыва икроножной мышцы
- Г. перелома плоских костей
- Д. внутримышечной гематомы четырехглавой мышцы бедра

Для диагностики повреждений периферических нервов в ранние сроки большое значение имеют все перечисленные данные, кроме:

- А. анамнеза
- Б. расположения раны
- В. нарушения чувствительности
- Г. сухожильных и периостальных рефлексов
- Д. двигательных расстройств

Наиболее точно дисплазию тазобедренного сустава выявляет рентгенологическая схема, разработанная:

- А. С.А. Рейнбергом
- Б. Радулеску
- В. Хильгенрейнером
- Г. Омбреданом
- Д. М.В. Волковым

Повреждение Монтеджа - это

- А. изолированный перелом локтевой кости
- Б. изолированный перелом лучевой кости
- В. перелом локтевой кости и вывих головки лучевой
- Г. перелом лучевой кости и вывих головки локтевой
- Д. перелом обеих костей предплечья

К множественным переломам относятся:

- А. повреждения двух и более анатомо-функциональных областей опорно-двигательного аппарата
- Б. два и более переломов в пределах одного сегмента
- В. два и более переломов в пределах одной конечности
- Г. два и более переломов двух и более конечностей
- Д. все перечисленное

Люмбальная пункция дает возможность точно подтвердить диагноз

- А. сотрясения головного мозга
- Б. эпидуральной гематомы
- В. субдуральной гематомы
- Г. внутримозговой гематомы
- Д. субарахноидального кровоизлияния

К переломам, сопровождающимся разрывом тазового кольца, относятся перелом

- А. крыла подвздошной кости
- Б. лонной кости
- В. губы вертлужной впадины
- Г. лонной и седалищной костей с одной стороны
- Д. лонной и седалищной костей с разных сторон

Наиболее часто встречающейся формой кривошеи является

- А. костная
- Б. мышечная
- В. рефлекторная
- Г. воспалительная
- Д. установочная

Этиологическим фактором врожденного вывиха бедра (дисплазии) является

- А. воспалительный процесс
- Б. травматический фактор
- В. дисплазия
- Г. неправильное членорасположение плода в утробе матери
- Д. нарушение обменных процессов

Установите, что является причиной развития заболеваний

- А. Диспластический сколиоз
 - Б. Юношеский кифоз (болезнь Шайерман-Мау)
1. Травма
 2. Нарушение соединительной ткани
 3. Нарушение кровообращения
 4. Дисплазия
 5. Остеопороз
- А. А-1,3 Б-4
 - Б. А-1,2 Б-1,2
 - В. А-1 Б-2,4
 - Г. А-2, 4 Б-3

Классификация закрытой черепно-мозговой травмы включает

- А. сотрясение головного мозга
- Б. сдавление головного мозга
- В. ушиб головного мозга
- Г. субарахноидальное кровоизлияние

Клинически ось нижней конечности проходит через образования

- А. передне-верхнюю ось подвздошной кости
- Б. внутренний край надколенника
- В. середину проекции голеностопного сустава
- Г. первый палец стопы

Возможные формы фиброзной остеодисплазии

- А. полиоссальная
- Б. олигооссальная
- В. монооссальная
- Г. акроформа

Радикальный способ лечения газовой гангрены - это

- А. ампутация
- Б. некрэктомия
- В. фасциотомия
- Г. снятие швов и открытое ведение раны
- Д. активное дренирование раны

Суставная капсула голеностопного сустава лишена укрепляющих связок:

- А. латерально и сзади
- Б. спереди и сзади
- В. медиально и сзади
- Г. латерально и медиально
- Д. медиально

Болезнь Блаунта - это

- А. извращение развития росткового хряща (дисплазия) с разрыхлением медиальной части эпифизарной пластинки, с последующей ее оссификацией, с поражением проксимального эпифиза большеберцовой кости
- Б. последствие перенесенного остеомиелита большеберцовой кости
- В. рахитоподобное заболевание
- Г. последствие банального рахита
- Д. остеохондропатия головки бедренной кости

Инкубационный период при столбняке составляет (дней)

- А. 1-2 дня
- Б. 3-5 дней
- В. 7-14 дней
- Г. 10-21 день
- Д. 24-30 дней

Начало острого гематогенного остеомиелита характеризуется

- А. резкими болями и болевой контрактурой
- Б. лейкоцитозом со сдвигом лейкоцитарной формулы влево
- В. высокой температурой
- Г. повышенной СОЭ
- Д. всем вышеперечисленным

Используя метод магнитно-резонансной томографии, можно осуществить все перечисленное, кроме:

- А. диагностики перелома
- Б. диагностики вывиха
- В. исследования структуры кости
- Г. диагностики опухоли
- Д. выявления инородных тел и секвестров

Международная классификация болезней – это:

- А. перечень наименований болезней в определенном порядке
- Б. перечень диагнозов в определенном порядке
- В. перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- Г. система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- Д. перечень, наименование болезней, диагнозов, синдромов, расположенных в определенном порядке

При лечении компрессионных переломов мыщелка большеберцовой кости со смещением отломков предпочтительным является

- А. артротомия, удаление поврежденных менисков, поднятие осевших мыщелков, металлоостеосинтез
- Б. закрытый компрессионно-дистракционный остеосинтез переломов большеберцовой кости
- В. ручное вправление переломов мыщелков большеберцовой кости
- Г. скелетное вытяжение за надлодыжечную область или пяточную
- Д. ультразвуковая сварка

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови в начальной стадии проявляется

- А. геморрагическим синдромом, наличием острых язв желудочно-кишечного тракта
- Б. нарушением микроциркуляции в легких, почках, печени
- В. острым канальцевым некрозом почек
- Г. респираторной недостаточностью
- Д. печеночной недостаточностью

Для полного разрыва мышцы характерно все перечисленное, кроме:

- А. отчетливого ощущения момента разрыва
- Б. резкой боли
- В. снижения функции конечности
- Г. выраженного гипотонуса конечности
- Д. западения в области разрыва мышцы

Профилактика бешенства при укусах животными заключается в осуществлении:

- А. промывания раны мыльной водой и раствором 3% H₂O₂
- Б. хирургической обработки раны с иссечением краев ее с наложением швов
- В. антирабической прививки
- Г. правильно а) и в)
- Д. все перечисленное

Основным ранним клиническим симптомом деформирующего артроза тазобедренного сустава является

- А. боль в области тазобедренного сустава
- Б. боль в нижней трети бедра и в области коленного сустава
- В. приводящая сгибательная контрактура
- Г. укорочение конечности
- Д. ограничение объема движений в суставе

Клиническая картина сдавления мягких тканей находится в прямой зависимости от

- А. возраста больного
- Б. длительности сдавления
- В. атмосферных условий
- Г. характера сдавливающего фактора

Экспертиза временной нетрудоспособности трудящихся более 6 дней осуществляется

- А. врачом
- Б. заведующим отделением
- В. контрольно-экспертной комиссией
- Г. главным врачом
- Д. бюро медико-социальной экспертизы

Установите, какой фармакологической группе соответствуют препараты

А. Селективные

Б. Неселективные

1. Диклофенак

2. Найз

3. Напроксен

4. Аркоксиа

5. Целебрекс

6. Ибупрофен

А. А-1,3,5 Б-2,4

Б. А-3,4,6 Б-2,5

В. А-2,4,5 Б-1,3,6

Г. А-1,2,3 Б-2,4,5

Непригодным для остеосинтеза диафизарных переломов являются

А. остеосинтез мостовидной пластиной

Б. интрамедуллярный остеосинтез штифтом с блокированием

В. чрескостный остеосинтез аппаратами и устройствами

Г. фиксаторы типа шелк, проволока, лента, спицы, винты, шурупы

Д. интрамедуллярный остеосинтез штифтом без блокирования

При фиброзной дисплазии возможно наличие сопутствующих синдромов

А. Фюрмайера

Б. Маффучи

В. Олбрайта

Г. Поланда

Д. Ларсена

Хондробластома (опухоль Кодмана) поражает чаще

А. диафизы длинных трубчатых костей

Б. плоские кости скелета

В. метафизы длинных трубчатых костей

Г. эпифизы длинных трубчатых костей

Д. равномерно различные отделы кости

Листок временной нетрудоспособности выдается при

А. острых заболеваниях

Б. обострении хронического заболевания

В. травмах с 6 дня

Г. различных ранениях

Наиболее характерным симптомом для вывиха является

- А. сильная боль
- Б. "костный" хруст
- В. возможность производить пассивные движения
- Г. "пружинящие" движения
- Д. выраженная ротация плеча

Установите, какой фармакологической группе соответствуют препарат

А. Защищенные пенициллины

Б. Макролиды

В. Аминогликозиды

1. Амикацин

2. Амоксиклав

3. Цефабол

4. Цедекс

5. Кларитромицин

Г. Цефалоспорины

А. А-1 Б-2 В-3 Г-4,5

Б. А-2 Б-5 В-1 Г-3,4

В. А-3,4 Б-2 В-4 Г-1

Г. А-5 Б-3,4 В-5 Г-2,5

Показанием к эндопротезированию при переломах и ложных суставах шейки бедра у пациентов пожилого возраста является

- А. оскольчатый перелом
- Б. субкапитальный перелом шейки бедра
- В. несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
- Г. вколоченный перелом шейки бедра

Одним из важных этапов эндопротезирования коленного сустава перед проведением костных опилов является

- А. удаление экзостозов надколенника
- Б. иссечение передней крестообразной связки
- В. синовэктомия
- Г. релиз мягких тканей
- Д. менискэктомия

Установите, что является причиной развития заболеваний

А. Диспластический артроз

Б. Асептический некроз

1. Травма

2. Нарушение кровообращения

3. Перегрузка сустава

4. Дисплазия

5. Системные заболевания скелета

А. А-1,2,5 Б-3

Б. А-1,3,4,5 Б-2

В. А-3,5 Б-1,2,3

Г. А-2,4,5 Б-4,5

Для повреждения периферического нерва характерны двигательные расстройства

А. гипертонус мышц выше уровня ранения

Б. вялый паралич ниже уровня ранения

В. судорожное сокращение мышц ниже уровня ранения

Г. усиление сухожильных и периостальных рефлексов ниже уровня ранения

Д. перемежающийся гипер- и гипотонус мышц ниже уровня ранения

Консервативное лечение косолапости включает

А. мягкое бинтование и ЛФК

Б. гипсовые повязки по Понцетти

В. гипсовые повязки по Виленскому

Г. редрессацию

Эпидуральная гематома возникает, в основном, в результате кровотечения из

А. поврежденных сосудов коры головного мозга

Б. поврежденных костей свода черепа

В. вены Галена

Г. ветвей средней оболочечной артерии

Д. ветвей передней мозговой артерии

Открытым переломом костей следует считать перелом, при котором

А. костная рана связана с внешней средой

Б. рана кожи и мягких тканей на уровне перелома не сообщается с костью

В. рана мягких тканей проникает до кости в 5 см от зоны перелома

Г. на уровне перелома располагается зона осаднения кожных покровов

Инкубационный период при анаэробной газовой инфекции составляет

- А. от 1 до 12 ч
- Б. от 12 до 24 ч
- В. от 24 до 48 ч
- Г. от 3 до 4 суток
- Д. свыше 5 суток

Причиной возникновения привычного вывиха является:

- А. родовая травма
- Б. повреждение сухожилия длинной головки бицепса
- В. разрыв и слабость капсулы плечевого сустава
- Г. инфекционный артрит
- Д. вывих плеча, сопровождающийся переломом ключицы

Установите, какие виды переломов характерны для перелома диафиза и проксимального метафиза плечевой кости

- А. Диафиз**
- Б. Проксимальный метафиз**
- Б. Проксимальный метафиз**
- 1. Вколоченный**
- 2. Косой**
- 3. Винтообразный**
- 4. С отрывом большого бугорка**
- 5. Переломо-вывих**
- А. А-1,2,4 Б-1,3,5
- Б. А-4,5 Б-2,3
- В. А-2,3 Б-1,4,5
- Г. А-5 Б-2,4

При развитии асептического некроза таранной кости и деформирующего остеоартроза голеностопного и подтаранного суставов показан

- А. остеосинтез винтами
- Б. остеосинтез спицами
- В. остеосинтез проволокой
- Г. гастралэктомия
- Д. артродез голеностопного и подтаранного суставов

К клиническим проявлениям анаэробной инфекции относится все перечисленное, исключая:

- А. боль в ране
- Б. отек, газообразование
- В. токсикоз
- Г. анестезию в области раны, гипертермию
- Д. субфебрилитет

Тяжесть черепно-мозговой травмы /ЧМТ/ оценивается по шкале комы Глазго

- А. легкая 13-14 баллов
- Б. средняя тяжесть 9-12 баллов
- В. тяжелая 4-8 баллов
- Г. крайне тяжелая менее 3 баллов

При лапароскопии брюшной полости невозможно определить:

- А. наличие свежей крови, гноя, экссудата, желудочного или кишечного содержимого
- Б. разрыва ткани печени и ее связок
- В. разрыва ткани селезенки или ее капсулы
- Г. наличия забрюшинной гематомы
- Д. язвенных эрозий желудка и кишки

Причиной возникновения привычного вывиха является

- А. родовая травма
- Б. инфекционный артрит
- В. вывих плеча, сопровождающийся переломом ключицы
- Г. повреждения в момент травматического вывиха в сочетании с неправильной тактикой ведения после вывиха
- Д. атрофия мягких тканей плеча

Оптимальным методом лечения винтообразных переломов костей голени со смещением отломков является

- А. гипсовая циркулярная повязка
- Б. скелетное вытяжение + гипсовая повязка
- В. компрессионно-дистракционный метод
- Г. наkostный или интрамедуллярный остеосинтез
- Д. гипсовая лонгета

При поражении лучевого нерва на уровне верхней трети плеча выпадает функция

- А. сгибания предплечья
- Б. разгибания предплечья
- В. сгибания кисти
- Г. разгибания кисти и пальцев

При операциях на кисти и пальцах рационально использовать виды обезболивания

- А. местную анестезию
- Б. проводниковую анестезию
- В. новокаиновую блокаду плечевого сплетения
- Г. внутрикостную новокаиновую блокаду со жгутом

Повреждение Галиацци - это

- А. изолированный перелом локтевой кости
- Б. изолированный перелом лучевой кости
- В. перелом локтевой кости и вывих головки лучевой
- Г. перелом лучевой кости и вывих головки локтевой
- Д. перелом обеих костей предплечья

Установите, какие симптомы характерны для нарушения движений в суставе

- А. Разболтанность сустава
- Б. Контрактура сустава
- В. Анкилоз
- 1. Ограничение движений
- 2. Избыточные движения
- 3. Боковая нестабильность сустава
- 4. Отсутствие движений
- 5. Атрофия мягких тканей
- А. А-1,2,3 Б-1,3,5 В-2,4,5
- Б. А-2,3 Б-1,5 В-4,5
- В. А-2,3,4 Б-1,2,5 В-3,4,5
- Г.)А-3 Б-2 В-1

Шоковый период травматической болезни характеризуется:

- А. глюкозурией
- Б. гипергликемией
- В. лактацидемией
- Г. правильно а) и б)
- Д. правильно все перечисленное

Суммарная длина нижней конечности включает в себя расстояние от передней верхней ости таза

- А. до большого вертела бедра
- Б. до суставной щели коленного сустава
- В. до края наружной лодыжки
- Г. до пяточного бугра
- Д. до внутренней лодыжки

Установите, какие симптомы характерны для данных заболеваний

А. Гематогенный остеомиелит

Б. Туберкулез

1. Боль

2. Высокая температура

3. Выраженный остеопороз

4. Секвестры

5. Лимфоцитоз

6. Лейкоцитоз

А. А-3,4,6 Б-1,2,4

Б. А-3,5 Б-4,6

В. А-1,2,4,6 Б-1,3,5

Г. А-3,5 Б-1,2,6

Клинически ось верхней конечности проходит через образования

А. середины проекции головки плечевой кости

Б. центра головчатого возвышения плеча

В. головки лучевой кости

Г. головки локтевой кости

Основными ранними рентгенологическими признаками саркомы Юинга и остеогенной саркомы являются:

А. очаг патологической деструкции кости

Б. локальный остеопороз

В. отсутствие четких границ опухоли

Г. слоистый (луковичный) периостит

Д. все перечисленное

Аутопластика дефектов периферических нервных стволов стандартно выполняется за счет

А. лучевого нерва

Б. локтевого нерва

В. наружного кожного нерва голени

Г. большеберцового нерва

Д. срединного нерва

Линия и треугольник Гютера применяется при исследовании нормального локтевого сустава. Для его определения необходимо знать все перечисленные ориентиры, кроме:

А. оси плеча

Б. расположения надмыщелков

В. расположения вершины локтевого отростка

Г. при разгибании указанные три точки (надмыщелки и локтевой отросток) составляют прямую линию

Д. при сгибании указанные три точки составляют равнобедренный треугольник

При простых переломах ребер обезболивание достигается путем

- А. паравертебральной новокаиновой блокады
- Б. новокаиновой блокады области перелома ребер
- В. вагосимпатической новокаиновой блокады по А.В. Вишневскому
- Г. введения промедола

При повреждении грудной клетки противопоказана

- А. рентгенография грудной клетки
- Б. зондирование раны грудной клетки
- В. измерение центрального венозного давления
- Г. выявление симптома Бирнера
- Д. перкуссия грудной клетки

Наиболее частым переломом проксимального отдела плеча является перелом

- А. головки
- Б. анатомической шейки
- В. большого бугорка
- Г. хирургической шейки
- Д. малого бугорка

Для травматического шока 1 степени характерно артериальное давление

- А. 60/40 мм рт. ст.
- Б. 70/60 мм рт. ст.
- В. 90/60 мм рт. ст.
- Г. 100/60 мм рт. ст.
- Д. 110/70 мм рт. ст.

Наиболее часто встречающаяся причина деформирующего артроза коленного сустава

- А. травмы коленного сустава: внутрисуставные переломы, неправильно сросшиеся переломы голени и бедра, последствия повреждения менисков и связок коленного сустава, вывихи голени
- Б. врожденный вывих надколенника
- В. болезнь Кенига
- Г. воспалительные процессы
- Д. инволюционный процесс

Нарушение подвижности в суставе принято характеризовать:

- А. как анкилоз
- Б. как контрактура
- В. как ригидность
- Г. как патологическая подвижность
- Д. все правильно

Медицинское страхование – это

- А. оплата медицинских услуг через страховую организацию
- Б. форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья
- В. оплата лечения и лекарств за счет накопленных пациентом на страховом счете средств
- Г. медицинское обслуживание населения за счет страховой организации
- Д. оплата дорогостоящих методов лечения с помощью квот

Укажите показания для оперативного вмешательства при повреждении внутреннего мениска у детей:

- А. первичное ущемление и «блокада» сустава
- Б. неоднократные «блокады» сустава в течение 6 месяцев после первой травмы
- В. затрудненная ходьба
- Г. затруднение подъема по лестнице
- Д. затруднение спуска по лестнице

Оптимальным методом лечения открытых переломов костей голени со смещением отломков является

- А. первичная хирургическая обработка, репозиция перелома, наложение разрезной гипсовой повязки от верхней трети бедра до кончиков пальцев стопы
- Б. первичная хирургическая обработка, репозиция перелома, наложение разрезной гипсовой повязки от коленного сустава до кончиков пальцев стопы
- В. первичная хирургическая обработка, наложение скелетного вытяжения
- Г. наложение компрессионно-дистракционного аппарата после первичной хирургической обработки
- Д. накостный или интрамедуллярный остеосинтез

Установите, какие основные симптомы характерны для заболеваний

А. Болезнь Блаунта

Б. Рахитоподобное

1. Варусная деформация

2. Внутренняя торсия костей голени

3. Расширение зоны роста

4. Сужение зоны роста

5. Симптом блюдца

6. Снижение высоты эпифиза

А. А-1,2,4,6 Б-1,2,3,5

Б. А-1,6 Б-3,4,5

В. А-3,4,5 Б-1,2,4

Г. А-3,5 Б-4,6

Остеопороз – это:

А. повреждение хрящевой ткани

Б. размягчение костной ткани

В. снижение минеральной плотности костной ткани

Г. синоним остеомалации

Д. нарушение образования остеоида

Возникновение симптома "очков" при переломе основания черепа объясняется:

А. повреждением продырявленной пластинки в передней черепной ямке

Б. разрывом позвоночной артерии

В. повреждением внутренней сонной артерии в полости черепа

Г. повреждением передней решетчатой вены

Д. повреждением задней решетчатой вены

Клинические проявления изменений в костях конечностей при несовершенном костеобразовании характеризуются всем перечисленным, кроме:

А. ломкости костей

Б. снижение содержания кальция в крови

В. деформации бедра (галифеобразная, саблевидная)

Г. деформации голени (саблевидная, О-образная, Х-образная)

Д. гипотония мышц

Рентгенологическая картина несовершенного костеобразования характеризуется

А. истончения кортикального слоя кости

Б. нарушение архитектоники и трабекулярности кости

В. деформация костей

Г. наличием кист

Лечение дисплазии тазобедренного сустава начинается:

- А. с рождения
- Б. в возрасте 1 месяца
- В. в возрасте 2 месяцев
- Г. в возрасте 3 месяцев
- Д. в возрасте 6 месяцев и старше

При фиброзной остеодисплазии чаще поражаются

- А. плоские кости
- Б. позвоночник
- В. длинные трубчатые кости
- Г. мелкие кости кистей и стоп
- Д. губчатые кости

Наиболее характерными клиническими признаками остеонидной остеомы при локализации ее в области длинных трубчатых костей являются

- А. ограничение функции близлежащего сустава
- Б. постоянные боли в месте локализации, местное повышение температуры
- В. ночные боли в пораженной области
- Г. атрофия мышц конечности
- Д. правильно в) и г)

Абдукционные вколоченные переломы хирургической шейки плеча со смещением под углом требуют одномоментной репозиции, если угол смещения равен:

- А. 10°
- Б. 20°
- В. 35°
- Г. 60°
- Д. 90°

Если вывих произошел между 6-м и 7-м шейным позвонками, то вывихнутым позвонком считается

- А. 6-й позвонок
- Б. 5-й позвонок
- В. 4-й позвонок
- Г. 7-й позвонок
- Д. 6-й и 5-й позвонки

Стабильно-функциональный остеосинтез рационален при использовании

- А. винтов
- Б. спиц
- В. интрамедуллярных конструкций с блокированием
- Г. аутотрансплантатов
- Д. синтетических материалов

Причинами возникновения гнойной инфекции травматических ран являются:

- А. "уличная" микрофлора
- Б. "госпитальная" микрофлора
- В. эндогенная микрофлора
- Г. верно а) и в)
- Д. верно б) и в)

Наиболее частое осложнение шва артерий - это

- А. кровотечение из зоны анастомоза
- Б. несостоятельность шва
- В. тромбоз анастомоза
- Г. некроз области анастомоза
- Д. нагноение

Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома) наиболее часто встречается

- А. в детском возрасте до 10 лет
- Б. в подростковом возрасте (12-16 лет)
- В. опухоль характерна для взрослых (20-40 лет)
- Г. в пожилом возрасте
- Д. одинаково часто встречается в любом возрасте

В диагностике повреждений спинного мозга ведущую роль играют перечисленные методы исследования, кроме:

- А. сбора анамнеза
- Б. исследования двигательных функций конечностей
- В. измерения температуры отдельных частей тела
- Г. исследования нарушений чувствительности конечностей
- Д. исследования проходимости подпаутинного пространства (спинальная пункция)

Повреждение внутреннего мыщелка большеберцовой кости, возникшего при чрезмерной аддукции, сопровождается повреждением

- А. боковых связок коленного сустава
- Б. крестообразных связок
- В. боковых и крестообразных связок
- Г. наружной малоберцовой связки, передней крестообразной связки и внутреннего мениска
- Д. боковых и крестообразных связок мениска

Ранним признаком острого тромбоза магистральных артерий конечности является

- А. боль
- Б. отек
- В. гипотермия
- Г. мраморность кожных покровов
- Д. парестезии

Биполярный эндопротез тазобедренного сустава отличается от однополюсного наличием

- А. металлполимерного узла трения
- Б. головки эндопротеза
- В. чашки эндопротеза
- Г. движений между вертлужной впадиной и металлической поверхностью головки
- Д. ножки эндопротеза

При дефекте артерии оптимальный вариант ее пластики - это

- А. аутовеной
- Б. аутоартерией
- В. венозным аллотрансплантатом
- Г. артериальным аллотрансплантатом
- Д. сосудистого ксенотрансплантатом

Установите, какие переломы характерны для детского и взрослого возраста

- А. Дети**
- Б. Взрослые**
- 1. Косой перелом**
- 2. Перелом по типу «зеленой» ветки**
- 3. Эпифизеолиз**
- 4. Оскольчатый перелом**
- 5. Остеоэпифизеолиз**
- А. А-1,2,3,4,5 Б-1,4
- Б. А-1,2,5 Б-1,3,4
- В. А-3,4,5 Б-1,5
- Г.)А-1,5 Б-2,3

Начальные признаки болезни Олье характеризуются

- А. температурной реакцией
- Б. укорочением и деформацией конечности
- В. припухлостью
- Г. изменением кожных покровов по типу кофейных пятен
- Д. болезненностью

Установите, какие переломы костей, составляющие локтевой сустав, являются внутри- и внесуставными

- А. Внутрисуставной
- Б. Внесуставной
- 1. Надмыщелковый
- 2. Т-образный
- 3. Перелом блока плечевой кости
- 4. Перелом головочки плечевой кости
- 5. Перелом локтевого отростка
- А. А-4,5 Б-2,3
- Б. А-1,2 Б-4,5
- В. А-2,3,4,5 Б-1
- Г. А-1,2,4, Б-3,5

Наиболее достоверным симптомом открытого повреждения сустава является

- А. наличие глубокой раны в проекции сустава
- Б. наличие раны, обильно кровоточащей в области сустава
- В. вытекание из раны синовиальной жидкости
- Г. крепитация отломков в области сустава с ранением мягких тканей в его проекции
- Д. резкое ограничение функции сустава при наличии раны в его проекции

Стабилизацию костных фрагментов при сочетанной травме опорно-двигательного аппарата наиболее целесообразно осуществлять

- А. скелетным вытяжением
- Б. гипсовой повязкой
- В. аппаратом внешней фиксации
- Г. накостной пластиной
- Д. бым из указанных способов

Установите, какие переломы бедренной кости являются внутри- и внесуставными

А. Внутрисуставной

Б. Внесуставной

1. Чрезвертельный

2. Перелом головки

3. Субкапитальный

4. Подвертельный

5. Базальный

А. А-2,4 Б-1,3,5

Б. А-1,4 Б-2,5

В. А-4,5 Б-2,4

Г. А-2,3,5 Б-1,4

Через сколько дней после травмы чаще развивается тромбоэмболия легочной артерии

А. 3-7 дней

Б. 8-12 дней

В. 13-21 дней

Г. 22-28 дней

Д. 30-36 дней

В зависимости от положения головки не встречается вывих плеча

А. верхнего

Б. нижнего

В. переднего

Г. заднего

Д. передне-нижнего

При правосторонней мышечной кривошее:

А. подбородок отклонен влево

Б. подбородок отклонен вправо

В. подбородок расположен по средней линии туловища

Г. голова по средней линии

Д. голова наклонена влево

Техника выполнения симптома "баллотирования" надколенника состоит:

А. в сжатии коленного сустава

Б. в сжатии надпателлярного заворота левой руки

В. в надавливании кончиков пальцев на надколенник в передне-заднем направлении

Г. в сжатии надпателлярного заворота левой рукой и надавливании кончиками пальцев на надколенник в передне-заднем направлении

Д. в перкуссии надколенника

Контрактура Фолькмана возникает вследствие повреждения

- А. плечевого сплетения
- Б. плечевой артерии
- В. лучевой артерии
- Г. двойного перелома плечевой кости
- Д. срединного нерва

В зависимости от положения головки различают все перечисленные вывихи плеча, за исключением:

- А. верхнего
- Б. нижнего
- В. переднего
- Г. заднего
- Д. передне-нижнего

Ведущим последствием остеопороза являются

- А. переломы костей
- Б. инсульты
- В. сахарный диабет
- Г. артериальная гипертензия
- Д. искривление нижних конечностей

При обследовании пациентов с переломом диафиза плеча следует проверять функцию нерва

- А. локтевого и срединного
- Б. лучевого
- В. срединного
- Г. локтевого
- Д. кожно-мышечного

Спондилоэпифизарная дисплазия обусловлена

- А. нарушением развития эпифиза, в том числе и эпифизарных зон позвонков
- Б. системным нарушением развития мышечной ткани
- В. аномалией развития почек
- Г. нарушением процессов оссификации
- Д. нейроэндокринными нарушениями

Жировая эмболия обычно возникает после травмы на:

- А. 3 сутки
- Б. 6 сутки
- В. 12 сутки
- Г. 18 сутки
- Д. 21 сутки

Среди внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плеча следует выделять

- А. чрезмышечковые переломы плеча и переломы мышечков
- Б. мышечковые (Т-образные) переломы плеча
- В. переломы блока плечевой кости
- Г. переломы головчатого возвышения
- Д. все перечисленное

Установите, какие симптомы характерны для заболеваний стоп

- А. Косолапость
- Б. Плоско-вальгусная деформация
- 1. Вальгусная установка стопы
- 2. Эквинус
- 3. Супинация
- 4. Снижение свода стопы
- 5. Приведение переднего отдела стопы
- А.)А-4,5 Б-2,4
- Б. А-2,3,5 Б-1,4
- В. А-2,4 Б-1,3,5
- Г. А-1,4 Б-2,5

Сроки активного дренирования гнойной раны составляют:

- А. от 3 до 5 суток
- Б. от 6 до 10 суток
- В. от 11 до 14 суток
- Г. сроки определяются отдельной конкретной ситуацией
- Д. верно б) и в)

Диагноз перелома зуба второго шейного позвонка устанавливается на основе спондилограммы:

- А. в передне-задней проекции
- Б. в боковой (профильной) проекции
- В. в аксиальной или полуаксиальной проекции
- Г. в передне-задней через открытый рот
- Д. правильно б) и г)

Наиболее часто вывихи возникают в

- А. тазобедренном суставе
- Б. коленном суставе
- В. плечевом суставе
- Г. локтевом суставе
- Д. лучезапястном суставе

Установите, как измеряется длина конечности

А. Абсолютная

Б. Относительная

1. От акромиального отростка лопатки до шиловидного отростка локтевой кости
2. От большого бугорка плечевой кости до шиловидного отростка локтевой кости
3. От большого вертела бедренной кости до наружной лодыжки
4. От пупка до внутренней лодыжки
5. От передней верхней ости подвздошной кости до внутренней лодыжки

А. А-2,3 Б-1,4,5

Б. А-1,3 Б-1,2,5

В. А-3 Б-1,5

Г. А-2 Б-1,3,5

Основными признаками перелома шейки бедра являются все перечисленные, кроме:

- А. боли в тазобедренном суставе
- Б. укорочения конечности
- В. симптома Гирголава
- Г. симптома "прилипшей пятки"
- Д. ротации конечности внутрь

Наиболее целесообразным методом лечения дисплазии тазобедренного сустава в раннем периоде является

- А. консервативный
- Б. гипсовые повязки
- В. функциональные шины
- Г. одномоментное закрытое вправление
- Д. оперативный

Разрыв дельтовидной связки чаще всего сопровождается:

- А. разрывом межберцового синдесмоза
- Б. разрывом наружных связок голеностопного сустава
- В. переломом пяточной и таранной костей
- Г. переломом плюсневых костей
- Д. вывихом в шопаровом суставе

Экспертизу стойкой нетрудоспособности проводят

- А. главный врач поликлиники
- Б. райздравотдел
- В. органы социального страхования
- Г. бюро медико-социальной экспертизы
- Д. клиничко-экспертная комиссия

В патогенезе сдавления мягких тканей ведущее значение имеет все перечисленное, кроме:

- А. кровотечения
- Б. интоксикации
- В. плазмопотери
- Г. чрезмерного болевого раздражения
- Д. спазма артериальных сосудов почек

Межпозвоночный диск, образовавший дефект в замыкающей пластинке позвонка и пролабиравший в тело позвонка, известен как

- А. выпячивание (выпадение) ядра диска
- Б. дегенеративный диск с костной шпорой
- В. спондилолиз
- Г. узел Шморля
- Д. ни один из вышеуказанных

Рентгенологические изменения в костях при фиброзной дисплазии характеризуются

- А. очагом деструкции с фестончатыми краями и "луковичным" периоститом
- Б. вздутыми костями, наличием кист
- В. очагом деструкции, захватывающим метафизарный отдел, зону роста и эпифиз
- Г. очагом деструкции по типу "матового стекла" и "тающего" сахара
- Д. очагом деструкции с наличием секвестроподобных тел

При травме позвоночника травма поясничного отдела занимает

- А. первое место
- Б. второе место
- В. третье место
- Г. четвертое место
- Д. пятое место

При травме наружного мыщелка большеберцовой кости, вызываемого чрезмерной абдукцией, сопровождается повреждением

- А. боковых связок
- Б. боковых и крестообразных связок
- В. внутренней большеберцовой связки, передней крестообразной связки и наружного мениска
- Г. менисков
- Д. крестообразных связок

Переломы головки плеча с полным разобщением и поворотом у молодых людей следует лечить

- А. оперативно вправляя головку и фиксируя фрагменты
- Б. удаляя головку в ранние сроки
- В. удаляя головку, производя артродез в ранние сроки
- Г. оперируя в поздние сроки, делая остеосинтез
- Д. оперируя в поздние сроки, удаляя головку

Правильное наложение кровоостанавливающего жгута характеризуется следующим условием:

- А. жгут наложен как можно туже на конечности
- Б. жгут наложен с силой, вызывающей онемение в дистальном отделе конечности
- В. жгут наложен так туго, как только остановится кровотечение
- Г. жгут наложен так, что из раны слегка сочится кровь
- Д. жгут накладывается до передавливания мышц конечности

В лечении пострадавших с тяжелыми переломами костей таза не применяются:

- А. лечение и профилактика травматического шока
- Б. восполнение потерянной при травме крови
- В. раннее вставание и активизация пострадавшего - "функциональное лечение"
- Г. репозиция смещенных отломков таза
- Д. профилактика и лечение возникающих осложнений

При ампутациях голени у детей малоберцовая кость укорачивается на:

- А. 1-2 см
- Б. 2-3 см
- В. 3-4 см
- Г. 5-6 см
- Д. 7-8 см

Болезнь Келлер-I - это

- А. остеохондропатия плюсневых костей стопы
- Б. остеохондропатия ладьевидной кости стопы
- В. атипичная форма остеомиелита костей стопы
- Г. остеохондропатия бугристости большеберцовой кости
- Д. остеохондропатия тел позвонков

Установите, какие симптомы характерны при повреждениях

- А. Ушиб
- Б. Вывих
- В. Перелом диафиза
- Г. Внутрисуставной перелом мы характерны при повреждениях

- 1. Боль
- 2. Припухлость
- 3. Патологическая подвижность
- 4. Гемартроз
- 5. Крепитация

- А. А-2 Б-1,3,4 В-1,5 Г-1,2,4 Г-4
- Б. А-1,2 Б-1,2,4 В-1,2,3,5 Г-1,2,4
- В.)А-2 Б-1, В-1,5 Г-4
- Г.)А-3 Б-5 В-1,5

Для определения группы крови следует забирать кровь для анализа

- А. до переливания высокомолекулярного декстрана
- Б. до переливания низкомолекулярного декстрана
- В. после переливания высокомолекулярного декстрана
- Г. после переливания низкомолекулярного декстрана
- Д. не имеет значения

Вид трансплантата для передней крестообразной связки, являющийся «золотым стандартом» для профессиональных атлетов - это

- А. нежная и полусухожильная мышца
- Б. четырехглавая мышца
- В. искусственный трансплантат
- Г. аллотрансплантат
- Д. связка надколенника

К наиболее часто встречающимся осложнениям травматического эпифизиолиза дистального конца бедра относятся

- А. нарушение (тромбоз) магистрального кровотока конечности
- Б. нарушение роста кости
- В. невозможность закрытой репозиции
- Г. повреждение сосудисто-нервного пучка
- Д. жировая эмболия

Синдром длительного сдавления конечности возникает в результате

- А. удара тяжелым предметом
- Б. придавливания конечности значительной тяжестью (например-тяжелая плита, стена дома)
- В. длительного нахождения жгута на конечности (более 4 час.)
- Г. сдавления циркулярной гипсовой повязкой
- Д. сдавления тесной одеждой

Установите, что является причиной развития заболеваний

- А. Диспластический сколиоз
- Б. Юношеский кифоз (болезнь Шайерман-Мау)

- 1. Травма
- 2. Нарушение соединительной ткани
- 3. Нарушение кровообращения
- 4. Дисплазия
- 5. Остеопороз

- А. А-1, 3 Б-4
- Б. А-1,2 Б-1, 2
- В. А-1 Б-2, 4
- Г. А-2, 4 Б-3

В целях диагностики частичного повреждения ахиллова сухожилия следует в первую очередь применять методы инструментального исследования

- А. термографический
- Б. полярографический
- В. УЗИ
- Г. электромиографический
- Д. рентгенографию

Дренирование плевральной полости при гемотораксе следует осуществлять через

- А. 3-е межреберье по средне-ключичной линии
- Б. 5-е межреберье по передней подмышечной линии
- В. 6-е межреберье полопаточной линии
- Г. 7-е межреберье по средней подмышечной линии
- Д. 8-е межреберье по передней подмышечной линии

В ранних фазах развития столбняка следует проводить дифференциальный диагноз:

- А. с менингитом
- Б. с отравлением стрихнином
- В. с бешенством
- Г. правильно а) и б)
- Д. со всем перечисленным

Установите, какие симптомы характерны для перелома

А. Пяточной кости

Б. Лодыжек

1. Гематома

2. Боль

3. Гемартроз голеностопного сустава

4. Снижение свода стопы

5. Подвывих стопы

А. А-1,2,4 Б-1,2,3,5

Б. А-1,3,4 Б-1,4

В. А-1,5 Б-1,4

Г. А-3,5 Б-2,4

При переломе верхней трети диафиза бедра типичным смещением отломков следует считать

А. смещение отломков по ширине, длине и под углом

Б. смещение вокруг оси

В. установка центрального отломка в положении отведения, сгибания и наружной ротации, периферического - кверху и кзади от центрального

Г. установка центрального отломка в положении приведения кнутри и кпереди, периферического - кзади вверх и под углом

Д. смещение центрального отломка кзади, периферического кпереди и кзади

Установите, чем проявляется косорукость

А. Лучевая косорукость

Б. Локтевая косорукость

1. Укорочение локтевой кости

2. Укорочение лучевой кости

3. Девиация кисти в лучевую сторону

4. Девиация кисти в локтевую сторону

5. Вывих головки лучевой кости

6. Аплазия или недоразвитие I пальца

А. А-5,6 Б-2,5

Б. А-1,4 Б-2,3

В. А-4,5,6 Б-3,5,6

Г. А-2,3,6 Б-1,4,5

Укажите положение ребенка с переломом костей таза при транспортировке:

- А. на животе
- Б. «лягушки»
- В. обе нижние конечности в строго горизонтальном положении
- Г. боковое стабилизированное положение
- Д. на боку с согнутыми ногами

Контрактура Фолькмана возникает вследствие:

- А. повреждения плечевого сплетения
- Б. продолжительного значительного, но не полного нарушения артериального кровотока
- В. короткого, измеряемого минутами, полного прекращения кровотока
- Г. двойного перелома плечевой кости
- Д. Вывиха головки плечевой кости

Каковы характерные клинические признаки остеонидной остеомы, располагающейся в длинных трубчатых костях

- А. ограничение функции близлежащего сустава
- Б. ночные боли в пораженной области
- В. постоянные боли в месте локализации, местное повышение температуры
- Г. атрофия мышц конечности

При консервативном лечении неосложненных переломов грудного отдела позвоночника чаще всего применяются

- А. скелетное вытяжение за кости черепа
- Б. вытяжение за голову петель Глиссона
- В. лямочное вытяжение за подмышечные впадины
- Г. скелетное вытяжение за кости таза
- Д. скелетное вытяжение за нижние конечности

Для перелома ключицы характерны все перечисленные признаки, кроме:

- А. верхняя конечность приподнята вверх и смещена кзади
- Б. над ключицей деформация и припухлость
- В. надключичная ямка сглажена
- Г. расстояние от позвоночника до медиального края лопатки увеличено на стороне повреждения
- Д. боль в области перелома

Для оскольчатых переломов костей свода черепа характерно

- А. вдавление в полость черепа с повреждением твердой мозговой оболочки
- Б. разделение костных фрагментов пересекающимися трещинами
- В. радиарное расхождение трещин от центра перелома
- Г. наложение одного костного фрагмента на другой
- Д. линейная форма перелома

Чаще всего из костей запястья ломается кость

- А. ладьевидная
- Б. трехгранная
- В. полулунная
- Г. крючковидная
- Д. большая многоугольная

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава состоит из

- А. головки, ножки эндопротеза
- Б. вкладыша, головки, ножки эндопротеза
- В. вертлужного компонента, ножки эндопротеза
- Г. вертлужного компонента, головки эндопротеза
- Д. вертлужного компонента, головки, вкладыша, ножки эндопротеза

В практике лечения неосложненных переломов поясничного отдела позвоночника применяются

- А. стяжки за дужки при помощи фиксатора Ткаченко
- Б. стяжки за остистые отростки при помощи фиксатора Цивьяна - Рамиха
- В. стяжки за остистые отростки лавсановой лентой
- Г. транспедикулярная фиксация
- Д. стяжки за остистые отростки проволокой (по Новаку)

Симптом Томпсона при подкожном разрыве ахиллова сухожилия это

- А. западение мягких тканей в области разрыва ахиллова сухожилия
- Б. невозможность стоять и ходить на пальцах поврежденной конечности
- В. отсутствием подошвенного сгибания стопы при сдавлении трехглавой мышцы голени
- Г. резкое ограничение супинации стопы
- Д. ощущение щелчка при разрыве ахиллова сухожилия

Установите, какие повреждения характерны при нестабильности коленного сустава

А. Антеромедиальная

Б. Постеролатеральная

1. Наружной боковой связки

2. Внутренней боковой связки

3. Наружного мениска

4. Внутреннего мениска

5. Передней крестообразной связки

6. Задней крестообразной связки

А. А-3,4 Б-2,5

Б. А-2,6 Б-4,5

В. А-5,6 Б-2,4

Г. А-2,4,5 Б-1,3,6

К понятию хирургической обработки раны относится

А. смазывание краев раны йодом, наложение повязки, внутримышечная инъекция антибиотиков

Б. промывание раны, обкалывание ее антибиотиками

В. удаление из раны инородных тел, обработка антисептиками, дренирование раны

Г. обработка кожи вокруг раны, анестезия, иссечение краев раны (кроме ран лица и кисти), удаление сгустков крови и инородных тел, обработка раны антисептиками, ревизия, гемостаз, восстановление поврежденных структур, ушивание кожи, повязка

Д. обработка кожи антисептиками, ревизия раны, гемостаз и наложение асептической повязки

Регенерация костной ткани наиболее продолжительна

А. в раннем возрасте

Б. в юности

В. в среднем возрасте

Г. у долгожителей

Д. в старческом возрасте

Треугольник Гютера определяется в положении

А. полного разгибания предплечья

Б. частичного разгибания в локтевом суставе

В. при согнутом предплечье под углом 40°

Г. при пронированном предплечье

Д. при супинированном предплечье

Вывих акромиального конца ключицы характеризуется

- А. признаком Маркса
- Б. симптомом "треугольной подушки"
- В. симптомом "клавиши"
- Г. симптомом Томпсона
- Д. симптом «выдвижного ящика»

По механизму повреждения различают следующие виды тупой травмы грудной клетки, за исключением:

- А. ушиба грудной клетки
- Б. сдавления грудной клетки в передне-заднем направлении
- В. сдавления грудной клетки в поперечном направлении
- Г. сдавления грудной клетки в косо-поперечном направлении
- Д. сотрясения грудной клетки

Операция отчленения конечности на уровне сустава называется

- А. ампутацией
- Б. экзартикуляцией
- В. первичной хирургической обработкой
- Г. костнопластической операцией
- Д. фасциопластической операцией

Признаками перелома пяточной кости являются:

- А. боли в области пяточной кости, уплощение свода стопы, деформация голеностопного сустава, опущение вершушек лодыжек на стороне перелома пяточной кости
- Б. деформация голеностопного сустава и смещение внутренней лодыжки вверх
- В. гемартроз голеностопного сустава, уплощение внутреннего свода стопы
- Г. боль в области расположения пяточной кости
- Д. отсутствие деформации голеностопного сустава

К первично-хроническому остеомиелиту относится

- А. Огнестрельный остеомиелит
- Б. Внутрикостный абсцесс Броди
- В. Посттравматический остеомиелит
- Г. Эпифизарный гематогенный остеомиелит

Оптимальным хирургическим доступом для лечения изолированного перелома дистального метаэпифиза лучевой кости типа colles является

- А. Комбинированный (тыльный и ладонный)
- Б. Ладонный расширенный (Henry)
- В. Тыльный (Thompson)
- Г. Ладонный (Orbay)

При изолированном переломе малого вертела бедренной кости срок иммобилизации нижней конечности у детей составляет (в неделях)

- А. 4-5
- Б. 3-4
- В. 2-3
- Г. 1-2

Под вертебропластикой понимают введение костного цемента в

- А. Основание черепа
- Б. Тело позвонка
- В. Копчик
- Г. Межпозвонковый диск

У больного после автомобильной катастрофы с поверхностным парадоксальным дыханием и сильной болью при вдохе вероятным является диагноз

- А. Гемоперикард
- Б. Травматический разрыв главного бронха
- В. Множественные переломы рёбер
- Г. Разрыв органов брюшной полости

Выраженность сколиотической дуги искривления в 38 градусов соответствует ____ степени тяжести

- А. Первой
- Б. Второй
- В. Четвертой
- Г. Третьей

Консервативное лечение фиброзной остеодисплазии

- А. Предусматривает медикаментозное лечение
- Б. Предусматривает физиотерапевтическое лечение
- В. Не проводится
- Г. Предусматривает аппаратотерапию

Величина ацетабулярного угла в норме у ребенка первого года жизни составляет (в градусах)

- А. 20
- Б. 40
- В. 30
- Г. 50

Эффективным методом лечения вывихов нижних шейных (сiii-cvii) позвонков является

- А. Закрытое или открытое вправление и спондилодез
- Б. Закрытое ручное одномоментное вправление по Рише – Гютеру
- В. Иммобилизация шейного отдела позвоночника воротником Шанца
- Г. Закрытое вправление и иммобилизация скелетным вытяжением за теменные бугры черепа

Стабильность акромиально-ключичного сочленения не зависит от _____ связки/связок

- А. Клювовидно-акромиальной
- Б. Конусовидной
- В. Акромиально-ключичных
- Г. Трапецевидной

Наиболее характерным рентгенологическим симптомом для первичной ретикулоклеточной саркомы является

- А. Пластинчатая деструкция
- Б. Мелкоочаговый характер деструкции
- В. Игольчатый периостит
- Г. Крупноочаговая деструкция

Если в процессе дистракции у пациента появляются боли в поражённом сегменте, необходимо

- А. Продолжить дистракцию, но в меньшем темпе, в сочетании с аналгетиками
- Б. Продолжить дистракцию, но в меньшем темпе, в сочетании с физиотерапией
- В. Прекратить дистракцию на 2-3 дня
- Г. Осуществить компрессию 2-3 мм и сделать перерыв

На первом этапе по протоколу damage control orthopedics у пациентов с политравмой выполняется

- А. Фиксация переломов аппаратами внешней фиксации
- Б. Остеосинтез переломов интрамедуллярными фиксаторами
- В. Остеосинтез переломов пластинами
- Г. Пластика дефекта мягких тканей

Ведущим начальным симптомом при остеогенной саркоме является

- А. Пальпируемая опухоль
- Б. Перемежающаяся хромота
- В. Появление ночных болей в зоне расположения опухоли
- Г. Повышение СОЭ

Количество сегментов шейного отдела спинного мозга равно

- А. 6
- Б. 2
- В. 8
- Г. 7

Летальность среди пациентов с политравмой в остром периоде в наименьшей степени обусловлена

- А. Тромбоэмболией легочной артерии
- Б. Шоком и кровопотерей
- В. Гнойными осложнениями
- Г. Тяжелой черепно-мозговой травмой

Для определения степени тяжести сколиоза используется классификация

- А. Вредена
- Б. Приорова
- В. Чаклина
- Г. Турнера

Патологическая установка стопы при врождённой косолапости складывается из

- А. Приведения, пронации и тыльного сгибания
- Б. Отведения, супинации и подошвенного сгибания
- В. Отведения, пронации и фиксации стопы в среднем положении
- Г. Приведения, супинации и подошвенного сгибания

Симптом «пустой ацетабулярной ямки» при ультразвуковом сканировании типичен для сустава _____ типа

- А. Транзиторного (1, Б)
- Б. 4
- В. 2 А, Б
- Г. 3 А, Б

Сила мышцы не зависит от ее длины в _____ режиме измерения

- А. Изодинамическом
- Б. Изотоническом
- В. Изокинетическом
- Г. Изометрическом

Аддитивные технологии изготовления имплантатов для погружного остеосинтеза обеспечивают

- А. Общедоступность имплантата
- Б. Универсальность имплантата
- В. Персонализацию и биологическую активность имплантата
- Г. Химическую уникальность имплантата

К тестам менисков относят тест

- А. Чувствительности фасеток
- Б. Чувствительности Фэйрбэнка
- В. МакКоннелла
- Г. Белера - Кремера

Мозаичная костно-хрящевая аутопластика показана при

- А. Наличии свободных внутрисуставных тел
- Б. Глубоких остеохондральных повреждениях мыщелков
- В. Привычном вывихе надколенника
- Г. Поверхностных хондральных повреждениях мыщелков

Под болезнью شوерман – мау понимают

- А. Рассекающий остеохондрит медиального мыщелка бедренной кости
- Б. Остеохондропатию апофизов тел позвонков
- В. Остеохондропатию головки плечевой кости
- Г. Остеохондропатию проксимального метафиза большеберцовой кости

Перелом дна вертлужной впадины сопровождается

- А. Центральным вывихом бедра
- Б. Удлинением конечности
- В. Невритом
- Г. Укорочением конечности

Закрытую репозицию надмыщелкового перелома плечевой кости у детей начинают

- А. Со смещения по ширине
- Б. С углового смещения
- В. С устранения ротационного смещения
- Г. Со смещения по длине

Чаще всего с применением пневмографии исследуется сустав

- А. Голеностопный
- Б. Плечевой
- В. Тазобедренный
- Г. Коленный

Если происходит падение при неполном сгибании в локтевом суставе, то вывих предплечья кпереди, как правило, сопровождается переломом

- А. Локтевого отростка
- Б. Головчатого возвышения
- В. Внутреннего надмыщелка
- Г. Венечного отростка

Для ахондроплазии характерна

- А. Изодактилия
- Б. Синдактилия
- В. Повышенная ломкость костей
- Г. Афангия

При полном взрывном переломе происходит повреждение

- А. Краниальной и каудальной замыкательных пластинок
- Б. Только краниальной замыкательной пластинки
- В. Только каудальной замыкательной пластинки
- Г. Тел позвонка и отростков

При частичном сохранении контакта между суставными поверхностями вывих называется

- А. Подвывихом
- Б. Предвывихом
- В. Переломовывихом
- Г. Песостоявшимся

В нормальном (здоровом) голеностопном суставе невозможно движение

- А. Супинации – 30°
- Б. Ротации – 45°
- В. Пронации – 20°
- Г. Тыльного сгибания – 20°

При множественных переломах костей в первую очередь целесообразно стабилизировать

- А. Большеберцовую кость
- Б. Бедренную кость
- В. Плечевую кость
- Г. Кости предплечья

К капсуле локтевого сустава сзади прилежит ____ нерв

- А. Локтевой
- Б. Срединный
- В. Мышечно-кожный
- Г. Лучевой

Под длиной голени понимают расстояние от ____ наружной лодыжки

- А. Нижнего полюса надколенника до нижнего края
- Б. Щели коленного сустава до нижнего края
- В. Верхнего полюса надколенника до нижнего края
- Г. Щели коленного сустава до середины

Если вывих произошел между 6 и 7 шейными позвонками, то вывихнутым позвонком считается

- А. 4
- Б. 6
- В. 5
- Г. 7

Планирование коррекции деформации в истинной плоскости (oblique plan of deformity correction) используют для

- А. Возможности устранить одновременно угловую деформацию, определяющуюся на прямой и боковой рентгенограммах
- Б. Выбора типа коррекции: одномоментного или дозированного
- В. Введения найденных параметров в компьютерную программу ортопедического гексапода
- Г. Выбора типа остеотомии: поперечной или косой

Ручное вправление заднего вывиха предплечья предполагает тягу по оси предплечья

- А. Кпереди при согнутом под прямым углом локтевом суставе с одновременной тягой за дистальную треть плеча кзади
- Б. При согнутом под прямым углом локтевом суставе с одновременной тягой за проксимальную треть предплечья кзади и тягой за дистальную треть плеча кпереди
- В. И его супинацию с давлением на головку лучевой кости при согнутом под прямым углом локтевом суставе
- Г. И супинационно-пронационные движения до полного разгибания в локтевом суставе, после чего – давление на головку лучевой кости с супинацией и сгибанием в локтевом суставе

Причиной истинного (истмического) спондилолистеза является

- А. Идиопатический сколиоз
- Б. Остеолизис дуги позвонка в межсуставной области или в области ножки дуги вследствие усталостного перелома
- В. Врожденная аномалия развития задних опорных структур позвонка
- Г. Травма позвоночника

Тканевая инженерия использует искусственные матрицы (скаффолды) после их

- А. Предварительной обработки гамма излучением
- Б. Предварительной обработки активным кислородом
- В. Предварительного насыщения остеогенными клетками или химическими или физическими стимуляторами
- Г. Предварительного выдерживания в подкожной жировой прослойке (естественный биореактор)

Для прогнозирования тяжести течения сколиоза позвоночника используются тесты, характеризующие

- А. Сакрализацию 5-го поясничного позвонка
- Б. Степень недоразвития 12-й пары ребер
- В. Возраст появления сколиоза и его локализацию
- Г. Степень стабильности позвоночника

Смертность детей в течение первых 12 месяцев жизни называется

- А. Младенческой
- Б. Перинатальной
- В. Неонатальной
- Г. Детской

Выраженность сколиотической дуги искривления в 8 градусов соответствует ____ степени тяжести

- А. Первой
- Б. Четвертой
- В. Третьей
- Г. Второй

Вправление первичного травматического вывиха грудинного конца ключицы осуществляется

- А. Врачами в машине скорой помощи
- Б. Амбулаторно под местной анестезией
- В. Стационарно под наркозом
- Г. На дому

Мышцы - затыжки поперечного свода стопы включают

- А. Длинный сгибатель пальцев
- Б. Переднюю большеберцовую мышцу
- В. Длинную малоберцовую мышцу
- Г. Межкостные мышцы

Амбулаторное лечение сколиозов не проводится детям

- А. Не имеющим искривления позвоночника, но с наличием торсии до 10°
- Б. С нестабильной формой сколиоза или со сколиозом 1 степени в начале пубертатного периода
- В. С углом искривления позвоночника до 10° , торсией $5-10^\circ$ без признаков прогрессирования
- Г. С впервые выявленным сколиозом 1-2 степени с законченным ростом позвоночника

Под повреждением монтеджи понимают

- А. Перелом лучевой кости и вывих головки локтевой кости
- Б. Перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости
- В. Расходящийся вывих в локтевом суставе
- Г. Вывих в локтевом суставе с переломом внутреннего надмыщелка и его интерпозицией в полость сустава

Контрактура дюпюитрена характеризуется контрактурой

- А. Посттравматической сгибательной пальцев кисти
- Б. Пальцев кисти вследствие повреждения локтевого и срединного нервов на уровне предплечья
- В. Пальцев и кисти вследствие повреждения плечевой артерии
- Г. Сгибательной пальцев кисти вследствие заболевания ладонного апоневроза

Чрезмерное растяжение позвоночника, что влечёт за собой разрыв спинных мышц и межпозвонковых дисков, возникает при _____ переломе

- А. Дистракционном
- Б. Вращательном
- В. Ротационном
- Г. Компрессионном

Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются

- А. Демографические показатели
- Б. Рождаемость и смертность
- В. Показатели физического развития
- Г. Заболеваемость и инвалидность

Основным симптомом при синдроме «запястного канала» является

- А. Ограничение движений в лучезапястном суставе
- Б. Крепитация в области запястного канала
- В. Онемение I, II, III пальцев
- Г. Боль в области запястья с ладонной стороны

Под длиной плеча понимают расстояние от

- А. Середины ключицы до локтевого отростка
- Б. Акромиального отростка лопатки до головки лучевой кости
- В. Акромиального отростка лопатки до наружного надмыщелка плечевой кости
- Г. Середины ключицы до наружного надмыщелка плечевой кости

Газовый режим тканей позволяет оценить

- А. Метод водородного клиренса
- Б. Полярография
- В. Лазерная доплеровская флоуметрия
- Г. Ультразвуковая доплерография

Перелом трехгранной кости чаще возникает при падении на кисть, находящуюся в положении _____ отведения

- А. Ладонного сгибания и локтевого
- Б. Тыльного разгибания и лучевого
- В. Тыльного разгибания и локтевого
- Г. Ладонного сгибания и лучевого

Переломы тела, углов лопатки без смещения лечатся при помощи

- А. Повязки Дезо
- Б. Гипсовой лонгетой от здорового надплечья
- В. Косыночной повязки
- Г. Гипсовой повязки по Вайнштейну

При оперативном лечении переломов диафиза плеча для остеосинтеза предпочтительно использование

- А. Деротационных накостных пластинок
- Б. Различных внутрикостных штифтов
- В. Винтов
- Г. Проволоки

Неполный вывих акромиального конца ключицы происходит при

- А. Разрыве только акромиально-ключичной связки
- Б. Разрыве только клювовидно-ключичной связки
- В. Полном разрыве акромиально-ключичной и ключично-клювовидной связок
- Г. Растяжении ключично-акромиальной связки

Методом выбора при лечении полного вывиха акромиального конца ключицы является

- А. Фиксация верхней конечности повязкой типа Дезо
- Б. Фиксация надплечья кольцами Дельбе
- В. Пластика клювовидно-ключичных связок
- Г. Фиксация верхней конечности в положении отведения до 90° и наружной ротации

У молодых лиц 24-40 лет с деформирующим артрозом коленного сустава i-ii стадий и нестабильностью сустава рекомендуется

- А. Высокая корригирующая остеотомия большеберцовой кости
- Б. Эндопротезирование коленного сустава
- В. Стабилизирующая операция на коленном суставе с восстановлением связочного аппарата
- Г. Артродез коленного сустава

При переломе мыщелков большеберцовой кости ходьбу с нагрузкой оперированной конечности после остеосинтеза с костной пластикой начинают

- А. Не ранее 4 месяцев и только после рентгенологического подтверждения консолидации
- Б. После снятия швов (12-14 сутки) для восстановления функции
- В. Через 2-3 месяца для стимуляции остеогенеза
- Г. Через 1-2 месяца для стимуляции остеогенеза

Ведущим клиническим симптом при болезни Блаунта является

- А. Варусная деформация голени
- Б. Вальгусная деформация голени
- В. Выраженный болевой синдром
- Г. Укорочение пораженной конечности

Ограничение объема пассивного и/или активного отведения и наружной ротации в плечевом суставе возникает при спастичности в _____ мышцах

- А. Большой грудной, подлопаточной
- Б. Большой и малой ромбовидных
- В. Надостной и подостной
- Г. Дельтовидной и двухглавой

Определение крепитации является нежелательной манипуляцией при переломе хирургической шейки плечевой кости, так как может вызвать травму

- А. Дельтовидной мышцы
- Б. Кожы
- В. Сосудисто-нервного пучка
- Г. Суставной капсулы

При изолированном переломе большого вертела бедренной кости срок иммобилизации нижней конечности у детей составляет (в неделях)

- А. 1-2
- Б. 4-5
- В. 2-3
- Г. 3-4

К оптимальным методам лечения многооскольчатых переломов диафиза бедра относят

- А. Скелетное вытяжение и гипс
- Б. Накостный остеосинтез
- В. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
- Г. Наложение кокситной повязки после одномоментной репозиции

При лечении диафизарного перелома методом остеосинтеза можно рекомендовать активные движения в суставах оперированной конечности

- А. С первых дней
- Б. Через 4 недели
- В. Через 2 недели
- Г. Через 1 неделю

Физиологическое отведение в тазобедренном суставе составляет (в градусах)

- А. 40-45
- Б. 30-35
- В. 20-25
- Г. 10-15

По классификации позвонки являются _____ костью

- А. Плоской
- Б. Трубчатой
- В. Воздухоносной
- Г. Смешанной

Под термином «панариций» понимают воспаление

- А. Подкожно-жировой клетчатки пальца
- Б. Кожи пальца
- В. Кости (фаланги пальца)
- Г. Всех тканей пальца

К патогномоничному признаку сложной формы расщепления кисти можно отнести наличие

- А. Клинодактилии
- Б. Конкресценции пястных костей
- В. Синдактилии
- Г. Поперечно расположенной фаланги

Для анализа и планирования коррекции деформаций бедренной кости в сагиттальной плоскости следует использовать

- А. Только общую механическую ось
- Б. Анатомические оси фрагментов
- В. Механические оси фрагментов
- Г. Анатомическую ось проксимального фрагмента и механическую – дистального фрагмента

Метастазы при саркомах костей чаще всего обнаруживают в

- А. Лимфатических узлах
- Б. Печени
- В. Других костях скелета
- Г. Лёгких

Операция альбрехта при плоскостопии заключается в артродезе сустава

- А. Медиального плюсне-ладьевидного
- Б. Первого плюсне-клиновидного
- В. Первого плюсне-фалангового
- Г. Шопара

Повреждение галеацци характеризуется

- А. Переломом локтевой кости и вывихом лучевой кости в плече-лучевом сочленении
- Б. Переломом диафиза лучевой кости и вывихом в лучелоктевом сочленении
- В. Переломом диафиза лучевой кости и переломом диафиза локтевой кости
- Г. Переломом лучевой кости и дивергирующим вывихом в локтевом суставе

Ось сгибания-разгибания коленного сустава находится

- А. На пересечении линии задней кортикальной пластинки бедренной кости с линией крыши межмыщелковой ямки бедренной кости
- Б. На пересечении механических осей бедренной и большеберцовой костей
- В. На пересечении механической оси бедренной кости и линии, касательной к наиболее выступающим точкам мыщелков бедренной кости
- Г. Посередине между мыщелками бедренной и большеберцовой костей

Протезирование культи после отморожения предусматривает

- А. Замену приёмной части культи в протезе, сделанном в первые 2,5-3 недели
- Б. Применение временных тренировочных протезов
- В. Изготовление постоянного протеза сразу после ампутации на операционном столе
- Г. Изготовление временного гипсового культеприемника на операционном столе

Измерение подфасциального давления необходимо при

- А. Оскольчатом переломе лучевой кости в типичном месте со смещением костных отломков
- Б. Диагностике синдрома сдавления мягких тканей предплечья и голени
- В. Переломе диафизарной части бедренной кости
- Г. Переломе шейки бедренной кости со смещением костных отломков

К основным рентгенологическим признакам гигантоклеточной опухоли относят

- А. Литический процесс с переходом через эпифизарную пластинку и суставной хрящ
- Б. Полость в метафизе без признаков лизиса или гиперпластических образований
- В. Литический процесс без периостальной реакции
- Г. Гиперпластический процесс с периостальной реакцией на локализацию опухоли

Виды аномалии развития позвоночника и ребер исключают

- А. Клиновидную форму нескольких позвонков
- Б. Увеличенные дужки позвонков
- В. Наличие дополнительных шейных или поясничных ребер
- Г. Сращение ребер с одной или двух сторон

Вторым этапом для остановки внутритазового кровотечения при нестабильных переломах костей таза у пациентов с политравмой является

- А. Фиксация С-рамой
- Б. Тампонада таза
- В. Ангиоэмболизация
- Г. Перевязка ветвей подвздошных артерий

При вальгусной деформации первого пальца стопы типичной формой сопутствующей деформации стопы является

- А. Вальгусная
- Б. Поперечно-распластанная
- В. Полая
- Г. Пяточная

Основным клиническим симптомом тяжести открытого перелома голени является

- А. Размер раны
- Б. Оскольчатый характер перелома
- В. Наличие кровотечения в области перелома
- Г. Болевая контрактура смежных суставов

«Молодая» гигрома характеризуется

- А. Появлением только у молодых людей
- Б. Исчезновением при надавливании пальцем или изменением положения
- В. Не исчезновением при надавливании пальцем или изменением положения
- Г. Маленькими размерами

Одним из основных принципов охраны здоровья является

- А. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
- Б. Социальная защита граждан РФ
- В. Безусловное выполнение пожеланий пациента по выбору методов диагностики и лечения
- Г. Взаимодействие со средствами массовой информации

Максимальный объем информации о повреждениях мягкотканых структур позвоночника и спинного мозга дает

- А. УЗИ
- Б. МСКТ
- В. Сцинтиграфия
- Г. МРТ

К наиболее распространенным причинам отрыва сухожилия длинной головки бицепса плеча относят

- А. Воздействие низких температур
- Б. Дегенеративно-дистрофические изменения
- В. Врожденную патологию
- Г. Разрыв ротаторной манжеты плеча

В состав функций врачебной комиссии не входит

- А. Принятие решения по вопросу приема на работу и увольнения сотрудников
- Б. Принятие решения по вопросу направления пациента на медико-социальную экспертизу в соответствии с законодательством РФ
- В. Принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи
- Г. Продление листов нетрудоспособности в случаях, установленных законодательством РФ