

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Акушерское дело» для аккредитации**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:  
[https://medik-otvet.ru/product/akusherskoe\\_delo/](https://medik-otvet.ru/product/akusherskoe_delo/)

### **ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ЯИЧНИКА ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ**

- 1) прогестерон
- 2) пролактин
- 3) окситоцин
- 4) вазопрессин

### **ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- 1) природных лечебных ресурсов
- 2) физических лечебных средств и упражнений
- 3) специальной аппаратуры и оборудования
- 4) методов акупунктуры и акупрессуры

### **В ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ МАССАЖА, ПОМИМО ПРИЕМОВ ПОГЛАЖИВАНИЯ, РАСТИРАНИЯ, РАЗМИНАНИЯ, ПРИМЕНЯЮТ РАСТЯГИВАНИЕ И**

- 1) выкручивание
- 2) прижигание
- 3) электромассажные вибрации
- 4) интенсивное разбивание

### **ГРЯЗИ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В БОЛОТИСТЫХ МЕСТАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТИЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ РАСТЕНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ \_\_\_\_\_ ГРЯЗЕЙ**

- 1) сапротелевых
- 2) торфяных
- 3) сопочных
- 4) сульфидных

### **К СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСИТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) головной боли в затылочной области
- 2) изменения вкусовых пристрастий
- 3) отеков нижних конечностей
- 4) активных шевелений плода

### **К ПРИЗНАКУ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ**

- 1) тонические судороги
- 2) клонические судороги
- 3) фибриллярные подергивания мышц лица
- 4) боль в эпигастральной области

### **БЕРЕМЕННЫМ ПАЦИЕНТКАМ ПРОТИВОПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ**

- 1) кори
- 2) гриппа
- 3) гепатита
- 4) столбняка

### **МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) определение нахождения предлежащей части плода
- 2) определение зрелости шейки матки
- 3) измерение окружности живота
- 4) проведение пельвиометрии

### **В СЛУЧАЕ ЧУВСТВА НАБУХАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, СЦЕЖИВАНИЕ МОЛОКА ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ С \_\_\_\_\_ СТОРОНЫ**

- 1) больной
- 2) правой
- 3) левой
- 4) здоровой

### **ПРИ МАСТИТЕ ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ САМОМАССАЖ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ**

- 1) риска хирургического вмешательства
- 2) температуры тела
- 3) болевого синдрома
- 4) выработки грудного молока

### **НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА НОВОРОЖДЕННОМУ НА ФОНЕ АДЕКВАТНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОКАЗАН ПРИ ЧАСТОТЕ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МЕНЕЕ \_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 120
- 2) 100
- 3) 60
- 4) 80

### **К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТ**

- 1) плавание

- 2) силовые упражнения
- 3) лечебную гимнастику
- 4) терренкуры

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хламидия
- 2) стафилококк
- 3) трихомонада
- 4) гонококк

**ПРИ МАСТИТЕ ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ \_\_\_\_\_ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ**

- 1) согревание
- 2) бинтование
- 3) самомассаж
- 4) сцеживание

**ТРЕТЬИМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) вставление
- 2) позицию
- 3) предлежание
- 4) положение

**ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ % ОЦК**

- 1) 1
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 10

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ МАССЫ ПЛОДА НЕОБХОДИМО**

- 1) к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки
- 2) разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- 3) умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- 4) от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки

**ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ МОНОКЛОНАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК ТЕЛА МАТКИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) фиброма
- 2) миома
- 3) ангиома
- 4) саркома

**ПАЦИЕНТКАМ, ПЕРЕНЕСШИМ РАЗРЫВ МАТКИ В РОДАХ, РЕКОМЕНДОВАНО**

**ПОВТОРНОЕ ПЛАНОВОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 42
- 2) 40
- 3) 39
- 4) 41

**ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФЕКЦИИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН САН-ЭПИД. НАДЗОРА НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 24
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 12

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЛФК В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) опущение стенок влагалища
- 2) наличие швов на промежности
- 3) разрыв промежности 3-й степени
- 4) стрессовое недержание мочи

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 18
- 2) 22
- 3) 16
- 4) 20

**ОСМОТР ОФТАЛЬМОЛОГА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМ**

- 1) женщинам, обращающимся по желанию
- 2) только женщинам с конъюнктивитом
- 3) всем женщинам
- 4) только женщинам после оперативной коррекции зрения

**ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПОКАЗАНА ПРИ**

- 1) перекруте ножки опухоли
- 2) трихомонадном кольпите
- 3) гиперплазии эндометрия
- 4) кандидамикозе

**ЗДОРОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЙ С ЧАСТОТОЙ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) 70
- 2) 100
- 3) 170

4) 80

**РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ \_\_\_\_\_  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- 1) паразитарными
- 2) грибковыми
- 3) вирусными
- 4) стрептококковыми

**НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО БОЛЕЕ \_\_\_\_\_  
СМ**

- 1) 50
- 2) 52
- 3) 47
- 4) 45

**СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В ПАКЕТЫ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 6 месяцев
- 2) 3 месяца
- 3) 3 года
- 4) 5 лет

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) менингит
- 2) пневмония
- 3) перикардит
- 4) холецистит

**ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ГИПОТОНИЕЙ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) проведении дезинтоксикационной терапии
- 2) применении слабительных препаратов
- 3) применении гипотензивных препаратов
- 4) проведении инфузионной терапии

**КРОВЬ II ГРУППЫ СОДЕРЖИТ АГГЛЮТИНОГЕН**

- 1) А
- 2) А и В
- 3) С
- 4) В

**ГНОЙНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ МИКРОБНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) опухоль

- 2) гематома
- 3) абсцесс
- 4) киста

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ**

- 1) крови на белок
- 2) крови на реакцию Вассермана (RW)
- 3) крови на хорионический гонадотропин (ХГЧ)
- 4) мочи на белок

**РЕКОМЕНДУЮТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ РЕГУЛЯРНЫЕ НЕУТОМИТЕЛЬНЫЕ ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ ЕЖЕДНЕВНО ПО \_\_\_\_\_ ЧАСА**

- 1) 3 - 4,5
- 2) 1,5 - 2
- 3) 1 - 1,5
- 4) 2,5 - 3

**ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ, ПРИ КОТОРОМ ОНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЕТ ВНУТРЕННИЙ ЗЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) низким
- 2) краевым
- 3) неполным
- 4) полным

**СОЧЕТАНИЕ МАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОДНОГО ПЛОДНОГО ЯЙЦА И ВНЕМАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДРУГОГО НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ БЕРЕМЕННОСТЬЮ**

- 1) эктопической
- 2) гетеротопической
- 3) фимбриальной
- 4) истмической

**ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НАЗНАЧАЮТ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ**

- 1) через 3 месяца
- 2) через 1 месяц
- 3) сразу после аборта
- 4) через 2 месяца

**ЛУЧЕВЫЕ ОЖОГИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕМ**

- 1) ультрафиолетовым
- 2) рентгеновским
- 3) микроволновым
- 4) радиоволновым

**ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ КРОВИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тромбоз
- 2) язва
- 3) пролежни
- 4) кровотечение

**ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 8
- 2) 12
- 3) 16
- 4) 20

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пневмококк
- 2) стрептококк
- 3) гонококк
- 4) стафилококк

**С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВБИ И ИХ ПЕРЕНОСЧИКОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОВОДИТСЯ \_\_\_\_\_ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

- 1) очаговая
- 2) профилактическая
- 3) гигиеническая
- 4) заключительная

**МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гидротерапия
- 2) аудиоанальгезия
- 3) рефлексотерапия
- 4) эпидуральная анестезия

**ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПНЕВМОНИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) простейшие
- 2) вирусы
- 3) бактерии
- 4) грибы

**ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) хромосомной патологии
- 2) синдромов с множественными врожденными пороками развития
- 3) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом
- 4) мультифакториальных болезней

**РОЖЕНИЦЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ТУЖИТЬСЯ**

- 1) при положительных признаках отделения последа
- 2) при наружном повороте головки
- 3) при прорезывании теменных бугров
- 4) после рождения головки

**К ФОРМИРОВАНИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРИВОДИТ ПЕРЕНЕСЁННАЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) краснуха
- 2) ВИЧ-инфекция
- 3) пищевая токсикоинфекция
- 4) рожа

**РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) двух
- 2) четырех
- 3) трех
- 4) пяти

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лактостаз
- 2) разрыв промежности
- 3) потеря массы новорожденного
- 4) асимметрия молочных желез

**КУРС НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ УВЧ-ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ЭНДОМЕТРИТЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕДУР**

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 14

**ЗАЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) материнством
- 2) карьерой
- 3) реализацией
- 4) достижением

**УЧАЩЕННОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) никтурия
- 2) олигоурия
- 3) дизурия
- 4) полиурия

**ПРИЕМ ПИЩИ В РОДАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) разрешен
- 2) добавлен
- 3) запрещен
- 4) ограничен

**ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКОВ  
БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) вероятных
- 2) предположительных
- 3) сомнительных
- 4) достоверных

**ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) цетиризин
- 2) левомепромазин
- 3) аминазин
- 4) этаперазин

**ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ФАКТОР**

- 1) рефлюксный
- 2) антиперистальтический
- 3) сфинктерный
- 4) трубно-перитонеальный

**К МЕТОДУ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМУ СВОЕВРЕМЕННО ОКАЗЫВАТЬ  
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ МАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ПОРАЖЕННЫХ,  
ОТНОСЯТ**

- 1) организованную эвакуацию
- 2) выведение из очага
- 3) оказание неотложной помощи
- 4) медицинскую сортировку

**ПРИОРИТЕТНЫМ ДОСТУПОМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эндотрахеальный
- 2) сублингвальный
- 3) внутривенный
- 4) внутримышечный

**САМЫМ КРУПНЫМ НЕРВОМ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бедренный
- 2) срединный
- 3) запирательный
- 4) седалищный

## **ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) на левом боку
- 2) с приподнятыми нижними конечностями
- 3) на правом боку
- 4) с возвышенным изголовьем

## **ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти
- 2) международная номенклатура заболеваний
- 3) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- 4) международная классификация заболеваний и травм

## **ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ РОЖДЕНИИ СУБМУКОЗНОГО УЗЛА МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) выворот матки
- 2) разрыв матки
- 3) разрыв промежности
- 4) выпадение петель кишечника

## **ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА**

- 1) крупный плод
- 2) перенашивание
- 3) макросомия плода
- 4) задержка роста плода

## **ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ**

- 1) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)
- 2) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)
- 3) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп)
- 4) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)

## **ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ**

- 1) изгнания плода
- 2) раскрытия
- 3) прелиминарным
- 4) предвестниковым

## **К ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) сальпингоофорит
- 2) эндометрит

- 3) парауретрит
- 4) цервицит

**УМЕРЕННАЯ АСФИКСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА, ЕСЛИ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР НА 1-ОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ БАЛЛА(ОВ)**

- 1) 1-3
- 2) 7-10
- 3) 4-6
- 4) 0-3

**ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ПРОЛОНГИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мизопростол
- 2) дротаверин
- 3) дидрогестерон
- 4) мифепристон

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ФОРМОЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ БЕРЕМЕННОСТЬ**

- 1) яичниковая
- 2) трубная
- 3) шейная
- 4) брюшная

**АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДДЕРЖАНИЕ**

- 1) температуры тела
- 2) объема крови
- 3) осмотического давления
- 4) онкотического давления

**ДЛИНА ВОЛНЫ 180–280 НМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕ**

- 1) коротковолновое ультрафиолетовое
- 2) красное
- 3) инфракрасное
- 4) средневолновое ультрафиолетовое

**ОТСУТСТВИЕ АГГЛЮТИНОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ \_\_\_\_\_ ГРУППЫ КРОВИ**

- 1) второй
- 2) первой
- 3) четвертой
- 4) третьей

**В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТОКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДОВАН**

- 1) нифедипин
- 2) динопрост
- 3) синэстрол
- 4) кальция хлорид

**ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) зрелая шейка матки
- 2) нерегулярные сокращения матки
- 3) перемещение центра тяжести тела
- 4) уменьшение объема околоплодных вод

**АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ НА \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЕ ГЕСТАЦИИ**

- 1) 40
- 2) 30
- 3) 20
- 4) 10

**К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) зидовудин
- 2) азитромицин
- 3) ремантадин
- 4) ацикловир

**ПОСЛЕДНЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) менархе
- 2) дисменорея
- 3) олигоменорея
- 4) менопауза

**ТЕРМИН «...URIA» (МАЛОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ) СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ ПРИСТАВКУ**

- 1) meso
- 2) sym
- 3) olig
- 4) pan

**К ФУНКЦИЯМ АКУШЕРКИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ ОТНОСИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) гинекологического осмотра
- 2) лапароскопии
- 3) общего осмотра
- 4) гистероскопии

**УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ РАССТРОЙСТВАМ \_\_\_\_\_ У РЕБЕНКА**

- 1) мочевыделительной системы
- 2) желудочно-кишечного тракта
- 3) опорно-двигательного аппарата
- 4) вестибулярного аппарата

**ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ \_\_\_\_\_ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

- 1) трехфазностью
- 2) быстротой
- 3) двухфазностью
- 4) молниеносностью

**ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОЖОГОВОЙ РАНЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 25
- 4) 30

**ДЛЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА**

- 1) тошнота по утрам
- 2) головная боль
- 3) загрудинная боль
- 4) одышка в покое

**ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗИСТО-СТРОМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЭНДОМЕТРИЯ**

- 1) гипертрофия
- 2) гипотрофия
- 3) гипоплазия
- 4) гиперплазия

**КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ВЫЗВАННЫМ ФОКАЛЬНЫМ ИНФАРКТОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) геморрагический инсульт
- 2) инфаркт головного мозга
- 3) ишемический инсульт
- 4) дисциркуляторная энцефалопатия

**ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ РОДОВ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ**

- 1) переходное молоко
- 2) молозиво

- 3) прогорклое молоко
- 4) постоянное молоко

**МЕНОПАУЗА, НАСТУПИВШАЯ В ВОЗРАСТЕ 40-44 ЛЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) преждевременная
- 2) ранняя
- 3) поздняя
- 4) своевременная

**ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) метилдопа
- 2) фуросемид
- 3) атенолол
- 4) эналаприл

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАПРАВЛЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В САНАТОРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) умеренная преэклампсия
- 2) уровень гемоглобина 102 г/л
- 3) первобеременная до 18 лет
- 4) невынашивание в анамнезе

**ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИЕ (ПАЦИЕНТЫ) С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ**

- 1) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении
- 2) направляются на дополнительное обследование
- 3) направляются на прием к участковому врачу
- 4) госпитализируются скорой помощью

**ПРИЕМ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ВОЗМОЖЕН СРАЗУ ПОСЛЕ**

- 1) установления лактации
- 2) родоразрешения
- 3) прекращения анестезии
- 4) первой дефекации

**ОСЛОЖНЕНИЕМ КИСТЫ ЯИЧНИКА, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) малигнизация кисты
- 2) рост кисты до больших размеров
- 3) перекрут ножки кисты
- 4) ущемление кистой соседних органов

**ОВАРИЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) большим
- 2) малым
- 3) лапароскопическим
- 4) средним

**К ОРГАНЕЛЛАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) гликокалис
- 2) ворсинки
- 3) жгутики
- 4) пили

**ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВКЛЮЧАЕТ \_\_\_\_\_ ЭТАПЫ**

- 1) диагностический и подготовительный
- 2) диагностический и лечебный
- 3) лечебный и дооперационный
- 4) ранний и поздний

**ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА \_\_\_\_\_ РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ**

- 1) полного
- 2) частичного
- 3) своевременного
- 4) запоздалого

**К ОСНОВНОМУ ДЕЙСТВИЮ ЭПИНЕФРИНА (АДРЕНАЛИНА) ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) появление злокачественной тахикардии
- 2) повышение возбудимости миокарда
- 3) появление умеренной брадикардии
- 4) понижение возбудимости миокарда

**ОТСУТСТВИЕМ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипоплазия
- 2) агенезия
- 3) гинатрезия
- 4) аплазия

**ВТОРЫМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) позицию
- 2) предлежание
- 3) членорасположение
- 4) вставление

**НЕГАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЗИГОТУ И БЛАСТОЦИСТУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) эмбриотоксическим
- 2) тератогенным
- 3) мутагенным
- 4) фетотоксическим

**ПОСЛЕ ОВУЛЯЦИИ ИЗ РАЗОРВАВШЕГОСЯ Фолликула образуются**

- 1) белое тело
- 2) морула
- 3) зигота
- 4) желтое тело

**К аномалиям, этиологическим фактором которых явились генные мутации, относятся**

- 1) полидактилия и синдактилия
- 2) синдромы Дауна и Эдвардса
- 3) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера
- 4) транслокационные формы хромосомных синдромов

**Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета ведет к развитию комы**

- 1) гипогликемической
- 2) печеночной
- 3) уремической
- 4) гипергликемической

**При лечении железодефицитной анемии используется**

- 1) панкреатин
- 2) цианокобаламин
- 3) аскорутин
- 4) мальтофер

**При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь за 3 дня до исследования из питания следует исключить**

- 1) манную кашу
- 2) черный хлеб
- 3) молоко
- 4) мясо

**Занятия гимнастикой во время беременности целесообразно завершать \_\_\_\_\_ облучением кабинета**

- 1) радиационным
- 2) инфракрасным
- 3) ультрафиолетовым
- 4) электромагнитным

**ТАУРИН ЖЕНСКОГО МОЛОКА УЧАСТВУЕТ В**

- 1) развитию сетчатки
- 2) регуляции работы кишечника
- 3) формированию флоры кишечника
- 4) перевариванию жиров

**ЧРЕСКОЖНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТКАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ОПЕРАЦИЮ ПО ПОВОДУ РАКА ВУЛЬВЫ, НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЮ**

- 1) диагностики нервных нарушений
- 2) коррекции болевого синдрома
- 3) профилактики лимфостаза
- 4) профилактики парестезий

**СЕКРЕЦИЕЙ МОЛОКА В ЖЕЛЕЗЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОЛАКТИНА И ОПОРОЖНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКСИТОЦИНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) галакторея
- 2) инволюция
- 3) лактация
- 4) мастопатия

**ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ ОТ МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАР**

- 1) 45
- 2) 30
- 3) 60
- 4) 15

**ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ НОРЭПИНЕФРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутрикожный
- 2) подкожный
- 3) внутримышечный
- 4) внутривенный

**ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЯИЧНИКА СОЕДИНЯЕТСЯ С**

- 1) боковой стенкой таза
- 2) круглой маточной связкой
- 3) мочевым пузырем
- 4) широкой маточной связкой

**ДНО МАТКИ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ \_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 26
- 2) 34
- 3) 32

4) 36

**ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕН ИЗ**

- 1) ликвора
- 2) рвотных масс
- 3) мокроты
- 4) смывов носоглотки

**ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) поступления в стационар
- 2) принятия решения об операции
- 3) начала подготовки к операции
- 4) начала заболевания

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ДИСМЕНОРЕИ РЕКОМЕНДОВАНО  
\_\_\_\_\_ ЛЕЧЕНИЕ**

- 1) медикаментозное
- 2) хирургическое
- 3) санаторно-курортное
- 4) физиотерапевтическое

**СИМПТОМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЧАСТО НАРАСТАЮТ**

- 1) ночью или ранним утром
- 2) днем или ранним вечером
- 3) до приема пищи
- 4) после приема пищи

**ТЕНЕЗМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) колиинфекции
- 2) сальмонеллеза
- 3) дизентерии
- 4) дисбактериоза

**НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ  
\_\_\_\_\_ ГРАММ**

- 1) 2500
- 2) 2700
- 3) 2300
- 4) 2000

**ПАЛАТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА  
ЗАПОЛНЯЮТ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 3

4) 2

**ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ММ.РТ.СТ.**

- 1) 40-50
- 2) 60-89
- 3) 80-100
- 4) 100-139

**АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) атропина сульфат
- 2) неостигмина метилсульфат
- 3) унитиол
- 4) мускарин

**В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ВИДИМЫЕ СЛИЗИСТЫЕ ПОЛОСТИ РТА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) розовые
- 2) желтушные
- 3) бледные
- 4) цианотичные

**ДОПУСТИМОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ ПРИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 1000
- 2) 2000
- 3) 1250
- 4) 1500

**ДИЕТА ПАЦИЕНТА, СТРАДАЮЩЕГО РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ, С ДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ**

- 1) углеводов и белка
- 2) белка и кальция
- 3) белка и калия
- 4) жиров и железа

**ПАЦИЕНТАМ С ОЖОГАМИ БОЛЕЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ В ПЕРВЫЕ \_\_\_\_ ДНЯ(ЕЙ)**

- 1) 3
- 2) 7
- 3) 4
- 4) 5

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ**

- 1) разрешение близких родственников на вмешательство
- 2) сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными
- 3) результаты обследования пациента
- 4) информированное согласие пациента

**ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ**

- 1) преэклампсии
- 2) запоров
- 3) многоплодной беременности
- 4) бесплодия

**ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ И ВЫДАЕТСЯ НА РУКИ ПАЦИЕНТКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ КАРТА БЕРЕМЕННОЙ, РОЖЕНИЦЫ И РОДИЛЬНИЦЫ**

- 1) личная
- 2) идентификационная
- 3) обменная
- 4) индивидуальная

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) язвенная болезнь
- 2) холецистит
- 3) цирроз печени
- 4) панкреатит

**МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 1-5
- 2) 10-15
- 3) 30-60
- 4) 20-30

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПООЩРЯТЬ ПАЦИЕНТКУ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ К УХОДУ ЗА**

- 1) родителями
- 2) ребенком
- 3) мужем
- 4) собой

**ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ МИНУТ(Ы) ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА**

- 1) 4 - 5
- 2) 1 - 3
- 3) 6 - 8
- 4) 5 - 6

**ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ,  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 2-5 (МЕНЕЕ 20) МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) ревмокардите
- 2) стенокардии
- 3) инфаркте миокарда
- 4) остеохондрозе

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
НАЗНАЧАЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ**

- 1) 26
- 2) 37
- 3) 40
- 4) 34

**ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ ПИЩИ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ  
СЛЕДУЕТ**

- 1) промыть желудок через зонд
- 2) отложить операцию на сутки
- 3) вызвать рефлекторную рвоту
- 4) назначить растительное слабительное

**ПАЦИЕНТКАМ С ФАКТОРАМИ РИСКА ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ УЗИ В ТЕЧЕНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ \_\_\_\_\_ РАЗ(А)**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение концентрации кальция
- 2) повышение концентрации простагландинов
- 3) понижение выработки окситоцина
- 4) повышение выработки эстрадиола

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПЛОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 60 - 80
- 2) 100 - 120
- 3) 120 - 160
- 4) 80 - 100

**ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЛОДА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОЗЖЕ 9 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ,  
НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) эмбриопатии
- 2) зиготопатии
- 3) гаметопатии
- 4) фетопатии

**СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ БОЛЕЗНЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) -iasis
- 2) -ismus
- 3) -oma
- 4) -itis

**ЭЛЕКТРОФОРЕЗ МЕДИ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ**

- 1) не влияющим на гормональную функцию яичника
- 2) снижающим эстрогенную насыщенность
- 3) повышающим эстрогенную насыщенность
- 4) стимулирующим функцию желтого тела

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО**

- 1) цвету кожных покровов
- 2) наличию сосательного рефлекса
- 3) степени громкости крика
- 4) характеру первого стула

**В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА**

- 1) 3 лет
- 2) 2 лет
- 3) 1,5 лет
- 4) 1 года

**НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ МАСКОЙ ПРОВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 10
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 30

**В ТРЕТЬЕМ МОМЕНТЕ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) дополнительное сгибание головки
- 2) разгибание головки
- 3) внутренний поворот головки
- 4) боковое сгибание туловища

**АКУШЕРКА НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ДОМ ДЛЯ ПАТРОНАЖА БЕРЕМЕННОЙ В СЛУЧАЕ НЕЯВКИ ПАЦИЕНТКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 7

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая почечная недостаточность
- 2) острый артрит
- 3) кардиогенный шок
- 4) отек головного мозга

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАЦЕПЦИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- 1) массы тела
- 2) рождаемости
- 3) Соловьева
- 4) Перля

**ОДНОРАЗОВЫЙ ПУПОЧНЫЙ ЗАЖИМ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ПУПОВИНУ ОТ ГРАНИЦЫ КОЖИ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ**

- 1) 4 см
- 2) 4 мм
- 3) 1 см
- 4) 1 мм

**МИОМЭКТОМИЮ РАЦИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ НА ЭТАПЕ**

- 1) десквамации
- 2) лютеиновой фазы
- 3) фолликулиновой фазы
- 4) овуляции

**ФОРМОЙ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА, ПРИ КОТОРОЙ ОСТРАЯ МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ ПРИВОДИТ К НЕАДЕКВАТНОЙ ДОСТАВКЕ КИСЛОРОДА К КЛЕТКАМ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШОК**

- 1) ожоговый
- 2) геморрагический
- 3) рефрактерный
- 4) травматический

**КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ \_\_\_\_\_ РАЗ В 2 ГОДА**

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 6

4) 7

**ФАКТОРОМ РИСКА ПЕРВИЧНОЙ ДИСМНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) до 30
- 2) после 45
- 3) до 45
- 4) после 30

**К ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) бартолинит
- 2) цистит
- 3) эндометрит
- 4) вульвит

**ВО ВТОРОМ МОМЕНТЕ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЛИЦЕВОМ ВСТАВЛЕНИИ ГОЛОВКА ПЛОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) дополнительное сгибание
- 2) вставление и разгибание
- 3) внутренний поворот с образованием заднего вида
- 4) внутренний поворот с образованием переднего вида

**ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ ЕДИНИЦ КАЖДОГО НАИМЕНОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

- 1) 7
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

**ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) предположительных
- 2) сомнительных
- 3) вероятных
- 4) достоверных

**ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) письменно
- 2) нотариально
- 3) в устной форме
- 4) через портал Госуслуги

**НА ЭТИКЕТКАХ МНОГОДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ**

- 1) срок и условия хранения
- 2) дату и время вскрытия
- 3) название организации
- 4) название и дозировку

**ПРОБА, ОСНОВАННАЯ НА РЕГИСТРАЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВДОХА, НАЗЫВАЕТСЯ ПРОБОЙ**

- 1) Генча
- 2) Штанге
- 3) Гентера
- 4) Карпмана

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ**

- 1) санация очагов инфекции до операции
- 2) исключение переохлаждения пациента
- 3) соблюдение диеты
- 4) ранняя активация пациента

**ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДОВАНО ПРЕДЛОЖИТЬ**

- 1) лечебную корригирующую гимнастику
- 2) наружный акушерский поворот
- 3) бальнеотерапию
- 4) акупунктуру

**АНТИГИПОКСИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уменьшение кислородной стоимости работы
- 2) увеличение числа митохондрий
- 3) преобладание положительных эмоций
- 4) активация синтеза белков

**ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) ежегодный скрининг на хламидиоз и гонорею
- 2) профилактический прием антибактериальных препаратов
- 3) постоянное применение гинекологических орошений
- 4) ограничение двигательной активности

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тромбоз глубоких вен
- 2) недержание мочи
- 3) восходящая инфекция
- 4) двусторонний нефроптоз

### **НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У РОДИЛЬНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мелькание мушек перед глазами
- 2) чувство голода
- 3) усталость
- 4) повышенный тонус матки

### **ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ 70 Г/Л БЕРЕМЕННУЮ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА**

- 1) госпитализацию в стационар
- 2) санаторно-курортное лечение
- 3) лечение в дневной стационар
- 4) физиопсихопрофилактическую подготовку к родам

### **ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ**

- 1) желтушные
- 2) цианотичные
- 3) гиперемированные
- 4) бледные

### **НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) миометрий
- 2) эндометрий
- 3) параметрий
- 4) периметрий

### **РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ НА ФЛАКОНАХ С РАСТВОРАМИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ИГЛЫ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ**

- 1) раствором йода
- 2) 70% спиртом
- 3) 3% перекисью
- 4) дистиллированной водой

### **САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ САЛЬПИНГИТЕ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ**

- 1) антибактериальной терапии
- 2) хирургического лечения
- 3) острой фазы заболевания
- 4) стационарного лечения

### **ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ \_\_\_\_\_ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) на 3-и сутки
- 2) на 4-е сутки
- 3) на 2-е сутки

4) в первые часы

**ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) ограничить потребление соли
- 2) ограничить потребление белков
- 3) увеличить потребление соли
- 4) увеличить потребление белков

**ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ**

- 1) своевременное опорожнение дренажного мешка
- 2) промывание катетера строго по назначению врача
- 3) обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания
- 4) обеспечение комфортных условий для мочеотделения

**ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДВОЙНЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) перенашивание
- 2) невынашивание
- 3) бурная родовая деятельность
- 4) развитие крупных плодов

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АНАЛИЗ \_\_\_\_\_ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- 1) недельного
- 2) месячного
- 3) ежедневного
- 4) поквартального

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) старческий возраст
- 2) алкоголизм
- 3) онкологическое заболевание
- 4) травма, несовместимая с жизнью

**ИЗМЕНЕНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) сомнительным
- 2) вероятным
- 3) достоверным
- 4) объективным

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) транексам
- 2) этамзилат
- 3) викасол
- 4) сорбифер

**ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ХАРАКТЕРНА РАННЯЯ**

- 1) ремиссия
- 2) манифестация
- 3) реабилитация
- 4) диагностика

**В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРВИЧНАЯ САНИТАРНАЯ МЕДИКО-ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОКАЗЫВАЕТСЯ В**

- 1) фельдшерско-акушерском пункте
- 2) женской консультации
- 3) центральной районной больнице
- 4) областной больнице

**ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 18
- 4) 32

**ОТСУТСТВИЕ ЭКСКУРСИИ ПУПОВИНЫ ПРИ НАТУЖИВАНИИ ЖЕНЩИНЫ В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) Шредера
- 2) Гентера
- 3) Довженко
- 4) Клейна

**ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ РАЗРЯДА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ПРОВОДЯТ**

- 1) компрессии грудной клетки
- 2) два искусственных вдоха
- 3) оценку сердечного ритма
- 4) повторный разряд дефибриллятора

**УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) выработки молока
- 2) аппетита
- 3) массы тела
- 4) иммунитета

### **ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ**

- 1) длины тела ( $m^2$ ) к массе тела (кг)
- 2) массы тела (кг) к длине тела ( $m^2$ )
- 3) длины тела ( $m^2$ ) к возрасту (лет)
- 4) массы тела (кг) к возрасту (лет)

### **ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР 3 БАЛЛА И МЕНЕЕ НА 1-ОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ АСФИКСИЯ**

- 1) легкая
- 2) умеренная
- 3) средняя
- 4) тяжелая

### **ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ**

- 1) «рисового отвара»
- 2) «болотной тины»
- 3) «горохового пюре»
- 4) «крахмальных зерен»

### **ОВАЛЬНЫЕ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЧКУЮЩИЕСЯ СФЕРЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИИ**

- 1) стрептококковой
- 2) дрожжевой
- 3) стафилококковой
- 4) клостридийной

### **ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРОВОДИТ**

- 1) акушерка
- 2) врач-гинеколог
- 3) физиотерапевт
- 4) массажист

### **ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- 1) состояние лимфатических узлов
- 2) состояние прямой кишки
- 3) степень развитости мышц брюшного пресса
- 4) положение, величину, консистенцию матки

### **ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК НА ЯРЛЫКАХ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ**

- 1) количество использованных материалов
- 2) дату и время вскрытия
- 3) количество оставшегося материала

4) имя ответственного врача

**ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

**ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) операция кесарево сечение
- 2) наложение акушерских щипцов
- 3) применение вакуум-экстракции
- 4) влагалищное родоразрешение

**АТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) тахипноэ
- 2) дисфория
- 3) тахикардия
- 4) гипертермия

**ПРИЕМ В АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ**

- 1) разрешен
- 2) осуществляется в обсервационное отделение
- 3) возможен только в первые 24 часа
- 4) запрещен

**СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ЗРЕЛОГО МОЛОКА» У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ СОСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И)**

- 1) 4-5
- 2) 3-4
- 3) 5-6
- 4) 2-3

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ РАБОТЫ В \_\_\_\_\_ ВРЕМЯ**

- 1) вечернее
- 2) послеобеденное
- 3) утреннее
- 4) ночное

**ПЕРЕД КОРМЛЕНИЕМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТТОКА МОЛОКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ \_\_\_\_\_ КОМПРЕССА**

- 1) спиртового

- 2) травяного
- 3) холодного
- 4) горячего

### **ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз
- 2) отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия
- 3) отсутствие сознания, дыхания, аритмия
- 4) отсутствие сознания, дыхания, пульса

### **ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАН**

- 1) тест на толерантность к глюкозе
- 2) определение глюкозы в моче
- 3) определение АЛТ и АСТ
- 4) определение общего белка в моче

### **ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) болевой синдром
- 2) наличие бактерий в средней порции мочи
- 3) острое повышение температуры тела
- 4) кровь в моче

### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) кардиотоники
- 2) блокаторы кальциевых каналов
- 3) нитраты
- 4) бета-адреноблокаторы

### **МАССА ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ БОЛЕЕ 4000 Г НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) макросомия
- 2) нормосомия
- 3) микросомия
- 4) полисомия

### **ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ПОКАЗАНА БЕРЕМЕННЫМ**

- 1) с нормально протекающей беременностью
- 2) всем без исключения
- 3) по желанию
- 4) по особым показаниям

### **ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) Конституцией Российской Федерации
- 2) 323-Федеральным Законом

- 3) клиническими рекомендациями МЗ РФ
- 4) приказом МЗ РФ 1130-Н

### **ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ**

- 1) этиотропным
- 2) паллиативным
- 3) патогенетическим
- 4) симптоматическим

### **МЫТЬЕ РУК МЫЛОМ ПО МЕТОДУ ОБРАБОТКИ РУК ХИРУРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 1 минуты
- 2) 30 секунд
- 3) 2 минут
- 4) 15 секунд

### **БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ**

- 1) болезненности
- 2) продолжительности
- 3) осложнений
- 4) тревоги

### **СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОПУХОЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) -iasis
- 2) -ismus
- 3) -itis
- 4) -oma

### **АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ \_\_\_\_\_ ТКАНИ**

- 1) уменьшением числа структурных элементов
- 2) увеличением числа структурных элементов
- 3) увеличением кровенаполнения
- 4) уменьшением кровенаполнения

### **ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) шигелла
- 2) эшерихия
- 3) сальмонелла
- 4) энтеровирус

### **ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ**

- 1) эпидермиса
- 2) всех слоев кожи
- 3) всех слоев эпителия

4) всех слоев тканей, включая костную

#### **ПРОГЕСТЕРОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В**

- 1) гипофизе
- 2) матке
- 3) гипоталамусе
- 4) яичнике

#### **ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, БИОТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗУЧАЕТ**

- 1) фармакопея
- 2) хронофармакология
- 3) фармакодинамика
- 4) фармакокинетика

#### **ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) импульсной электротерапии
- 2) массажа и рефлексотерапии
- 3) компрессионного трикотажа
- 4) лекарственного электрофореза

#### **ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ СПЕРЕДИ ОГРАНИЧЕНА**

- 1) серединой внутренней поверхности симфиза
- 2) верхним краем симфиза
- 3) нижним краем симфиза
- 4) серединой проекций вертлужных впадин

#### **В СЛУЧАЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) придерживаться выжидательной тактики
- 2) назначение гепарина
- 3) лечение в дневном стационаре
- 4) досрочное родоразрешение

#### **ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИЕМ КОК НАЗНАЧАЮТ ПАЦИЕНТКЕ \_\_\_\_ ОПЕРАЦИИ**

- 1) в день
- 2) накануне
- 3) через 1 день после
- 4) через 7 дней после

#### **ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ НА ТЕЛЕ БОЛЬНОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СЫПЬ**

- 1) геморрагическая
- 2) пустулёзная

- 3) везикулёзная
- 4) буллёзная

**СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ**

- 1) 70 - 90
- 2) 100 - 120
- 3) 16 - 20
- 4) 30 - 60

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИЯ**

- 1) микоплазменная
- 2) герпетическая
- 3) гонококковая
- 4) уреоплазменная

**ВЕДУЩАЯ ПРИЧИНА В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ**

- 1) экстрагенитальная патология
- 2) послеродовое кровотечение
- 3) HELLP-синдром
- 4) послеродовой эндометрит

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) раствор нитрата серебра
- 2) эритромициновую мазь
- 3) глазные капли Колбиоцин
- 4) хлорид натрия

**УДАЛЕНИЕ РОДИВШЕГОСЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) малым
- 2) большим
- 3) лапароскопическим
- 4) средним

**ЭКСТИРПАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) малым
- 3) большим
- 4) лапароскопическим

**ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ**

- 1) наложения швов
- 2) снятия швов
- 3) выписки из стационара
- 4) окончания операции

**«МАТКА КУВЕЛЕРА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) многоплодной беременности
- 2) предлежании плаценты
- 3) преждевременной отслойке плаценты
- 4) первичной слабости родовой деятельности

**ПРИ ПОЛНОМ РАЗРЫВЕ МАТКИ СХВАТКИ**

- 1) прекращаются
- 2) усиливаются
- 3) становятся дискоординированными
- 4) становятся болезненными

**ОКОЛОМАТОЧНАЯ ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) параметрий
- 2) эндометрий
- 3) периметрий
- 4) миометрий

**ЭМБРИОНАЛЬНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ ВЫКИДЫШ, ПРОИЗОШЕДШИЙ НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ С 5 ДО \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 21
- 2) 10
- 3) 16
- 4) 12

**ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 20-21
- 2) 11-11,5
- 3) 12,5-13
- 4) 9-10

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) психостимулирующее
- 2) противоаллергическое
- 3) антипсихотическое
- 4) антигипертензивное

**ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ**

### **РОДАХ АКУШЕРКА ПРОВОДИТ**

- 1) введение бронхолитиков
- 2) согревание ребенка
- 3) самостоятельное подключение к ИВЛ
- 4) тактильную стимуляцию

### **ОДНИМ ИЗ РАННИХ СИМПТОМОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гематурия
- 2) симптом Щёткина-Блюмберга
- 3) нарушение мочеиспускания
- 4) контактное кровотечение

### **КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ**

- 1) перекись водорода
- 2) хлоргексидин
- 3) спирт
- 4) йодонат

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) ревматоидный артрит
- 2) плеврит
- 3) обморок
- 4) расслоение аорты

### **МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В АВТОКЛАВЕ СТЕРИЛИЗУЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ \_\_\_\_ ГРАДУСА**

- 1) 123
- 2) 132
- 3) 164
- 4) 144

### **КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) медицинская помощь
- 2) диагностика
- 3) профилактика
- 4) медицинское вмешательство

### **ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ МЕНИНГОКОККОВЫЙ**

- 1) назофарингит
- 2) сепсис
- 3) менингит

4) полиартрит

**С ЦЕЛЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
НОВОРОЖДЕННОМУ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ВВЕДЕНИЕ ВИТАМИНА**

- 1) К
- 2) А
- 3) В
- 4) Е

**К ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  
ОТНОСЯТ**

- 1) синегнойную палочку
- 2) кишечную палочку
- 3) микобактерию
- 4) стрептококк

**УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) пиурия
- 2) глюкозурия
- 3) полиурия
- 4) гематурия

**СТЕП-ТЕСТ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБАМ С**

- 1) дозированной физической нагрузкой
- 2) изменением внешней среды
- 3) уменьшением венозного возврата
- 4) максимальной задержкой дыхания

**СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГАСТРИТА, ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЕННОСТЬ В  
\_\_\_\_\_ ОБЛАСТИ**

- 1) правой подвздошной
- 2) эпигастральной
- 3) парагастральной
- 4) левой подвздошной

**РЕДКИЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) метроррагией
- 2) олигоменореей
- 3) полименореей
- 4) менометроррагией

**СПОСОБ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОЙ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) сопутствующей патологии
- 2) вирусной нагрузки

- 3) срока гестации
- 4) стадии заболевания

**НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПРОВОДЯТ**

- 1) одной рукой
- 2) двумя руками
- 3) проксимальной частью кисти
- 4) двумя пальцами

**СМЕНУ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЯ РОДИЛЬНИЦАМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ**

- 1) 1 раз в три дня
- 2) 1 раз в семь дней
- 3) ежедневно
- 4) каждые 12 часов

**НЕОБХОДИМУЮ ДИЕТУ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗНАЧАЕТ**

- 1) диетсестра
- 2) медицинская сестра
- 3) пациент
- 4) лечащий врач

**СУРРОГАТНАЯ МАТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДОНОРОМ**

- 1) яйцеклетки
- 2) крови
- 3) фолликула
- 4) мозга

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ ДО \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 20
- 2) 40
- 3) 120
- 4) 80

**РОЖЕНИЦЕ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДЛАГАТЬ**

- 1) ограничить движения
- 2) свободное положение
- 3) вынужденное положение
- 4) полное расслабление

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- 1) длительности родов
- 2) частоте и продолжительности схваток
- 3) скорости раскрытия шейки матки
- 4) времени излития околоплодных вод

## **СТАТИСТИКА ЗДОРОВЬЯ ИЗУЧАЕТ**

- 1) здоровье населения без учета факторов, на него влияющих
- 2) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам
- 3) здоровье населения в неразрывной связи с факторами, на него влияющими
- 4) рождаемость, смертность и воспроизводство населения

## **ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАРА ВНУТРЬ УПАКОВКИ ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИКАТОРАМИ \_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

## **ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) эпицистостома
- 2) илеостома
- 3) трахеостома
- 4) гастростома

## **ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ СУХОЕ БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДЯТ**

- 1) утром в день операции
- 2) вечером накануне операции
- 3) за сутки до операции
- 4) на операционном столе

## **КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутриутробная гипоксия плода
- 2) возбудимость и тонус матки повышены
- 3) преждевременное излитие околоплодных вод
- 4) замедленное раскрытие шейки матки

## **ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МАЗОК НА**

- 1) гормональный фон
- 2) онкоцитологию
- 3) состав микрофлоры
- 4) степень чистоты влагалища

## **В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ МИОМЫ МАТКИ РЕКОМЕНДОВАНО \_\_\_\_\_ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

- 1) трансвагинальное
- 2) комплексное
- 3) трансабдоминальное

4) доплерометрическое

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) отслойка плаценты
- 2) отек мозга
- 3) отслойка сетчатки
- 4) отек легких

**ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ НАРУШЕНИЯ РИТМА МЕНСТРУАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эндокринный
- 2) сердечно-сосудистый
- 3) желудочно-кишечный
- 4) психогенный

**ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ОБШИРНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЖИ И ГЛУБЖЕЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИМСЯ ГИПОВОЛЕМИЕЙ, РАССТРОЙСТВАМИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ГЕМОДИНАМИКИ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШОК**

- 1) геморрагический
- 2) ожоговый
- 3) рефрактерный
- 4) травматический

**ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) хаотично
- 2) циклично
- 3) по шкале Апгар
- 4) по половому признаку

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) гематурии
- 2) гипотонии
- 3) протеинурии
- 4) отеков

**ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ФАЗЫ ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРНЫ \_\_\_\_\_ СУДОРОГИ**

- 1) мимические
- 2) спастические
- 3) тонические
- 4) клонические

**НАИБОЛЕЕ БОГАТЫ УГЛЕВОДАМИ \_\_\_\_\_ ПРОДУКТЫ**

- 1) овощные

- 2) мясные
- 3) мучные
- 4) молочные

**С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТРЕВОГИ И СТРАХА ПЕРЕД РОДАМИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ПРОВОДИТСЯ \_\_\_\_\_ ПОДГОТОВКА**

- 1) спортивная
- 2) практическая
- 3) основательная
- 4) психопрофилактическая

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ ЧАСТОЕ КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- 1) агалактии
- 2) мастопатии
- 3) гипогалактии
- 4) мастита

**ИНТЕГРАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗОЖ, В МЕДИЦИНСКУЮ МОДЕЛЬ КАК СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) правительством
- 2) медицинскими организациями
- 3) отдельными лицами и семьями
- 4) образованием

**БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ И ФИБРОМИОМой МАТКИ ПРОВОДИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ \_\_\_\_\_ ВАНН**

- 1) углекислых
- 2) йодобромных
- 3) радоновых
- 4) сероводородных

**ДОРОДОВОЙ ПАТРОНАЖ БЕРЕМЕННОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ**

- 1) дважды
- 2) трижды
- 3) четырежды
- 4) однажды

**ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ С**

- 1) язвой желудка
- 2) запорами
- 3) аменореей
- 4) бронхиальной астмой

**ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

## **ГРУППЫ**

- 1) тетрациклинов
- 2) аминогликозидов
- 3) макролидов
- 4) фторхинолонов

## **В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ В ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ, КАК ПРАВИЛО, ПОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) через 3 - 4 месяца
- 2) сразу после операции
- 3) через 3 - 4 часа
- 4) на 3 - 4 сутки

## **МЕДИЦИНСКАЯ ФОРМА № 003/у-МС ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

- 1) постановки беременной на учет
- 2) поступлении роженицы в стационар
- 3) смерти новорожденного
- 4) смерти матери

## **ВСЕ ПРИЕМЫ ВОСТОЧНОГО МАССАЖА ВЫПОЛНЯЮТСЯ**

- 1) в воде
- 2) горячими камнями
- 3) с кремом
- 4) на «сухую руку»

## **ДАННЫМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году
- 2) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году
- 3) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; среднегодовая численность населения
- 4) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

## **ИСТИННАЯ ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕФЕКТОМ \_\_\_\_\_ ЭПИТЕЛИЯ**

- 1) цилиндрического
- 2) покровного
- 3) мерцательного
- 4) кубического

## **ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ИХ ВДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ингаляцией
- 2) инъекцией
- 3) впрыскиванием
- 4) компрессом

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ У РОДИЛЬНИЦЫ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) провести баллонную тампонаду матки
- 2) катетеризировать мочевой пузырь пациентки
- 3) заказать компоненты крови для трансфузии
- 4) информировать главного врача, пациентку и ее партнера

**ПОД ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ВВЕДЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ**

- 1) путем внутривенной инфузии
- 2) через желудочный зонд
- 3) с помощью питательных клизм
- 4) через гастростому

**ВИДОМ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увольнение
- 2) лишение права занимать определенные должности
- 3) замечание
- 4) предупреждение

**ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ НАЗНАЧАЮТ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) неделю
- 2) месяц
- 3) 12 часов
- 4) 24 часа

**ЖЕНЩИНАМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) отказаться от трудовой деятельности
- 2) заниматься физическими упражнениями
- 3) увеличить потребление пищевых продуктов
- 4) ограничить физическую активность

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 40 - 60
- 2) 60 - 90
- 3) 30 - 40
- 4) 15 - 20

**ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ**

- 1) цинка
- 2) кальция
- 3) серы
- 4) молибдена

**БЕРЕМЕННЫМ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОРЫ  
И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) медикаментозное лечение
- 2) диетотерапию
- 3) лечебную физкультуру
- 4) физиотерапию

**К ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРАМ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ 6 КЛАССА  
ОТНОСЯТСЯ ИНДИКАТОРЫ**

- 1) многопараметровые
- 2) процесса
- 3) интеграторы
- 4) эмуляторы

**ПОСЛЕ РОДОВ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОСТЕПЕННО ВКЛЮЧАТЬСЯ В**

- 1) уход за ребенком
- 2) профессиональную деятельность
- 3) домашнюю работу
- 4) спортивные тренировки

**БЕРЕМЕННЫМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОКАЗАНА ИНДУКТОТЕРМИЯ  
ОБЛАСТИ**

- 1) спины
- 2) плеч и шеи
- 3) стоп и голеней
- 4) живота

**НОРМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО БОЛЕЕ \_\_\_\_\_  
ГРАММ**

- 1) 2700
- 2) 2300
- 3) 3000
- 4) 4000

**В ПЕРВЫЕ ДВА ЧАСА ПОСЛЕ РОДРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО  
СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТКИ**

- 1) непрерывно

- 2) каждые 60 минут
- 3) однократно
- 4) каждые 20-30 минут

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ЭМБОЛИЕЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ ИНФУЗИОННУЮ ТЕРАПИЮ В ОБЪЕМЕ \_\_\_\_\_ МЛ/КГ**

- 1) 50-60
- 2) 30-40
- 3) 70-80
- 4) 10-20

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУТЬ**

- 1) контактно-бытовой
- 2) трансмиссивный
- 3) воздушно-капельный
- 4) половой

**ПАЦИЕНТУ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) уменьшение калорийности рациона
- 2) частое дробное питание
- 3) голодание
- 4) ограничение жидкости

**ПРИЗНАКОМ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие изменений дневного диуреза
- 2) учащенное болезненное мочеиспускание
- 3) моча соломенно-желтого цвета
- 4) отсутствие изменений ночного диуреза

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНА ПРИ**

- 1) седловидной матке
- 2) миоме матки
- 3) истмико-цервикальной недостаточности
- 4) перегородке тела матки

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности и развитие плода
- 2) ознакомление с основами гигиены, режимом и питанием беременных
- 3) устранение психогенного компонента родовой боли
- 4) разъяснение физиологической сущности родов и течения послеродового периода

### **ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ I ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) исправления положения плода
- 2) сохранения членорасположения плода
- 3) профилактики кровотечения
- 4) стимуляции родовой деятельности

### **ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вульвит
- 2) сальпингит
- 3) уретрит
- 4) цистит

### **В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ НАРУЖНЫМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ СМ**

- 1) 28 - 29
- 2) 31 - 32
- 3) 25 - 26
- 4) 20 - 21

### **К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) сепсис
- 2) некроз
- 3) гематома
- 4) эмболия

### **АПНОЭ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) остановкой сердца
- 2) остановкой дыхания
- 3) приступом судорог
- 4) общим цианозом

### **ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ТАЗА ПОКАЗАНО РОДРАЗРЕШЕНИЕ ПУТЕМ**

- 1) наложения акушерских щипцов
- 2) плановой операции кесарево сечение
- 3) вакуум-экстракции плода
- 4) укорочения второго периода родов

### **ПЕРЕД КАЖДЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА И ПОСЛЕ НЕГО КОННЕКТОР (ПОРТ) ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ**

- 1) раствором натрия хлорида
- 2) спиртосодержащим антисептиком
- 3) реамберином
- 4) хлоргексидином

**ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАРАЖЕНИЕ ТРАНСМИССИВНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ \_\_\_\_\_  
МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ**

- 1) хирургический
- 2) биологический
- 3) барьерный
- 4) гормональный

**ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ СТАЦИОНАРНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ, БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА НАПРАВЛЯЕТСЯ В**

- 1) отделение патологии беременности акушерских стационаров
- 2) гинекологическое отделение медицинских организаций
- 3) профильное отделение акушерских стационаров
- 4) профильное отделение медицинских организаций

**ПОМОЩЬ ПО РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- 1) физических лечебных средств и упражнений
- 2) методов акупунктуры и акупрессуры
- 3) природных лечебных ресурсов
- 4) специальной аппаратуры и оборудования

**ПРИ ЖАЛОБАХ НА ИЗЖОГУ БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОШЕНИЕ \_\_\_\_\_  
ОДЕЖДЫ**

- 1) облегающей
- 2) свободной
- 3) синтетической
- 4) утягивающей

**РАСТВОР НОВОКАИНА В КОНЦЕНТРАЦИИ 0,25 - 0,5% ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
\_\_\_\_\_ АНЕСТЕЗИИ**

- 1) проводниковой
- 2) инфильтрационной
- 3) эпидуральной
- 4) терминальной

**ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА РЕКОМЕНДОВАН ТЩАТЕЛЬНЫЙ  
МОНИТОРИНГ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ГОДА (ЛЕТ)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

**МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРИМЕНЕНИИ НЕ  
БОЛЕЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 2

- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

**В НОРМЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В**

- 1) маточной трубе
- 2) шейке матки
- 3) теле матки
- 4) брюшной полости

**В ТЕРМИНЕ « ...LINGUA»(ПОД ЯЗЫК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДЛОГ**

- 1) in
- 2) pro
- 3) per
- 4) sub

**МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОДНОРАЗОВУЮ УПАКОВКУ \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) белого
- 2) желтого
- 3) черного
- 4) красного

**АМНИОТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ**

- 1) способствует свободным движениям плода
- 2) способствует компрессии пуповины в родах
- 3) ограничивает транспортную функцию
- 4) ограничивает свободные движения плода

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ УВЧ-ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ЭНДОМЕТРИТЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МИН**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 7
- 4) 15

**СЦЕЖИВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРИ ПРИЗНАКАХ ЛАКТОСТАЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) повышения иммунитета
- 2) профилактики гипотрофии
- 3) профилактики мастита
- 4) снижения иммунитета

**РАДИОВОЛНОВУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) большим
- 2) малым
- 3) средним
- 4) лапароскопическим

**СБОР КОЛЮЩЕГО И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ОДНОРАЗОВЫЙ КОНТЕЙНЕР  
МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 7
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

**ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА УСТАНОВЛИВАЮТ ВО ВРЕМЯ**

- 1) родов
- 2) беременности
- 3) диспансеризации
- 4) выписки

**ПРИ ОЖГОВОМ ШОКЕ ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_  
ТКАНИ**

- 1) интактные
- 2) мягкие
- 3) обожженные
- 4) центральные

**ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТА ПО ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ У  
БЕРЕМЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ \_\_\_\_\_ КОМФОРТ**

- 1) психологический
- 2) эстетический
- 3) абсолютный
- 4) относительный

**РЕАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ В НОРМЕ**

- 1) резкощелочная
- 2) нейтральная
- 3) кислая
- 4) слабощелочная

**ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) озноб
- 2) чувство жара
- 3) рвота
- 4) судороги

**ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЗРЕЛОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипотрофия
- 2) гидроцефалия
- 3) повышенный тургор кожи
- 4) мацерация кожи

**ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ \_\_\_\_\_ ПАЛАТЫ**

- 1) четырех или пятиместные
- 2) четырех или шестиместные
- 3) трех или четырехместные
- 4) одно или двухместные

**К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) сублингвальный
- 2) внутривенный
- 3) пероральный
- 4) ректальный

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ РОДОВ В НОРМЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ НА \_\_\_ НЕДЕЛЕ**

- 1) 8
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**ПОВТОРНОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 14
- 2) 18
- 3) 25
- 4) 20

**ПАЦИЕНТАМ С ЗАПОРОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ СРЕДСТВ**

- 1) контактных слабительных
- 2) противодиарейных
- 3) системных антибактериальных
- 4) обезболивающих

**ПЕРИОД МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА +12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) менопауза
- 2) пременопауза
- 3) перименопауза
- 4) постменопауза

**РЕКОМЕНДОВАНО НАПРАВЛЯТЬ БЕРЕМЕННУЮ НА СКРИНИНГ 1-ГО ТРИМЕСТРА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ \_\_\_\_\_ В КРОВИ**

- 1) плацентарного лактогена
- 2) прогестерона
- 3) хорионического гонадотропина
- 4) эстрадиола

**К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СВЯЗОК, ОТНОСИТСЯ**

- 1) черепашья
- 2) восьмиобразная
- 3) колосовидная
- 4) уздечка

**ХОДЬБА И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ \_\_\_\_\_ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВ**

- 1) увеличивают
- 2) сокращают
- 3) не изменяют
- 4) продлевают

**В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ДЕТЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ РЕБЕНКА**

- 1) каждого
- 2) одного
- 3) старшего
- 4) младшего

**ГИБЕЛЬ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) антенатальная
- 2) интранатальная
- 3) постнатальная
- 4) перинатальная

**КАК ПРАВИЛО, РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 12-13
- 2) 4-6
- 3) 8-10
- 4) 17-18

**ЛИХОРАДКА, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) подострая
- 2) мимолетная

- 3) острая
- 4) хроническая

**ИНФОРМИРОВАТЬ ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) беременных
- 2) рожениц
- 3) гинекологических пациенток
- 4) всех женщин

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ В СВЯЗИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мочекаменная болезнь
- 2) острый цистит
- 3) острый пиелонефрит
- 4) активный гломерулонефрит

**ПОРОКОМ СЕРДЦА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА, ПРИ КОТОРОМ ЧАСТЬ КРОВИ ИЗ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАПРАВЛЯЕТСЯ ОБРАТНО В ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аортальный стеноз
- 2) митральная недостаточность
- 3) митральный стеноз
- 4) сердечная недостаточность

**ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАРТНЕРА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ**

- 1) 113/У-20
- 2) 058/У
- 3) 090/У
- 4) 003/У-МС-20

**С ЦЕЛЬЮ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) макролиды
- 2) фторхинолоны
- 3) минизистон
- 4) мифепристон

**КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ОСТРОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ангионевротический отёк
- 2) коллапс
- 3) контактный дерматит
- 4) лекарственная болезнь

**ПРИДАТКАМИ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) яичники и влагалище
- 2) шейка матки и влагалище
- 3) шейка матки и яичники
- 4) маточные трубы и яичники

**РАННИМ СЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 48
- 2) 62
- 3) 24
- 4) 36

**НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕРИЛИЗУЕМОЙ УПАКОВКИ РАСПОЛАГАЮТ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ \_\_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) ранняя выписка из роддома
- 2) нарушение правил заключительной дезинфекции
- 3) отсутствие приточно-вытяжной вентиляции
- 4) увеличение частоты инвазивных вмешательств

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ПЕРИОДА СИФИЛИСА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И)**

- 1) 6-7
- 2) 16-17
- 3) 2-3
- 4) 12-13

**НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТКИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- 1) опорно-двигательного аппарата
- 2) органов пищеварения
- 3) нервной системы
- 4) сердечно-сосудистой системы

**ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ I ПРОВОДИТСЯ ПРИ \_\_\_\_\_ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА**

- 1) полном ножном
- 2) неполном ножном
- 3) чисто ягодичном
- 4) смешанном ягодичном

**ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНА**

- 1) лейкоцитурия
- 2) цилиндрурия
- 3) гематурия
- 4) полиурия

**ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) скудные, безболезненные менструации
- 2) обильные, болезненные менструации
- 3) творожистые выделения из половых путей
- 4) межменструальные кровянистые выделения

**ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель с мокротой
- 2) загрудинная боль
- 3) артериальная гипотония
- 4) судорожный статус

**ИНСУЛИН ВВОДЯТ \_\_\_\_\_ АНТИСЕПТИКА(ОМ) НА МЕСТЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ИНЪЕКЦИИ**

- 1) после полного высыхания
- 2) через 15 секунд после обработки
- 3) без обработки
- 4) через 30 секунд после обработки

**ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- 1) химический
- 2) лазерный
- 3) паровой
- 4) инфракрасный

**С ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ РЕКОМЕНДОВАНО ВЫПОЛНЕНИЕ \_\_\_\_\_ ШЕЙКИ МАТКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА**

- 1) лапароскопии
- 2) биопсии
- 3) бактериоскопии
- 4) гистероскопии

**ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) ацетилсалициловую кислоту
- 2) эргокальциферол
- 3) цианокобаламин
- 4) аскорбиновую кислоту

**ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О(Б)**

- 1) обстоятельства происшествия
- 2) регистрации пострадавшего
- 3) гражданстве пострадавшего
- 4) виновнике происшествия

**ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В РАСТЕНИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ ЯДЫ**

- 1) синтетические
- 2) растительные
- 3) промышленные
- 4) бытовые

**БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДИЕТЫ**

- 1) белково-витаминной
- 2) с ограничением белковой пищи
- 3) преимущественно углеводно-жировой
- 4) с ограничением овощей, фруктов

**ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ У ВЗРОСЛЫХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПЛОЩАДИ ГЛУБОКОГО ОЖОГА ОТ \_\_\_\_\_ %**

- 1) 10
- 2) 18
- 3) 20
- 4) 15

**СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) гиперемия
- 2) иктеричность
- 3) акроцианоз
- 4) диффузный цианоз

**РАЗРЫВЫ ШЕЙКИ МАТКИ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ**

- 1) ручном обследовании стенок полости матки
- 2) ультразвуковом обследовании
- 3) рентгенологическом обследовании
- 4) осмотре родовых путей с помощью зеркал

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) медикаментозный
- 2) хирургический
- 3) физиотерапевтический
- 4) санаторно-курортный

**РАЗГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПЛОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В \_\_\_ МОМЕНТЕ  
БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

**ЗА 30-60 МИНУТ ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ РЕКОМЕДОВАНО  
ПРОВЕСТИ ПАЦИЕНТКЕ**

- 1) профилактику РДС плода
- 2) антибиотикопрофилактику
- 3) физиопсихопрофилактику
- 4) профилактику кровотечения

**ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ КОХЕРА В  
КОЛИЧЕСТВЕ**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

**СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В  
БУМАЖНЫЕ ИМПОРТНЫЕ ПАКЕТЫ, ЗАКРЫТЫЕ ТЕРМОСШИВАНИЕМ, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 3 недели
- 2) 96 часов
- 3) 72 часа
- 4) 8 недель

**РЕКОМЕНДОВАНО ОПРЕДЕЛЯТЬ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПО ДАТЕ**

- 1) овуляции
- 2) последней менструации
- 3) полового контакта
- 4) оплодотворения

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ  
ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) отслойка плаценты
- 2) нарушение мочеиспускания
- 3) отслойка сетчатки
- 4) нарушение сознания

**РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТКИ С ЭМБОЛИЕЙ  
ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ ДО РОДРАЗРЕШЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ  
ЛЕЖА НА**

- 1) правом боку
- 2) левом боку
- 3) животе
- 4) спине

**ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦА(ЕВ)**

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 8

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ РОДОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) дыхательную гимнастику
- 2) поднятие тяжестей
- 3) общеукрепляющие упражнения
- 4) упражнения для спины

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ, ПО**

- 1) обследованию пострадавшего
- 2) постановке предварительного диагноза
- 3) сопровождению пострадавшего
- 4) применению лекарственных препаратов

**УТЕРОТОНИКОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) метронидазол
- 2) метацин
- 3) клотримазол
- 4) карбетоцин

**СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) календула
- 2) левзея
- 3) женьшень
- 4) валериана

**ПОЛИПЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) малым
- 2) большим
- 3) лапароскопическим
- 4) средним

**ДЛИНА ВОЛНЫ 280–320 НМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕ**

- 1) инфракрасное
- 2) длинноволновое ультрафиолетовое
- 3) красное
- 4) средневолновое ультрафиолетовое

**ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 100
- 2) 450
- 3) 250
- 4) 500

**ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ ХАРАКТЕРНО**

- 1) эритема кожи, эпидермис интактен
- 2) поражение эпидермиса, иногда с захватом дермы
- 3) деструкция кожи и тканей, расположенных глубже
- 4) поражение кожи на всю ее толщину

**ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПО БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ С ПАЦИЕНТКОЙ БЕСЕДУ О**

- 1) пороках развития плода
- 2) заболеваниях детского возраста
- 3) хромосомных заболеваниях
- 4) рациональном питании

**ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ СТАНОВИТСЯ \_\_\_\_\_ РОДНИЧОК**

- 1) боковой
- 2) большой
- 3) малый
- 4) средний

**ПО СРОЧНОСТИ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА**

- 1) несрочные и быстрые
- 2) экстренные, срочные и плановые
- 3) внеплановые и запланированные
- 4) внеплановые и отсроченные

**НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ МАТКИ**

- 1) поперечный в области нижнего сегмента
- 2) продольный в области нижнего сегмента
- 3) Т-образный
- 4) корпоральный

**ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦА(ЕВ)**

- 1) 5-6
- 2) 12-18
- 3) 3-4
- 4) 22-24

**СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) взвешивание беременных
- 2) прикроватный тест
- 3) признак Вастена
- 4) измерение окружности живота

**МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ И ПРИ НАЛИЧИИ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хирургический
- 2) гормональный
- 3) календарный
- 4) барьерный

**ПОТЕРЯ КРОВИ ОБЪЕМОМ 750-1500 МЛ (15-30% ОЦК) СООТВЕТСТВУЕТ \_\_\_\_\_ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**В КАЧЕСТВЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВЕСТИ**

- 1) осмотр мягких родовых путей
- 2) катетеризацию мочевого пузыря
- 3) вакуум-аспирацию полости матки
- 4) баллонную тампонаду матки

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА У БЕРЕМЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) стоя
- 2) лежа на спине
- 3) лежа на боку
- 4) лежа на животе

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РОДАХ ПАЦИЕНТКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ \_\_\_\_\_ МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ**

- 1) немедикаментозные

- 2) фармакологические
- 3) инвазивные
- 4) хирургические

**ОСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ АМЕНОРЕЕЙ**

- 1) фармакологической
- 2) физиологической
- 3) психогенной
- 4) ложной

**К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСИТСЯ КЛАСС**

- 1) А
- 2) Б
- 3) Д
- 4) Г

**ПАЦИЕНТКА, НУЖДАЮЩАЯСЯ В ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ С 20 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В \_\_\_\_\_ ОТДЕЛЕНИЕ**

- 1) родовое
- 2) обсервационное
- 3) гинекологическое
- 4) реанимационное

**ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) парентеральный
- 2) фекально-оральный
- 3) контактно-бытовой
- 4) трансмиссивный

**ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ПРИ РОЖДЕНИИ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ**

- 1) 22-24
- 2) 26-28
- 3) 28-29
- 4) 18-20

**ЛИДОКАИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ С \_\_\_\_\_ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ**

- 1) антикоагулянтным
- 2) противовоспалительным
- 3) местноанестезирующим
- 4) жаропонижающим

**В НОРМЕ ДЛИНА ПУПОВИНЫ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СМ**

- 1) 70
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 50

**ЦЕЛЮЮ АКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предупреждение занесения инфекции в рану
- 2) профилактика тромбоэмболических осложнений
- 3) удлинение послеоперационного периода
- 4) предупреждение вторичного кровотечения

**В ОСНОВЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕЖИТ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) минеральных ванн
- 2) электромагнитного излучения
- 3) воды
- 4) грязей

**ИЛЫ СОЛЕННЫХ ВОДОЕМОВ, ОТНОСИТЕЛЬНО БЕДНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ \_\_\_\_\_ ГРЯЗЕЙ**

- 1) сопочных
- 2) торфяных
- 3) сапротелевых
- 4) сульфидных

**ПРИ НАЛОЖЕНИИ ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ РОДИЛЬНИЦЕ С РАЗРЫВАМИ 3-4 СТЕПЕНИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ**

- 1) 5 дней
- 2) 1 месяц
- 3) 2 дня
- 4) 2 недели

**ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЮ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) большим
- 2) малым
- 3) средним
- 4) лапароскопическим

**РАННИМ ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 34
- 2) 32
- 3) 36

4) 40

**ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ КОМЕ**

- 1) диабетической
- 2) гипогликемической
- 3) печеночной
- 4) уремической

**НАВИСАНЕ ЗАДНЕГО СВОДА ВЛАГАЛИЩА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) миомы матки
- 2) острого холецистита
- 3) внутрибрюшного кровотечения
- 4) кишечной непроходимости

**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипотермия
- 2) нарушение гемодинамики
- 3) угнетение центральной нервной системы
- 4) нарушение мочеиспускания

**УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) полиурия
- 2) изостенурия
- 3) олигурия
- 4) гипостенурия

**ГРЯЗИ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В РАЙОНАХ С АКТИВНОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ \_\_\_\_\_ ГРЯЗЕЙ**

- 1) сульфидных
- 2) торфяных
- 3) сапропелевых
- 4) сопочных

**НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ УВЧ-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ ВУЛЬВОВАГИНИТОМ ПОКАЗАНА В КАЧЕСТВЕ \_\_\_\_\_ МЕТОДА**

- 1) анальгетического
- 2) антиэкссудативного
- 3) регенеративного
- 4) иммуномодулирующего

**В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СМ**

- 1) 25 - 26
- 2) 31 - 32
- 3) 20 - 21

4) 28 - 29

**ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО (ПАЦИЕНТА) С ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) с приподнятым изголовьем
- 2) на боку
- 3) с приподнятыми нижними конечностями
- 4) полусидя

**НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эвакуация плодного яйца кюреткой
- 2) введение гипертонического раствора в полость матки
- 3) вакуум-аспирация полости матки
- 4) медикаментозный аборт

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- 1) методов акупунктуры и акупрессуры
- 2) специальной аппаратуры и оборудования
- 3) физических лечебных средств и упражнений
- 4) природных лечебных ресурсов

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕД БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ХРАНИТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 48
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 72

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ У МАТЕРИ**

- 1) сахарный диабет
- 2) хронический пиелонефрит
- 3) обструктивный бронхит
- 4) язвенная болезнь

**ПРИЗНАКОМ ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нитевидный пульс
- 2) повышение артериального давления
- 3) артериальное давление 110/70
- 4) гиперемия лица

**ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ,**

**НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) плацентоцентез
- 2) хорионбиопсия
- 3) амниоцентез
- 4) амниоскопия

**ПЕРВОЙ ПИЩЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) зрелое молоко
- 2) молозиво
- 3) молочная смесь
- 4) молочная каша

**КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАГАЛИЩНЫХ МАЗКОВ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ РАЗ(А)**

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ НА ШЕЙКУ МАТКИ БЕРЕМЕННОЙ С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРОВОДИТСЯ С \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ**

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 2
- 4) 4

**ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) судороги
- 2) дизурия
- 3) гипертензия
- 4) диспноэ

**ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУТЬ**

- 1) гематогенный
- 2) лимфогенный
- 3) восходящий
- 4) нисходящий

**ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) резко уменьшается
- 2) уменьшается незначительно
- 3) увеличивается умеренно
- 4) резко увеличивается

**ДЛИНА НЕБЕРЕМЕННОЙ МАТКИ ВМЕСТЕ С ШЕЙКОЙ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СМ**

- 1) 11-13
- 2) 3-4
- 3) 7-10
- 4) 5-6

**К ПРЕДВЕСТНИКАМ РОДОВ ОТНОСЯТ**

- 1) кровянистые выделения из половых путей
- 2) отхождение околоплодных вод
- 3) опускание дна матки
- 4) частые мочеиспускания

**АСПИРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) большим
- 2) малым
- 3) средним
- 4) лапароскопическим

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ГЕРПЕСА У БЕРЕМЕННОЙ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ ПАЦИЕНТКУ НЕОБХОДИМО**

- 1) экстренно родоразрешить
- 2) перевести в наблюдательный стационар
- 3) перевести в наблюдательное отделение
- 4) выписать домой

**НА КУРОРТЫ С ГРЯЗЯМИ И ПИТЬЕВЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТКИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ \_\_\_\_\_ СИСТЕМЫ**

- 1) пищеварительной
- 2) центральной нервной
- 3) сердечно-сосудистой
- 4) мочевыделительной

**СЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ПОЛОВЫХ ГУБ В ОБЛАСТИ ЛОБКА ОБРАЗУЕТ**

- 1) переднюю спайку
- 2) преддверие влагалища
- 3) ножки клитора
- 4) заднюю спайку

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 2
- 2) 12
- 3) 3
- 4) 6

**ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бупивакаин
- 2) пропранолол
- 3) пропофол
- 4) бензокаин

**ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНА БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОКРУЖАЮЩИЕ ТКАНИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) инцизия
- 2) экстракция
- 3) резекция
- 4) эктомия

**ЗА 3-4 ЧАСА ДО ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПАЦИЕНТКЕ**

- 1) поспать
- 2) легкий перекус
- 3) чашку чая
- 4) сделать гимнастику

**РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ И**

- 1) яичниками, мочеиспускательным каналом, маткой
- 2) маткой, яичниками, прямой кишкой, влагалищем
- 3) влагалищем, маткой, мочевым пузырем
- 4) яичниками, маткой, маточными трубами, влагалищем

**«ЗАДНЕЕ» МОЛОКО СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) билирубина
- 2) белка
- 3) жира
- 4) холестерина

**СЫПЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ ХАРАКТЕР**

- 1) геморрагический
- 2) везикулёзный
- 3) пустулёзный
- 4) розеолёзный

**ТУБЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) малым
- 3) большим
- 4) лапароскопическим

**ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАНИМАЦИИ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) коррекции метаболических расстройств
- 2) проведении закрытого массажа сердца
- 3) искусственной вентиляции легких
- 4) восстановлении проходимости дыхательных путей

**ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ \_\_\_\_\_ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) противовирусные
- 2) антибактериальные
- 3) антикоагулянтные
- 4) глюкокортикостероидные

**ВЕГЕТОКОРРИГИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАПРАВЛЕННЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ**

- 1) репродуктивной системы
- 2) головного мозга
- 3) минерального баланса
- 4) артериального давления

**НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) постановка на учет
- 2) обучение уходу за новорожденным
- 3) сбор анамнеза
- 4) полное обследование женщины

**КАМЕРЫ СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАГРУЖАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 15
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 10

**АКУШЕРКА ФАП ПРОХОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ В И С КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 18
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 4

**БОЛЕЗНЬ «БЕРИ-БЕРИ» РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА**

- 1) тиамин
- 2) рибофлавин
- 3) эргокальциферол

4) цианокобаламин

**КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА НА ОДИН ПРИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ  
\_\_\_\_\_ ДОЗА**

- 1) разовая
- 2) пробная
- 3) насыщающая
- 4) ударная

**ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) температура тела 40 градусов, озноб
- 2) затрудненный отток молока
- 3) повышение артериального давления
- 4) свободный отток молока

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ СИМПТОМОВ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО  
СИНДРОМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) кальция
- 2) натрия
- 3) железа
- 4) калия

**СТЕПЕНЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПРИ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО УРОВНЮ**

- 1) альбуминемии
- 2) глюкозурии
- 3) протеинурии
- 4) гематокрита

**ВТОРАЯ ФАЗА ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) форсированным дыханием
- 2) патологическим типом дыхания
- 3) кратковременным апноэ
- 4) нормальным дыханием

**ОСЛОЖНЕНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОМ НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И  
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) HELLP-синдромом
- 2) EPH-синдромом
- 3) остеомалацией
- 4) гепатитом

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ И СПОР, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) продезинфицированными
- 2) одноразовыми

- 3) чистыми
- 4) стерильными

**УГРОЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ ОСТРОЙ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ НЕАДЕКВАТНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ КИСЛОРОДА КЛЕТКАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) шок
- 2) обморок
- 3) коллапс
- 4) синдром

**ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) шкала тяжести
- 2) дневник наблюдения
- 3) гемограмма
- 4) кардиограмма

**ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 14
- 2) 8
- 3) 12
- 4) 10

**ЛЕТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ СОПРЯЖЕНА С**

- 1) гиперхолестеринемией
- 2) гемофилией
- 3) карликовостью
- 4) анэнцефалией

**СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гнойный сальпингофарит
- 2) температура тела 39 градусов
- 3) обострение хронического пиелонефрита
- 4) сердечно-легочная недостаточность

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

## **ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В УСЛОВИЯХ**

- 1) ОРИТ
- 2) гинекологического отделения
- 3) послеродового отделения
- 4) АОПБ

## **ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧИСЛО**

- 1) женщин детородного возраста
- 2) детей, родившихся живыми и мертвыми
- 3) женщин, не состоящих в браке
- 4) мужчин, состоящих в браке

## **ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертензия
- 2) гипотония
- 3) анемия
- 4) гипогликемия

## **В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПОКАЗАНО**

- 1) проведение родостимуляции
- 2) рассечение промежности
- 3) кесарево сечение
- 4) применение акушерских щипцов

## **ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ЙОДА В ПИЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) диффузный токсический зоб
- 2) недостаток массы тела
- 3) эндемический зоб
- 4) сахарный диабет

## **НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ СИФИЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУТЬ**

- 1) парентеральный
- 2) воздушно-капельный
- 3) половой
- 4) контактно-бытовой

## **БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) наиболее отдаленными точками теменных бугров
- 2) границей волосистой части лба и затылочным бугром
- 3) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- 4) наиболее отдаленными точками венечного шва

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТКУ С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ВРАЧУ**

- 1) функциональной диагностики
- 2) терапевту
- 3) акушеру-гинекологу
- 4) физиотерапевту

**К ТРИХОМОНИАЗУ НИЖНЕГО ОТДЕЛА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН ОТНОСИТСЯ**

- 1) вагинит
- 2) вульвит
- 3) парауретрит
- 4) сальпингит

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗРЫВОВ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖ**

- 1) двуручный
- 2) ультразвуковой
- 3) кистевой
- 4) пальцевой

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) гиперемия
- 2) полиурия
- 3) акроцианоз
- 4) олигурия

**ТЕКУЩАЯ ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) выявления инфекции
- 2) выписки пациента
- 3) сдачи анализов на исследование
- 4) начала антибактериальной терапии

**ЕЖЕДНЕВНЫЙ УЧЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) журнала поступления в стационар
- 2) журнала выписки из стационара
- 3) опросных листов пациентов
- 4) историй болезни пациентов

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ**

- 1) сосков
- 2) рук

- 3) остроты обоняния
- 4) коленных суставов

**УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) брадипноэ
- 2) тахипноэ
- 3) брадикардия
- 4) тахикардия

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рациональное питание
- 2) природно-экологические факторы
- 3) гиперлипидемия
- 4) неблагоприятные климатические условия

**ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ОБЛУЧЕНИЕ**

- 1) инфракрасное
- 2) ультрафиолетовое
- 3) ультразвуковое
- 4) электромагнитное

**ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР НОВОРОЖДЕННОГО ВРАЧОМ-НЕОНАТОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) 2
- 2) 12
- 3) 4
- 4) 24

**ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 16-20
- 2) 6-10
- 3) 2-5
- 4) 11-15

**ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ В \_\_\_\_\_ ТОЧКАХ**

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

**ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) с приподнятыми ногами
- 2) с приподнятым изголовьем

- 3) на левом боку
- 4) на правом боку

### **ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- 1) дифтерии
- 2) туберкулеза
- 3) кори
- 4) коклюша

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИМЫШЕЧНО**

- 1) окситоцин
- 2) этамзилат
- 3) фамотидин
- 4) прегнантол

### **МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) всем беременным
- 2) только для женщин из группы высокого риска
- 3) только женщинам с выраженным болевым симптомом
- 4) женщинам, находящимся в родильном зале

### **ЗАЩИТОЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты
- 2) марлевая повязка, смоченная 2% раствором пищевой соды
- 3) промывание открытых участков кожи и глаз слабым раствором лимонной кислоты
- 4) сухая марлевая повязка

### **ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) позиция
- 2) вид
- 3) членорасположение
- 4) предлежание

### **СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В**

- 1) яичниках
- 2) гипофизе
- 3) трофобласте
- 4) надпочечниках

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) УВЧ на грудную клетку
- 2) интубацию трахеи

- 3) дыхательную гимнастику
- 4) диету с повышенным содержанием белка

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СРОКОМ ДО 12 НЕДЕЛЬ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) большим
- 3) малым
- 4) лапароскопическим

**ВНЕЗАПНО НАСТУПИВШИЙ РАЗРЫВ ЯИЧНИКА, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ КРОВИ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) анорексия
- 2) овуляция
- 3) аневризма
- 4) апоплексия

**В СРЕДНЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА СИФИЛИСА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО**

- 1) 2 лет
- 2) 1 года
- 3) 6 месяцев
- 4) 2 месяцев

**ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ДИХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО РОДРАЗРЕШЕНИЕ В \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 39-40
- 2) 34-35
- 3) 35-36
- 4) 37-38

**СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР**

- 1) секундами
- 2) днями
- 3) минутами
- 4) неделями

**ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ \_\_\_\_\_ ЖЕЛЕЗЫ**

- 1) щитовидной
- 2) поджелудочной
- 3) слюнной
- 4) вилочковой

## **ХОЛОДОВЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ ПРОБЫ ОТНОСЯТСЯ К ПРОБАМ С**

- 1) уменьшением венозного возврата
- 2) максимальной задержкой дыхания
- 3) дозированной физической нагрузкой
- 4) изменением внешней среды

## **К ПЕРИОПЕРАТИВНОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ВРЕМЯ**

- 1) с момента окончания операции до восстановления трудоспособности
- 2) от поступления пациента в стационар до начала операции
- 3) от принятия решения об операции до восстановления трудоспособности
- 4) с момента окончания операции до выписки из стационара

## **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ**

- 1) артериальное давление
- 2) сердцебиение плода
- 3) тонус матки
- 4) рефлекс Бабинского

## **ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ ПУЛЬС**

- 1) ритмичный, аритмичный
- 2) полный, пустой
- 3) твердый, мягкий
- 4) скорый, медленный

## **УСТАНОВКУ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА РОЖЕНИЦЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ В НАЧАЛЕ \_\_\_\_\_ ПЕРИОДА РОДОВ**

- 1) третьего
- 2) латентной фазы первого
- 3) активной фазы первого
- 4) второго

## **ПРИ РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) применить баллонную тампонаду матки
- 2) транспортировать пациентку в операционную
- 3) начать трансфузию заменителей крови
- 4) катетеризировать вторую периферическую вену

## **ВЗРОСЛЫМ ПАЦИЕНТАМ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕРАПИЯ**

- 1) варфарином
- 2) стрептокиназой
- 3) клопидогрелом
- 4) аспирином

**НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ ПРОГНОЗ**

- 1) благоприятный
- 2) неблагоприятный
- 3) крайне неблагоприятный
- 4) сомнительный

**ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ**

- 1) токсикоза
- 2) тромбоза
- 3) геморрагического шока
- 4) тяжелой преэклампсии

**ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 30-32
- 2) 32-40
- 3) 26-28
- 4) 36-38

**ОБМЫВАНИЕ РЕБЕНКА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ В ПЕРВЫЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 24
- 2) 16
- 3) 12
- 4) 20

**СОДЕРЖАНИЕ МНОГОДОЗОВОГО ФЛАКОНА ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 24
- 4) 3

**МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЕМ РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МАССА ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ГРАММ**

- 1) 750
- 2) 500
- 3) 1000
- 4) 1500

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) лейкоурия
- 2) лейкокемия

- 3) гликемия
- 4) гликурия

**МЕДИЦИНСКУЮ ОДНОРАЗОВУЮ МАСКУ РАЗРЕШАЕТСЯ НОСИТЬ НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ**

- 1) бланк экстренного извещения форма № 058/у
- 2) медицинскую карту стационарного больного
- 3) статистическую карту выбывшего из стационара
- 4) журнал приема и регистрации больных

**ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ**

- 1) выписку из амбулаторной карты
- 2) направление
- 3) памятку
- 4) лабораторный бланк

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 30 - 60
- 2) 110-160
- 3) 70-80
- 4) 90-100

**ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ТЕЧЕНИЕ \_\_ СУТОК**

- 1) 6-8
- 2) 8-10
- 3) 4-5
- 4) 2-3

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) усиление сократительной деятельности матки
- 2) уменьшение лактации
- 3) повышение артериального давления
- 4) гипогликемия

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ КРЕСТЦОВОГО МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ КОНЬЮГАТОЙ**

- 1) диагональной
- 2) истинной
- 3) анатомической
- 4) наружной

**ХОЛОДНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ В РОДАХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ К**

- 1) руке
- 2) голове
- 3) ноге
- 4) спине

**ВЫПОЛНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) сотрудникам социально-гуманитарных служб
- 2) подъехавшим на место происшествия родственникам
- 3) выездной бригаде скорой медицинской помощи
- 4) сотрудникам органов внутренних дел

**ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) применении кровезаменителей
- 2) применении баночного массажа
- 3) соблюдении постельного режима
- 4) ранней активизации

**НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ \_\_\_\_ %**

- 1) 60-80
- 2) 80-100
- 3) 20-40
- 4) 40-50

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ВИДЕ**

- 1) овариоэктомии
- 2) пангистерэктомии
- 3) тубэктомии
- 4) миомэктомии

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИКОТИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) полижинакс
- 2) бепантен
- 3) тержинан
- 4) солкосерил

**КВАРЦЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ**

- 1) дезинфекции
- 2) дератизации
- 3) дезинсекции
- 4) стерилизации

**ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МЕТОД**

- 1) паровой
- 2) инфракрасный
- 3) воздушный
- 4) газовый

**БОЛЬНОЙ ГЕПАТИТОМ А НАИБОЛЕЕ ЗАРАЗЕН В**

- 1) период желтухи
- 2) период реконвалесценции
- 3) преджелтушный период
- 4) начале инкубационного периода

**ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ БОЛИ И БЫСТРОЕ ЗАЖИВЛЕНИИ СОСКОВ У КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН НАСТУПАЕТ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ \_\_\_\_\_ ТЕРАПИИ**

- 1) гальванической
- 2) электромагнитной
- 3) ультразвуковой
- 4) лазерной

**НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ОПЕРАЦИЮ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ, ПРОВОДИТСЯ**

- 1) по всей передней поверхности тела
- 2) в краниосакральной области
- 3) на области операции
- 4) по всей задней поверхности тела

**БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ОБЩИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ, НАЧИНАЯ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ \_\_\_\_ МИНУТ(Ы)**

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 5

**ПРИ ОСТРОЙ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЬНЫЕ ОТМЕЧАЮТ ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) болей в сердце
- 2) общей слабости
- 3) выраженной одышки

4) отеков на ногах

**СКУДНЫЕ ИЛИ РЕДКИЕ МЕНСТРУАЦИИ С НАЧАЛА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ ПЕРВИЧНОЙ**

- 1) полименореей
- 2) альгоменореей
- 3) гиперменореей
- 4) олигоменореей

**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ СЕРОЗНОГО МАСТИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) обработку молочной железы этиловым спиртом
- 2) антибактериальную терапию
- 3) хирургическое лечение
- 4) повязку с хлоргексидином

**ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) длительного безводного периода
- 2) большой кровопотери
- 3) стремительных родов
- 4) нарушения метаболизма

**КАЛ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ СОБИРАЮТ В \_\_\_\_\_ КОНТЕЙНЕРЫ**

- 1) многоразовые
- 2) стеклянные
- 3) пластиковые
- 4) бумажные

**ДЛЯ СБОРА МОКРОТЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ \_\_\_\_\_ ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ**

- 1) стерильные
- 2) одноразовые
- 3) чистые
- 4) многоразовые

**ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ В СУСТАВЕ**

- 1) патологическая подвижность
- 2) боль
- 3) отсутствие активных движений
- 4) отек

**ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ АНОГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ФОРМА**

- 1) везикулезная
- 2) эритематозная
- 3) геморрагическая
- 4) буллезная

**МЕНОПАУЗА, НАСТУПИВШАЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 40 ЛЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) поздняя
- 2) ранняя
- 3) преждевременная
- 4) своевременная

**ПРАВЫМ КОСЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ**

- 1) верхним краем лонного сочленения и крестцовым мысом
- 2) правым крестцово-подвздошным сочленением и левым подвздошно-лобковым бугорком
- 3) наиболее отдаленными точками безымянных линий
- 4) левым крестцово-подвздошным сочленением и правым подвздошно-лобковым бугорком

**ПСИХОЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уменьшение кислородной стоимости работы
- 2) активация синтеза белков
- 3) увеличение числа митохондрий
- 4) преобладание положительных эмоций

**ПОКАЗАНИЕМ К НАПРАВЛЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В САНАТОРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) маловодие
- 2) чрезмерная рвота беременных
- 3) возраст беременной до 18 лет
- 4) многоводие

**МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 12
- 2) 11
- 3) 8
- 4) 13

**К СИМПТОМАМ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА ОТНОСИТСЯ**

- 1) брадикардия
- 2) потеря массы тела
- 3) колебание настроения
- 4) брадипноэ

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) терапии антидепрессантами

- 2) санаторно-курортного лечения
- 3) когнитивно-поведенческой терапии
- 4) физиотерапевтического лечения

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН К РОДАМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) лекции, беседы
- 2) тестирования
- 3) конференции
- 4) семинары

**АСФИКСИЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО, ПРИЧИНОЙ КОТОРОЙ СТАЛИ ИНТРАНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ АСФИКСИЯ**

- 1) вторичная
- 2) острая
- 3) первичная
- 4) хроническая

**ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) анемометр
- 2) гигрометр
- 3) термометр
- 4) барометр

**ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕКРОЗ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) прерывание беременности
- 2) миому матки
- 3) кисту яичника
- 4) кесарево сечение

**ДЛЯ ХЛАМИДИЙНОГО ЦЕРВИЦИТА ХАРАКТЕРНЫ \_\_\_\_\_ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА**

- 1) творожистые
- 2) кровянистые
- 3) слизисто-гнойные
- 4) сукровично-серозные

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ЧАСТОТОЙ \_\_\_\_\_ В МИНУТУ**

- 1) 160-180
- 2) 60-80
- 3) 10-20
- 4) 100-120

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ**

- 1) до 28 недель
- 2) до 12 недель
- 3) любом
- 4) до 22 недель

**ПАЦИЕНТ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕН ОДИН ДОМА БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В \_\_\_\_\_ БАЛЛА(ОВ)**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 6

**СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кетонурия
- 2) диспепсия
- 3) кровотечение
- 4) полидипсия

**ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВАКЦИНУ**

- 1) АДС-М
- 2) БЦЖ
- 3) КОКАВ
- 4) ФСМЕ-Иммун

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) полурия
- 2) диспноэ
- 3) гиперемия
- 4) олигурия

**ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВОЗНИКАЕТ ОДЫШКА**

- 1) смешанная
- 2) физиологическая
- 3) инспираторная
- 4) патологическая

**ПО ОКОНЧАНИИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА НАСТУПАЕТ \_\_\_\_\_ СИФИЛИС**

- 1) третичный
- 2) вторичный
- 3) скрытый
- 4) первичный

**ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧСС И АД ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПАЦИЕНТКИ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПРОБОЙ**

- 1) психоэмоциональной
- 2) велоэргометрической
- 3) клиностатической
- 4) ортостатической

**ВНУТРЕННИЕ НОЖКИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ, СЛИВАЯСЬ ПОД КЛИТОРОМ, ОБРАЗУЮТ**

- 1) уздечку клитора
- 2) переднюю спайку
- 3) заднюю спайку
- 4) уздечку губ

**К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) т-образная
- 2) \"чепец\"
- 3) уздечка
- 4) восьмиобразная

**ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ**

- 1) коническая
- 2) цилиндрическая
- 3) призматическая
- 4) шарообразная

**АКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) самостоятельное рождение последа
- 2) наружный массаж матки
- 3) применение спазмолитиков
- 4) ручное обследование полости матки

**ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К ПЛОДУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) антиагрегантов
- 2) антибактериальной терапии
- 3) антиретровирусной терапии
- 4) антикоагулянтов

**К ОСНОВНОМУ ПРИЗНАКУ ОТЕКА ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) лихорадка
- 2) свистящее дыхание

- 3) пеннистая мокрота
- 4) боль в груди

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДОВАНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПИЩУ ОБОГАЩЕННУЮ**

- 1) йодом
- 2) клетчаткой
- 3) солью
- 4) сахаром

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ**

- 1) с кардио-нагрузкой
- 2) укрепляющие тазовое дно
- 3) изменяющие положение органов
- 4) на расслабление диафрагмы

**ПОД РЕЗЕКЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) выскабливание полости
- 2) удаление части органа
- 3) удаление периферической части органа
- 4) полное удаление органа

**ДЛЯ МАССАЖА ПРОМЕЖНОСТИ В РОДАХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) вазелин
- 2) крем
- 3) гель
- 4) масло

**УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ НА 10 СМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) Альфельда
- 2) Шредера
- 3) Кюстнера-Чукалова
- 4) Гентера

**ПРИ ПЕРЕДНЕГОЛОВНОМ ВСТАВЛЕНИИ ГОЛОВКА ПЛОДА РОЖДАЕТСЯ \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) прямым
- 2) вертикальным
- 3) малым косым
- 4) средним косым

**К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нитрофурил

- 2) кальцемирн
- 3) лоратадин
- 4) амоксициллин

**ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАН ПРИЕМ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА ПРОЗРАЧНОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ ДО НАЧАЛА АНЕСТЕЗИИ**

- 1) 2 часа
- 2) 30 минут
- 3) 1 час
- 4) 15 минут

**ЦЕЛЮ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНДИВИДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) социальная интеграция в общество
- 2) полное физическое выздоровление
- 3) приобретение новых навыков
- 4) расширение круга общения

**ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ БОТУЛИЗМА СИМПТОМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) увеличение селезёнки
- 2) головная боль
- 3) параличи и парезы
- 4) серозный менингит

**ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ КРОВИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ**

- 1) д-димера
- 2) антител к тиреопироксидазе
- 3) глюкозы
- 4) хорионического гонадотропина

**БАРТОЛИНОВЫ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) внутренним половым органам женщин
- 2) внутренним половым органам мужчин
- 3) наружным половым органам мужчин
- 4) наружным половым органам женщин

**НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВА ХОЛЕСТЕРИНА В ПИЩЕ СОДЕРЖИТСЯ В**

- 1) овощах, фруктах
- 2) яйцах, сыре
- 3) кукурузе, горохе
- 4) рыбе, ягодах

**ИЗМЕНЕНИЕМ ФЕНОТИПА, КОПИРУЮЩИМ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО ВОЗНИКАЮЩИМ ПОД ВЛИЯНИЕМ**

**ФАКТОРОВ СРЕДЫ, НАРУШАЮЩИХ ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тератогения
- 2) морфоз
- 3) генокопия
- 4) фенокопия

**ГРАНИЦЕЙ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ И ВНУТРЕННИМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ЖЕНЩИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) задний свод влагалища
- 2) задняя промежность
- 3) передняя промежность
- 4) девственная плева

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ОТНОСЯТ \_\_\_\_\_ АНАЛИЗ РОДОСЛОВНОЙ**

- 1) генетический
- 2) лабораторный
- 3) клинический
- 4) статистический

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 7
- 4) 8

**КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ \_\_\_ РАЗ(А) ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 2

**ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ**

- 1) чашечки
- 2) канальцы
- 3) клубочки
- 4) лоханки

**ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) резкое повышение артериального давления
- 2) острая гипоксия мозга
- 3) метеоризм
- 4) высокая температура тела

**МЕНОПАУЗА, НАСТУПИВШАЯ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 55 ЛЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) своевременная
- 2) преждевременная
- 3) поздняя
- 4) ранняя

**ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКИ**

- 1) давящие
- 2) окклюзионные
- 3) влажные
- 4) сухие

**КОНТАКТНАЯ МЕТОДИКА ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С АБСЦЕССОМ БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) вместо антибактериальной терапии
- 2) до хирургического лечения
- 3) после хирургического лечения
- 4) для профилактики рецидива

**СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПЛОДОМ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ПО РОДОВОМУ КАНАЛУ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) биомеханизмом родов
- 2) асинклитизмом
- 3) конфигурацией головки
- 4) течением родов

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОРМОНА В МОЧЕ И КРОВИ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) вероятных
- 2) предположительных
- 3) сомнительных
- 4) достоверных

**ПРИ ЖАЛОБАХ НА ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН \_\_\_\_\_ ДУШ**

- 1) горячий
- 2) контрастный
- 3) циркулярный
- 4) холодный

**ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО РОДОВ РАЗВИВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) врожденный порок сердца
- 2) врожденная ветряная оспа

- 3) вторичный иммунодефицит
- 4) синдром задержки роста

**ВИДОМ ЦИРКУЛЯТОРНОГО ШОКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПЕРВИЧНЫМ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ ОЦК, ВЕНОЗНОГО ВОЗВРАТА, СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА И ДОСТАВКИ КИСЛОРОДА, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШОК**

- 1) ожоговый
- 2) гиповолемический
- 3) рефрактерный
- 4) травматический

**ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕШЕНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) опистотонус
- 2) гидрофобия
- 3) телеангиэктазии
- 4) бубон

**ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отхождение околоплодных вод
- 2) отхождение слизистой пробки из цервикального канала
- 3) увеличение двигательной активности плода
- 4) появление регулярных схваток

**ВСЕ ПАЦИЕНТКИ С АМЕНОРЕЯМИ ПОДЛЕЖАТ \_\_\_\_\_ НАБЛЮДЕНИЮ**

- 1) постоянному
- 2) стационарному
- 3) диспансерному
- 4) ежегодному

**ПОСТУКИВАНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ МОЛОТОЧКОМ ПО ЗАПЯСТЬЮ (НАД МЕСТОМ ПРОХОЖДЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА) ЯВЛЯЕТСЯ ТЕСТОМ**

- 1) Тинеля
- 2) Дуркана
- 3) Фалена
- 4) Голобородько

**ДИСМЕНОРЕЯ, ПОЯВИВШАЯСЯ В ТЕЧЕНИЕ 6-12 МЕСЯЦЕВ С МЕНАРХЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вторичной
- 2) механической
- 3) органической
- 4) первичной

**НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12

- 2) 3
- 3) 2
- 4) 6

**ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- 1) состояние лимфоузлов
- 2) состояние прямой кишки
- 3) степень развитости мышц брюшного пресса
- 4) состояние внутренних половых органов

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) судорожный синдром
- 2) отслойка сетчатки
- 3) отслойка плаценты
- 4) гиперемия кожи

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА**

- 1) определение причины состояния пострадавшего
- 2) поиск возможных медицинских документов
- 3) наличие у него дыхания и центрального пульса
- 4) поиск документов, удостоверяющих личность

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАРА ВНУТРЬ УПАКОВКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ \_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

**ПОД ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) запоздалое сокращение сердца
- 2) уменьшение частоты сердечных сокращений
- 3) увеличение частоты сердечных сокращений
- 4) преждевременное сокращение сердца

**СИМПТОМОМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приступ удушья
- 2) снижение артериального давления
- 3) повышение артериального давления
- 4) подъем температуры тела

**ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ**

- 1) микромассажа клеток

- 2) поглощения токсинов крови
- 3) разрушения патогенных организмов
- 4) стимуляции гемопоэза

### **ИЗЖОГА БЕРЕМЕННЫХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) гастроэзофагеального рефлюкса
- 2) появления эрозий на слизистой пищевода
- 3) уменьшения образования слизи в желудке
- 4) повышения кислотности желудочного сока

### **ВО ВРЕМЯ РОДОВ ПРИЕМ ЖИДКОСТИ**

- 1) запрещен
- 2) ограничен
- 3) рекомендован
- 4) противопоказан

### **ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) воспалении придатков матки
- 2) перекруте ножки опухоли яичника
- 3) хроническом эндометрите
- 4) перфорации матки

### **ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ**

- 1) канальцы
- 2) артерии
- 3) клубочки
- 4) чашечки

### **НАЛИЧИЕ ПАРТНЕРА В РОДАХ**

- 1) приветствуется
- 2) нежелательно
- 3) запрещается
- 4) мешает

### **ПРИ ЖАЛОБАХ НА ЗАПОРЫ И ГЕМОРРОЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВИТЬ В РАЦИОН ПИТАНИЯ**

- 1) острые приправы
- 2) животные жиры
- 3) слабительные препараты
- 4) пищевые волокна

### **ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) отравление
- 3) аутоиммунные нарушения

4) хеликобактериальная инфекция

**ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ У  
НОВОРОЖДЕННЫХ, МАТЕРИ КОТОРЫХ СТРАДАЮТ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,  
НАЗЫВАЕТСЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ**

- 1) анэмбриония
- 2) фетопатия
- 3) аутоплоидия
- 4) нейропатия

**ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сперма
- 2) слюна
- 3) кровь
- 4) моча

**ПРИ АМНИОСКОПИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) многоплодную беременность
- 2) аномалии развития плода
- 3) цвет околоплодных вод
- 4) состав околоплодных вод

**ПАЦИЕНТКЕ С ХОРИОАМНИОНИТОМ ТЕРМОМЕТРИЮ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ  
КАЖДЫЕ(Й) \_\_\_\_ ЧАС(А)**

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 3

**ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ  
ЖИДКОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) многоплодие
- 2) маловодие
- 3) микросомия плода
- 4) рубец на матке

**БЕРЕМЕННЫХ ГОТОВЯТ К БУДУЩЕМУ МАТЕРИНСТВУ В**

- 1) «школах»
- 2) «колледжах»
- 3) «санаториях»
- 4) «профилакториях»

**ТУБЕРКУЛЁЗ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИЯМ**

- 1) сапронозным
- 2) антропонозным

- 3) антропозоонозным
- 4) зоонозным

**В НОРМЕ ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В СОСТАВ ПУПОВИНЫ ВХОДЯТ**

- 1) две вены и одна артерия
- 2) две артерии и одна вена
- 3) две вены и две артерии
- 4) одна вена и одна артерия

**КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) обладать необратимым действием
- 2) иметь сложные инструкции применения
- 3) оказывать системное влияние на организм
- 4) быть высокоэффективным

**В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ СМ**

- 1) 28 - 29
- 2) 31 - 32
- 3) 25 - 26
- 4) 20 - 21

**К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) подкожный
- 2) ректальный
- 3) внутривенный
- 4) ингаляционный

**ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) разгибание головки
- 2) сгибание головки
- 3) внутренний поворот головки затылком кзади
- 4) внутренний поворот головки затылком кпереди

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕЗИНЫ В АВТОКЛАВЕ СТЕРИЛИЗУЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 135
- 2) 120
- 3) 165
- 4) 140

**ТЕРМИН «...ГЛЮСАЕМИА» (УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В КРОВИ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ**

- 1) hyper

- 2) hypo
- 3) poly
- 4) para

**I МОМЕНТ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ \_\_\_\_\_ ГОЛОВКИ ПЛОДА**

- 1) наружный поворот
- 2) внутренний поворот
- 3) сгибание
- 4) разгибание

**БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) вечером накануне операции
- 2) за двое суток до операции
- 3) утром накануне операции
- 4) утром в день операции

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С III-IV СТАДИЕЙ ЭНДОМЕТРИОЗА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ**

- 1) электросонтерапию
- 2) акупунктуру
- 3) медицинский массаж
- 4) поведенческую терапию

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ**

- 1) сотрудников социально-гуманитарной службы
- 2) ближайших родственников пострадавшего
- 3) бригаду скорой медицинской помощи
- 4) сотрудников отдела внутренних дел

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 80
- 2) 86
- 3) 70
- 4) 110

**СХОЖИМИ МОМЕНТАМИ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ВИДАХ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) дополнительное сгибание головки
- 2) сгибание головки, разгибание головки
- 3) боковое сгибание в шейно-грудном отделе
- 4) асинклитическое вставление

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОДЕ ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 100 - 120
- 2) 30 - 40
- 3) 60 - 90
- 4) 20 - 30

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 110 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) асистолия
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) экстрасистолия

**КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ В ЦСО ПОДЛЕЖИТ \_\_\_\_\_ % ОТ ИНСТРУМЕНТОВ КАЖДОГО НАИМЕНОВАНИЯ**

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 15
- 4) 10

**ПРИ ОТЕКЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВНУТРИВЕННО ВВОДИТСЯ**

- 1) розувастатин
- 2) фуросемид
- 3) изосорбида мононитрат
- 4) телмисартан

**ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ**

- 1) прием углеводов
- 2) стресс
- 3) переохлаждение
- 4) прием жирной пищи

**В АКТИВНОЙ ФАЗЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 50
- 4) 60

**БЕРЕМЕННОЙ С ПОЛНЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) операции кесарево сечение в неотложном порядке
- 2) профилактики дистресс-синдрома плода
- 3) операции кесарево сечение в плановом порядке
- 4) консервативной терапии, пролонгирующей беременность

**СТАНДАРТОМ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) доплерометрия
- 2) цервикометрия
- 3) амниоцентез
- 4) хорионбиопсия

**ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ \_\_\_\_\_ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) адренергических
- 2) отхаркивающих
- 3) бронхолитических
- 4) жаропонижающих

**ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И)**

- 1) 24
- 2) 22
- 3) 16
- 4) 28

**ПОКАЗАТЕЛИ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА И ВЫСОТЫ СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЬ В**

- 1) протокол УЗИ
- 2) протокол ВРТ
- 3) партограмму
- 4) гравидограмму

**ПЕРВЫМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) вставление головки плода
- 2) предлежащую часть плода
- 3) высоту дна матки
- 4) возбудимость матки

**ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ДОЛЖНЫ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ С**

- 1) угрозой прерывания беременности
- 2) нормально протекающей беременностью
- 3) полным предлежанием плаценты
- 4) преэклампсией тяжелой степени

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ АЭРОБНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ \_\_\_\_\_ МИНУТ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 150
- 2) 120
- 3) 130

4) 170

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 54 УДАРА В МИНУТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) норма
- 2) тахикардия
- 3) брадикардия
- 4) экстрасистолия

**ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

- 1) психиатра - нарколога
- 2) анестезиолога-реаниматолога
- 3) медицинского психолога
- 4) гинеколога - эндокринолога

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ У ПАЦИЕНТКИ ВЫРАЖЕННОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ТОШНОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НЕОБХОДИМО**

- 1) дать пациентке отдохнуть
- 2) использовать другую пробу
- 3) снизить интенсивность пробы
- 4) прекратить тестирование

**СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И**

- 1) дайвинг
- 2) борьбу
- 3) бег
- 4) плавание

**ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) ничего не делать
- 2) держать руки беременной
- 3) обеспечить проходимость дыхательных путей
- 4) осуществить переливание плазмы крови

**СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА \_\_\_\_\_ ЭПИТЕЛИЕМ**

- 1) однослойным кубическим
- 2) цилиндрическим реснитчатым
- 3) многослойным плоским
- 4) однослойным плоским

**ПРИ ЛЮБОМ СПОСОБЕ ВВЕДЕНИЯ ПИЩИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В \_\_\_\_\_ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ**

- 1) лежащем
- 2) полулежащем
- 3) полусидящем
- 4) сидящем

### **НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ**

- 1) замачивают в растворе соды
- 2) высушивают в сушильном шкафу
- 3) протирают антисептиком
- 4) промывают в спирте

### **ДАНЫМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) число отдельных заболеваний, зарегистрированных в данном году; среднегодовая численность населения
- 2) число заболеваний, выявленных впервые в данном году; среднегодовая численность населения
- 3) число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за медицинской помощью
- 4) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

### **ДЕЛЕЦИЯ КРОТКОГО ПЛЕЧА 5 ХРОМОСОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА**

- 1) кошачьего крика
- 2) Патау
- 3) Дауна
- 4) Вольфа-Хиршхорна

### **К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МАЛЯРИЙНОГО ПАРОКСИЗМА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) тошнота, рвота, диарея
- 2) озноб, жар, пот
- 3) бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение
- 4) жажда, сухость во рту, олигурия

### **ИЛЫ ПРЭСНЫХ ВОДОЕМОВ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ \_\_\_\_\_ ГРЯЗЕЙ**

- 1) торфяных
- 2) сапропелевых
- 3) сопочных
- 4) сульфидных

### **ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПЛОДА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) большим косым
- 2) малым поперечным

- 3) малым косым
- 4) большим поперечным

### **ЦЕЛЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ КАМЕР ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высушивание инструментов после мытья
- 2) устранение остатков моющих средств
- 3) снижение риска контаминации инструментов
- 4) быстрое охлаждение инструментов

### **ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ**

- 1) лейкопения, уменьшение СОЭ
- 2) снижение гемоглобина и цветового показателя
- 3) увеличение гемоглобина и эритроцитов
- 4) лейкоцитоз, увеличение СОЭ

### **КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАК ЖЕ**

- 1) гипофизом
- 2) плацентой
- 3) щитовидной железой
- 4) гипоталамусом

### **ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) полулежа с приподнятыми ногами
- 2) лежа на левом боку
- 3) полусидя с опущенными ногами
- 4) лежа на правом боку

### **БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ ФОРМУ**

- 1) ромбовидную
- 2) овальную
- 3) округлую
- 4) треугольную

### **ТЕПЛЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ В РОДАХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ К \_\_\_\_\_ ЖЕНЩИНЫ**

- 1) нижней части живота
- 2) области сердца
- 3) икроножным мышцам
- 4) шейно-воротниковой зоне

### **БЕСПЛОДИЕ, ПРИ КОТОРОМ НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, НЕСМОТря НА РЕГУЛЯРНУЮ ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) первичным
- 2) маточным
- 3) трубным
- 4) вторичным

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лапароскопия
- 2) цистоскопия
- 3) гистероскопия
- 4) кольпоскопия

**ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 10,5
- 2) 11
- 3) 12
- 4) 13

**ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТАХ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 18-19
- 2) 24-25
- 3) 20-21
- 4) 23-24

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) каждый день
- 2) при выявлении инфекции
- 3) каждый месяц
- 4) после выписки пациента

**ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) реакция гиперчувствительности немедленного типа
- 2) снижение сократительной способности миокарда
- 3) уменьшение объема циркулирующей крови
- 4) реакция гиперчувствительности замедленного типа

**УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ РОДИЛЬНИЦ С ГИПОГАЛАКТИЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ \_\_\_\_\_ МЕТОДА**

- 1) седативного
- 2) тонизирующего
- 3) ионкорректирующего
- 4) трофостимулирующего

**У ВСЕХ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА**

- 1) правой руке
- 2) это не имеет значения
- 3) левой руке
- 4) обеих руках

**УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ В ПЛАНЕ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ**

- 1) угрозу
- 2) опасность
- 3) норму
- 4) ритуал

**ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ГОЛОВКИ**

- 1) дополнительное сгибание
- 2) внутренний поворот
- 3) разгибание
- 4) сгибание

**В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ \_\_\_\_\_ ПЕРИОД (А)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 1

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ ПОКАЗАНЫ \_\_\_\_\_ ВАННЫ**

- 1) хлоридно-натриевые
- 2) хвойно-магниевые
- 3) скипидарные
- 4) сероводородные

**РОДЫ ПРОВОДЯТ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ**

- 1) гепатозе беременных
- 2) остром гепатите
- 3) хроническом тонзиллите
- 4) трихомониазе

**ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- 1) рождением последа
- 2) прорезыванием головки плода
- 3) рождением ребенка
- 4) полным раскрытием маточного зева

**НА СТЕРИЛЬНОМ СТОЛЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОЖНО ХРАНИТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 3
- 3) 24
- 4) 6

**ПРИЗНАКОМ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) промокание повязки кровью
- 2) усиление боли
- 3) побледнение краев
- 4) выхождение кишечных петель под кожу

**ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ  
\_\_\_\_\_ МАЛОГО ТАЗА**

- 1) входа
- 2) узкой части
- 3) выхода
- 4) широкой части

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО СИФИЛИСА У  
БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) тетрациклины
- 2) карбапенемы
- 3) аминогликозиды
- 4) пенициллины

**ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) клиническая смерть
- 2) потеря сознания
- 3) судорожное сокращение мышц
- 4) расстройства дыхания и кровообращения

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 30
- 2) 15
- 3) 28
- 4) 35

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С ВЫРАЖЕННЫМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ С ЦЕЛЬЮ СЕДАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) йодобромных ванн
- 2) селективной хромотерапии
- 3) контрастного душа
- 4) импульсной магнитотерапии

### **К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) мотилиум
- 2) алмагель
- 3) рифампицин
- 4) ранитидин

### **СИЛЬНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ СХВАТКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) патологического прелиминарного периода
- 2) слабости родовой деятельности
- 3) дискоординированной родовой деятельности
- 4) чрезмерной родовой деятельности

### **ПАЦИЕНТЫ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ**

- 1) во всех случаях острых отравлений
- 2) при тяжелом состоянии пациента
- 3) в случаях, когда не удалось промыть желудок
- 4) при бессознательном состоянии пациента

### **ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЧИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ОСНОВАНА НА ВЫЯВЛЕНИИ**

- 1) хорионического гонадотропина
- 2) плоского эпителия
- 3) уробилиногена
- 4) кетоновых тел

### **МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В \_\_\_\_ ЭТАПА(ОВ)**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

### **ЦЕЛЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ**

- 1) крестцово - подвздошных сочленений
- 2) мышц промежности
- 3) реберно - позвоночных сочленений
- 4) грудных мышц

### **К ВИДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) гимнастика
- 2) борьба
- 3) плавание
- 4) йога

**К НАИБОЛЕЕ РЕДКИМ ФОРМАМ АНОМАЛИИ ТАЗА ОТНОСЯТ**

- 1) остеомалаятический
- 2) общеравномерно-суженный
- 3) поперечносуженный
- 4) простой плоский

**РАЗНОСТЬ МЕЖДУ СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дефицитом пульса
- 2) максимальным артериальным
- 3) пульсовым давлением
- 4) минимальным артериальным

**ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПРАВОЙ ИЛИ ЛЕВОЙ СТОРОНЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вид
- 2) позиция
- 3) вставление
- 4) предлежание

**КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) положительный френикус-симптом
- 2) нависание сводов влагалища
- 3) кровянистые выделения из половых путей
- 4) болезненность придатков матки при пальпации

**НА КУРОРТЫ С СУЛЬФИДНЫМИ ВАННАМИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТКИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- 1) опорно-двигательного аппарата
- 2) органов пищеварения
- 3) периферической нервной системы
- 4) сердечно-сосудистой системы

**В СЕМЬЯХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ \_\_\_\_\_ ИНВАЗИВНОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) постнатальной
- 2) ранней
- 3) неонатальной
- 4) преимплантационной

**К ТИПИЧНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) гипотония
- 2) анафилактический шок

- 3) тошнота и рвота
- 4) кровотечение

### **ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ**

- 1) воздушно-капельный
- 2) пищевой
- 3) контактный
- 4) парентеральный

### **В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 9
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 6

### **ПРИ ВРОЖДЁННОЙ КРАСНУХЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) деформация зубов, кератит, глухота
- 2) желтуха, увеличение печени и селезенки
- 3) катаракта, микроцефалия, пороки сердца
- 4) сиалоаденит, орхит, панкреатит

### **ВАРИАНТОМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССА БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) энуклеация
- 2) вапоризация
- 3) катетеризация
- 4) вскрытие

### **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) наложить сухую стерильную повязку
- 2) снять швы, дренировать рану
- 3) наложить повязку с ихтиоловой мазью
- 4) ввести наркотический анальгетик

### **СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В БИКСЫ С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 28
- 2) 14
- 3) 20
- 4) 40

### **НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биопсия хориона
- 2) амниоцентез
- 3) электрокардиография
- 4) ультразвуковое исследование

**ПАЦИЕНТАМ С НЕВРИТОМ СЛУХОВОГО НЕРВА ПРОТИВОПОКАЗАН**

- 1) дротаверин
- 2) стрептомицин
- 3) нитроглицерин
- 4) панкреатин

**ПРИ ГЛУБОКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЦИЕНТКИ ОПТИМАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) индуктотермии
- 2) ультрафиолетового облучения
- 3) гальванизации
- 4) радиационного облучения

**ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ**

- 1) В
- 2) Г
- 3) Б
- 4) А

**НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ингаляционная анестезия
- 2) проводниковая анестезия
- 3) эпидуральная анестезия
- 4) правильное дыхание

**АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хлорпирамина гидрохлорид
- 2) увлажненный кислород
- 3) кальция глюконат
- 4) трехвалентное железо

**ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ПРАВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ \_\_\_\_\_ ЭЛЕКТРОД**

- 1) желтый
- 2) красный
- 3) черный
- 4) зеленый

**ПРИ ГИПОКСИИ ПЛОДА АЦИДОЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ**

- 1) снижается

- 2) нарастает
- 3) изменяется так же, как в эритроцитах
- 4) существенно не изменяется

**К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, КУПИРУЮЩЕМУ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) фраксипарин
- 2) амоксиклав
- 3) промедол
- 4) сальбутамол

**ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА НАПРАВЛЕНО НА**

- 1) подготовку к беременности
- 2) подавление овуляции
- 3) улучшение качества жизни
- 4) стимуляцию овуляции

**ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПРИ РАНЕЕ РЕГУЛЯРНОМ МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) олигоменореей
- 2) аменореей
- 3) опсоменореей
- 4) полименореей

**ПОРАЖЕНИЕМ МИОКАРДА, ВЫЗВАННЫМ НАРУШЕНИЕМ КРОВотоКА ПО КОРОНАРНЫМ АРТЕРИЯМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сердечная недостаточность
- 2) гипертоническая болезнь
- 3) ишемическая болезнь сердца
- 4) постинфарктный кардиосклероз

**КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тахипноэ
- 2) гиперемия кожных покровов
- 3) брадипноэ
- 4) повышенное потоотделение

**ДИСМЕНОРЕЯ, СВЯЗАННАЯ С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) механической
- 2) функциональной
- 3) вторичной
- 4) первичной

**ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК СОВОКУПНОСТЬ**

## **ПРОЦЕССОВ**

- 1) рождаемости, смертности, первичной заболеваемости, общей заболеваемости
- 2) естественного прироста, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, заболеваемости, смертности
- 3) рождаемости, смертности, естественного прироста населения
- 4) рождаемости, брака, разводов, младенческой смертности, первичной заболеваемости

## **НЕОБХОДИМЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА "ОСТРЫЙ ЖИВОТ" ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перкуссия грудной клетки
- 2) аускультация сердца
- 3) определение тургора тканей
- 4) пальпация живота

## **РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ АУСКУЛЬТАЦИЮ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ КАЖДЫЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 10

## **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ЖЕНЩИН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ККАЛ**

- 1) 3800 - 4000
- 2) 1800 - 2000
- 3) 2800 - 3000
- 4) 800 - 1000

## **МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ**

- 1) трансабдоминальным доступом под обезболиванием
- 2) трансабдоминальным доступом без обезболивания
- 3) влагалищным доступом без обезболивания
- 4) влагалищным доступом под обезболиванием

## **ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ ПРЕЭКЛАМПСИИ**

- 1) ранней
- 2) легкой
- 3) тяжелой
- 4) умеренной

## **ЗАНЯТИЯ ЛФК В ДНИ МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) проводят 2-3 раза в день

- 2) проводят 2-3 раза в неделю
- 3) сочетают с пеллоидотерапией
- 4) противопоказаны

**ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ**

- 1) сухой пробиркой
- 2) сухой банкой
- 3) стерильной пробиркой
- 4) стерильной банкой

**ПРИ ЖАЛОБАХ НА БОЛЬ В ЛОБКЕ БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО**

- 1) бандажа
- 2) корсета
- 3) воротника
- 4) наколенника

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА И УСТРАНЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ГИМНАСТИКА**

- 1) Стрельниковой
- 2) Кегеля
- 3) Щетина
- 4) Бутейко

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 11
- 2) 12,5
- 3) 13
- 4) 9

**К ФУНКЦИЯМ АКУШЕРКИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ ОТНОСИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО**

- 1) контрацепции
- 2) прерыванию беременности
- 3) уходу за новорожденным
- 4) гигиене

**ПЕРВИЧНЫМ АФФЕКТОМ ПРИ СИФИЛИСЕ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШАНКР**

- 1) мягкий
- 2) плотный
- 3) жидкий
- 4) твердый

**ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И)**

- 1) 16
- 2) 20
- 3) 24
- 4) 28

**ПОД ТЕРМИНОМ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ» ПОНИМАЮТ ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЕНКА ТОЛЬКО \_\_\_\_\_ МОЛОКОМ**

- 1) сцеженным
- 2) пастеризованным
- 3) донорским
- 4) грудным

**ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИН**

- 1) 90-100
- 2) 60-80
- 3) 100-110
- 4) 40-60

**ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОДГОТОВИТЬ РОДИЛЬНИЦУ С НОВОРОЖДЕННЫМ К ПЕРЕВОДУ В \_\_\_\_\_ ОТДЕЛЕНИЕ**

- 1) инфекционное
- 2) акушерское физиологическое
- 3) акушерское наблюдательное
- 4) гинекологическое

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ПИЩИ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ККАЛ В СУТКИ**

- 1) 1300
- 2) 1200
- 3) 1500
- 4) 1400

**СИНТЕЗ И МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА D3 УСИЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ \_\_\_\_\_ ОБЛУЧЕНИЯ**

- 1) средневолнового ультрафиолетового
- 2) длинноволнового ультрафиолетового
- 3) инфракрасного
- 4) радиационного

**СИНДРОМОМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ОРГАНИЗМА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипотония
- 2) брадикардия
- 3) олигурия
- 4) гиповолемия

**АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) 5% р-р эфедрина гидрохлорид
- 2) 0,1% р-р атропина сульфат
- 3) 5% р-р натрия димеркаптопропансульфонат
- 4) 0,1% р-р эпинефрина гидрохлорид

**ПОЯВЛЕНИЕ БЕЛКА В МОЧЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) глюкозурия
- 2) пиурия
- 3) гематурия
- 4) протеинурия

**К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) окклюзионная
- 2) Дезо
- 3) черепашья
- 4) спиральная

**ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) жареные блюда
- 2) кисломолочные блюда
- 3) фрукты и овощи
- 4) пшеничный хлеб

**ГЕПАТИТ С ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сапронозом
- 2) зоонозом
- 3) антропонозом
- 4) антропозоонозом

**ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ РАЗ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 7
- 4) 16

**К БАРЬЕРНЫМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) вазэктомия

- 2) внутриматочный контрацептив
- 3) презерватив
- 4) прерванный половой акт

#### **СПОСОБСТВУЕТ ЗАЖИВЛЕНИЮ ТРЕЩИН СОСКОВ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) электрокоагуляции
- 2) озонотерапии
- 3) криотерапии
- 4) фототерапии

#### **У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ДИАБЕТОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ**

- 1) резко уменьшена
- 2) остается без изменений
- 3) уменьшена
- 4) повышена

#### **ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- 1) средним косым
- 2) малым поперечным
- 3) большим косым
- 4) малым косым

#### **ПОД ИССЕЧЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) удаление периферической части органа
- 2) дренирование патологического очага
- 3) полное удаление органа
- 4) удаление патологически измененных тканей

#### **ТЕРМИН «НАЕМАНГИ...» (СОСУДИСТАЯ ОПУХОЛЬ) ИМЕЕТ СУФФИКС**

- 1) -itis
- 2) -oma
- 3) -ismus
- 4) -iasis

#### **НОВОРОЖДЕННОГО ВЫКЛАДЫВАЮТ НА ЖИВОТ И ГРУДЬ МАТЕРИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЯМОГО \_\_\_\_\_ КОНТАКТА**

- 1) эмоционального
- 2) телесного
- 3) теплового
- 4) психологического

#### **К ВЛАГАЛИЩНЫМ РОДОРАЗРЕШАЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛОДА ОТНОСИТСЯ**

- 1) амниотомия

- 2) вакуум-экстракция
- 3) эпизиотомия
- 4) вакуум-аспирация

**ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОЛИЗА У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ**

- 1) креатинин
- 2) уровень тромбоцитов
- 3) суточную протеинурию
- 4) гематокрит

**ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АНГИНОЗНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА**

- 1) сердцебиение
- 2) головная боль
- 3) загрудинная боль
- 4) отеки на ногах

**ЛЕЧЕНИЕ НЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) амбулаторно
- 2) стационарно
- 3) оперативно
- 4) паллиативно

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НИФЕДИПИНА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ (ЮТСЯ)**

- 1) вторичная слабость родовой деятельности
- 2) медикаментозное прерывание беременности
- 3) гипотоническое маточное кровотечение
- 4) начавшиеся преждевременные роды

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ \_\_\_\_\_ МОЛОКА**

- 1) ультрапастеризованного
- 2) топленого
- 3) непастеризованного
- 4) кипяченого

**МЕНОПАУЗА, НАСТУПИВШАЯ В ВОЗРАСТЕ 45-55 ЛЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) преждевременная
- 2) своевременная
- 3) поздняя
- 4) ранняя

**БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_**

## **САНТИМЕТРОВ**

- 1) 9
- 2) 8
- 3) 11
- 4) 12

## **ВТОРОЙ УЗ - СКРИНИНГ ПЛОДА ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(Я)**

- 1) 28 - 30
- 2) 15 - 17
- 3) 18 - 21
- 4) 24 - 26

## **НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ БЕЛКАМИ ПИЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) овощи
- 2) мучные изделия
- 3) крупы
- 4) мясо

## **БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕЛА, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ**

- 1) головокружения
- 2) одышки
- 3) изжоги
- 4) отеков

## **ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПОЛНОГО ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) трофобластическая эмболизация
- 2) влагалищное кровотечение
- 3) артериальная гипертензия
- 4) проявление гипертиреоза

## **ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ЗАПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ**

- 1) дугласова углубления
- 2) прямой кишки
- 3) мочевого пузыря
- 4) шейки матки

## **НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тромбоз
- 2) кольпит
- 3) эндометрит
- 4) перитонит

## **ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ И ИХ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УЧЕТ ОРГАНИЗУЕТ**

- 1) дежурная акушерка
- 2) врач-эпидемиолог
- 3) лаборант-эксперт
- 4) операционная медсестра

## **ПАЦИЕНТАМ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ НА КОЖЕ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ РЕКОМЕНДОВАНО МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) антисептиков
- 2) антибиотиков
- 3) антикоагулянтов
- 4) антимикотиков

## **ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) улучшение процесса регенерации
- 2) подготовка пациента к операции
- 3) оформление пациента в стационар
- 4) предупреждение возможных осложнений

## **В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПРОИСХОДИТ**

- 1) оценка качества питательных веществ
- 2) механическая обработка питательных веществ
- 3) расщепление и всасывание питательных веществ
- 4) расщепление питательных веществ с помощью микрофлоры

## **НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА, ПРИ КОТОРОМ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 38 ДНЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) полименореей
- 2) олигоменореей
- 3) пройоменореей
- 4) аменореей

## **ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ БАРБИТУРАТАМИ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНФУЗИЯ НАТРИЯ**

- 1) хлорида
- 2) гидрокарбоната
- 3) нитрита
- 4) тиосульфата

## **ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИК РЕЛАКСАЦИИ И ЙОГИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) снижению чувства тревоги
- 2) увеличению продолжительности первого периода

- 3) повышению вероятности медикаментозного обезболивания
- 4) уменьшению удовлетворенности родами

**ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) лапароскопическим
- 2) средним
- 3) малым
- 4) большим

**ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ**

- 1) Скробанским К.К.
- 2) Бодяжиной В.И.
- 3) Строгановым В.В.
- 4) Славянским К.Ф.

**ФИЗИОТЕРАПИЮ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ РАЦИОНАЛЬНО НАЧИНАТЬ НА \_\_\_\_\_ СУТКИ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 7

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЕ ПЛОДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- 1) родильные дома
- 2) гинекологические стационары
- 3) поликлиники для взрослого населения
- 4) женские консультации

**НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА У ЖЕНЩИНЫ ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ**

- 1) кормления
- 2) физической активности
- 3) сна
- 4) состояния покоя

**ПАЦИЕНТ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ И ИМЕЮЩИЙ ОЦЕНКУ ШРМ 0-1 БАЛЛА**

- 1) направляется на второй этап медицинской реабилитации
- 2) нуждается в стационарном лечении
- 3) направляется на третий этап медицинской реабилитации
- 4) не нуждается в продолжении реабилитации

**ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ**

- 1) редкое, с длительным апноэ
- 2) поверхностное, неритмичное
- 3) шумное, глубокое
- 4) с затрудненным вдохом

**ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАННЕЙ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ СТАДИИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мигрирующая эритема
- 2) атрофический акродерматит
- 3) очаговая склеродермия
- 4) доброкачественная лимфоцитома

**В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) подготовке пациентки к экстренной операции
- 2) подготовке пациентки к плановой операции
- 3) проведении дезинтоксикационной терапии
- 4) применении болеутоляющих препаратов

**АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТОНΙΑ У ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СНИЖЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НИЖЕ \_\_\_\_\_ ММ.РТ.СТ**

- 1) 100/60
- 2) 120/80
- 3) 140/90
- 4) 110/70

**РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) Б
- 3) В
- 4) Г

**ВЫЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ \_\_\_\_\_ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТА**

- 1) выборочное
- 2) поэтажное
- 3) патоморфологическое
- 4) целенаправленное

**К ЧИСТО ПРОГЕСТИНОВЫМ КОНТРАЦЕПТИВАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) мини-свечи
- 2) мини-пили
- 3) накожный пластырь
- 4) мини-тампоны

**ТРАНСПОРТИРОВКА ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЭВАКУАЦИЯ**

- 1) медицинская
- 2) транспортная
- 3) экстренная
- 4) упреждающая

**К СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) стенокардия Принцметала
- 2) тиреоидит Хашимото
- 3) саркома Капоши
- 4) хорея Гентингтона

**СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА В ТАБЛЕТКАХ И В ВИДЕ СПРЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) буккальный
- 2) трансдермальный
- 3) пероральный
- 4) сублингвальный

**ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ**

- 1) появления кровянистых выделений
- 2) рождения последа
- 3) появления последовых схваток
- 4) рождения плода

**ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ В 38 - 39 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЫЧНО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СМ**

- 1) 25 - 28
- 2) 32 - 33
- 3) 35 - 38
- 4) 21 - 25

**ВРЕМЯ ПОЛНОГО СВЕРТЫВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 7-9
- 2) 1-3
- 3) 3-5
- 4) 5-7

**ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) первичный привычный выкидыш
- 2) аномальное маточное кровотечение
- 3) вторичный привычный выкидыш

4) овуляторный менструальный цикл

**ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ИНСТРУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) дезинфекция
- 2) предстерилизационная очистка
- 3) физическая дезинсекция
- 4) стерилизация

**ВО ВРЕМЯ ПОТУГ СВОБОДНОЕ УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) ограничивается
- 2) допускается
- 3) поощряется
- 4) запрещается

**ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА \_\_\_\_\_ НА ИНСТРУМЕНТЕ**

- 1) гнойных выделений
- 2) крови
- 3) моющего средства
- 4) бактерий

**ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ИЛИ ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ ТРАВМОЙ**

- 1) обструктивной
- 2) аспирационной
- 3) ингаляционной
- 4) септической

**ОТНОШЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА К СИСТОЛИЧЕСКОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОМОГАЕТ ОЦЕНИТЬ**

- 1) степень гипоксии плода
- 2) стадии ДВС-синдрома
- 3) стадии геморрагического шока
- 4) аномалию родовой деятельности

**ПРИЧИНОЙ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ УКУС**

- 1) вшей
- 2) клещей
- 3) пчел
- 4) комаров

**САМЫМ ГЛУБОКИМ СВОДОМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СВОД**

- 1) правый боковой

- 2) левый боковой
- 3) передний
- 4) задний

**К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ "УГАРНЫМ ГАЗОМ" ОТНОСИТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ В КРОВИ**

- 1) карбоксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) миоглобина
- 4) оксигемоглобина

**ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТКИ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ, АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ИХ**

- 1) проточной водой
- 2) 70% спиртом
- 3) 5% раствором йода
- 4) проточной водой с мылом

**ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) пациенты с ИППП
- 2) доноры плазмы крови
- 3) контактные по ВИЧ
- 4) потребители психоактивных веществ

**ОСМОТР РОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) всем женщинам
- 2) только первородящим
- 3) только повторнородящим
- 4) только женщинам из группы риска

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ БАГРОВОЕ ПЯТНО, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эмболия
- 2) гематома
- 3) некроз
- 4) тромбофлебит

**В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОЛОМ ВЫДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПЕРИОД(А)**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

**СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ РАЗМЕР МАТКИ СООТВЕТСТВУЕТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЯМ  
БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 15
- 2) 30
- 3) 12
- 4) 20

**ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИНЫ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ \_\_\_\_\_  
МЛ**

- 1) 250-500
- 2) 500-700
- 3) 100-200
- 4) 1000-1300

**ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) утром на лице
- 2) утром на ногах
- 3) вечером на ногах
- 4) вечером на лице

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ПО \_\_\_\_\_ ПОКАЗАНИЯМ**

- 1) санитарно-гигиеническим
- 2) эпидемиологическим
- 3) карантинно-социальным
- 4) методическим

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) несовместимый с жизнью порок развития плода
- 2) экстрагенитальная патология в стадии компенсации
- 3) предлежание плаценты
- 4) рубец на матке

**ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧСС И АД ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПАЦИЕНТКИ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПРОБОЙ**

- 1) велоэргометрической
- 2) психоэмоциональной
- 3) клиностатической
- 4) ортостатической

**МАЛЫЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ ОТДЕЛЯЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА**

- 1) девственной плевой
- 2) межгубной бороздой
- 3) передней спайкой
- 4) задней спайкой

**СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО НА ШЕЙКУ МАТКИ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 39-40
- 2) 28-29
- 3) 36-37
- 4) 22-23

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) санаторно-курортный
- 2) медикаментозный
- 3) хирургический
- 4) физиотерапевтический

**КРУПНЫЕ ПРЯМЫЕ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ С ОБРУБЛЕННЫМИ КОНЦАМИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИИ**

- 1) клостридийной
- 2) дрожжевой
- 3) стафилококковой
- 4) стрептококковой

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВО ПРИСУТСТВИЯ НА РОДАХ ОТЦА РЕБЕНКА ИЛИ ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ**

- 1) № 678
- 2) № 572н
- 3) № 323
- 4) № 574

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОМУ РОДРАЗРЕШЕНИЮ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) установить катетер в мочевого пузырь
- 2) приготовить теплую грелку
- 3) поставить очистительную клизму
- 4) произвести вскрытие плодного пузыря

**К ФУНКЦИЯМ АКУШЕРКИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТКИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ И ОТСУТСТВИЕМ ЖАЛОБ ОТНОСИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) гистероскопии
- 2) лапароскопии
- 3) забора мазков на флору
- 4) гинекологического осмотра

**ПОЛОСТЬ НЕБЕРЕМЕННОЙ МАТКИ НА ФРОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ИМЕЕТ ВИД**

- 1) треугольника
- 2) прямоугольника

- 3) овала
- 4) круга

**ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О \_\_\_\_\_ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) состоянии
- 2) регистрации
- 3) гражданстве
- 4) национальности

**СРОКОМ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И МАЗЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 45
- 2) 2
- 3) 14
- 4) 90

**СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК МАММОГРАФИЧЕСКАЯ**

- 1) плотность
- 2) мягкость
- 3) жидкость
- 4) вязкость

**ПРИ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ТЕРАПИИ**

- 1) иммуномодулирующей
- 2) антибактериальной
- 3) иммуносупрессивной
- 4) антимикотической

**ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ УБОРКИ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА \_\_\_\_\_ КЛАССА ОПАСНОСТИ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ У ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 45
- 2) 50
- 3) 55

4) 60

**ВСЕ ПАЦИЕНТЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ОБСЛЕДОВАНЫ НА**

- 1) бруцеллёз
- 2) сальмонеллёз
- 3) туберкулёз
- 4) дифтерию

**ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) информировании родственников о состоянии пациентки
- 2) наблюдении за гемодинамическими показателями пациентки
- 3) применении болеутоляющих препаратов
- 4) постановке очистительной клизмы

**ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВТОРЫМ МОМЕНТОМ  
БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутренний поворот головки
- 2) сгибание головки
- 3) разгибание головки
- 4) дополнительное сгибание головки

**ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ**

- 1) мышцы
- 2) вены
- 3) артерии
- 4) капилляры

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЛЮБОЙ ФОРМЕ ВНЕМАТОЧНОЙ  
БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хирургический
- 2) медикаментозный
- 3) физиотерапевтический
- 4) консервативный

**МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ РАБОТНИКАМИ  
ОРГАНИЗАЦИИ В ОДНОРАЗОВУЮ УПАКОВКУ \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) красного
- 2) белого
- 3) желтого
- 4) черного

**СНИЖАЕТ ВЯЗКОСТЬ И АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА МОКРОТЫ**

- 1) терпингидрат

- 2) кодеина фосфат
- 3) ацетилцистеин
- 4) мукалтин

**ФАКТОРОМ РИСКА ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нормальные роды в анамнезе
- 2) одноплодная беременность
- 3) первая беременность
- 4) кесарево сечение в анамнезе

**ЖЕНЩИНЫ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ ГЕНИТАЛИЙ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- 1) V
- 2) II
- 3) IV
- 4) I

**ПОД ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА**

- 1) коррекцию проявления патологических генотипов
- 2) прерывание беременности в случае высокой вероятности заболевания плода
- 3) предупреждение рождения или зачатия больного ребенка
- 4) прерывание беременности в случае пренатально диагностированной болезни

**ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ**

- 1) альфа-лактозу
- 2) казеин
- 3) таурин
- 4) холестерин

**ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) ввести анальгетики
- 2) приготовить грелку
- 3) вызвать врача
- 4) дать слабительное

**ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К**

- 1) слепой кишке
- 2) прямой кишке
- 3) шейке матки
- 4) сигмовидной кишке

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ПРОХОДЯТ \_\_\_\_ ЭТАП(А) ОБРАБОТКИ**

- 1) 2

- 2) 3
- 3) 1
- 4) 4

**ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) элиминация инфекций, передающихся половым путем
- 2) регуляция менструального цикла
- 3) снижение минеральной плотности костей
- 4) лизис спаек в малом тазу

**ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ МЕТОДАМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ**

- 1) гипотензивным
- 2) ионкорректирующим
- 3) седативным
- 4) вегетокорректирующим

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ, ПО**

- 1) перемещению пострадавшего
- 2) постановке предварительного диагноза
- 3) применению лекарственных препаратов
- 4) обследованию пострадавшего

**ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- 1) обострений заболевания
- 2) воздействия факторов риска развития заболевания
- 3) возникновения инвалидности
- 4) развития хронической формы заболевания

**В ВОРОТНУЮ ВЕНУ ОТТЕКАЕТ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТ**

- 1) диафрагмы
- 2) почек
- 3) кишечника
- 4) надпочечников

**СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В**

- 1) смотровых, манипуляционных, палатах для родильниц
- 2) операционных, родильных блоках, палатах для новорожденных
- 3) процедурных, манипуляционных, палатах для беременных
- 4) смотровых, манипуляционных, палатах интенсивной терапии

**РАЗРЫВ ЯИЧНИКА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) опухоль
- 2) яичниковая беременность
- 3) киста
- 4) апоплексия

**ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) излитие околоплодных вод
- 2) боль внизу живота
- 3) маточное кровотечение
- 4) изменение сердцебиения плода

**ДЛИНА ВОЛНЫ 635 НМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕ**

- 1) длинноволновое ультрафиолетовое
- 2) красное
- 3) коротковолновое ультрафиолетовое
- 4) инфракрасное

**УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ \_\_\_\_\_ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) внематочной
- 2) многоплодной
- 3) угрозы прерывания
- 4) маточной

**ПОД ГЕМОЛИЗОМ ПОНИМАЮТ \_\_\_\_\_ ЭРИТРОЦИТОВ**

- 1) оседание
- 2) образование
- 3) склеивание
- 4) разрушение

**ПРИЕМ ПИЩИ ВОЗМОЖЕН ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) часов
- 2) минут
- 3) дней
- 4) недель

**ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР ПРИ НАЛИЧИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА НА ФОНЕ ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНА В**

- 1) гематологическое отделение
- 2) отделение анестезиологии-реаниматологии
- 3) операционный блок
- 4) гинекологическое отделение

**ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

**ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЛЕЧЕНИЕ**

- 1) хирургическое
- 2) консервативное
- 3) физиотерапевтическое
- 4) санаторно-курортное

**ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ВРЕМЯ ОТ МОМЕНТА ДОСТАВКИ ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 24
- 2) 1
- 3) 12
- 4) 3

**УДУШЬЕ, ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) отека легких
- 2) пневмонии
- 3) кровохарканья
- 4) легочного кровотечения

**ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ПЛЕЧА ШИНА КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ОТ**

- 1) пястно-фаланговых суставов до средней трети плеча
- 2) лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- 3) лучезапястного сустава до средней трети плеча
- 4) пястно-фаланговых суставов до угла здоровой лопатки

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА МОЖЕТ БЫТЬ ОСТРОЕ УХУДШЕНИЕ ФУНКЦИИ**

- 1) почек
- 2) печени
- 3) легких
- 4) селезенки

**ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипомастия
- 2) масталгия
- 3) гипермастия
- 4) мастопатия

**ПРИ ПЕРИТОНИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ**

- 1) Пастернацкого
- 2) Куленкампа

- 3) Щеткина-Блюмберга
- 4) Мейо-Робсона

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРЕН \_\_\_\_\_ СИНДРОМ**

- 1) диспепсический
- 2) гипертонический
- 3) интоксикационный
- 4) гепатолиенальный

**РЕАГИРУЮТ НА ВСЕ КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ПОКАЗЫВАЮТ УРОВЕНЬ ГИБЕЛИ БИОТЕСТОВ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ \_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**ТАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ РВОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) консультация гастроэнтеролога
- 2) консультация терапевта
- 3) коррекция режима питания
- 4) госпитализация в стационар

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ \_\_\_\_\_ ДИЕТА**

- 1) сбалансированная
- 2) углеводная
- 3) белковая
- 4) низкокалорийная

**МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДИСПЛАЗИЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 30-33
- 2) 60-66
- 3) 50-55
- 4) 40-44

**ХОРИОНКАРЦИНОМА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ**

- 1) гемолитической болезни
- 2) преждевременных родов
- 3) искусственного аборта
- 4) трофобластической болезни

**ПРЕИМУЩЕСТВОМ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПЕРЕД ЭПИДУРАЛЬНОЙ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) более быстрое начало эффекта
- 2) возможность длительного обезболивания

- 3) отсутствие влияния на внутричерепное давление
- 4) возможность корректировки дозы

**ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) продольных складок
- 2) кишечных ворсинок
- 3) полулунных складок
- 4) кишечных полей

**В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА 1-Й ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЛЕГКОЙ И УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) атропина сульфат
- 2) дифенгидрамин
- 3) флутиказона пропионат
- 4) пиридоксин

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАССАЖА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ РАСТИРАНИЯ**

- 1) силовые разминающие
- 2) вибрационные
- 3) глубокие обхватывающие
- 4) циркуляторные

**ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ С ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

- 1) большие
- 2) малые
- 3) средние
- 4) лапароскопические

**В НОРМЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 28-32
- 2) 10-12
- 3) 16-20
- 4) 22-26

**ПОЯВЛЕНИЕ ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТЕКА**

- 1) мозга
- 2) легких
- 3) гортани
- 4) Квинке

**К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ**

- 1) атеросклероз коронарных артерий

- 2) врожденный порок сердца
- 3) ревматический эндокардит
- 4) ревматический миокардит

**ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ В ЛЮТЕИНОВУЮ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) компульсивным
- 2) маниакальным
- 3) дисфорическим
- 4) аффективным

**ДЛЯ КОРИ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА НА**

- 1) слизистой оболочке щек
- 2) слизистой оболочке влагалища
- 3) верхней половине туловища
- 4) нижней половине туловища

**СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ПЛОСКОГО ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАЗМЕРАМ**

- 1) истинной конъюгаты
- 2) индекса Соловьева
- 3) поперечного размера плоскости входа
- 4) поперечного размера плоскости выхода

**РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) брадикардией
- 2) полиурией
- 3) гипотонией
- 4) гипертензией

**МОЧА ЦВЕТА КОКА-КОЛЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) HELLP-синдрома
- 2) многоводия
- 3) маловодия
- 4) острого цистита

**ПРИ ЖАЛОБАХ НА ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН КОМПЛЕКС**

- 1) прыжков на скакалке
- 2) статических поз
- 3) витаминов
- 4) упражнений

**ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО**

- 1) раскрытия маточного зева
- 2) раскрытия внутреннего зева

- 3) излития околоплодных вод
- 4) сглаживания шейки матки

**НОВОРОЖДЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО \_\_\_\_\_ ДНЯ**

- 1) 7
- 2) 30
- 3) 28
- 4) 14

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) ежемесячно
- 2) ежеквартально
- 3) еженедельно
- 4) ежедневно

**АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) налорфин
- 2) бемеград
- 3) атропин
- 4) унитиол

**УСИЛЕНИЕ БОЛИ ПРИ БЫСТРОМ ОТНЯТИИ РУКИ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ГЛУБОКУЮ ПАЛЬПАЦИЮ ЖИВОТА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ**

- 1) Бартомье-Михельсона
- 2) Раздольского
- 3) Щёткина-Блумберга
- 4) Образцова

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ САНАЦИИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИВЛ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 2 - 5
- 2) 20 - 30
- 3) 5 - 10
- 4) 15 - 20

**СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ВЛАГАЛИЩА ВЫСТЛАНА \_\_\_\_\_ ЭПИТЕЛИЕМ**

- 1) многослойным плоским
- 2) однослойным цилиндрическим
- 3) однослойным кубическим
- 4) однослойным плоским

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 3

- 2) 2
- 3) 1
- 4) 4

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) парацетамол и атропина сульфат
- 2) нифедипин и атозибан
- 3) магния сульфат и окситоцин
- 4) клонидин и промедол

**ОПРЕДЕЛИТЬ ПАТОЛОГИЮ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ПОЗВОЛЯЕТ**

- 1) измерение пульса
- 2) измерение артериального давления
- 3) проба Шиллера
- 4) проба Ли-Уайта

**БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА В**

- 1) системном кровотоке
- 2) каловых массах
- 3) желудочном соке
- 4) панкреатическом соке

**ПОД ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ПОНИМАЮТ**

- 1) брадикардию
- 2) асистолию
- 3) аритмию
- 4) тахикардию

**ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ГОЛОВКИ ПЛОДА РАЗМЕРАМ ТАЗА МАТЕРИ В РОДАХ НАЗВАН ИМЕНЕМ**

- 1) Вастена
- 2) Шредера
- 3) Отта
- 4) Цовьянова

**БОЛЬШИНСТВО СЛУЧАЕВ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРОИСХОДИТ**

- 1) после кесарева сечения
- 2) во время кесарева сечения
- 3) во время вагинальных родов
- 4) после вагинальных родов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА ВСЮ БЕРЕМЕННОСТЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ИЗНАЧАЛЬНО НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КГ**

- 1) 12,5 – 18
- 2) 5 - 9
- 3) 7 - 11
- 4) 11,5 - 16

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 30
- 2) 40
- 3) 5
- 4) 10

**РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) увеличению послеродовых осложнений
- 2) уменьшению лактостаза
- 3) росту маститов у матери
- 4) уменьшению инфекционной заболеваемости

**ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О \_\_\_\_\_ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) социальном статусе
- 2) семейном статусе
- 3) повреждениях
- 4) гражданстве

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИНФЕКЦИОННОГО МАСТИТА У РОДИЛЬНИЦЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) активное кормление и сцеживание молока
- 2) подавление лактации
- 3) согревающий компресс
- 4) физиолечение и прекращение грудного вскармливания

**ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА ВЫПОЛНЯЕТСЯ СО СКОРОСТЬЮ \_\_\_\_\_ КМ/ЧАС**

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-7
- 4) 8-10

**ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) остановка кровотечения
- 2) восстановление дыхания
- 3) остановка тромбообразования
- 4) восстановление мочеиспускания

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) удушье
- 2) кровотечение
- 3) гипертонический криз
- 4) приступ стенокардии

**СОЕДИНЯЯСЬ ВМЕСТЕ, ПЕЩЕРИСТЫЕ ТЕЛА ОБРАЗУЮТ \_\_\_\_\_ КЛИТОРА**

- 1) головку
- 2) тело
- 3) уздечку
- 4) ножки

**БЕРЕМЕННЫМ ПОСЛЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ**

- 1) длительных поездок на транспорте
- 2) прогулок в парке
- 3) сбалансированного питания
- 4) общения с родственниками

**ПЕРИОД ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) перименопауза
- 2) пременопауза
- 3) менопауза
- 4) постменопауза

**ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА**

- 1) легкие и сложные
- 2) легкие, средней сложности и сложные
- 3) малые, средние и большие
- 4) малые и большие

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ HELLP СИНДРОМА У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) сохранение беременности
- 2) прерывание беременности
- 3) интенсивное лечение
- 4) амбулаторное наблюдение

**ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В ПРОВОДЯТ**

- 1) амбулаторно
- 2) в инфекционном стационаре
- 3) в многопрофильном стационаре
- 4) в отделениях реанимации

**ОТХОДЫ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫЕ**

**МИКРООРГАНИЗМАМИ III–IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ**

- 1) А
- 2) Б
- 3) Г
- 4) В

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В**

- 1) 48 часов
- 2) 12 часов
- 3) день
- 4) три дня

**ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С 22 ПОЛНЫХ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ И ЗАВЕРШАЕТСЯ НА \_\_\_\_ ПОЛНЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 1
- 4) 7

**ЖЕНЩИНЫ С БЕСПЛОДИЕМ ПОДЛЕЖАТ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА**

- 1) хламидиоз
- 2) токсоплазмоз
- 3) микоплазмоз
- 4) уреоплазмоз

**ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МИОМОЙ МАТКИ ПРИХОДИТСЯ К НАЧАЛУ**

- 1) перименопаузы
- 2) постменопаузы
- 3) менопаузы
- 4) менархе

**ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИЕЙ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) антибиотиков
- 2) анальгетиков
- 3) спазмолитиков
- 4) глюкокортикостероидов

**МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРОХОДИТ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ**

- 1) венечного шва
- 2) теменных бугров
- 3) лобных бугров
- 4) стреловидного шва

**ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) катетеризация мочевого пузыря
- 2) выскабливание полости матки
- 3) баллонная тампонада матки
- 4) искусственное вскрытие плодного пузыря

**К ПЕРЕНОСЧИКАМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) иксодовые клещи
- 2) лобковые вши
- 3) песчаные блохи
- 4) комары рода Anopheles

**ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТОМ НАЗЫВАЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕ**

- 1) мочевого пузыря
- 2) околоматочной клетчатки
- 3) брюшины малого таза
- 4) маточной трубы

**К ФУНКЦИЯМ АКУШЕРКИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТКИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ И ОТСУТСТВИЕМ ЖАЛОБ ОТНОСИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) лапароскопии
- 2) забора мазков на цитологическое исследование
- 3) гистероскопии
- 4) влагалищного бимануального исследования

**ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ БАЛЛА(ОВ)**

- 1) 10 – 12
- 2) 2 – 4
- 3) 8 – 10
- 4) 5 – 7

**СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ \_\_\_\_\_ ОПЕРАЦИИ**

- 1) через сутки после
- 2) в день после
- 3) в день перед
- 4) за сутки до

**УПЛОТНЕНИЕ МЯГКОЙ БЕРЕМЕННОЙ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) Отта
- 2) Горвица-Гегара
- 3) Снегирева
- 4) Пискачека

**ЧАЩЕ ПОТУГИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К СХВАТКАМ ПРИ ОПУСКАНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА НА**

- 1) плоскость входа
- 2) узкую плоскость
- 3) широкую плоскость
- 4) тазовое дно

**К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ**

- 1) воронко-тазовые
- 2) круглые
- 3) широкие
- 4) крестцово-маточные

**В КОНЦЕ 2-ГО МОМЕНТА БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ, ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ, ГОЛОВКА ПЛОДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СВОИМ СТРЕЛОВИДНЫМ ШВОМ НА ТАЗОВОМ ДНЕ В \_\_\_\_\_ РАЗМЕРЕ**

- 1) поперечном
- 2) прямом
- 3) вертикальном
- 4) косом

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ЭМБОЛИЕЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ГЕМОРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ РЕКОМЕНДОВАНО АКТИВНОЕ**

- 1) обтирание
- 2) питание
- 3) согревание
- 4) охлаждение

**С АНОДА (ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА), ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕФИБРОЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПАЦИЕНТКАМ С САЛЬПИНГИТОМ, ВВОДИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО**

- 1) милдронат
- 2) лидаза
- 3) интал
- 4) преднизолон

**НАРУЖНЫМ ПРИЕМОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБ**

- 1) Малиновского
- 2) Шредера
- 3) Абуладзе
- 4) Довженко

**МЕТОДОМ АНТРОПОГЕНЕТИКИ, ОСНОВАННЫМ НА ПРОСЛЕЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ**

**В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) близнецовый
- 2) цитологический
- 3) биохимический
- 4) генеалогический

**ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) половые гормоны
- 2) гормоны щитовидной железы
- 3) антигипертензивные препараты
- 4) антибактериальные препараты

**ВНУТРЕННИЙ ЗЕВ ШЕЙКИ МАТКИ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА \_\_ СУТКИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА**

- 1) 14
- 2) 20
- 3) 3
- 4) 10

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ В САНАТОРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический пиелонефрит в ремиссии
- 2) анемия средней степени тяжести
- 3) чрезмерная рвота беременной
- 4) полное предлежание плаценты

**УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАТКИ ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 4

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С ОЖОГАМИ ПООЩРЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ \_\_\_\_\_ РЕГИДРАТАЦИИ**

- 1) ректальной
- 2) оральной
- 3) чрескожной
- 4) подкожной

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) пол пострадавших
- 2) его последствия
- 3) его причины

4) возраст пострадавших

**ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) не определяется
- 2) уменьшается
- 3) увеличивается
- 4) не изменяется

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) задержка роста
- 2) хроническая гипоксия
- 3) ассиметричная макросомия
- 4) острая гипоксия

**СРОК ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ КЛАССА В ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 10
- 4) 14

**БРАХИЦЕФАЛИЯ, МОНГОЛОИДНЫЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) болезни Дауна
- 2) фенилкетонурии
- 3) муковисцидоза
- 4) спинальной мышечной атрофии

**ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МАТКИ**

- 1) размягчением тела
- 2) размягчением перешейка
- 3) асимметрией
- 4) сокращением

**МОЛОЗИВО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ**

- 1) белков
- 2) витаминов
- 3) углеводов
- 4) микроэлементов

**ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РОДОВ ЖЕНЩИНЕ НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО**

- 1) стоять
- 2) дышать
- 3) петь
- 4) лежать

**БЕРЕМЕННАЯ С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА ПОДЛЕЖИТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 38
- 2) 35
- 3) 40
- 4) 36

**БЕРЕМЕННАЯ С МНОГОПЛОДИЕМ ПОСЕЩАЕТ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 3 раза в неделю
- 2) 1 раз в месяц
- 3) 5 раз в триместр
- 4) 2 раза в месяц

**НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ СЧИТАЕТСЯ \_\_\_\_\_ Г/Л**

- 1) 102
- 2) 120
- 3) 100
- 4) 110

**ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ АСТМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) боль в животе
- 2) головная боль
- 3) за грудиной боль
- 4) удушье

**ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ МЛ/СУТКИ**

- 1) 1000-1500
- 2) 2000-2500
- 3) 2700-3000
- 4) 1600-1900

**ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ С**

- 1) язвой желудка
- 2) запорами

- 3) невынашиванием
- 4) бронхиальной астмой

**ЖЕНЩИНЫ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- 1) I
- 2) IV
- 3) II
- 4) III

**ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) диффузный цианоз
- 2) кольцевидная эритема
- 3) акроцианоз
- 4) \"сосудистые звездочки\"

**ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) покраснения
- 2) аллергического ринита
- 3) анафилактического шока
- 4) крапивницы

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) глюкозурия
- 2) бактериурия
- 3) фосфатурия
- 4) пиурия

**ОСТРЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ОТВЕТ НА ТЯЖЕЛОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ И КРОВОПОТЕРЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ СИСТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШОК**

- 1) травматический
- 2) геморрагический
- 3) гиповолемический
- 4) анафилактический

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 140
- 2) 170
- 3) 120
- 4) 150

**СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАЛАТЕ**

## **СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) ухудшению процесса адаптации новорожденного
- 2) возникновению гнойно-септической инфекции
- 3) осложнению работы медицинского персонала
- 4) кормлению ребенка «по требованию»

## **ПРИ РАЗВИТИИ ЭКЛАМПСИИ И ЭКСТРЕННОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ МЕТОДОМ ВЫБОРА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ АНЕСТЕЗИЯ**

- 1) общая
- 2) эпидуральная
- 3) местная
- 4) регионарная

## **ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) вакцины
- 2) сыворотки
- 3) анатоксины
- 4) иммуноглобулины

## **В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕРОВОДОГО ПЕРИОДА МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ СЕКРЕТИРУЮТ**

- 1) окситоцин
- 2) молозиво
- 3) переходное молоко
- 4) пролактин

## **ДИЕТОТЕРАПИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕНОРЕИ**

- 1) показана
- 2) противопоказана
- 3) не рекомендована
- 4) рекомендована

## **ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ \_\_\_\_\_ МАССАЖЕМ**

- 1) общеукрепляющим
- 2) гинекологическим
- 3) глубоким тканевым
- 4) локальным вибрационным

## **ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) разгибание
- 2) внутренний поворот
- 3) дополнительное сгибание
- 4) сгибание

**ПАЦИЕНТ, НУЖДАЮЩИЙСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЕВАНИИ, РАЗДЕВАНИИ, ТУАЛете, ПРИЕМЕ ПИЩИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В \_\_\_\_ БАЛЛ(А)**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 2

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЖУЩЕ-КОЛЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОПУСКАЮТ В**

- 1) непрокальваемые контейнеры однократного применения
- 2) непрокальваемые контейнеры многократного применения
- 3) мягкую тару
- 4) разобранном и измельченном виде

**БЕРЕМЕННУЮ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ВРАЧУ**

- 1) реаниматологу
- 2) гематологу
- 3) ревматологу
- 4) кардиологу

**ДЛЯ РАСЧЕТА ШОКОВОГО ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ**

- 1) стетоскоп
- 2) фонендоскоп
- 3) тазометр
- 4) тонометр

**ДЛИНА ВОЛНЫ 320–400 НМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕ**

- 1) красное
- 2) длинноволновое ультрафиолетовое
- 3) коротковолновое ультрафиолетовое
- 4) инфракрасное

**ПРИ КАРДИОТОКОГРАФИИ ПЛОДА ОСЦИЛЛЯЦИИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ КАК СРЕДНЯЯ АМПЛИТУДА СИГНАЛА В МИНУТНОМ ИНТЕРВАЛЕ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) акцелерациями
- 2) базальной частотой
- 3) вариабельностью
- 4) сальтаторным ритмом

**ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ**

- 1) в родильном зале
- 2) после перевода в послеродовое отделение

- 3) через 6 часов после родов
- 4) на вторые сутки после родов

**РОДИЛЬНИЦЕ СО ШВАМИ НА ПРОМЕЖНОСТИ ПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВЫЙ  
ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 56
- 2) 70
- 3) 85
- 4) 86

**ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА С МЕТАСТАЗАМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бактериемия
- 2) септикопиемия
- 3) септический шок
- 4) септицемия

**ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПЛОДА ПРОДВИГАЕТСЯ  
ПО ПЛОСКОСТЯМ ТАЗА \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) средним косым
- 2) малым косым
- 3) большим косым
- 4) малым поперечным

**ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЮТ**

- 1) прием пряностей перед кормлением
- 2) ограничение жидкости
- 3) прием горячего напитка перед кормлением
- 4) ограничение белков

**УМЕНЬШЕНИЕ ПРЯМЫХ РАЗМЕРОВ ТАЗА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ  
РАЗМЕРАХ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ \_\_\_\_\_ ТАЗА**

- 1) плоскорихитического
- 2) плоского
- 3) кососмещенного
- 4) общеравномерносуженого

**ОСНОВНЫМ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) питание через зонд
- 2) применение противокашлевых средств
- 3) санация трахеобронхиального дерева
- 4) профилактика пролежней

**ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) отхождение гнойной мокроты, лихорадка

- 2) свистящие хрипы, одышка, сухой кашель
- 3) одышка, слабость, лихорадка
- 4) влажный кашель, кровохарканье

**ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБЪЕКТИВНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) субъективными
- 2) сомнительными
- 3) вероятными
- 4) достоверными

**ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- 1) состояние лимфатических узлов
- 2) состояние прямой кишки
- 3) степень развитости мышц брюшного пресса
- 4) состояние придатков матки

**К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ПОВЫШАЮЩИМ ТОНУС МИОМЕТРИЯ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) вальпроевая кислота
- 2) гепарин натрия
- 3) метилэргометрин
- 4) аскорбиновая кислота

**ПИУРИЯ И БАКТЕРИУРИЯ У БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- 1) раннего токсикоза
- 2) преэклампсии
- 3) сахарного диабета
- 4) пиелонефрита

**В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) госпитализации пациентки
- 2) применении спазмолитиков
- 3) проведении дезинтоксикационной терапии
- 4) применении анальгетиков

**ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ГЕМОРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 100-150
- 2) 200-250
- 3) 500-550
- 4) 400-450

**К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА**

**ОТНОСИТСЯ**

- 1) головная боль
- 2) боль в животе
- 3) приступ удушья
- 4) загрудинная боль

**ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РОДОВ  
НАЗНАЧАЮТ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 15
- 3) 16
- 4) 13

**ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОК  
ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ ПРОВОДЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ РАЗ(А)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ТИПИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИНФАРКТА  
МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) безболевой
- 2) абдоминальный
- 3) ангинозный
- 4) астматический

**У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ АНОМАЛЬНЫМИ  
МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ  
РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЯТЬ \_\_\_\_\_ КИСЛОТУ**

- 1) аскорбиновую
- 2) ацетилсалициловую
- 3) транексамовую
- 4) янтарную

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 1 раз в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 2 раза в неделю

**РАССЛАБЛЕНИЮ ТАЗОВОГО ДНА В РОДАХ СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) акупрессура
- 2) холод

- 3) акупунктура
- 4) футбол

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОГО КРИТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ \_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НАРУШЕНИЯ СЕКРЕЦИИ**

- 1) инсулина
- 2) гепарина
- 3) тироксина
- 4) глюкагона

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 100
- 2) 160
- 3) 120
- 4) 140

**ДОПУСКОМ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СПЕЦИАЛИСТА**

- 1) аккредитация
- 2) аттестация
- 3) сертификация
- 4) лицензирование

**ОТСУТСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В \_\_\_\_ БАЛЛ(А)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛЬГЕТИК**

- 1) метамизол натрия
- 2) морфин
- 3) трамадол

4) кодеина фосфат

**ДЛИНА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ СМ**

- 1) 20-22
- 2) 15-17
- 3) 5-7
- 4) 10-12

**РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В**

- 1) гинекологических стационарах
- 2) женских консультациях
- 3) центрах социального обслуживания
- 4) стоматологических поликлиниках

**МЕНЯТЬ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ СЛЕДУЕТ НЕ РЕЖЕ \_\_\_\_ РАЗ(А) В НЕДЕЛЮ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА**

- 1) середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- 2) два поперечных пальца выше пупка
- 3) два поперечных пальца ниже пупка
- 4) уровне мечевидного отростка и реберных дуг

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПАЦИЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) динамометр
- 2) тонометр
- 3) ростометр
- 4) урومتر

**К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) ишемическую болезнь сердца
- 2) артериальную гипертензию
- 3) приобретенные пороки сердца
- 4) острый инфаркт миокарда

**НАРУЖНЫЙ ЗЕВ ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ \_\_\_\_ ФОРМУ**

- 1) точечную
- 2) щелевидную
- 3) т-образную

4) серповидную

**ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРЕД КОРОВЬИМ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ В НЕМ**

- 1) липазы
- 2) белка
- 3) витаминов
- 4) жиров

**ЗАДАЧЕЙ ЛФК В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) восстановление нарушенного механизма дыхания
- 2) укрепление мышц брюшного пресса
- 3) стимуляция процессов регенерации
- 4) адаптация дыхательной системы к нагрузке

**В КАЧЕСТВЕ ВТОРОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) соматотропин
- 2) гонадотропины
- 3) аденокортикотропин
- 4) тиреотропин

**С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИМЕНЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ**

- 1) менопаузальная
- 2) стимулирующая
- 3) подавляющая
- 4) патогенетическая

**ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ НА \_\_\_\_\_ ДЕНЬ**

- 1) 8-10
- 2) 3-5
- 3) 12-14
- 4) 6-9

**ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипогалактия
- 2) неправильное прикладывание ребенка к груди
- 3) ношение бюстгалтера
- 4) несоблюдение женщиной гигиены

**ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ**

- 1) рвоте

- 2) тяжелой преэклампсии
- 3) гестационном пиелонефрите
- 4) гипотензии

**ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ \_\_\_\_\_ ДЛЯ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) свойственны
- 2) патологичны
- 3) нормальны
- 4) гармоничны

**НИЗКОИНТЕНСИВНУЮ УВЧ-ТЕРАПИЮ ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ НАЗНАЧАЮТ НА \_\_\_\_\_ ОБЛАСТЬ**

- 1) поясничную
- 2) периумбликальную
- 3) эпигастрально-перикардальную
- 4) пояснично-крестцовую

**МОНИТОРИНГ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ВКЛЮЧАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА**

- 1) сывороточный альбумин
- 2) аспартатаминотрансферазу
- 3) аланинаминотрансферазу
- 4) хорионический гонадотропин

**ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ У ВРАЧА**

- 1) хирурга
- 2) онколога
- 3) нефролога
- 4) венеролога

**БЕРЕМЕННЫЕ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ ДО 10 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) уточнения диагноза
- 2) обследования и лечения
- 3) прерывания беременности
- 4) определения тактики родоразрешения

**ЭЛЕКТРОСОН-ТЕРАПИЯ ПРИ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ МЕТОДАМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ**

- 1) седативным
- 2) вегетокорректирующим
- 3) гипотензивным
- 4) ионкорректирующим

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО \_\_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 5 - 7
- 2) 1 - 2
- 3) 2 - 3
- 4) 3 - 4

**АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОМУ РОДРАЗРЕШЕНИЮ ПУТЕМ  
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУПОВИНЫ**

- 1) истинный узел
- 2) предлежание
- 3) ложный узел
- 4) выпадение

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁН \_\_\_\_\_ ВАРИАНТ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА**

- 1) гастроэнтеритический
- 2) тифоподобный
- 3) септический
- 4) субклинический

**УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ НАТОЩАК У БЕРЕМЕННЫХ В НОРМЕ НЕ БОЛЕЕ  
\_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 6.1
- 2) 3.3
- 3) 5.1
- 4) 5.5

**ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ БИМАНУАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТКЕ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) трижды за беременность
- 2) дважды за беременность
- 3) при первом визите
- 4) при каждом визите

**СЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ПОЛОВЫХ ГУБ НА ГРАНИЦЕ С ПРОМЕЖНОСТЬЮ ОБРАЗУЕТ**

- 1) заднюю спайку
- 2) преддверие влагалища
- 3) ножки клитора
- 4) переднюю спайку

**В КАЧЕСТВЕ «ПРОТИВОШОКОВОЙ ТЕРАПИИ» ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ПОМОЩИ  
ЛУЧШЕ ВСЕГО ДАВАТЬ ПАЦИЕНТУ ПИТЬ \_\_\_\_\_ ВОДУ**

- 1) кипяченую
- 2) минеральную

- 3) холодную
- 4) сладкую

**ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА**

- 1) органах брюшной полости
- 2) органах малого таза
- 3) верхних конечностях
- 4) нижних конечностях

**ВПЧ ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_ ТИП**

- 1) 61
- 2) 6
- 3) 16
- 4) 42

**В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАКАТЫ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ**

- 1) искусственное вскармливание
- 2) применение сосок
- 3) применение докорма
- 4) грудное вскармливание

**ПАЦИЕНТУ С ОЖОГОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ \_\_\_\_\_ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) снотворных
- 2) психостимулирующих
- 3) антидепрессантных
- 4) ноотропных

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА  
СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 12,5
- 2) 11
- 3) 10,5
- 4) 13

**СИНДРОМОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ОТСУТСТВИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГАЗООБМЕНА В ЛЕГКИХ СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) апноэ
- 2) асистолия
- 3) анурия
- 4) асфиксия

**НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ГРИБОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) свинушка тонкая
- 2) сыроежка зеленая

- 3) бледная поганка
- 4) мухомор красный

**ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В \_\_\_\_\_ ПОРЯДКЕ**

- 1) отсроченном
- 2) плановом
- 3) экстренном
- 4) неотложном

**СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗ УПАКОВКИ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ В**

- 1) воздушном стерилизаторе
- 2) металлических ящиках
- 3) бактерицидных камерах
- 4) бельевых шкафах

**ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ \_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 24
- 2) 20
- 3) 26
- 4) 22

**ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ГОЛОВКА ПЛОДА РОЖДАЕТСЯ \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) средним косым
- 2) вертикальным
- 3) большим косым
- 4) малым косым

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ**

- 1) еженедельно
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) ежедневно
- 4) 2 раза в неделю

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ФОРМОЙ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС**

- 1) инвазивный
- 2) полный
- 3) частичный
- 4) метастатический

**ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА НАЗНАЧАЮТСЯ БЕРЕМЕННЫМ ПРИ УРОВНЕ ГЕМОГЛОБИНА НИЖЕ \_\_\_\_ Г/Л**

- 1) 130
- 2) 140
- 3) 120
- 4) 110

**ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ**

- 1) гнойные
- 2) творожистые
- 3) пенистые
- 4) кровянистые

**ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ УЧАСТВУЕТ В РЕГУЛЯЦИИ \_\_\_\_\_ ОБМЕНА**

- 1) липидного
- 2) белкового
- 3) углеводного
- 4) минерального

**ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ ГИГИЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) здоровье работающего населения
- 2) влияние факторов окружающей среды на организм больного человека
- 3) влияние факторов окружающей среды на организм здорового человека
- 4) эпидемиология заболеваний

**ОСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ АМЕНОРЕЕЙ**

- 1) ложной
- 2) психогенной
- 3) фармакологической
- 4) физиологической

**КОНТРОЛЬ КРОВИ НА АНТИТЕЛА У БЕРЕМЕННЫХ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУСОМ ПРОВОДЯТ**

- 1) дважды
- 2) ежемесячно
- 3) однократно
- 4) трехкратно

**ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ УСИЛИВАЕТСЯ**

- 1) синтез эндогенного мелатонина
- 2) секреция эндокринных желез
- 3) кровообращение и трофика тканей
- 4) плотность клеточных мембран

**НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ АНЕСТЕЗИЯ**

- 1) проводниковая
- 2) эпидуральная
- 3) парацервикальная
- 4) внутрикостная

**ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одышка
- 2) недомогание
- 3) повышение температуры
- 4) головная боль

**К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННОГО, ОТНОСЯТСЯ ПАЦИЕНТКИ С**

- 1) хориоамнионитом в родах
- 2) тяжелой преэклампсией
- 3) хроническим гастритом
- 4) многоплодной беременностью

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ \_\_\_\_\_ БУТЫЛОК И ПОСУДЫ**

- 1) стеклянных
- 2) керамических
- 3) алюминиевых
- 4) пластиковых

**САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНОЙ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) генерализованная инфекция
- 2) респираторный дистресс-синдром
- 3) хроническая внутриутробная гипоксия
- 4) врожденные аномалии развития

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НА ГЛУБИНУ \_\_\_\_\_ СМ**

- 1) 1-2
- 2) 7-8
- 3) 3-4
- 4) 5-6

**В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ ПЕРЕД КОРМЛЕНИЕМ РЕБЕНКА НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ РУКИ**

- 1) водой

- 2) спиртом
- 3) хозяйственным мылом
- 4) перекисью водорода

**ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ \_\_\_\_\_ КОСТЕЙ**

- 1) двух лобковых и двух подвздошных
- 2) двух седалищных и двух подвздошных
- 3) двух лобковых и двух седалищных
- 4) подвздошной, седалищной и лобковой

**МАССА МАТКИ У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАММ**

- 1) 50-70
- 2) 60-70
- 3) 90-100
- 4) 70-80

**ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЮ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ \_\_\_\_ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО**

- 1) вторым
- 2) первым
- 3) третьим
- 4) четвертым

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 2

**ПОСЛЕ РОДОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОЛОДНЫЕ КОМПРЕССЫ НА ПРОМЕЖНОСТЬ**

- 1) постоянно
- 2) ежечасно
- 3) регулярно
- 4) периодически

**ПЕРИОДОМ ОТМОРОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПЕРИОД**

- 1) реактивный
- 2) промежуточный
- 3) скрытый
- 4) дореактивный

**МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ**

### **МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ**

- 1) инфекционистом-гепатологом
- 2) дерматологом-венерологом
- 3) акушером-гинекологом
- 4) анестезиологом-реаниматологом

### **ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ВЫКИДЫША**

- 1) в ходу
- 2) угрожающего
- 3) неполного
- 4) полного

### **ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА ПРОВЕДЕНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ**

- 1) показано
- 2) не рекомендовано
- 3) противопоказано
- 4) рекомендовано

### **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА НЕОБХОДИМО РАСПОЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ЛЕЖА НА СПИНЕ**

- 1) на ровной, жесткой поверхности
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) на мягкой, пружинящей поверхности
- 4) с приподнятым ножным концом

### **ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ**

- 1) на верхние этажи зданий
- 2) в подвалы
- 3) на улицу
- 4) на нижние этажи зданий

### **СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА ПРОВОДЯТ \_\_\_\_\_ % РАСТВОРОМ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА**

- 1) 2,5
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5,5

### **ПЕЛЛОИДОТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ НЕРАЗВИВАЮЩУЮСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, ОПТИМАЛЬНА С ПОМОЩЬЮ ГРЯЗЕВЫХ**

- 1) ванн
- 2) вагинальных тампонов
- 3) торакальных аппликаций

4) душой

**ЦЕЛЮ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение срока хранения инструментов
- 2) полное уничтожение микроорганизмов
- 3) удаление белковых и жировых загрязнений
- 4) уничтожение спор микроорганизмов

**СИМПТОМ РАЗМЯГЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЕЙКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- 1) Пискачека
- 2) Горвица-Гегара
- 3) Отта
- 4) Снегирева

**К ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ  
ОТНОСИТСЯ**

- 1) перелом нижней челюсти
- 2) перелом позвоночника
- 3) перелом ребер
- 4) травма внутренних органов

**ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ**

- 1) в ближайшие дни
- 2) безотлагательно
- 3) без ограничения по срокам
- 4) в ближайшие часы

**МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ БЫЛ РАЗРАБОТАН  
УЧЕНЫМ**

- 1) Малиновским М.С.
- 2) Земмельвейсом И.Ф.
- 3) Красовским А.Я.
- 4) Вельвовским И.З.

**ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ МОЖНО УСТАНОВИТЬ**

- 1) в конце беременности
- 2) только в родах
- 3) во втором триместре беременности
- 4) при постановке на учет

**ФАКТОРОМ РИСКА ВТОРИЧНОЙ ДИСМНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) табакокурение
- 2) миома матки
- 3) психологическое расстройство

4) отягощенная наследственность

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛУЧАЯ ИНФЕКЦИИ В СТАЦИОНАРЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ \_\_\_\_\_ МОНИТОРИНГ**

- 1) кадровый
- 2) термический
- 3) статистический
- 4) микробиологический

**ПРИ ПОПАДАНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ МЯГКИХ ТКАНЕЙ**

- 1) некроз
- 2) гематома
- 3) абсцесс
- 4) инфильтрат

**ПОД ТЕРМИНОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) хроническая патология
- 2) самостоятельный симптом
- 3) клинический симптомокомплекс
- 4) самостоятельное заболевание

**ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) предлежание
- 2) положение
- 3) вид
- 4) позиция

**НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ДЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) 1 - 3
- 2) 4 - 8
- 3) 14 - 18
- 4) 10 - 13

**ОБУЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В РОДАХ РАЦИОНАЛЬНО НАЧИНАТЬ С \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 16-18
- 2) 33-35
- 3) 28-30
- 4) 22-24

**УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В \_\_\_\_\_ БАЛЛ(А)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 4

**НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ НА ШЕЙКУ МАТКИ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРОВОДИТСЯ В \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 28-36
- 2) 2-10
- 3) 4-12
- 4) 12-27

**ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) оксазолидиноны
- 2) монобактамы
- 3) нитрофураны
- 4) нитроимидазолы

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ЖАЛОБАХ НА ТОШНОТУ И РВОТУ РЕКОМЕНДОВАНО СОБЛЮДАТЬ**

- 1) постельный режим
- 2) рациональную диету
- 3) физическую нагрузку
- 4) чайную паузу

**МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) барьерный метод
- 2) прерванный половой акт
- 3) гормональная контрацепция
- 4) спермицид

**ЖЕНЩИНАМ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ПМС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМАНДА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, ВРАЧА ТЕРАПЕВТА И ВРАЧА**

- 1) эндокринолога
- 2) психиатра
- 3) невролога
- 4) дерматолога

**ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутренний поворот плечиков
- 2) сгибание головки
- 3) разгибание головки

4) внутренний поворот головки

**РОДРАЗРЕШЕНИЕ У ПАЦИЕНТОК С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ В СТАЦИОНАРЕ \_\_\_\_\_ УРОВНЯ**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 2

**ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ ПРИВОДИТ К**

- 1) микросомии
- 2) макросомии
- 3) полисомии
- 4) нормосомии

**ПОД ГЕМАТОМОЙ ПОНИМАЮТ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В**

- 1) полости сустава
- 2) плевральной полости
- 3) тканях и органах
- 4) полости перикарда

**РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 28
- 2) 30
- 3) 38
- 4) 34

**ОСТРАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) преждевременной отслойки плаценты
- 2) перенашивания беременности
- 3) экстрагенитальных заболеваний
- 4) излития околоплодных вод

**АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ НАЧИНАЮТ ОКАЗЫВАТЬ**

- 1) при угрозе разрыва промежности
- 2) после рождения головки плода
- 3) при прорезывании головки плода
- 4) после рождения плечиков плода

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ**

- 1) церулоплазмина
- 2) альфа-фетопротейна
- 3) липопротеина

4) кислого гликопротеина

### **КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ И ОТЕКА ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) приступе бронхиальной астмы
- 2) острой правожелудочковой недостаточности
- 3) острой левожелудочковой недостаточности
- 4) острой сосудистой недостаточности

### **НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЕСЛИ**

- 1) появились признаки жизнедеятельности у пострадавшего
- 2) нет эффекта в течение 10 минут при асистолии
- 3) нет эффекта в течение 60 минут при асистолии
- 4) настаивают близкие родственники пострадавшего

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА МАГНИЯ СУЛЬФАТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) угнетения дыхания
- 2) запоров
- 3) отеков голеней
- 4) рвоты

### **МЕСТО ПЕРЕХОДА ТЕЛА МАТКИ В ШЕЙКУ ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) влагалище
- 2) перешеек
- 3) полость
- 4) ампула

### **СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРЕДСТАВЛЕНА \_\_\_\_\_ ЭПИТЕЛИЕМ**

- 1) многослойным плоским
- 2) цилиндрическим мерцательным
- 3) однослойным плоским
- 4) однослойным кубическим

### **ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) каждый день
- 2) после выписки пациента
- 3) при выявлении инфекции
- 4) каждый месяц

### **СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

- 1) вносятся с согласия пациента
- 2) вносятся без согласия пациента
- 3) вносятся по решению администрации

4) не вносятся

**ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) изолировать пациентку
- 2) изменить диету
- 3) вызвать родственников
- 4) проинформировать врача

**ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МЕНОПАУЗЕ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ АМЕНОРЕЕЙ**

- 1) психогенной
- 2) фармакологической
- 3) физиологической
- 4) ложной

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ**

- 1) 12
- 2) 28
- 3) 42
- 4) 22

**ПРИБЫВШИМ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ СОТРУДНИКАМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О**

- 1) регистрации пострадавшего
- 2) выполненных мероприятиях
- 3) прогнозе на выздоровление
- 4) гражданстве пострадавшего

**БАКТЕРИИ, РАЗМНОЖАЮЩИЕСЯ В ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНОГО КИСЛОРОДА, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ АНАЭРОБАМ**

- 1) факультативным
- 2) микроаэрофильным
- 3) аэротолерантным
- 4) облигатным

**ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КУРСА ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТКУ О ВОЗМОЖНОСТИ \_\_\_\_\_ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ**

- 1) перерождения
- 2) купирования
- 3) малигнизации
- 4) рецидива

**ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ ПРОБА**

- 1) уксусная
- 2) йодная
- 3) тепловая
- 4) холодовая

**ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ, ОСЛОЖНЕННОМ ПЕРИТОНИТОМ, ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПЕРВЫЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ) С МОМЕНТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ**

- 1) 10 - 12
- 2) 22 - 24
- 3) 6 - 8
- 4) 2 - 3

**ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) спиртовые растворы
- 2) альдегидсодержащие средства
- 3) дистиллированную воду
- 4) щелочные растворы

**В СТРУКТУРЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ВЫДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ФАЗ(Ы)**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА С \_\_\_\_\_ КОНЦОМ**

- 1) опущенным ножным
- 2) приподнятым ножным
- 3) приподнятым головным
- 4) опущенным головным

**ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ САЛЬПИНГИТ, СВЧ-ТЕРАПИЮ РАЦИОНАЛЬНО НАЧИНАТЬ НА \_\_\_\_\_ ДЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) 1
- 2) 5
- 3) 28
- 4) 14

**ВЫКЛАДЫВАТЬ НОВОРОЖДЕННОГО НА ГРУДЬ МАТЕРИ ПОСЛЕ РОДОВ НЕОБХОДИМО ДЛЯ**

- 1) улучшения постнатальных исходов
- 2) проведения первичного осмотра
- 3) быстрого заживления родничков
- 4) профилактики пупочной грыжи

**К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) питательная
- 2) очистительная
- 3) масляная
- 4) лекарственная

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ \_\_\_\_\_ МЯГКИХ СЫРОВ**

- 1) обезжиренных
- 2) созревших
- 3) копченых
- 4) плавленых

**ЗРЕЛАЯ ШЕЙКА МАТКИ УКРОЧЕНА ДО \_\_\_\_ СМ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ, НАЧИНАЯ С \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(ЛИ) БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 41
- 2) 39
- 3) 40
- 4) 42

**ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МАТКИ**

- 1) надвлагалищная ампутация
- 2) опорожнение полости
- 3) баллонная тампонада
- 4) лигирование сосудов

**ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ ОТКРЫВАЕТСЯ ВО ВЛАГАЛИЩЕ**

- 1) ампулярным отделом
- 2) наружным зевом
- 3) внутриматочным отделом
- 4) внутренним зевом

**ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ ОПЕРАТИВНОЕ РОДРАЗРЕШЕНИЕ ПРОВОДЯТ В \_\_\_\_\_ ПОРЯДКЕ**

- 1) экстренном
- 2) плановом
- 3) срочном

4) неотложном

**ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫЗЫВАЕМЫМ БЛЕДНОЙ ТРЕПОНЕМОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) СПИД
- 2) гепатит
- 3) сифилис
- 4) туберкулез

**ПРИ ЛЕГКИХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) глубокая кома
- 2) появление судорог
- 3) нарушение зрения
- 4) легкое опьянение

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНОЗА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) цефтриаксон
- 2) метронидазол
- 3) сумамед
- 4) амоксиклав

**ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая сердечная недостаточность
- 2) посттромбофлебитический синдром
- 3) остеомиелитический свищ
- 4) послеоперационная грыжа

**ПРИ СИНДРОМЕ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ У РОЖЕНИЦ**

- 1) наблюдается гипертензия
- 2) самочувствие не страдает
- 3) увеличивается объем циркулирующей крови
- 4) затруднен возврат венозной крови к сердцу

**ПРОЦЕСС УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТКАНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гипертрофия
- 2) реституция
- 3) регенерация
- 4) гиперплазия

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯ(ЕЙ)**

- 1) 80
- 2) 86
- 3) 70

4) 84

**ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) переносица
- 2) большой родничок
- 3) малый родничок
- 4) подзатылочная ямка

**КРИТЕРИЕМ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/ЛИТР**

- 1) 1,1 - 3,1
- 2) 7,1 - 10,0
- 3) 5,1 - 7,0
- 4) 3,1 - 5,1

**КОМПЛЕКС ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТЫХ, ПСИХИЧЕСКИХ И ОБМЕННО-ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ УГАСАНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ, НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМ**

- 1) поликистозный
- 2) аденогенитальный
- 3) предменструальный
- 4) климактерический

**ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАГРУБАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СЕРОЗНОМ МАСТИТЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ**

- 1) сцеживание молока
- 2) наложение спиртового компресса
- 3) орошение фурацилином
- 4) наложение обезболивающей мази

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ**

- 1) макропен
- 2) окситоцин
- 3) нифедипин
- 4) динопрост

**ПАЦИЕНТА С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ТРАНСПОРТИРУЮТ В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) лежа на животе
- 2) с приподнятыми нижними конечностями
- 3) с приподнятым изголовьем
- 4) лежа на спине

**КОНТАКТНЫЕ ОЖОГИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С \_\_\_\_\_ ПРЕДМЕТАМИ**

- 1) горячими
- 2) холодными
- 3) колючими
- 4) скользкими

**ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 24
- 2) 48
- 3) 12
- 4) 36

**ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 20-30
- 2) 80-90
- 3) 15-20
- 4) 40-60

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ У МАТЕРИ**

- 1) гипотония
- 2) преэклампсия
- 3) спленомегалия
- 4) гипотермия

**МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКАХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_ %**

- 1) 90
- 2) 40
- 3) 70
- 4) 60

**ДЕМОГРАФИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАУКОЙ, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ**

- 1) факторную обусловленность здоровья
- 2) воспроизводство населения
- 3) вопросы брака и плодовитости
- 4) состав населения

**ПОДАВЛЕНИЕ ЛАКТАЦИИ В ВИДЕ ПОСТЕПЕННОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В \_\_\_\_\_ СЦЕЖИВАНИИ МОЛОКА**

- 1) полном
- 2) регулирующем
- 3) болезненном
- 4) редком

**СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПАКЕТЫ, ЗАКРЫТЫЕ ТЕРМОСШИВАНИЕМ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 18

**С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ ДИСФОРИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ \_\_\_\_\_ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ**

- 1) чистогестагенные
- 2) комбинированные
- 3) экстренные
- 4) посткоитальные

**ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) тестостерон
- 2) фолликулин
- 3) окситоцин
- 4) питуитрин

**ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО \_\_\_\_\_ СНЯТЬ ОБУВЬ И ОДЕЖДУ**

- 1) немедленно
- 2) медленно
- 3) быстро
- 4) аккуратно

**МАЛЫЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ, СЛИВАЯСЬ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ С БОЛЬШИМИ, ОБРАЗУЮТ**

- 1) уздечку клитора
- 2) уздечку губ
- 3) переднюю спайку
- 4) заднюю спайку

**РЕКОМЕНДОВАНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) через 1 час
- 2) в течение первого часа
- 3) в течение первых суток
- 4) через 12 часов

**ПРИ ХОРИОНАМНИОНИТЕ НА ФОНЕ НЕЗРЕЛЫХ РОДОВЫХ ПУТЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО РОДРАЗРЕШЕНИЕ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В \_\_\_\_\_ ПОРЯДКЕ**

- 1) неотложном
- 2) плановом
- 3) экстренном
- 4) обязательном

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСТРАДАВШИХ В ОЧАГАХ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В \_\_\_\_\_ ЭТАП(А)**

- 1) один
- 2) два
- 3) три
- 4) четыре

**ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ**

- 1) резкая слабость
- 2) кожный зуд
- 3) головная боль
- 4) падение артериального давления

**СРОК БЕРЕМЕННОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И)**

- 1) 28 - 32
- 2) 22 - 28
- 3) 32 - 34
- 4) 34 - 37

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА**

- 1) предстерилизационную очистку
- 2) утилизацию
- 3) дезинфекцию
- 4) последующее хранение

**ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ МЕНСТРУАЦИИ ДО ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ АМЕНОРЕЕЙ**

- 1) ложной
- 2) психогенной
- 3) фармакологической
- 4) физиологической

**ПРИ НАЗОДУОДЕНАЛЬНОМ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ ЗОНД**

- 1) тонкий желудочный
- 2) дуоденальный
- 3) назогастральный
- 4) толстый желудочный

**РАЗРЫВ ПРОМЕЖНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ПОВРЕЖДАЕТСЯ ЗАДНЯЯ СПАЙКА, СЛИЗИСТАЯ ВЛАГАЛИЩА И КОЖА, ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЫВОМ \_\_\_\_\_ СТЕПЕНИ**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

**В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОДНА ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЖЕНЩИН**

- 1) 2200
- 2) 1400
- 3) 2000
- 4) 1200

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА, ПРОВОДЯЩЕГО КОМПРЕССИЮ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, КАЖДЫЕ \_\_\_ МИНУТ(Ы)**

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 4
- 4) 2

**ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 11
- 2) 10
- 3) 9
- 4) 13

**ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА**

- 1) улицу
- 2) крыши зданий
- 3) верхние этажи зданий
- 4) нижние этажи и в подвалы

**ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ**

- 1) термолабильных материалов
- 2) любого пластика
- 3) стекла
- 4) стали

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ ПУЛЬСА НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ(Ы)**

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 20

**К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ НЕДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- 1) кожа бархатистая, розовая
- 2) громкий крик
- 3) непропорциональное телосложение
- 4) мышечный гипертонус

**ОТНОШЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ К ГОЛОВКЕ И ТУЛОВИЩУ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) членорасположение
- 2) позиция
- 3) вид
- 4) положение

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ АНЕМИЕЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ У БЕРЕМЕННЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ АНЕМИЯ**

- 1) В12-дефицитная
- 2) геморрагическая
- 3) гемолитическая
- 4) железодефицитная

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 110
- 2) 86
- 3) 70
- 4) 100

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 7
- 3) 5
- 4) 14

**ОДНИМ ИЗ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сальпингоэктомия
- 2) тубэктомия
- 3) миомэктомия
- 4) овариоэктомия

**НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ТЕХНИКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

## \_\_\_\_\_ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА У ГРУДИ

- 1) свободное
- 2) правильное
- 3) горизонтальное
- 4) вертикальное

## ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поперечное положение
- 2) разгибательное вставление
- 3) тазовое предлежание
- 4) предлежание плаценты

## ЖЕНЩИНЫ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- 1) II
- 2) III
- 3) IV
- 4) I

## ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОК С ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ МРТ

- 1) головного мозга
- 2) органов малого таза
- 3) органов грудной клетки
- 4) поясничного отдела позвоночника

## ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) заместительная
- 2) патогенетическая
- 3) симптоматическая
- 4) этиотропная

## ВНУТРЕННИМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) клитор
- 2) бартолинова железа
- 3) девственная плева
- 4) матка

## ВНУТРИМАТОЧНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

- 1) избыточной массе тела
- 2) резус-отрицательной принадлежности крови пациента
- 3) хронических воспалительных заболеваниях половых органов
- 4) низкой массе тела

### **ЛОБОК ПО БОКАМ ОГРАНИЧЕН**

- 1) малыми половыми губами
- 2) большими половыми губами
- 3) паховыми складками
- 4) переходной складкой

### **ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ НА 4-8 ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ \_\_\_\_\_ ДВОЙНЯ**

- 1) монохориальная моноамниотическая
- 2) не разделившаяся
- 3) дихориальная диамниотическая
- 4) монохориальная диамниотическая

### **НОРМАЛЬНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ**

- 1) 500-700
- 2) 700-800
- 3) 100-200
- 4) 300-500

### **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРЕЭКЛАМПСИЮ РЕКОМЕНДОВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ \_\_\_\_\_ В МОЧЕ**

- 1) холестерина
- 2) билирубина
- 3) глюкозы
- 4) креатинина

### **ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) пельвиоперитонит
- 2) геморрагический шок
- 3) матка Кувелера
- 4) абсцесс

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ, ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ДВС-синдром
- 2) Неллр-синдром
- 3) отек легких
- 4) острый жировой гепатоз

### **ПОД ИРРИГОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

- 1) желудка
- 2) толстого кишечника
- 3) пищевода
- 4) тонкого кишечника

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ЭМБОЛИЕЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ РЕКОМЕНДОВАНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

- 1) целостности тканей промежности
- 2) репродуктивной функции
- 3) объема циркулирующей крови
- 4) жизненного объема легких

**СТЕРИЛЬНЫЕ УПАКОВКИ С ИНСТРУМЕНТАМИ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ**

- 1) на подоконнике
- 2) в темном сухом месте
- 3) в холодильной камере
- 4) возле раковины

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 8-9
- 4) 6-7

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рентгенография
- 2) электрокардиография
- 3) пикфлоуметрия
- 4) спирометрия

**СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ**

- 1) один раз в 7 дней
- 2) 4-5 раз в сутки
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) ежедневно

**В НОРМЕ ГЛАВНЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пучок Гиса
- 2) волокна Пуркинье
- 3) предсердно-желудочковый узел
- 4) синусно-предсердный узел

**МЕНСТРУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ С ИНТЕРВАЛАМИ МЕНЕЕ 21 ДНЯ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) альгоменореей
- 2) гипоменореей
- 3) гиперменореей
- 4) полименореей

**ПРИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) химические индикаторы
- 2) биологические индикаторы
- 3) результаты лабораторных исследований
- 4) контрольно-измерительные приборы

**ОДНОЙ ИЗ РЕДКИХ ПРИЧИН ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕН**

- 1) васкулит
- 2) аневризма
- 3) тромбоз
- 4) эмболия

**ПАЦИЕНКАМ С БЕССИМПТОМНОЙ МИОМОЙ МАТКИ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ РЕКОМЕНДОВАНО**

- 1) медикаментозное лечение
- 2) стационарное лечение
- 3) хирургическое вмешательство
- 4) динамическое наблюдение

**К ТРИХОМОНИАЗУ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ОТНОСИТСЯ**

- 1) вульвит
- 2) сальпингит
- 3) уретрит
- 4) цервицит

**В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ ЯИЧНИКА ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН**

- 1) прогестерон
- 2) эстрадиол
- 3) инсулин
- 4) окситоцин

**БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В**

- 1) левой подвздошной области
- 2) правой подвздошной области
- 3) околопупочной области
- 4) правом подреберье

**ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ \_\_\_\_ % ОТ ОДНОВРЕМЕННО ОБРАБОТАННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

- 1) 7

- 2) 3
- 3) 1
- 4) 5

**ОСЛОЖНЕНИЕМ МОНОХОРИАЛЬНОЙ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПЛОДОВ**

- 1) респираторный дистресс-синдром
- 2) фето-фетальный синдром
- 3) синдром одновременной задержки роста
- 4) синдром прямой венозной перфузии

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 13
- 2) 10,5
- 3) 11
- 4) 12,5

**АКУШЕРКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА МИНИМУМ \_\_\_\_\_ КОМПЛЕКТАМИ СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

**ПАЦИЕНТКАМ С ДИСМЕНОРЕЕЙ С ВОЗРАСТА МЕНАРХЕ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) комбинированных оральных контрацептивов
- 2) интравагинального кольца
- 3) пищевых добавок
- 4) минеральных добавок

**МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТ ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 4

**ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ**

- 1) наложение жгута
- 2) бинтование эластичным бинтом
- 3) обезболивание
- 4) согревание

**ПРОБА, ОСНОВАННАЯ НА РЕГИСТРАЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЫДОХА, НАЗЫВАЕТСЯ ПРОБОЙ**

- 1) Карпмана
- 2) Гентера
- 3) Штанге
- 4) Генча

**ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИЙ У ДЕВУШКИ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) аменореей
- 2) дисменореей
- 3) ациклическим маточным кровотечением
- 4) меноррагией

**ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МАТКИ**

- 1) сокращением
- 2) размягчением тела
- 3) асимметрией
- 4) размягчением перешейка

**ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- 1) с момента начала операции
- 2) с момента окончания операции
- 3) в день операции
- 4) за 30 минут до операции

**В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛЕЖИТ**

- 1) гиперандрогения
- 2) гиперэстрогения
- 3) гипоэстрогения
- 4) гипоандрогения

**ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) поверхностными ожогами кожи
- 2) судорогами без потери сознания
- 3) нарушением дыхания
- 4) учащением сердцебиения

**В НОРМЕ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ(Ы)**

- 1) 6 - 7
- 2) 8 - 9
- 3) 4 - 5
- 4) 2 - 3

**ПОСЛЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО НАРУЖНОГО МАССАЖА МАТКИ У РОДИЛЬНИЦЫ ПРИ РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) дезинтоксикационной терапии
- 2) токолитической терапии
- 3) ручного обследования матки
- 4) надвлагалищной ампутации матки

**ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) метиловый спирт
- 2) бикарбонат натрия
- 3) этиловый спирт
- 4) перекись водорода

**ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- 1) волокнами Пуркинье
- 2) ножками пучка Гиса
- 3) сосочковыми мышцами
- 4) сухожильными нитями

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) наиболее отдаленными точками венечного шва
- 2) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- 3) серединой большого родничка и подъязычной костью
- 4) наиболее отдаленными точками теменных бугров

**ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- 1) после установления точного диагноза
- 2) непосредственно по окончании операции
- 3) поступлением пациента в операционную
- 4) накануне операции

**ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ**

- 1) одновременное сокращение всех мышечных волокон
- 2) расслабление всех мышечных волокон
- 3) неравномерное сокращение всех мышечных волокон
- 4) сокращение только нижнего сегмента матки

**ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ ВОДЫ**

- 1) 15
- 2) 12
- 3) 10
- 4) 20

**ОСНОВНЫМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вертикальный
- 2) контактный
- 3) половой
- 4) водный

**ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ФАКТОР**

- 1) шеечный
- 2) сфинктерный
- 3) рефлюксный
- 4) антиперистальтический

**ПАРОВЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ**

- 1) силикона
- 2) дерева
- 3) стекла
- 4) бумаги

**К СТИМУЛЯТОРАМ РОСТА ЛЕЙОМИОМЫ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) жиры
- 2) андрогены
- 3) эстрогены
- 4) белки

**ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ОПЕРАЦИЮ ПО ПОВОДУ ТРУБО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ**

- 1) 2-4 часа
- 2) 12-16 часов
- 3) 1-2 дня
- 4) 3-5 дней

**К АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ**

- 1) нитроминт
- 2) эналаприл
- 3) клексан
- 4) атенолол

**К ВОДНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЯМ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) линименты
- 2) настойки
- 3) настои
- 4) эмульсии

**ПОМОЩЬ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ С**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- 1) природных лечебных ресурсов
- 2) методов акупунктуры и акупрессуры
- 3) физических лечебных средств и упражнений
- 4) специальной аппаратуры и оборудования

## **ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) белка в крови
- 2) эритроцитов в крови
- 3) эритроцитов в моче
- 4) белка в моче

## **ВОСПАЛЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ И КЛАПАНОВ СЕРДЦА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) эндокардит
- 2) перикардит
- 3) миокардит
- 4) эпикардит

## **КРИОДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) большим
- 3) малым
- 4) лапароскопическим

## **ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ**

- 1) жидкости и соли
- 2) белков и углеводов
- 3) белков и жиров
- 4) жидкости и углеводов

## **ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ КЛУБОЧКОВ, ВОВЛЕКАЮЩЕЕ КАНАЛЬЦЫ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНУЮ ТКАНЬ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) уретрит
- 2) пиелонефрит
- 3) гломерулонефрит
- 4) цистит

## **ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) прерывание беременности
- 2) кесарево сечение
- 3) миому матки
- 4) опухоль яичника

**В РАМКАХ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ НА НАЛИЧИЕ HBV-ИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ МАРКЁР**

- 1) anti-HBs
- 2) HBe-Ag
- 3) HBcor-Ag
- 4) HBs-Ag

**ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 100 МЛ**

- 1) 0,9% раствора натрия хлорида
- 2) 2% раствора натрия гидрокарбоната
- 3) 10% раствора натрия хлорида
- 4) 5% раствора магния сульфата

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ СОЗНАНИЯ, ДЫХАНИЯ И ПУЛЬСА У ПОСТРАДАВШЕГО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ БОЛЕЕ \_\_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 60
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 30

**МОЛОКО ПРИОБРЕТАЕТ ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ К \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА**

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 8-9
- 4) 6-7

**К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) внезапная гипертензия
- 2) отек мозга
- 3) отслойка сетчатки
- 4) внезапная гипотензия

**СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) измерение окружности живота
- 2) прикроватный тест
- 3) контроль массы тела
- 4) признак Вастена

**ОТСУТСТВИЕ ЭМБРИОНА В ПЛОДНОМ ЯЙЦЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) фетопатия

- 2) анэмбриония
- 3) эмбриопатия
- 4) анеуплоидия

**НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) метrorрагией
- 2) полименореей
- 3) альгоменореей
- 4) гипоменореей

**РАССТРОЙСТВО, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ В ЛЮТЕИНОВУЮ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) перименструальным
- 2) предменструальным
- 3) интраменструальным
- 4) постменструальным

**РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНА НА СНИЖЕНИЕ \_\_\_\_\_ ПАЦИЕНТА**

- 1) расходов на лечение
- 2) физической активности
- 3) нервной возбудимости
- 4) степени инвалидности

**ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЛАВНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА В ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ И ОБРАТНО ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ ЛЕСЕНКУ**

- 1) скользящую
- 2) эргономическую
- 3) веревочную
- 4) гусеничную

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ОСНОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА МОЧИ**

- 1) токсикологического
- 2) иммунохроматографического
- 3) общего
- 4) микробиологического

**ОПЕРАЦИЯ ВСКРЫТИЯ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) амниоскопия
- 2) амнионит
- 3) амниоцентез
- 4) амниотомия

**ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРЕН ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ**

- 1) тремор нижних конечностей
- 2) спазм дыхательных путей
- 3) гипотонус мышц
- 4) гипертонус мышц

**ВОЗБУДИТЕЛЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ**

- 1) пикорнавирусов
- 2) ретровирусов
- 3) ортомиксовирусов
- 4) флавивирусов

**ДЛЯ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРНЫ \_\_\_\_\_ СУДОРОГИ**

- 1) тонические
- 2) мимические
- 3) спастические
- 4) клонические

**СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 6% РАСТВОРОМ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 18 °С ПРОВОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 360
- 2) 240
- 3) 180
- 4) 120

**ФАТАЛЬНАЯ АМНИОТИЧЕСКАЯ ЭМБОЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ**

- 1) разрыва промежности
- 2) разрыва матки
- 3) гибели плода
- 4) отслойки плаценты

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) влагалищная диафрагма
- 2) шейный колпачок
- 3) прерванный половой акт
- 4) презерватив

**ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 42
- 2) 20
- 3) 32
- 4) 39

**ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Федеральный закон РФ «О медицинском страховании граждан»
- 2) Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 3) Трудовой кодекс РФ
- 4) Федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»

**РАННИЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 18
- 4) 36

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА РОДОВЫХ ЗАЛОВ ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 7

**МЕРОПРИЯТИЕМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение противоожогового аэрозоля
- 2) наложение асептической повязки
- 3) обработка растительным маслом
- 4) обработка фукорцином

**ПЕРИОДОМ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТКАНЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО НАЧАЛА СОГРЕВАНИЯ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПЕРИОД**

- 1) восстановительный
- 2) поздний реактивный
- 3) ранний реактивный
- 4) дореактивный

**КРАСНУХА, ВОЗНИКШАЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПАСНА РАЗВИТИЕМ**

- 1) бронхиальной астмы у женщины
- 2) сахарного диабета у женщины
- 3) врожденных пороков у ребенка
- 4) обострения пиелонефрита у женщины

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КРИВАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТРОИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

- 1) ЧДД
- 2) САД
- 3) ЧСС
- 4) ДАД

**МОЛОЗИВО ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ РЕАКЦИЮ**

- 1) слабощелочную
- 2) амфотерную
- 3) кислую
- 4) щелочную

**ПРИ ВЫРАЖЕННОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА**

- 1) сосудистого хирурга
- 2) гепатолога
- 3) травматолога - ортопеда
- 4) гематолога

**УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ВЫШЕ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гипергликемия
- 2) полигликемия
- 3) гипогликемия
- 4) олигогликемия

**ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) середина стреловидного шва
- 2) большой родничок
- 3) малый родничок
- 4) середина венечного шва

**ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПОСЛЕ ВСАСЫВАНИЯ ИЗ РАНЫ ПОПАДАЮТ В КРОВОТОК И ОКАЗЫВАЮТ \_\_\_\_\_ ДЕЙСТВИЕ**

- 1) этиотропное
- 2) кумулятивное
- 3) рефлекторное
- 4) резорбтивное

**ГЕМАТУРИЯ ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ \_\_\_\_\_ В МОЧЕ**

- 1) цилиндров
- 2) бактерий
- 3) лейкоцитов
- 4) эритроцитов

**ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) воспалении придатков матки
- 2) перекруте ножки опухоли яичника
- 3) внематочной беременности
- 4) хроническом эндометрите

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ ВО ВРЕМЯ ПЕРВИЧНОГО ТУАЛЕТА НОВОРОЖДЁННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) раствор
- 2) мазь
- 3) гель
- 4) капли

**ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 7
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 10

**ХЛАМИДИИ ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ МИКРООРГАНИЗМАМИ**

- 1) аэробными
- 2) грамотрицательными
- 3) грамположительными
- 4) не облигатными

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический пиелонефрит
- 2) обструктивный бронхит
- 3) приобретенный порок сердца
- 4) ишемическая болезнь сердца

**ТРИСОМИЯ ХРОМОСОМЫ 13 ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА**

- 1) Вольфа-Хиршхорна
- 2) Патау
- 3) Эдвардса
- 4) кошачьего крика

**ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА В ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) самостоятельно
- 2) лежа на каталке
- 3) под руку медицинским персоналом
- 4) сидя на коляске

**МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ \_\_\_\_\_ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА**

- 1) всеми
- 2) воздушными
- 3) наземными
- 4) водными

**ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЮ МАТКИ И ПРИДАТКОВ ПРИ СПАЕЧНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧИНАЮТ ПРОВОДИТЬ С \_\_\_\_ ДНЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) 1-2
- 2) 5-7
- 3) 8-9
- 4) 3-4

**МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В**

- 1) слюне
- 2) крови
- 3) влагалищном секрете
- 4) сперме

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРОМИДА ГИДРОХЛОРИДА (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) антиаритмическое
- 2) противорвотное
- 3) диуретическое
- 4) гипотензивное

**ВЕГЕТОКОРРЕГИРУЮЩИМ МЕТОДОМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пелоидотерапия
- 2) акупунктура
- 3) эндоназальная гальванизация
- 4) транскраниальная стимуляция

**ПЕРИОД ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО КОНЦА 8-Й НЕДЕЛИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) эмбриональным
- 2) плацентарным
- 3) фетальным
- 4) постнатальным

**ПЕРВИЧНУЮ ОБРАБОТКУ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ**

- 1) после первого прикладывания к груди
- 2) сразу после рождения ребенка
- 3) после перевода в послеродовое отделение
- 4) сразу после рождения последа

**НОВОРОЖДЕННОМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ \_\_\_\_\_ ВСКАРМЛИВАНИЕ**

- 1) парентеральное
- 2) смешанное

- 3) естественное
- 4) искусственное

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ С НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ НАЗНАЧАЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ**

- 1) 32
- 2) 34
- 3) 40
- 4) 22

**МЕРОПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КАЖДЫЕ**

- 1) 48 часов
- 2) 24 часа
- 3) 3-5 дней
- 4) 5-7 дней

**МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ИМЕЮЩИЙ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО», ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ**

- 1) «Гигиена и санитария»
- 2) «Лабораторная диагностика»
- 3) «Лечебное дело»
- 4) «Сестринское дело»

**ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАНИМАЮТ**

- 1) осложнения беременности
- 2) онкологические заболевания
- 3) врожденные аномалии
- 4) воспалительные заболевания

**ПАЦИЕНТУ С ОЖОГОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ**

- 1) анальгетиками
- 2) седативными средствами
- 3) местными анестетиками
- 4) барбитуратами

**РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) гибели
- 2) врожденным уродствам
- 3) хромосомным аномалиям
- 4) олигофрении

**С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКОВ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) гальванизация

- 2) магнитотерапия
- 3) индуктотермия
- 4) лазеротерапия

#### **ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ АКТИВНОСТЬ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ**

- 1) изменяется циклично
- 2) уменьшается
- 3) увеличивается
- 4) не изменяется

#### **ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМБИНИРОВАННОЙ ОРАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) недостаточный контрацептивный эффект
- 2) отсутствие связи с половым актом
- 3) безопасность использования курящими женщинами
- 4) защита от инфекций, передающихся половым путем

#### **РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО МЕТОДАМ**

- 1) лечебной гимнастики
- 2) санаторно-курортного лечения
- 3) контрацепции
- 4) физиотерапии

#### **БАКТЕРИЦИДНЫЕ КАМЕРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ**

- 1) дезинфекции воздуха
- 2) хранения инструментов
- 3) освещения помещений
- 4) дезинфекции поверхностей

#### **АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛЛЕРГЕНА ОБЫЧНО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 3
- 4) 2

#### **ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА РЕКОМЕНДОВАНО ЗАВЕРШИТЬ РОДЫ**

- 1) применением полостных акушерских щипцов
- 2) применением вакуум-экстракции плода
- 3) применением выходных акушерских щипцов
- 4) операцией кесарево сечение

#### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ 42 НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) перенашиванием

- 2) недонашиванием
- 3) невынашиванием
- 4) перезрелостью

**СРАЩЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) 4-х оболочек между плодами
- 2) 1-го хориона и 2-х амнионов
- 3) 2-х хорионов и 2-х амнионов
- 4) 1-го хориона и 1 амниона

**НАЛИЧИЕ ПАРТНЕРА В РОДАХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНО ПАЦИЕНТКАМ ПРИ НАЛИЧИИ \_\_\_\_\_ РОДОВЫХ БОКСОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ**

- 1) индивидуальных
- 2) общих
- 3) предродовых
- 4) операционных

**К СИНТЕТИЧЕСКИМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ**

- 1) лоперамид
- 2) бисакодил
- 3) сеннадексин
- 4) глицерин

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ВСЕХ НОВОРОЖДЕННЫХ**

- 1) раннее
- 2) позднее
- 3) отсроченное
- 4) регламентированное

**ЗАБОР КРОВИ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) после ужина
- 2) после завтрака
- 3) утром натощак
- 4) в любое время дня

**СОСТОЯНИЕМ С ДЛИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ ВАЗОПРЕССОРОВ, ПРИ УСЛОВИИ УТРАТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФУЗИОННОЙ НАГРУЗКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ШОК**

- 1) травматический
- 2) ожоговый
- 3) геморрагический
- 4) рефрактерный

### **УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ УСИЛИВАЕТ СИНТЕЗ**

- 1) меланина
- 2) мелатонина
- 3) дофамина
- 4) релаксина

### **ЗАВЕРШЕНИЕ ЛАКТАЦИИ ОБЫЧНО ДЛИТСЯ ДО \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 2-3
- 2) 4-5
- 3) 6-7
- 4) 8-9

### **ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) анальгин
- 2) амоксиклав
- 3) прогестерон
- 4) окситоцин

### **ДЛЯ КОСВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ МАЛОГО ТАЗА ПРОВОДЯТ**

- 1) пальпацию лонного сочленения
- 2) измерение окружности живота
- 3) пальпацию живота
- 4) пельвиметрию

### **ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) кровь в моче
- 2) острое повышение температуры тела
- 3) болевой синдром
- 4) отсутствие клинических симптомов

### **ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) при наличии показаний
- 2) при каждом посещении
- 3) через одно посещение
- 4) через два посещения

### **Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является**

- 1) физическая активность
- 2) охрана окружающей среды
- 3) рациональное питание
- 4) диспансеризация

### **ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) сразу после операции
- 2) через сутки после операции

- 3) во время операции
- 4) утром перед операцией

**ХОЛОДНЫЕ КОМПРЕССЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ В РОДАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НА ОБЛАСТЬ**

- 1) живота
- 2) поясницы
- 3) груди
- 4) шеи

**ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ \_\_\_\_\_ ПОДДЕРЖКУ**

- 1) материальную
- 2) психологическую
- 3) гуманитарную
- 4) социальную

**ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 22 - 25
- 2) 18 - 20
- 3) 15 - 18
- 4) 27 - 28

**ПАЦИЕНТАМ С АНОГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ТЕРАПИИ**

- 1) антибактериальной
- 2) противовирусной
- 3) антимикотической
- 4) противопротозойной

**НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ПОМОЩНИКАМИ ВРАЧЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) социальные работники
- 2) акушерки
- 3) заведующие
- 4) медицинские братья

**ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) подкожный
- 2) ингаляционный
- 3) инъекционный
- 4) пероральный

**К ВНУТРЕННИМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) бартолиновы железы
- 2) уретра
- 3) матка
- 4) клитор

**ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ**

- 1) кровотечение
- 2) гипоксия
- 3) анемия
- 4) тромбоз

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРУППОВОГО ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ РОДИЛЬНИЦ НЕОБХОДИМО**

- 1) закрыть отделение
- 2) изолировать палату
- 3) провести уборку по типу заключительной
- 4) прекратить прием беременных и рожениц

**ОСНОВНОЕ КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ МАТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ \_\_\_\_\_ АРТЕРИЯ**

- 1) маточная
- 2) яичниковая
- 3) половая
- 4) наружная подвздошная

**УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ СНИЖАЕТ РИСК**

- 1) пролапса матки
- 2) послеродовой депрессии
- 3) уменьшения лактации
- 4) расхождения швов

**НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ**

- 1) повышение роли санаторно-курортной помощи
- 2) развитие первичной медико-санитарной помощи
- 3) повышение роли стационаров
- 4) развитие сети диспансеров

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) дезинфекция
- 2) предстерилизационная очистка
- 3) механическая дератизация
- 4) стерилизация

**ДИАПАЗОНОМ МЕЖДУ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ПЛАЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) распределение в водной фазе
- 2) широта терапевтического действия
- 3) метаболизм первого прохождения
- 4) депонирование в сосудистом русле

**ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) чувство жара
- 2) озноб
- 3) сухость кожных покровов
- 4) бледность кожных покровов

**С ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ РАКА МАТКИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) лапароскопии
- 2) аспирационной биопсии эндометрия
- 3) бактериоскопии
- 4) пункции заднего свода влагалища

**АМИДОПИРИНОВАЯ ПРОБА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА \_\_\_\_\_ НА ИНСТРУМЕНТЕ**

- 1) моющего средства
- 2) крови
- 3) гнойных выделений
- 4) бактерий

**ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_\_ %**

- 1) 35-39
- 2) 40-45
- 3) 51-55
- 4) 46-50

**СТЕНКА МАТКИ СОСТОИТ ИЗ \_\_\_\_\_ СЛОЕВ**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 4

**ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) оофорит
- 2) эндометрит
- 3) цервицит

4) сальпингит

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТА С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ОБМОРОКАМИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ВРАЧУ**

- 1) неврологу
- 2) гепатологу
- 3) ревматологу
- 4) нефрологу

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ \_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

**ДЛЯ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ХАРАКТЕРНА БОЛЬ**

- 1) в руке
- 2) в голове
- 3) за грудиной
- 4) внизу живота

**ПРИ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ И МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_ МИНУТ ОТ МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА**

- 1) 60
- 2) 20
- 3) 30
- 4) 40

**НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА**

- 1) информированное добровольное
- 2) подписанное по настоянию врача
- 3) нотариально заверенное
- 4) подписанное при свидетелях

**УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) сомнительным
- 2) субъективным
- 3) достоверным
- 4) вероятным

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ РОДАХ**

**СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 86
- 2) 70
- 3) 80
- 4) 84

**ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ ПУЛЬСА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЩАДЯЩЕ-ТРЕНИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 140-160
- 2) 80-100
- 3) 100-120
- 4) 120-140

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ**

- 1) каждый квартал
- 2) 1 раз в год
- 3) каждый месяц
- 4) 2 раза в год

**ИЗБЫТОЧНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД (МНОГОВОДИЕ) ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ \_\_\_\_ ЛИТРОВ**

- 1) 4
- 2) 7
- 3) 2,5
- 4) 1,5

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД**

- 1) дерматоглифический
- 2) цитологический
- 3) близнецовый
- 4) биохимический

**ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ С**

- 1) язвой желудка
- 2) запорами
- 3) бесплодием
- 4) бронхиальной астмой

**ГНОЕВИДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) сифилиса
- 2) кандидоза
- 3) трихомоноза
- 4) гонореи

**ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 4-6
- 2) 6-10
- 3) 1-2
- 4) 10-12

**ПОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) диагностику болезни у эмбриона или плода
- 2) мероприятия по предотвращению беременности при высоком риске рождения больного ребенка
- 3) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания у ребенка
- 4) оценку риска развития заболевания будущего ребенка

**К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) доноры крови
- 2) дети первого года жизни
- 3) беременные женщины
- 4) потребители инъекционных наркотиков

**ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) миому матки
- 2) кисту яичника
- 3) кесарево сечение
- 4) прерывание беременности

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В**

- 1) наличии необходимых лекарственных препаратов
- 2) наличии необходимого оборудования
- 3) отсутствии опасности для реанимирующихся
- 4) отсутствии инфекционных заболеваний у пострадавшего

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА В ДНЯХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 70
- 2) 56
- 3) 50
- 4) 74

**МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ В \_\_\_\_\_ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) овуляторную
- 2) эстрогеновую
- 3) любую
- 4) прогестероновую

**ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ АНТИСЕПТИКА, СОДЕРЖАЩЕГО**

- 1) фурацилин
- 2) спирт
- 3) перекись водорода
- 4) моющее средство

**ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) «Мистраль»
- 2) раствор фурацилина
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) «Ниттифор»

**ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫМ В СОСТОЯНИИ ОЖОГОВОГО ШОКА**

- 1) не подлежат эвакуации
- 2) вторая
- 3) отсроченная
- 4) первая

**ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) тяжелая преэклампсия
- 2) железодефицитная анемия
- 3) избыточная масса тела
- 4) дефицит массы тела

**ВЫКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО НА ЖИВОТ И ГРУДЬ МАТЕРИ СНИЖАЕТ РИСК**

- 1) гиповолемии
- 2) гипертермии
- 3) гипотермии
- 4) гипогликемии

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) атрофия эндометрия
- 2) повышенный уровень прогестерона
- 3) гипертрофия эндометрия
- 4) пониженный уровень окситоцина

### **ЗАЩИТУ ПРОМЕЖНОСТИ ПРОВОДЯТ В ПЕРИОДЕ**

- 1) изгнания плода
- 2) раннем послеродовом
- 3) рождения последа
- 4) раскрытия шейки матки

### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДЕНЬ (ДНЕЙ)**

- 1) 5-7
- 2) 14-21
- 3) 4-11
- 4) 24-31

### **ПРАВИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННОГО СПОСОБСТВУЕТ \_\_\_\_\_ ВСКАРМЛИВАНИЕ**

- 1) индивидуальное
- 2) искусственное
- 3) естественное
- 4) смешанное

### **НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) энурез
- 2) диурез
- 3) парез
- 4) диатез

### **ГЕНОРЕГУЛЯТОРНЫМ ЭФФЕКТОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) активация синтеза белков
- 2) увеличение числа митохондрий
- 3) уменьшение кислородной стоимости работы
- 4) преобладание положительных эмоций

### **БАРТОЛИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ**

- 1) слизистой оболочки влагалища
- 2) больших желез преддверия влагалища
- 3) параректальной клетчатки
- 4) молочных желез

### **НАГНОЕНИЕ РАНЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) практически сразу
- 2) через 3 - 5 часов
- 3) на 3 - 5 сутки
- 4) через 3 - 5 месяцев

**ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОК  
ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ПРОВОДЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_ РАЗ(А)**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 1

**КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) асфиксия
- 2) брадипноэ
- 3) апноэ
- 4) тахипноэ

**ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В  
СТАЦИОНАРАХ \_\_\_ ГРУППЫ**

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 3

**ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) изменение ритма и продолжительности менструаций
- 2) резкая боль внизу живота
- 3) патологические выделения из половых путей
- 4) иррадиация боли в прямую кишку

**К СИМПТОМАМ ТРИАДЫ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА ОТНОСЯТ**

- 1) артериальную гипотонию, бактериурию, отеки
- 2) артериальную гипертензию, протеинурию, отеки
- 3) клонические судороги, олигурию, билирубинемия
- 4) артериальную гипертензию, гематурию, анемию

**МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ**

- 1) формах человеческого сознания
- 2) морали поведения
- 3) внутреннем духовном мире
- 4) профессиональном долге

**К НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЕ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ**

- 1) *Escherichia coli*
- 2) *Chlamydia spp*
- 3) *Mycobacterium tuberculosis*
- 4) *Yersinia pestis*

**ОТХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ**

- 1) Б
- 2) В
- 3) Г
- 4) А

**ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ И ОТЕК, К ГРУДИ МОЖНО ПРИКЛАДЫВАТЬ \_\_\_\_\_ КОМПРЕССЫ**

- 1) гипертонические
- 2) горячие
- 3) холодные
- 4) спиртовые

**ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО**

- 1) применить грелку на низ живота
- 2) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- 3) попытаться вызвать мочеиспускание рефлекторно
- 4) ввести мочегонные средства

**АНТИКОАГУЛЯНТОМ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фраксипарин
- 2) эптифибатид
- 3) гепарин
- 4) апиксабан

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) ингибиторы АПФ
- 2) сердечные гликозиды
- 3) седативные средства
- 4) м-холиноблокаторы

**В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ, РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ**

- 1) нуклеиновые кислоты
- 2) углеводы
- 3) белки
- 4) жиры

**ПОД ЭКСТИРПАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) удаление любой части органа
- 2) полное удаление органа
- 3) удаление патологически измененных тканей
- 4) выскабливание полости

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вирус
- 2) бактерия
- 3) простейшее
- 4) микобактерия

**ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ГАРАНТИРОВАННОЙ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) страховой полис
- 2) паспорт гражданина РФ
- 3) медицинская карта амбулаторного больного
- 4) медицинская карта стационарного больного

**МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ**

- 1) почечной колики
- 2) дистресс-синдрома плода
- 3) пареза кишечника
- 4) приступа судорог

**ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРЕЗ КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) индуктотермия
- 2) гальванизация
- 3) фонофорез
- 4) электрофорез

**ГИСТЕРОСОНОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ**

- 1) эрозии шейки матки
- 2) бесплодии
- 3) кисте яичника
- 4) внематочной беременности

**К РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ДОПУСКАЕТСЯ \_\_\_\_\_, ПРОШЕДШЕЕ(ИЙ) ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1) технический персонал
- 2) работник клининговой компании
- 3) младший медицинский персонал
- 4) лицо, достигшее 18 лет

**ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) схватки потужного характера
- 2) раскрытие шейки матки 5 см

- 3) целый плодный пузырь
- 4) головка плода на тазовом дне

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГИБЕЛЬ**

- 1) бактерий
- 2) дрожжевых грибов
- 3) вирусов
- 4) всех микроорганизмов

**ПОД ТАХИКАРДИЕЙ ПОНИМАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 70
- 2) 50
- 3) 60
- 4) 100

**БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ВЫПОЛНЯЮТ С \_\_\_\_\_ ЦЕЛЬЮ**

- 1) диагностической
- 2) лечебной
- 3) информационной
- 4) профилактической

**НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) малым
- 2) большим
- 3) средним
- 4) лапароскопическим

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ИСКУССТВЕННЫЕ ВДУВАНИЯ В СООТНОШЕНИИ**

- 1) 3:2
- 2) 2:1
- 3) 30:2
- 4) 20:1

**РЕЗЕРВУАРОМ И ИСТОЧНИКОМ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) платяные и головные вши
- 2) консервы домашнего приготовления
- 3) дикие животные и птицы
- 4) домашние животные и птицы

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) проведении очистительной клизмы

- 2) гигиеническом душе
- 3) санитарной обработке кожных покровов
- 4) приеме общей ванны

**ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА**

- 1) простагландинов
- 2) андрогенов
- 3) эстрогенов
- 4) гестагенов

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ ПУЛЬСА НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_\_ ЦИКЛА(ОВ) (ПО 30 КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И 2 ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХА)**

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 2

**ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПУТЬ**

- 1) трансдермальный
- 2) ингаляционный
- 3) внутривенный
- 4) сублингвальный

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ НОРМОТЕРМИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 40
- 2) 30
- 3) 10
- 4) 60

**ПАЦИЕНТКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ДИСМЕНОРЕЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) интравагинального кольца
- 2) комбинированных оральных контрацептивов
- 3) пищевых добавок
- 4) минеральных добавок

**БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) большим

- 3) малым
- 4) лапароскопическим

**СРОКОМ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) устранение ранних послеоперационных осложнений
- 2) выписка из стационара
- 3) восстановление трудоспособности
- 4) заживление послеоперационной раны

**ЧТОБЫ ПЕРВОЕ КОРМЛЕНИЕ БЫЛО УСПЕШНЫМ, НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАЙТИ**

- 1) грудь
- 2) бутылочку
- 3) пустышку
- 4) сосок

**ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) понижении артериального давления
- 2) брадикардии
- 3) повышении артериального давления
- 4) мерцательной аритмии

**ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ СПОСОБСТВУЕТ \_\_\_\_\_**

**ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ**

- 1) позднее
- 2) раннее
- 3) эпизодическое
- 4) периодическое

**ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА \_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 18 - 20
- 2) 4 - 6
- 3) 10 - 12
- 4) 7 - 9

**ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ГОЛОВКА ПЛОДА ПРОДВИГАЕТСЯ ПО ПЛОСКОСТЯМ МАЛОГО ТАЗА \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) малым косым
- 2) средним косым
- 3) прямым
- 4) большим косым

**ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) не изменяются

- 2) изменяются циклично
- 3) понижаются
- 4) повышаются

### **АСИНКЛИТИЧЕСКОЕ ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ**

- 1) анатомически узком тазе
- 2) ягодичном предлежании
- 3) лицевом предлежании
- 4) предлежании плаценты

### **ПРИ МНГОВОДИИ В РОДАХ ВСКРЫТИЕ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ**

- 1) эксцентрично, на высоте схватки
- 2) эксцентрично, вне схватки
- 3) центрально, на высоте схватки
- 4) центрально, вне схватки

### **ПОД НИКТУРИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) преобладание ночного диуреза над дневным
- 2) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
- 3) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
- 4) редкое болезненное мочеиспускание в ночное время

### **ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

- 1) дыхательного объема
- 2) жизненной емкости легких
- 3) пиковой скорости выдоха
- 4) остаточного объема

### **АЦИКЛИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ РЕГУЛЯРНЫМИ МЕНСТРУАЦИЯМИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) дисменструальные
- 2) олигоменореей
- 3) межменструальные
- 4) полименореей

### **БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ЖАЛОБАХ НА ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОШЕНИЕ \_\_\_\_\_ ТРИКОТАЖА**

- 1) утягивающего
- 2) декоративного
- 3) гигиенического
- 4) компрессионного

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наложение гипсовой повязки

- 2) выполнение иммобилизации
- 3) наложение кровоостанавливающего жгута
- 4) применение скелетного вытяжения

### **ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 3 ПЕРИОДА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) продолжительности 1 и 2 периодов родов
- 2) размеров и толщины плаценты
- 3) внутриутробного состояния плода
- 4) наличия признаков отделения плаценты

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ**

- 1) хронического кольпита
- 2) хронического цистита
- 3) острого эндоцервицита
- 4) tuboовариального абсцесса

### **ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПАЦИЕНТУ ПРОВОДЯТ**

- 1) частичную санитарную обработку и смену белья
- 2) обтирание кожи и смену белья
- 3) полную санитарную обработку
- 4) частичную санитарную обработку

### **ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бактериурия
- 2) пиурия
- 3) лейкоцитурия
- 4) протеинурия

### **ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) накормить пациентку
- 2) получить информированное согласие пациентки
- 3) побеседовать с родственниками пациентки
- 4) напоить пациентку

### **В СТАЦИОНАРЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) кладовой для грязного белья
- 2) шкафу в санитарной комнате
- 3) шкафу в ванной комнате
- 4) мешках в кабинете сестры хозяйки

### **ЖЕНЩИНАМ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ**

- 1) стрессовых ситуаций
- 2) физической активности
- 3) рекомендаций врача
- 4) половых контактов

**ПРИ ТРЕЩИНАХ СОСКОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДЫ \_\_\_\_\_  
ЛЕЧЕНИЯ**

- 1) гормонального
- 2) антибактериального
- 3) хирургического
- 4) физиотерапевтического

**ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) травма мочеиспускательного канала
- 2) острая задержка мочи
- 3) появление отеков
- 4) недержание мочи

**НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ ДО \_\_\_\_\_  
НЕДЕЛЬ**

- 1) 38
- 2) 37
- 3) 40
- 4) 39

**НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА МЕДИ ВЫЗЫВАЮТ МУТАЦИИ ГЕНА АТР7В ПРИ БОЛЕЗНИ**

- 1) Гоше
- 2) Вильсона-Коновалова
- 3) Хантингтона
- 4) Менкеса

**ЭКОНОМИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) преобладание положительных эмоций
- 2) увеличение числа митохондрий
- 3) уменьшение кислородной стоимости работы
- 4) активация синтеза белков крови

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ**

- 1) цветом биологического индикатора
- 2) температурой
- 3) запахом
- 4) отсутствием роста тест-культур

**ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕПОЛНОГО ВЫКИДЫША  
С ЦЕЛЬЮ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кюретаж
- 2) вакуум-аспирация
- 3) серкляж
- 4) вакуум-экстракция

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ТАЛАССОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 18
- 2) 20
- 3) 14
- 4) 16

**ТОШНОТА ПО УТРАМ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) объективным
- 2) вероятным
- 3) сомнительным
- 4) достоверным

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗРЫВОВ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ \_\_\_\_\_ КОМПРЕСС**

- 1) ледяной
- 2) холодный
- 3) теплый
- 4) горячий

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ В РОДАХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) подозрение на инфекцию
- 2) первые своевременные роды
- 3) головное предлежание плода
- 4) отсутствие желания роженицы

**ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НАЗНАЧАЮТ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОСУДАХ**

- 1) нижних и верхних конечностей
- 2) верхних конечностей и головы
- 3) нижних конечностей и малого таза
- 4) плечевого пояса и шеи

**ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ НАЧИНАТЬ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ) ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 4
- 4) 24

**ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАЧАТИЕ, НАЗЫВАЮТСЯ МЕТОДАМИ**

- 1) овуляции
- 2) контрацепции

- 3) ограничения
- 4) стимуляции

**В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ПРИМЕНЯЮТ \_\_\_\_\_**  
**ПРЕПАРАТЫ**

- 1) отхаркивающие
- 2) жаропонижающие
- 3) противокашлевые
- 4) противовирусные

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ НА**

- 1) хранение
- 2) утилизацию
- 3) дезинфекцию
- 4) стерилизацию

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ЖАЛОБАХ НА БОЛЬ В СПИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ \_\_\_\_\_ АКТИВНОСТИ**

- 1) физической
- 2) эмоциональной
- 3) творческой
- 4) трудовой

**К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) медицинская карта стационарного больного
- 2) бланк экстренного извещения
- 3) направление на санаторно-курортное лечение
- 4) направление в стационар

**ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) цианоз слизистой оболочки влагалища
- 2) пигментация кожи на лице и белой линии живота
- 3) выслушивание сердцебиения плода
- 4) определение хорионического гормона

**ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) глюкозурия, протеинурия
- 2) гематурия, протеинурия
- 3) лейкоцитурия, бактериурия
- 4) глюкозурия, цилиндрурия

**ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА В-12 РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) цинга
- 2) дерматоз

- 3) рахит
- 4) анемия

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ**

- 1) инфракрасном облучении
- 2) дарсонвализации
- 3) ультратонтерапии
- 4) лекарственном электрофорезе

**ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ**

- 1) полулунным
- 2) четырехстворчатым
- 3) двустворчатым
- 4) трехстворчатым

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) гипергликемия
- 2) гиперхолестеринемия
- 3) гиперпротеинемия
- 4) гипербилирубинемия

**ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ**

- 1) белков
- 2) соли
- 3) сахара
- 4) углеводов

**ФАКТОРОМ РИСКА ВЫПАДЕНИЯ ПЕТЕЛЬ ПУПОВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) затылочное вставление головки плода
- 2) тазовое предлежание плода
- 3) абсолютно короткая пуповина
- 4) высокое расположение плаценты

**УКОРОЧЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) контракция
- 2) дистракция
- 3) коррекция
- 4) ретракция

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ЭМБОЛИЕЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) ручного обследования полости матки
- 2) сердечно-легочной реанимации

- 3) бимануальной компрессии матки
- 4) фиксации летального исхода

### **НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОРМЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПО**

- 1) желанию матери
- 2) требованию
- 3) рекомендации акушерки
- 4) расписанию

### **ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ МАССАЖ БОЛЕЗНЕННОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЯЮТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К**

- 1) подмышечной впадине
- 2) ключице
- 3) грудной клетке
- 4) соску

### **С ЦЕЛЬЮ НОРМАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) углекислые ванны
- 2) седативные препараты
- 3) лечебную гимнастику
- 4) инфракрасную лазеротерапию

### **ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН**

- 1) Пирогову
- 2) Боцману
- 3) Дюцману
- 4) Рошалю

### **ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТКАНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гиперплазия
- 2) реституция
- 3) регенерация
- 4) гипертрофия

### **ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) гематурией, глюкозурией, цилиндрурией
- 2) гематурией, протеинурией, цилиндрурией
- 3) лейкоцитурией, протеинурией, бактериурией
- 4) лейкоцитурией, протеинурией, цилиндрурией

**ДЛЯ УГРОЖАЮЩЕГО РАЗРЫВА МАТКИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) затрудненное мочеиспускание
- 2) бурная родовая деятельность
- 3) слабость родовой деятельности
- 4) признак Вастена отрицательный

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЭМБОЛИЮ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ РЕКОМЕНДОВАНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА ПУТЕМ УСТАНОВКИ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ ВНУТРИВЕННЫХ КАТЕТЕРОВ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 3

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ И МАТКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫХ ВАНН С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ \_\_\_\_ Г/Л**

- 1) 20-40
- 2) 10-15
- 3) 60-80
- 4) 100-120

**ЖЕНЩИНАМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДМЫВАТЬСЯ \_\_\_\_ РАЗ(А) В ДЕНЬ**

- 1) 6-7
- 2) 8-9
- 3) 4-5
- 4) 2-3

**ПАЦИЕНТ, НУЖДАЮЩИЙСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ, УБОРКЕ ДОМА, ПОХОДЕ В МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В \_\_\_\_ БАЛЛ(А)**

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

**СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В ЩЕЛОЧНУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) алкалоз
- 2) ацидоз
- 3) пиноцитоз
- 4) гемостаз

**НЕОПРЕДЕЛЯЕМЫМ НАЗЫВАЕТСЯ УРОВЕНЬ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ ВИЧ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ КОПИЙ/МЛ**

- 1) 50
- 2) 80
- 3) 350
- 4) 380

**ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН СТИМУЛИРУЕТ СЕКРЕЦИЮ**

- 1) эстрогенов
- 2) прогестерона
- 3) эстриола
- 4) андрогенов

**ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА**

- 1) маммолога
- 2) эндокринолога
- 3) физиотерапевта
- 4) онколога

**К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ ОТ**

- 1) поступления пациента в медицинскую организацию до начала операции
- 2) поступления пациента в приемный покой до времени оформления ее в палату
- 3) вызова бригады скорой медицинской помощи до начала операции
- 4) назначения лабораторного обследования до начала операции

**ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ПЛАЗМА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ %**

- 1) 50-54
- 2) 55-60
- 3) 66-70
- 4) 61-65

**К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ**

- 1) сухой кашель, одышку
- 2) снижение памяти, запоры
- 3) отеки, боли в пояснице
- 4) жажду, кожный зуд

**БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО И БЕСПЛАТНО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАЦИЕНТУ \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ**

- 1) экстренная
- 2) плановая
- 3) стационарная
- 4) амбулаторная

**ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) укорочение конечности

- 2) патологическая подвижность
- 3) гемартроз
- 4) деформация

**РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) средним
- 2) большим
- 3) малым
- 4) лапароскопическим

**МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А**

- 1) контактный
- 2) воздушно-капельный
- 3) фекально-оральный
- 4) трансмиссивный

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА**

- 1) предстерилизационную очистку
- 2) стерилизацию
- 3) последующее хранение
- 4) утилизацию

**ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) термометр
- 2) гигрометр
- 3) анемометр
- 4) барометр

**ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- 1) многоводием
- 2) рвотой беременных
- 3) преэклампсией
- 4) тошнотой

**ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ**

- 1) опиоидные анальгетики
- 2) утеротонизирующие средства
- 3) антигипертензивные средства
- 4) неопиоидные анальгетики

**ВОЗРАСТ ЖЕНЩИН, ПРИ КОТОРОМ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОСОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 35-45
- 2) 20-25
- 3) 15-18
- 4) 25-35

**ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ОТСРОЧЕННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУПОВИНЫ У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ЗАПАС**

- 1) антител
- 2) железа
- 3) кальция
- 4) гликогена

**СНИЖЕНИЕ СОСУДИСТОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ К \_\_\_\_\_ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

- 1) повышению диастолического
- 2) снижению диастолического
- 3) повышению систолического
- 4) снижению систолического

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ**

- 1) инфекции
- 2) плоскостопия
- 3) близорукости
- 4) кариеса

**АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наружное кровотечение
- 2) нарушение целостности кожи
- 3) патологическая подвижность
- 4) местное повышение температуры

**ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) викасол
- 2) сальбутамол
- 3) дицинон
- 4) мизопростол

**РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ ДО \_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 35
- 2) 30
- 3) 45
- 4) 40

**ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ, ЧАЩЕ РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НА ФОНЕ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ \_\_\_\_\_ БРОНХИТА**

- 1) обструктивного
- 2) хронического
- 3) острого
- 4) рецидивирующего

**ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфильтративная
- 2) инфильтративно-гнойная
- 3) абсцедирующая
- 4) флегмонозная

**ПРИ ХИМИЧЕСКОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) контрольно-измерительные приборы
- 2) химические индикаторы
- 3) результаты лабораторных исследований
- 4) биологические индикаторы

**ПРИМЕНЯТЬ БИМАНУАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ**

- 1) противопоказано
- 2) рекомендовано
- 3) не рекомендовано
- 4) обязательно

**ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ(И) БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 37-39
- 2) 33-34
- 3) 39-40
- 4) 30-32

**ДЛИНА ВОЛНЫ 810–1200 НМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЕ**

- 1) коротковолновое ультрафиолетовое
- 2) длинноволновое ультрафиолетовое
- 3) инфракрасное
- 4) красное

**ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ АНТИСЕПТИКИ В ХИРУРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Пастер Луи
- 2) Дьяконов П.И.
- 3) Пирогов Н.И.
- 4) Листер Дж.

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) платифиллина гидротартрат
- 2) метацин
- 3) атропина сульфат
- 4) прозерин

### **КОНТАКТНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) рака шейки матки
- 2) нормальной беременности
- 3) нормальной менопаузы
- 4) апоплексии яичника

### **ДЕЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ**

- 1) оболочек плодного яйца
- 2) контракционного кольца
- 3) пояса соприкосновения
- 4) предлежащей пуповины

### **БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ**

- 1) от медицинских работников женской консультации
- 2) от знакомых
- 3) из интернет-ресурсов
- 4) из литературных источников

### **ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- 1) рождением последа
- 2) рождением плода
- 3) сокращением матки
- 4) излитием околоплодных вод

### **ВАРИАНТОМ НЕОСЛОЖНЁННОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В ПЕРВЫЕ СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) субфебрильная температура
- 2) тромбоз нижних конечностей
- 3) парез кишечника
- 4) острое кровотечение

### **СЛОЙ ЭНДОМЕТРИЯ, КОТОРЫЙ НЕ ОТТОРГАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) базальный
- 2) висцеральный
- 3) корковый
- 4) ворсинчатый

**СРЕДНЕТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА  
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 150-500
- 2) 50-100
- 3) 550-700
- 4) 750-1000

**НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И  
ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эпидуральная анестезия
- 2) физиопсихопрофилактика
- 3) спазмолитики
- 4) психотропные средства

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПОСЛЕРОДОВЫЙ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ**

- 1) дистресс
- 2) спазм
- 3) шок
- 4) паралич

**БАРТОЛИНОВЫ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В**

- 1) слизистой оболочке шейки матки
- 2) толще малых половых губ
- 3) толще больших половых губ
- 4) слизистой оболочке влагалища

**ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ \_\_\_\_\_ СЕКУНД**

- 1) 30-35
- 2) 10-15
- 3) 15-20
- 4) 25-30

**ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ СТРЕМИТЕЛЬНОГО  
ИЗЛИТИЯ ВОД ПРИ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) продольном положении
- 2) лицевом вставлении
- 3) переднеголовном вставлении
- 4) поперечном положении

**ОБРАБОТКУ ГЛАЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ**

- 1) гонобленнореи
- 2) ксерофтальмии

- 3) пиогенной инфекции
- 4) вирусного конъюнктивита

### **ПОД АНУРИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) нормальное количество мочи
- 2) отсутствие мочи
- 3) большое количество мочи
- 4) малое количество мочи

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС - СИНДРОМА ПЛОДА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) десмопрессин
- 2) дексаметазон
- 3) детоксин
- 4) дапсон

### **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ**

- 1) флуконазол
- 2) фуросемид
- 3) феррум Лек
- 4) фуразидин

### **ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ СГИБАНИЕ ИЛИ РАЗГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ ТОЧКОЙ**

- 1) ведущей
- 2) отсчета
- 3) проводной
- 4) фиксации

### **К ОРГАНЕЛЛАМ, СЛУЖАЩИМ КАНАЛОМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДНК У БАКТЕРИЙ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) жгутики
- 2) гликокаликс
- 3) ворсинки
- 4) пили

### **К ВНУТРЕННИМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) яичники, маточные трубы, матка, влагалище
- 2) влагалище, матка, мочевого пузыря
- 3) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- 4) матка, яичники, мочевого пузыря, влагалище

### **ПРИ ОСМОТРЕ ПОСЛЕДА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ**

- 1) только оболочек

- 2) краев плаценты
- 3) только долек плаценты
- 4) плаценты и оболочек

**ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ЗАКАЗАТЬ**

- 1) антибиотики
- 2) консультацию терапевта
- 3) изотонический раствор
- 4) свежезамороженную плазму

**ГИАЛУРОНИДАЗА В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) магнитотерапии
- 2) лазеротерапии
- 3) электрофореза
- 4) фонофореза

**ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ЛФК НЕОБХОДИМО \_\_\_\_\_ НАГРУЗКИ**

- 1) введение силовой
- 2) отсутствие динамики
- 3) введение концентрической
- 4) постепенное увеличение

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С МАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ РАННИХ СРОКОВ ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ ПОВТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ БЕТА-ХГЧ В КРОВИ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 36
- 4) 48

**ПЕРВЫЙ УЗ - СКРИНИНГ ПЛОДА ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 15 - 18
- 2) 17 - 20
- 3) 7 - 10
- 4) 11 - 14

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОК С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАЧИНАЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) сахаропонижающих пероральных препаратов
- 2) диетотерапии и физической активности
- 3) пробиотиков
- 4) инсулинотерапии

### **ПЕРЕД СНОМ БЕРЕМЕННОЙ ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ**

- 1) бутерброд с колбасой
- 2) фрукты
- 3) пирожное
- 4) жареный картофель

### **ДИАБЕТ, РАЗВИВШИЙСЯ ПОСЛЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) сахарный диабет 1 типа
- 2) гестационный сахарный диабет
- 3) сахарный диабет промежуточного типа
- 4) сахарный диабет 2 типа

### **ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЗАПОРАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ**

- 1) растительные
- 2) синтетические
- 3) солевые
- 4) осмотические

### **ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ ОБЫЧНО ПРЕДШЕСТВУЕТ**

- 1) длительный подготовительный период
- 2) бурная родовая деятельность
- 3) артериальная гипертензия
- 4) длительный безводный период

### **ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ**

- 1) пересечения пуповины плода
- 2) рождения плечевого пояса
- 3) отделения плаценты
- 4) рождения плода

### **НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЯЮТСЯ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ**

- 1) 6 недель
- 2) 30 дней
- 3) 14 дней
- 4) 12 недель

### **ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ПОСЛЕ РОДОВ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДЫ \_\_\_\_\_ ТЕРАПИИ**

- 1) когнитивно-поведенческой
- 2) антибактериальной
- 3) гормональной
- 4) семейно-системной

**ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ В \_\_\_\_\_ РАЗМЕРЕ ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА ИЗ МАЛОГО ТАЗА**

- 1) поперечном
- 2) правом косом
- 3) прямом
- 4) левом косом

**БЕРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СВОЕГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ \_\_\_\_\_ БЛЮДА**

- 1) отварные
- 2) жареные
- 3) тушеные
- 4) запеченные

**ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РОЖДЕНИЕ ТУЛОВИЩА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МОМЕНТОМ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ В РОДАХ**

- 1) вторым
- 2) третьим
- 3) первым
- 4) четвертым

**НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР 5 БАЛЛОВ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ \_\_\_\_\_ СТЕПЕНИ**

- 1) крайней
- 2) тяжелой
- 3) средней
- 4) легкой

**ПРИ НЕУДАЧЕ ВЛАГАЛИЩНОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ МИНУТ**

- 1) 30
- 2) 90
- 3) 120
- 4) 60

**НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ АДАПТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (ТР) ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТС) ЕВРАЗЭС**

- 1) «о безопасности молока и молочной продукции»
- 2) «пищевая продукция в части ее маркировки»
- 3) «о безопасности мяса и мясной продукции»
- 4) «о безопасности зерна»

**МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЕМ РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ**

\_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ

- 1) 28
- 2) 40
- 3) 37
- 4) 22

**ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ И УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) УФО-терапия
- 2) УВЧ-терапия
- 3) индуктотермия
- 4) гальванизация

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) агалактия
- 2) гиперлактация
- 3) гипогалактия
- 4) мастит

**БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОЛУЧАТЬ ДО НАЧАЛА**

- 1) реабилитационных мероприятий
- 2) хирургического лечения
- 3) противовоспалительной терапии
- 4) антибактериальной терапии

**ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипотензия
- 2) тошнота и рвота
- 3) гипертензия
- 4) упорный запор

**В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ АЭРОБНАЯ НАГРУЗКА \_\_\_\_\_ ИНТЕНСИВНОСТИ**

- 1) средней
- 2) высокой
- 3) низкой
- 4) переменной

**ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР**

- 1) в течение суток
- 2) через несколько часов
- 3) через несколько минут

4) через несколько дней

**У ЖЕНЩИН ТРИХОМОНАДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИНФИЦИРУЮТ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ**

- 1) уретры
- 2) влагалища
- 3) мочевого пузыря
- 4) маточных труб

**ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) температура тела 37 градусов
- 2) возраст до 18 лет
- 3) хронический пиелонефрит
- 4) острый бронхит

**ЕСЛИ НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ МОЖНО РАЗРЕШИТЬ НА \_\_\_\_\_ СУТКИ ПОСЛЕ РОДРАЗРЕШЕНИЯ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ИОНОФОРЕЗ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ОКСИТОЦИНОМ ПОКАЗАН ПРИ**

- 1) трещинах сосков
- 2) гипогалактии
- 3) лактостазе
- 4) гнойном мастите

**ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБА ОТНОСИТСЯ К ПРОБАМ С**

- 1) изменением внешней среды
- 2) уменьшением венозного возврата
- 3) максимальной задержкой дыхания
- 4) дозированной физической нагрузкой

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ**

- 1) 058/У
- 2) 113/У-20
- 3) 111/У-20
- 4) 060/У

**ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) послеродовым
- 2) последовым
- 3) предвестниковым

4) прелиминарным

**ПРИ ЭМБРИОПАТИИ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД**

- 1) поздний неонатальный
- 2) фетогенеза
- 3) органогенеза
- 4) ранний неонатальный

**ДОСТОВЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ СУСТАВА**

- 1) отек мягких тканей
- 2) безболезненность движений
- 3) изменение формы
- 4) патологическая подвижность

**ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие трупных пятен
- 2) появление мышечного окоченения
- 3) снижение температуры тела до температуры окружающей среды
- 4) отсутствие дыхательных движений

**УРОВЕНЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НАМЕЧЕННЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) капаситет
- 2) реабилитационный потенциал
- 3) приспособление
- 4) реабилитационный статус

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ**

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в 3 дня
- 3) 2 раза в неделю
- 4) еженедельно

**НАЧАЛО ЛАКТАЦИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ \_\_\_\_\_ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ**

- 1) покраснением
- 2) уменьшением
- 3) уплотнением
- 4) нагрубанием

**ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 14 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ**

- 1) школьные врачи
- 2) женские консультации

- 3) детские поликлиники
- 4) акушерские стационары

**ПОТЕРЯ 50% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ СООТВЕТСТВУЕТ СТАДИИ ШОКА**

- 1) обратимой
- 2) компенсированной
- 3) необратимой
- 4) декомпенсированной

**ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хориоамнионит
- 2) предлежание плаценты
- 3) многоводие
- 4) истмико-цервикальная недостаточность

**РАСЧЕСЫВАНИЕ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ**

- 1) один раз в три дня
- 2) ежедневно
- 3) не реже одного раза в неделю
- 4) один раз в два дня

**УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ НА \_\_\_\_ БАЛЛА(ОВ)**

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 0

**ВЕРХНЕЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) диастолическим
- 2) систолическим
- 3) пульсовым
- 4) аритмическим

**РОДЫ, НАСТУПИВШИЕ В СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТ 22 ДО 37 НЕДЕЛЬ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) преждевременными
- 2) своевременными
- 3) запоздалыми
- 4) угрожающими

**БЕРЕМЕННЫМ ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ В АВТОМОБИЛЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ \_\_\_\_\_ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1) педиатрический
- 2) инфляционный
- 3) трехточечный
- 4) двухточечный

**БЕСПЛОДИЕ, ПРИ КОТОРОМ В ПРОШЛОМ БЫЛИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОДНАКО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА РЕГУЛЯРНОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАЧАТИЕ БОЛЕЕ НЕ ПРОИСХОДИТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вторичным
- 2) маточным
- 3) первичным
- 4) трубным

**ПРИ ПЕРЕДНЕГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЧЕРЕЗ ПЛОСКОСТИ ТАЗА ГОЛОВКА ПЛОДА ПРОДВИГАЕТСЯ СВОИМ \_\_\_\_\_ РАЗМЕРОМ**

- 1) вертикальным
- 2) средним косым
- 3) прямым
- 4) большим косым

**ОБ УГРОЗЕ ЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) парастезий нижних конечностей
- 2) гиперемии кожных покровов
- 3) иктеричности кожных покровов
- 4) отеков нижних конечностей

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) растительных жиров
- 2) сложных углеводов
- 3) кофеина
- 4) белка

**ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) субфебрилитет
- 2) фебрилитет
- 3) лизис
- 4) кризис

**ФАКТОРОМ РИСКА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ МАТЕРИ СТАРШЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 30
- 2) 25
- 3) 35

4) 20

**СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ Понижением секреторной деятельности молочных желез в период лактации, называется**

- 1) гипогалактией
- 2) гипергалактией
- 3) лактостазом
- 4) лактореей

**Измерение окружности живота в конце нормальной беременности производится**

- 1) на уровне пупка
- 2) на уровне дна матки
- 3) в положении стоя
- 4) в положении лежа на боку

**Плановое родоразрешение у пациенток с вращением плаценты необходимо осуществлять на сроке беременности \_\_\_\_\_ недель(и)**

- 1) 37-39
- 2) 40-42
- 3) 32-34
- 4) 34-36

**Беременным женщинам при путешествии в самолете рекомендуется одевать компрессионный трикотаж на время**

- 1) турбулентности
- 2) взлета
- 3) всего полета
- 4) посадки

**При физическом методе контроля стерилизаторов используют**

- 1) химические индикаторы
- 2) контрольно-измерительные приборы
- 3) результаты лабораторных исследований
- 4) биологические индикаторы

**Для профилактики разрывов промежности и влагалища во время родов можно использовать \_\_\_\_\_ массаж промежности**

- 1) двуручный
- 2) пальцевой
- 3) кистевой
- 4) ладонный

**Групповыми заболеваниями в акушерском стационаре следует считать появление \_\_\_\_\_ внутрибольничных заболеваний в пределах одного**

### **ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 5

### **ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ФУНКЦИЯ**

- 1) выделительная
- 2) питательная
- 3) эндокринная
- 4) метаболическая

### **ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МЕТОД**

- 1) паровой
- 2) газовый
- 3) плазменный
- 4) химический

### **ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ**

- 1) спазмолитиков
- 2) токолитоков
- 3) муколитиков
- 4) бронхолитиков

### **ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПИРТОВОЙ РАСТВОР**

- 1) бриллиантового зеленого
- 2) метиленового синего
- 3) мирамистина
- 4) хлоргексидина

### **ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиповитаминоз
- 2) авитаминоз
- 3) курение
- 4) переохлаждение

### **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ И ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ РЕГУЛЯРНО, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) альгоменореей
- 2) гипоменореей
- 3) олигоменореей

4) гиперменореей

**СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) гемостаз
- 2) ацидоз
- 3) пиноцитоз
- 4) алкалоз

**ПРЯМЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_  
КОНЬЮГАТА**

- 1) истинная
- 2) диагональная
- 3) наружная
- 4) внутренняя

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  
ХРОНИЧЕСКАЯ \_\_\_\_\_ У МАТЕРИ**

- 1) гипотермия
- 2) гипертрофия
- 3) гипотония
- 4) гипертензия

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие отеков
- 2) травма уретры
- 3) недержание мочи
- 4) острая задержка мочеиспускания

**ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ РЕКОМЕНДОВАНА ДИЕТА С ОГРАНИЧЕНИЕМ \_\_\_\_\_ И  
СОЛЕННОЙ ПИЩИ**

- 1) острой
- 2) сладкой
- 3) кислой
- 4) горькой

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ КИШЕЧНИКА ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) запор
- 2) диарея
- 3) метеоризм
- 4) колика

**В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НА КАЖДУЮ ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА АКУШЕРА-  
ГИНЕКОЛОГА ВВОДИТСЯ/ ВВОДЯТСЯ \_\_\_\_\_ ДОЛЖНОСТЬ/ДОЛЖНОСТИ  
АКУШЕРКИ**

- 1) 0,5
- 2) 0,25
- 3) 2
- 4) 1

**ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПРАВОЙ ИЛИ ЛЕВОЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПЛОДА**

- 1) позиция
- 2) членорасположение
- 3) предлежание
- 4) положение

**ТРИСОМИЯ ХРОМОСОМЫ 18 ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА**

- 1) кошачьего крика
- 2) Вольфа-Хиршхорна
- 3) Дауна
- 4) Эдвардса

**САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бессимптомная бактериурия
- 2) перенашивание беременности
- 3) железодефицитная анемия
- 4) тазовое предлежание плода

**БЕРЕМЕННОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ЗАРЯДКУ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ В ДЕНЬ**

- 1) 20-30
- 2) 10-15
- 3) 40-50
- 4) 55-70

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАМКАХ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ**

- 1) фолиевую кислоту
- 2) витамин С
- 3) рыбий жир
- 4) витамин В12

**ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) состояния здоровья новорожденных
- 2) первичной заболеваемости населения
- 3) ранней постановки на учет по беременности
- 4) инвалидности взрослого населения

**ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутренний поворот плечиков
- 2) сгибание головки
- 3) внутренний поворот головки
- 4) разгибание головки

**УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НИЖЕ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) олигогликемия
- 2) полигликемия
- 3) гипогликемия
- 4) гипергликемия

**ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) боль в пояснице, дизурия, лихорадка
- 2) жажда, полиурия, полидипсия
- 3) диспепсия, боль в правом подреберье
- 4) слабость, кожный зуд, артралгии

**ЗДОРОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЙ СО СПОНТАННЫМ ДЫХАНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) 15
- 2) 20
- 3) 10
- 4) 30

**ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ТКАНИ В ДРУГОЙ, РОДСТВЕННЫЙ ЕЙ ВИД, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) регенерация
- 2) организация
- 3) метаплазия
- 4) гиперплазия

**ГЕЛИОТЕРАПИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИН СОСКОВ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ**

- 1) субинволюции матки
- 2) застое молока
- 3) гнойном мастите
- 4) грудном вскармливании

**ДЛЯ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ**

- 1) рассечений промежности
- 2) внутриутробной гипоксии
- 3) недоношенности
- 4) летальности

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) невынашивание беременности
- 2) фибромиома матки
- 3) обильная менструация
- 4) межменструальное кровотечение

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С РАЗРЫВАМИ ПРОМЕЖНОСТИ, В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО МЕТОДА, РЕКОМЕНДОВАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ**

- 1) сульфата магния
- 2) натрия гидрокарбоната
- 3) хлорида натрия
- 4) йодида калия

**ПРОФИЛАКТИКОЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ**

- 1) железодефицитной анемии
- 2) бессимптомной бактериурии
- 3) скрытых отеков
- 4) явных отеков

**СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В КРАФТ-ПАКЕТЫ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 20
- 3) 28
- 4) 40

**МЕРОПРИЯТИЕМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) растирание снегом
- 2) применение согревающего компресса
- 3) смазывание жирным кремом
- 4) наложение теплоизолирующей повязки

**В КАЧЕСТВЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) противовирусной терапии
- 2) антибактериальной терапии
- 3) комбинированных оральных контрацептивов
- 4) внутриматочной терапевтической системы

**ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ («РЕКТАЛЬНЫЙ ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) сальмонеллеза

- 2) дизентерии
- 3) энтеровирусной инфекции
- 4) эшерихиоза

**ВЛАГАЛИЩНЫЕ СВОДЫ ИНФИЛЬТРИРОВАННЫЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ ПРИ**

- 1) субмукозной миоме матки
- 2) острым панкреатите
- 3) пельвиоперитоните
- 4) кишечной непроходимости

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСОБЕННО В ПЕРВЫЕ \_\_\_\_ МЕСЯЦА(ЕВ)**

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 6

**ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В**

- 1) родильном зале
- 2) послеродовом отделении
- 3) детской поликлинике
- 4) выписной комнате

**ДЛЯ АДЕКВАТНОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕПОЛНОГО ВЫКИДЫША РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЕНИЕ \_\_\_\_\_ АНЕСТЕЗИИ**

- 1) инфильтрационной
- 2) внутривенной
- 3) ингаляционной
- 4) эпидуральной

**СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) состоянием здоровья матери и ребенка
- 2) только состоянием здоровья матери
- 3) только состоянием здоровья ребенка
- 4) увеличением массы тела ребенка

**ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ**

- 1) лапароскопическим
- 2) средним
- 3) большим
- 4) малым

**ПЕРИОД ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ**

- 1) 3 недели
- 2) 6 месяцев
- 3) 10 недель
- 4) 4 месяца

**ВОЗБУДИТЕЛИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОХРАНЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В СУХОМ СОСТОЯНИИ ДО \_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

**ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРИОДА РАСКРЫТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) латентной
- 2) активной
- 3) прелиминарной
- 4) транзиторной

**ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КОККИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ВИДЕ ВИНОГРАДНОЙ ГРОЗДИ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИИ**

- 1) дрожжевой
- 2) стрептококковой
- 3) клостридийной
- 4) стафилококковой

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ \_\_\_\_\_ РВОТА**

- 1) чрезмерная
- 2) легкая
- 3) умеренная
- 4) средняя

**ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ КУРС ФИЗИОТЕРАПИИ НА \_\_\_\_\_ ДЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

- 1) 10-14
- 2) 28
- 3) 1
- 4) 5-7

**СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) удушьем
- 2) бронхиальной астмой

- 3) диспноэ
- 4) сердечной астмой

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) медсестрами
- 2) специалистами сервисных служб
- 3) санитарками
- 4) заведующими хозяйственных служб

#### **ЖЕНЩИНАМ С РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТИПОМ КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ ВВОДИТСЯ**

- 1) антирезусный иммуноглобулин
- 2) антибактериальный препарат
- 3) гемостатический препарат
- 4) глюкокортикостероид

#### **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) легочное кровотечение
- 2) головная боль
- 3) слабость
- 4) кашель с мокротой

#### **ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА БЕЗ МЕТАСТАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) септицемия
- 2) пиодермия
- 3) септикопиемия
- 4) анемия

#### **МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ**

- 1) переднетеменном предлежании
- 2) заднем виде затылочного предлежания
- 3) переднем виде затылочного предлежания
- 4) лобном предлежании

#### **БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРАВИЛЬНО И РЕГУЛЯРНО**

- 1) плавать
- 2) питаться
- 3) отдыхать
- 4) гулять

#### **МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ПОДХОДИТ К МАТКЕ НА УРОВНЕ**

- 1) наружного зева
- 2) внутреннего зева
- 3) дна матки
- 4) трубного угла

**ПРИ ТРУДНОСТЯХ С КОРМЛЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ \_\_\_\_\_**

**НАКЛАДКИ**

- 1) компрессионные
- 2) специальные
- 3) ортопедические
- 4) охлаждающие

**СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) йодид калия
- 2) пеликсим
- 3) оксибутират натрия
- 4) этаперазин

**БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ В САМОЛЕТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) сидеть со скрещенными ногами
- 2) ходить по салону
- 3) принимать успокоительные
- 4) пить газированные напитки

**ИСХОДОМ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение количества околоплодных вод
- 2) невозможность родоразрешения через естественные родовые пути
- 3) синдром задержки роста плода
- 4) увеличение числа оперативного родоразрешения

**ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мозговое вещество
- 2) белочная оболочка
- 3) корковое вещество
- 4) кубический эпителий

**СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ**

- 1) безотлагательно
- 2) без ограничения по срокам
- 3) в ближайшие часы
- 4) в ближайшие дни

**НАПОЛНЕНИЕ ГРУДИ МОЛОКОМ ПРОИСХОДИТ НА \_\_\_\_\_ ДЕНЬ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 8-9
- 2) 9-10
- 3) 2-5
- 4) 6-7

**ФАКТОРОМ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ К РАЗВИТИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дефицит массы тела
- 2) наследственность
- 3) очаг хронической инфекции
- 4) гиповитаминоз

**ВЕРОЯТНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ (НЕАДЕКВАТНЫХ) ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИНЫ НА ФИЗИОТЕРАПИЮ ВОЗРАСТАЕТ В ПЕРИОД**

- 1) овуляции
- 2) десквамации
- 3) пролиферации
- 4) менопаузы

**НОШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО БАНДАЖА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ЖАЛОБАХ НА БОЛЬ В**

- 1) голове
- 2) локте
- 3) лобке
- 4) желудке

**НОРМАЛЬНОЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ВЗРОСЛЫХ В ДИАПАЗОНЕ \_\_\_\_\_ ММ. РТ. СТ.**

- 1) 80 - 84
- 2) 90 - 94
- 3) 130 - 139
- 4) 120 - 129

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пневмококк
- 2) микобактерия
- 3) шигелла
- 4) вирус

**К ТИПУ ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ УТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ВЫШЕ ВЕЧЕРНЕЙ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) извращенная
- 2) послабляющая
- 3) перемежающаяся
- 4) атипичная

**ПОД ПОНЯТИЕМ РЕАНИМАТОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАУКУ О(Б)**

- 1) жизнедеятельности человека
- 2) профилактике экстремальных ситуаций
- 3) оживлению организма

4) строении организма

**К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ КИСЛОРОДАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) омепразол
- 2) диакарб
- 3) гипохлорит кальция
- 4) перекись водорода

**ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипоэстрогения
- 2) гиперэстрогения
- 3) гипоандрогения
- 4) гиперандрогения

**АЛЬБУМИН ОТНОСЯТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) ненаркотические анальгетики
- 2) плазмозаменители
- 3) антикоагулянты
- 4) антибиотики

**УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ РОДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) Альфельда
- 2) Гогенбихлера
- 3) Микулича
- 4) Довженко

**ОТНОШЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ПЛОДА К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вид
- 2) предлежание
- 3) положение
- 4) позиция

**ВО II И III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЭТИОТРОПНОМ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ**

- 1) норфлоксацин
- 2) офлоксацин
- 3) меропенем
- 4) цефиксим

**ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) заявление 2 свидетелей
- 2) обменная карта беременной, роженицы и родильницы
- 3) свидетельство о браке

4) свидетельство о рождении ребенка

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ ПАЦИЕНТКУ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ВРАЧУ**

- 1) неврологу
- 2) гематологу
- 3) маммологу
- 4) онкологу

**САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ С ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ОТЁКЕ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вдыхание кислорода через пары спирта
- 2) озонотерапия
- 3) искусственная вентиляция легких (ИВЛ)
- 4) оксигенотерапия

**ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОСТЬ МАТКИ**

- 1) наружным зевом
- 2) внутриматочным отделом
- 3) ампулярным отделом
- 4) внутренним зевом

**ПРИЗНАКОМ ЖИВОРОЖДЕНИЯ У РЕБЕНКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) глотательный рефлекс
- 2) розовая кожа
- 3) самостоятельное дыхание
- 4) сосательный рефлекс

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ИЛИ НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВРАЧОМ**

- 1) терапевтом
- 2) общей практики
- 3) специалистом
- 4) главным

**СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ РЕКОМЕНДОВАНО**

- 1) уточнить положение и предлежание второго плода
- 2) внутривенно ввести метилэргометрин
- 3) выполнить вакуум-экстракцию второго плода
- 4) произвести амниотомию второго плода

**ВИРУС ГЕПАТИТА D МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИНФЕКЦИЮ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА**

- 1) В
- 2) С
- 3) А
- 4) Е

**КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ЛИХОРАДКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ**

- 1) легочного кровотечения
- 2) острой дыхательной недостаточности
- 3) коллапса
- 4) острой коронарной недостаточности

**ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гальванизация
- 2) кавитация
- 3) индуктотермия
- 4) пеллоидотерапия

**НАЗНАЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ПОСЛЕ РОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛАКТАЦИИ ВОЗМОЖНО НЕ РАНЕЕ \_\_\_\_\_ ДНЯ**

- 1) 21
- 2) 15
- 3) 18
- 4) 10

**РОДИЛЬНИЦ С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В \_\_\_\_\_ ОТДЕЛЕНИЕ**

- 1) обсервационное
- 2) физиологическое
- 3) гинекологическое
- 4) инфекционное

**ИССЛЕДОВАНИЕМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК КРОВОТЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) осмотр шейки матки в зеркалах
- 2) бимануальное влагалищное исследование
- 3) микроскопия влагалищных мазков
- 4) трансвагинальное ультразвуковое исследование

**К ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРАМ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ИНДИКАТОРЫ \_\_ КЛАССА**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) не более одного часа
- 2) от нескольких минут до нескольких часов
- 3) от нескольких минут до нескольких дней
- 4) не более одного дня

### **ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЖИДКОСТИ КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) ограничить объем до 1-1,5 литров в сутки
- 2) пить сколько хочется
- 3) увеличить объем до 2-2,5 литров в сутки
- 4) строго придерживаться норм

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) галакторея
- 2) мастопатия
- 3) инволюция
- 4) лактостаз

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рвота
- 2) эвентрация кишечника
- 3) бронхопневмония
- 4) лигатурный свищ

### **ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

- 1) гематолога
- 2) эндокринолога
- 3) нефролога
- 4) кардиолога

### **ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА РЕКОМЕНДОВАНО РОДРАЗРЕШЕНИЕ ПУТЕМ**

- 1) наложения акушерских щипцов
- 2) классического акушерского пособия
- 3) применения вакуум-экстракции
- 4) операции кесарево сечение

### **ПОДНЯТИЕ ДНА МАТКИ ВЫШЕ ПУПКА И ОТКЛОНЕНИЕ ВПРАВО В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) Малиновского
- 2) Клейна
- 3) Альфельда

4) Шредера

**ПРИ ЛОБНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ВЕДУЩЕЙ ТОЧКОЙ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) малый родничок
- 2) подбородок
- 3) надбровье
- 4) большой родничок

**ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЪЮГАТЫ НЕОБХОДИМО \_\_\_\_\_  
КОНЪЮГАТЕ(Ы)**

- 1) отнять 1,5-2 см от диагональной
- 2) отнять 1,5-2 см от наружной
- 3) прибавить 1,5-2 см к диагональной
- 4) прибавить 1,5-2 см к наружной

**ПЕРИОД ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ**

- 1) 6 месяцев
- 2) 10 недель
- 3) 3 недели
- 4) 3 месяца

**ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ НАРУШЕН СИНТЕЗ \_\_\_\_\_ БЕЛКА**

- 1) гистонового
- 2) фибриллярного
- 3) трансмембранного
- 4) ферментативного

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БАРБИТУРАТАМИ СТАДИЯ «ЗАСЫПАНИЯ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) отсутствием рефлексов
- 2) угнетением дыхания
- 3) потерей сознания
- 4) снижением реакций

**СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ ПРИ**

- 1) образовании пояса прилегания
- 2) раскрытии маточного зева до 8 см
- 3) раскрытии маточного зева до 3 см
- 4) появлению схваток потужного характера

**БЕРЕМЕННАЯ ИНФОРМИРУЕТСЯ ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РОДРАЗРЕШЕНИЕ С ОТМЕТКОЙ В \_\_\_\_\_ КАРТЕ БЕРЕМЕННОЙ, РОЖЕНИЦЫ И РОДИЛЬНИЦЫ**

- 1) индивидуальной

- 2) обменной
- 3) идентификационной
- 4) личной

**СУБФЕБРИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_°С**

- 1) 39,1 - 40,0
- 2) 37,1 - 38,0
- 3) 36,1 - 37,0
- 4) 38,1 - 39,0

**К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) назначение лечения
- 2) профилактика осложнений
- 3) беседы с пациенткой
- 4) общение с родственниками

**ПАЦИЕНТАМ С ОЖОГАМИ БОЛЕЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ В \_\_\_\_\_ ПОРЯДКЕ**

- 1) экстренном
- 2) плановом
- 3) отсроченном
- 4) диагностическом

**ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ**

- 1) антифомсилан
- 2) фенилэфрин
- 3) нашатырный спирт
- 4) азаметония бромид

**ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ МАССАЖ БОЛЕЗНЕННОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СОСКУ ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО \_\_\_\_\_ ГРУДЬ**

- 1) разминать
- 2) сдавливать
- 3) дренировать
- 4) стимулировать

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперхолестеринемия
- 2) переохлаждение
- 3) гиповитаминоз
- 4) гипербилирубинемия

**ПРИ ТРУДНОСТЯХ С КОРМЛЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) молокоотсос
- 2) бутылочки с соской
- 3) пустышки
- 4) искусственную смесь

#### **МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) введение спермы в полость матки
- 2) стимуляция овуляции и сперматогенеза
- 3) проведение манипуляций с зародышевым материалом
- 4) перенос оплодотворенных яйцеклеток в полость матки

#### **ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ОТ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ В \_\_\_\_\_ ТРИМЕСТРЕ**

- 1) 1 и 3
- 2) любом
- 3) 1 и 2
- 4) 2 и 3

#### **ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) установления диагноза
- 2) окончания операции
- 3) перевода пациента из операционной
- 4) начала операции

#### **ВСЕМ ПАЦИЕНТКАМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЭМБОЛИЮ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ РЕКОМЕНДОВАНА \_\_\_\_\_ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ**

- 1) катетеризация
- 2) нейростимуляция
- 3) инстилляция
- 4) нейромодуляция

#### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСТИННОЙ КОНЪЮГАТЫ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУЖНОЙ КОНЪЮГАТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) индекс Соловьева
- 2) размер Франка
- 3) диагональную конъюгату
- 4) межкостистую дистанцию

#### **ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ**

- 1) антибактериальных препаратов
- 2) эпинефрина
- 3) антигистаминных препаратов
- 4) сальбутамола

#### **СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

**СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 220
- 2) 280
- 3) 250
- 4) 300

**СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ И УПАКОВАННЫХ В ПАКЕТЫ ИЗ ПЕРГАМЕНТА, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СУТОК**

- 1) 28
- 2) 14
- 3) 20
- 4) 40

**ПОД АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОНИМАЮТ СИНДРОМ ПОВЫШЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО АД БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ММ.РТ.СТ.**

- 1) 139
- 2) 129
- 3) 149
- 4) 99

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ, В РОДАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) аудиоаналгезию
- 2) эпидуральную анестезию
- 3) акупрессуру
- 4) акупунктуру

**САМЫМ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕПАТИТА В У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая печёночная недостаточность
- 2) хроническая почечная недостаточность
- 3) гемоглинурийная лихорадка
- 4) острая надпочечниковая недостаточность

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, НАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ(ОЕ)**

- 1) услуга
- 2) помощь
- 3) профилактика
- 4) вмешательство

**ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ФАЗЕ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертонический раствор
- 2) гипотонический раствор
- 3) цельная кровь

4) свежемороженая плазма

**ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИТОМ ОПТИМАЛЬНО ПРОВОДИТЬ**

- 1) с интервалом 3 дня
- 2) с интервалом 1 день
- 3) ежедневно
- 4) еженедельно

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БОЛЬНЫХ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) 2 недели
- 2) 7 дней
- 3) 10 дней
- 4) день

**ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) гипохромная
- 2) гиперхромная
- 3) нормохромная
- 4) гемолитическая

**СИНДРОМОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕЗАПНОЙ ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ, УТРАТОЙ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА И ПАДЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обморок
- 2) кома
- 3) коллапс
- 4) эпилепсия

**ПРИОРИТЕТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) беспокойство за оставленную работу
- 2) дефицит самоухода
- 3) чувство страха
- 4) недооценка тяжести своего состояния

**К НАРУЖНОМУ СЛОЮ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ**

- 1) лобково-копчиковые
- 2) седалищно-пещеристые
- 3) седалищно-копчиковые
- 4) подвздошно-копчиковые

**РАДИАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ СВЯЗАНЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ**

## **\_\_\_\_\_ ИЗЛУЧЕНИЯ**

- 1) радиочастотного
- 2) ультрафиолетового
- 3) ионизирующего
- 4) инфракрасного

## **У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) метформин
- 2) седуксен
- 3) флуоксетин
- 4) динитрофенол

## **МАТКА КУВЕЛЕРА ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ \_\_\_\_\_ МАТКИ**

- 1) ампутации
- 2) иммобилизации
- 3) экстирпации
- 4) эмболизации

## **ПАЦИЕНТАМ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ДИЕТЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ В РАЦИОНЕ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ**

- 1) насыщенными жирными кислотами
- 2) полиненасыщенными жирными кислотами
- 3) простыми углеводами
- 4) холестерином

## **ПУЛЬСОКСИМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ**

- 1) артериального давления
- 2) температуры тела
- 3) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- 4) оксигенации и пульса

## **ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДЫВАНИЯ РЕБЕНКА К ГРУДИ СЦЕЖИВАТЬ МОЛОКО СЛЕДУЕТ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА(ОВ)**

- 1) 3,5-4
- 2) 2,5-3
- 3) 4,5-5
- 4) 1-1,5

## **ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) магния сульфат
- 2) калия хлорид
- 3) декстран
- 4) липофундин

**ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ И ПАРИЕТАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сальпингит
- 2) параметрит
- 3) пельвиоперитонит
- 4) разлитой перитонит

**ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ПЛОДА, ПРИ КОТОРОМ СТРЕЛОВИДНЫЙ ШОВ ОТКЛОНЕН ОТ СРЕДИННОЙ ЛИНИИ ТАЗА К ЛОНУ ИЛИ К КРЕСТЦУ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) синклитизм
- 2) асинклитизм
- 3) сгибание
- 4) разгибание

**ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НАЗНАЧАТЬ**

- 1) невролог
- 2) уролог
- 3) гинеколог
- 4) сексолог

**ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) лапароскопических исследований
- 2) заживления послеоперационных ран
- 3) раздельного диагностического выскабливания
- 4) консервативного удаления миом

**ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) анатоксины
- 2) антибиотики
- 3) иммуноглобулины
- 4) сыворотки

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) опухоль яичников
- 2) острый гнойный сальпингоофорит
- 3) хронический сальпингоофорит
- 4) маточное кровотечение

**К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ**

- 1) пузырно-маточные
- 2) кардинальные
- 3) крестцово-маточные

4) круглые

**ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕНЫ**

- 1) коленного сгиба
- 2) кисти
- 3) локтевого сгиба
- 4) стопы

**К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ НАТОЩАК ОТНОСЯТ \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 2,2 - 3,3
- 2) 3,3 - 5,5
- 3) 6,6 - 8,8
- 4) 1,1 - 2,2

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ КОНЪЮГАТОЙ**

- 1) наружной
- 2) анатомической
- 3) истинной
- 4) диагональной

**ЖЕНСКИЙ ТАЗ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ**

- 1) подвздошной, седалищной и лобковой
- 2) двух тазовых, крестца и копчика
- 3) двух лобковых и двух подвздошных
- 4) двух лобковых и двух седалищных

**ЕСТЕСТВЕННАЯ МЕНОПАУЗА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ АМЕНОРЕИ**

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 10

**ОЖОГ IV СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) поверхностным повреждением эпидермиса
- 2) отслойкой эпидермиса в виде пузырей
- 3) некрозом кожи и подкожной клетчатки
- 4) образованием влажного струпа в виде толстостенных пузырей

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) самостоятельное дыхание
- 2) гиперемия кожи
- 3) наличие сосательного рефлекса

4) гримаса при раздражении

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СУДОРОГ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) преднизолон
- 2) магния сульфат
- 3) атропина сульфат
- 4) реланиум

**ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ ГОРМОНА**

- 1) инсулина
- 2) пролактина
- 3) тиреотропного
- 4) глюкагона

**ПРИГОДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОНКОЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЦИЕНТКИ, В СЛУЧАЕ ЕЕ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 14 дней
- 2) 21 день
- 3) 3 месяца
- 4) 6 месяцев

**НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ**

- 1) излитие околоплодных вод
- 2) отхождение слизистой пробки
- 3) прижатие головки ко входу в малый таз
- 4) появление регулярных схваток

**ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ ПРОВОДЯТ С СУХОЙ ДЕКСТРОЗОЙ В КОЛИЧЕСТВЕ \_\_\_\_\_ ГРАММ**

- 1) 75
- 2) 15
- 3) 50
- 4) 25

**ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЧА ИМЕЕТ ЦВЕТ**

- 1) \"пива\"
- 2) \"мясных помоев\"
- 3) бесцветный
- 4) соломенно-желтый

**ОЖОГ I СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) поверхностным повреждением эпидермиса
- 2) отслойкой эпидермиса в виде пузырей

- 3) омертвением всех слоев кожи
- 4) некрозом кожи и подкожной клетчатки

**СИМПТОМ ПОКОЛАЧИВАНИЯ ПО ПОЯСНИЦЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ**

- 1) печени
- 2) легких
- 3) почек
- 4) сердца

**РОДИЛЬНИЦЕ В ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ \_\_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 7-8
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 3-4

**ДЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРНЫ \_\_\_\_\_ СЛУЧАИ**

- 1) сомнительные
- 2) спорадические
- 3) единичные
- 4) повторные

**ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ ЧИСТО ЯГОДИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД**

- 1) Кюстнера-Чукалова
- 2) Уилта-Иванова
- 3) Креде-Лазаревича
- 4) Морисо-Вайта

**РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В**

- 1) обычной одежде и сменной обуви
- 2) обычной одежде и обуви
- 3) сменной одежде и бахилах
- 4) сменной одежде и обуви

**РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уменьшение массы тела
- 2) изменение цвета мочи
- 3) увеличение суточного диуреза
- 4) уменьшение суточного диуреза

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПАЦИЕНТА**

- 1) денежное вознаграждение

- 2) письменное согласие
- 3) карту больного
- 4) словесную благодарность

#### **ЧЕТВЕРТЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сгибание головки
- 2) разгибание головки
- 3) внутренний поворот головки
- 4) внутренний поворот плечиков, наружный поворот головки

#### **У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНА СОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ**

- 1) магниезией
- 2) бета-адреномиметиками
- 3) прогестероном
- 4) метацином

#### **К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСЯТ**

- 1) золотистый стафилококк
- 2) бета-гемолитический стрептококк
- 3) риккетсии
- 4) вирусы

#### **ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ПАЦИЕНТАМ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ**

- 1) удалить содержимое желудка через зонд
- 2) отложить операцию на сутки
- 3) вызвать рвоту
- 4) назначить слабительное

#### **ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЛНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ И КРОВОТЕЧЕНИИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) прикладыванию пузыря со льдом на область матки и наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом
- 2) наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом роженицы, подготовке набора первой помощи при кровотечении, подготовке женщины к экстренной операции «кесарево сечение»
- 3) выдаче дицинона и прикладывании пузыря со льдом на область матки
- 4) выдаче дицинона и наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом

#### **ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) контактно-бытовой
- 2) водный

- 3) фекально-оральный
- 4) парентеральный

**ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)**

- 1) 2,9
- 2) 26,0
- 3) 3,6
- 4) 3,1

**К АНОМАЛИЯМ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРЫХ ЯВИЛИСЬ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ**

- 1) транслокационные формы хромосомных синдромов
- 2) синдромы Дауна и Эдвардса
- 3) полидактилия и синдактилия
- 4) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера

**ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА МОКРОТА**

- 1) стекловидная
- 2) слизистая
- 3) розовая пенистая
- 4) "ржавая"

**ПОД ТЕРМИНОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) симптом
- 2) клинический симптомокомплекс
- 3) хроническая патология
- 4) заболевание

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АНТИТЕЛ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) микроскопию толстой капли крови
- 2) реакцию Райта и Хеддельсона
- 3) бактериологический посев крови
- 4) иммунный блоттинг

**ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) исправления положения плода
- 2) сохранения членорасположения плода
- 3) профилактики кровотечения
- 4) родостимуляции

**К ОСНОВНОМУ ВОЗБУДИТЕЛЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) пневмококк
- 2) микобактерию

- 3) вирус
- 4) кишечную палочку

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) ростомер
- 2) тонометр
- 3) урометр
- 4) динамометр

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РВОТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) атропина сульфат
- 2) дифенгидрамин (димедрол)
- 3) скополамин
- 4) метоклопромид гидрохлорид (церукал)

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИЙОХИНОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхит
- 2) трахеит
- 3) тонзиллит
- 4) сифилис

**УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЗЯТЫЙ ИЗ ПАЛЬЦА НАТОЩАК У БЕРЕМЕННЫХ В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР, В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) менее 3,3
- 2) более 8,1
- 3) менее 6,3
- 4) более 6,6

**ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) гонадотропины
- 2) миорелаксанты
- 3) иммунодепрессанты
- 4) антиагреганты

**ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПАРАНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) декстран (реополиглюкин)
- 2) менадиона натрия бисульфит (викасол)
- 3) липофундин
- 4) диклофенак натрия

**АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕЗУС РАСПОЛОЖЕНЫ НА**

- 1) тромбоцитах
- 2) лейкоцитах
- 3) белках
- 4) эритроцитах

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

- 1) с 7-го по 20-й
- 2) с 10-го по 30-й
- 3) с 5-го по 15-й
- 4) с 7-го по 28-й

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) гиперемированные
- 2) желтушные
- 3) бледные
- 4) цианотичные

**БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) запрет аборт
- 2) свободная продажа хирургических инструментов
- 3) наличие квалифицированных медицинских кадров
- 4) информационная пропаганда абортов

**ПЕРЕДОЗИРОВКА МАГНИЯ СУЛЬФАТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) дыхательной и сердечной недостаточности
- 2) запоров
- 3) отеков голеней
- 4) рвоты

**ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ДНЯХ**

- 1) 8-10
- 2) 4-5
- 3) 2-3
- 4) 6-8

**ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ**

- 1) крови и плазмы
- 2) количество крови и массы тела
- 3) различных видов клеток крови
- 4) различных видов лейкоцитов

**ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗГИБАНИЕ ИЛИ СГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) проводной
- 2) точкой фиксации
- 3) точкой отсчета
- 4) ведущей

**ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ**

**ПОМОЩИ ПРИ БЮДЖЕТНО-СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) медицинская карта стационарного больного
- 2) паспорт
- 3) страховой полис
- 4) медицинская карта амбулаторного больного

**ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) оксибутират натрия
- 2) оксипрогестерона капронат
- 3) профази
- 4) прогестерон

**БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ НА ДВА ГЛАВНЫХ БРОНХА ПРОИСХОДИТ НА УРОВНЕ ПОЗВОНКОВ**

- 1) 6-7 грудных
- 2) 7 шейного - 1 грудного
- 3) 4-5 грудных
- 4) 2-3 грудных

**ГИДРОХЛОРОТИАЗИД (ГИПОТИАЗИД) СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ**

- 1) утром с препаратами калия
- 2) вечером с препаратами калия
- 3) утром
- 4) вечером

**УКОРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) кишечной непроходимости
- 2) миомы матки
- 3) острого холецистита
- 4) внутрибрюшного кровотечения

**РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) консультирование по санаторно-курортному лечению
- 2) использование современных методов контрацепции
- 3) консультирование по лечебной гимнастике
- 4) консультирование по физиотерапии

**СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1:2
- 2) 2:1
- 3) 2:4
- 4) 3:1

**К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- 1) бактериальную и вирусную инфекцию
- 2) курение
- 3) гиповитаминоз
- 4) переохлаждение

#### **ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ**

- 1) полулунным
- 2) четырехстворчатым
- 3) двустворчатым (митральным)
- 4) трехстворчатым

#### **НАРУЖНЫЙ ЗЕВ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ ФОРМУ**

- 1) серповидную
- 2) щелевидную
- 3) точечную
- 4) т-образную

#### **ПРИ РАХИТЕ НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН**

- 1) кальция, фосфора
- 2) калия, магния
- 3) калия, железа
- 4) кальция, железа

#### **ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертонус мышц - сгибателей
- 2) мышечная гипотония
- 3) тремор конечностей
- 4) гипертонус мышц - разгибателей

#### **ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- 1) состояние прямой кишки
- 2) степень развитости мышц брюшного пресса
- 3) состояние внутренних половых органов и связочного аппарата
- 4) состояние лимфоузлов

#### **ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) преждевременные роды
- 2) выкидыш и бесплодие
- 3) эрозия шейки матки
- 4) эктопия шейки матки

#### **СРЕДНИЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 13,5
- 2) 9,5

3) 10

4) 12

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) закупорка общего желчного протока желчными камнями
- 2) закупорка общего желчного протока лямблиями
- 3) вирусный гепатит
- 4) гемолитическая болезнь новорожденных

### **К ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) прекращение контакта с аллергеном
- 2) устранение гиподинамии
- 3) отказ от алкоголя
- 4) сбалансированное питание

### **НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ванкомицин
- 2) гентамицин
- 3) тетрациклин
- 4) амоксициллин

### **К ОСЛОЖНЕНИЯМ КИСТ ЯИЧНИКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) малигнизация кист
- 2) рост кисты до больших размеров
- 3) перекрут ножки с разрывом капсулы
- 4) ущемление соседних органов

### **ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕШЕНСТВА НАИБОЛЕЕ ДЛИННЫЙ ПРИ УКУСЕ В ОБЛАСТИ**

- 1) шеи
- 2) промежности
- 3) лица
- 4) голени

### **ПОД ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ**

- 1) изменение взаимоотношений в паре
- 2) нарушение социальной адаптации
- 3) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма
- 4) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем

## **НА ФОНЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ**

- 1) 2 раза в сутки
- 2) до и после введения раствора магния сульфата
- 3) 4 раза в сутки
- 4) 3 раза в сутки

## **РЕЛАКСАЦИЯ МАТКИ БЫСТРО ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) метронидазола
- 2) дифенгидрамина (димедрола)
- 3) энфлурана
- 4) гидрхлорогиазида (гипотиазида)

## **ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) установления диагноза
- 2) поступления в стационар
- 3) начала заболевания
- 4) начала подготовки к операции

## **ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) продукты с малым содержанием клетчатки
- 2) ограничение поваренной соли
- 3) продукты, богатые клетчаткой
- 4) ограничение жидкости

## **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) ввести наркотический анальгетик
- 2) наложить повязку с ихтиоловой мазью
- 3) наложить сухую стерильную повязку
- 4) снять несколько швов, дренировать рану

## **К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ОТНОСЯТ**

- 1) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- 2) приступ удушья, брадикардия
- 3) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- 4) лихорадка, рвота

## **ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) позицию и вид плода
- 2) вставление головки
- 3) предлежащую часть
- 4) высоту стояния дна матки

## **КРИОДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) большим гинекологическим операциям
- 2) малым гинекологическим операциям
- 3) средним гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

**ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 7

**РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ О**

- 1) безопасном аборте
- 2) беспорядочных половых связях
- 3) профессиональных вредностях
- 4) психологическом аспекте аборт

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ НЕДОКОРМА У НОВОРОЖДЕННОГО СЛЕДУЕТ**

- 1) провести контрольное кормление
- 2) докармливать кашей
- 3) допаивать кипяченой водой
- 4) ввести прикорм

**ПРИЗНАКОМ ПРЕДВЕСТНИКОВ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отхождение вод
- 2) структурное изменение шейки матки
- 3) редкие схватки
- 4) кровотечение

**ПРИЗНАКОМ ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) подъем сегмента ST
- 2) Q патологический
- 3) высокий остроконечный T
- 4) T в грудных отведениях

**ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) ввести анальгетики
- 2) приготовить теплую грелку
- 3) вызвать лаборанта
- 4) дать слабительное

**КОНТРОЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1) количества прикорма
- 2) усвоения пищи

- 3) массы тела
- 4) количества высосанного молока из груди матери

### **ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) соматическое здоровье
- 2) социально-экономический уровень жизни
- 3) генетические заболевания
- 4) аномалии полового развития

### **К СТАДИЯМ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ СТАДИИ**

- 1) прилива, красного и серого опеченения, разрешения
- 2) подъема, стояния температуры, кризиса
- 3) легочных и внелегочных проявлений
- 4) начальная, развернутых клинических проявлений, стадия осложнений

### **ДИАПАЗОН МЕЖДУ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ПЛАЗМЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) толерантностью
- 2) периодом полувыведения
- 3) шириной терапевтического действия
- 4) тахифилаксией

### **ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) малый объем
- 2) плохое кровоснабжение
- 3) плохое развитие кардиального сфинктера
- 4) вертикальное положение

### **РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) консультирование по методам лечебной гимнастике
- 2) консультирование по санаторно-курортному лечению
- 3) работу с женщинами группы риска по предупреждению нежелательной беременности
- 4) консультирование по методам физиотерапии

### **ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ЧУМНОГО БУБОНА**

- 1) безболезненный, мягкий
- 2) плотной консистенции, болезненный, периаденит
- 3) безболезненный, размер до 1 см
- 4) поражаются только заднешейные лимфатические узлы

### **К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ**

- 1) стрессы
- 2) нерациональное питание
- 3) гиподинамия
- 4) очаг хронической инфекции

### **МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О**

- 1) формах человеческого сознания
- 2) морали поведения
- 3) внутреннем духовном мире человека
- 4) профессиональном долге медицинских работников

### **РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО**

- 1) санаторно-курортному лечению
- 2) методам контрацепции
- 3) лечебной гимнастике
- 4) физиотерапии

### **ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЗНАЧАЮТ ДО**

- 1) нормализации температуры тела
- 2) исчезновения боли в поясничной области
- 3) исчезновения отеков и нормализации артериального давления
- 4) нормализации анализов мочи

### **ПРИЗНАКОМ ПЕРЕНОШЕННОСТИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) масса тела 4000 г
- 2) гидроцефалия плода
- 3) широкие швы и роднички
- 4) мацерация кожи стоп и ладоней

### **ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОТЕКОВ, ГЕМАТУРИИ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) цистита
- 2) гломерулонефрита
- 3) нефроптоза
- 4) пиелонефрита

### **К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) метациклин (рондамицин)
- 2) рифампицин
- 3) азитромицин (сумамед)
- 4) парацетамол

### **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЧИСТЫХ ГЕСТАГЕНОВ ОСНОВАН НА**

- 1) понижении вязкости цервикальной слизи
- 2) вычислении опасного периода
- 3) спермицидном эффекте

4) супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию

**ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕВОЧЕК, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ**

- 1) № 353
- 2) № 514н
- 3) № 928
- 4) № 689н

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СЕРДЦА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) отсутствие подготовки
- 2) накануне легкий ужин
- 3) постановку очистительной клизмы
- 4) разъяснение сущности исследования пациентке

**ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10,5
- 2) 11
- 3) 12
- 4) 13

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 13
- 2) 9
- 3) 12,5
- 4) 11

**МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТ ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 1 часа
- 2) 2 часов
- 3) 1 суток
- 4) 2 суток

**ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

- 1) Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 2) Федеральный закон РФ «О медицинском страховании граждан»
- 3) Федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»
- 4) Трудовой кодекс РФ

**ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) расширение коронарных артерий
- 2) гипертермия
- 3) головная боль, гипотензия
- 4) сужение коронарных артерий

**У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ**

- 1) А
- 2) Е
- 3) В
- 4) С

**ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) соблюдение правил гигиены
- 2) прегравидарная подготовка
- 3) противовирусная терапия
- 4) инфузионная терапия

**РАННИМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) остеопороз
- 2) катаракта
- 3) стероидный диабет
- 4) миопатия

**К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) жаропонижающих средств
- 2) отхаркивающих средств
- 3) антибактериальных средств
- 4) бронхолитических средств

**ФЛУКОНАЗОЛ (ДИФЛЮКАН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) противогрибковые средства
- 2) антибиотики
- 3) ненаркотические анальгетики
- 4) противоглистные средства

**АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) физиологической аменореей
- 2) психогенной аменореей
- 3) фармакологической аменореей
- 4) ложной аменореей

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ СЧИТАЮТСЯ**

- 1) групповые занятия
- 2) индивидуальные занятия

- 3) самостоятельное самообучение
- 4) занятия он-лайн

**ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЮТ ПРИНЦИПУ**

- 1) не следует принимать
- 2) должны назначаться врачом
- 3) не причиняют вреда плоду во время эмбриогенеза
- 4) можно принимать без консультации врача

**РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ (В НЕДЕЛЯХ)**

- 1) 38
- 2) 28
- 3) 30
- 4) 34

**БЕРЕМЕННОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ**

- 1) туберкулёза
- 2) бешенства
- 3) брюшного тифа
- 4) ветряной оспы

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 140 календарных дней
- 2) 170 календарных дней
- 3) 120 календарных дней
- 4) 150 календарных дней

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 12,5
- 2) 11
- 3) 10,5
- 4) 13

**ПРИ ЛИХОРАДКЕ СВЫШЕ 39° ГРАДУСОВ У ДЕТЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) парацетамола
- 2) ацетилсалициловой кислоты
- 3) ибуклина
- 4) ибупрофена

**ПОСЛЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЬНОГО РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТенок ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ПОВТОРНО ДРУГОЙ АКУШЕРКОЙ**

- 1) показано
- 2) противопоказано

- 3) зависит от возраста пациентки
- 4) зависит от ситуации

### **ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

- 1) распределение посещений городских жителей
- 2) выполнение плана посещений
- 3) фактическая среднечасовая нагрузка врача в поликлинике
- 4) среднее число посещений на 1 жителя в год

### **КОРОТКИЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) менометроррагией
- 2) полименореей
- 3) метроррагией
- 4) олигоменореей

### **ДИАБЕТ, РАЗВИВШИЙСЯ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) сахарный диабет 2 типа
- 2) сахарный диабет промежуточного типа
- 3) сахарный диабет 1 типа
- 4) гестационный сахарный диабет

### **В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ**

- 1) применение инъекций антибиотиков
- 2) подкладывание клеенки под матрац больного
- 3) рациональное питание
- 4) регулярная смена положения тела

### **ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ РОДРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наложение вакуум-экстрактора
- 2) операция кесарево сечение
- 3) плодоразрушающая операция
- 4) самопроизвольные роды

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- 1) гигиенический уход
- 2) кормление «по требованию»
- 3) тугое пеленание
- 4) измерение температуры тела

### **ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) приготовить теплую грелку
- 2) по назначению врача готовить пациентку к экстренной операции

- 3) ввести анальгетики
- 4) дать слабительное

### **ДЛЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА**

- 1) тошнота
- 2) головная боль
- 3) загрудинная боль
- 4) одышка

### **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ КОНЪЮГАТОЙ**

- 1) наружной
- 2) истинной
- 3) диагональной
- 4) анатомической

### **ЛЕКЦИЯ О ВЛИЯНИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О**

- 1) гигиене
- 2) питании
- 3) режиме дня
- 4) вреде курения, алкоголя и наркотиков

### **ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 24-26
- 2) 26-28
- 3) 18-20
- 4) 28-29

### **СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) объема распределения
- 2) периода полувыведения
- 3) дозы
- 4) способа приема

### **ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) подавление сексуальности в подростковом возрасте
- 2) профилактика первого аборта и незапланированной беременности
- 3) частые обращения в женскую консультацию
- 4) ознакомление с техникой сексуального общения

### **АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ БЕЛОК**

- 1) альбумин
- 2) глобулин

- 3) гепарин
- 4) фибриноген

**ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) амниоскопия
- 2) амниоцентез
- 3) плацентоцентез
- 4) биопсия хориона

**ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «А» ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) водный
- 2) парентеральный
- 3) половой
- 4) через укусы комара

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) недержание мочи
- 2) потеря тонуса мочевого пузыря
- 3) запор
- 4) пролежни

**МАССА МАТКИ У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)**

- 1) 90-100
- 2) 60-70
- 3) 80-90
- 4) 70-80

**ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН**

- 1) Строгановым В.В.
- 2) Скробанским К.К.
- 3) Бодяжиной В.И.
- 4) Бровкиным Д.П.

**ДИАГНОЗЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ АКУШЕРКОЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) заключительными
- 2) дополнительными
- 3) окончательными
- 4) ориентировочными

**ПРИ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОМ ДИАБЕТЕ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ У**

- 1) только эндокринолога
- 2) только гинеколога
- 3) терапевта
- 4) акушера и эндокринолога

### **ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ**

- 1) Бодяжиной В.И.
- 2) Строгановым В.В.
- 3) Скробанским К.К.
- 4) Славянским К.Ф.

### **ПРИЗНАКОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия лица
- 2) повышение артериального давления
- 3) частый нитевидный пульс
- 4) артериальное давление 110/70

### **СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ**

- 1) ограничивает свободу движений эмбриона
- 2) способствует питанию плода
- 3) создает защитную подушку для эмбриона
- 4) обеспечивает иммунологическую защиту

### **СПОСОБ РОДРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) вирусной нагрузки
- 2) ВИЧ-статуса полового партнёра
- 3) возраста
- 4) срока гестации

### **ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) катетеризировать периферическую вену
- 2) назначить общий анализ крови
- 3) обработать палату
- 4) вызвать санитарку

### **КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ**

- 1) встречаемости родителей одиночек
- 2) сердечно-сосудистых заболеваний
- 3) рождаемости детей с врожденными пороками развития
- 4) расторжения браков

### **ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ**

- 1) в любых условиях
- 2) только в условиях развернутой операционной
- 3) в присутствии второй акушерки
- 4) в теплом помещении

**ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 11
- 2) 12,5
- 3) 10,5
- 4) 13

**РЕЗУС-КОНФЛИКТ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ КРОВЬ**

- 1) матери - резус-отрицательная, а плода - резус-положительная
- 2) матери и плода - резус-положительная
- 3) матери и плода - резус-отрицательная
- 4) матери - резус-положительная, а плода - резус-отрицательная

**БЕРЕМЕННАЯ С ДВОЙНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) в 40 недель
- 2) за 2 недели до родов
- 3) с началом срочных родов
- 4) сразу же после отхождения вод

**ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ, ТО МОГУТ ВОЗНИКАТЬ**

- 1) гипоксия
- 2) тромбоз
- 3) кровотечения
- 4) анемия

**ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) соблюдении строгого постельного режима, применении антикоагулянтов
- 2) активном послеоперационном ведении больного, применении антикоагулянтов
- 3) применении баночного массажа на грудную клетку
- 4) применении солевых кровезаменителей

**ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) размягчением перешейка матки
- 2) размягчением тела матки
- 3) сокращением матки при пальпации
- 4) асимметрией матки

### **К ВЫПЛАТАМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) выплаты по беременности и родам
- 2) компенсация материального ущерба
- 3) компенсация морального ущерба
- 4) компенсации вследствие стихийных бедствий

### **ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНО ФОРМИРУЮТСЯ В ПЕРИОД**

- 1) интранатальный
- 2) постнатальный
- 3) плацентарный
- 4) эмбриональный

### **ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 24
- 2) 22
- 3) 16
- 4) 28

### **К ПРИЗНАКАМ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ**

- 1) гипертония
- 2) фибриллярные подергивания мышц лица
- 3) боль в эпигастральной области, рвота
- 4) гипотония

### **СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- 1) панкреатин (фестал)
- 2) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
- 3) бенциклан (галидор)
- 4) ацидин-пепсин

### **ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛИХОРАДКОЙ ЗИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОПАСНО В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА**

- 1) аутоиммунного гепатита
- 2) почечной недостаточности
- 3) гемолитической анемии
- 4) микроцефалии

### **ЛИНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) аминогликозиды
- 2) пенициллины
- 3) гликопептиды
- 4) линкозамиды

### **ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) приглушенные звук и свет
- 2) яркий свет, громкий звук, боль
- 3) просторная одежда
- 4) тишина

### **КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) быть низкоэффективным
- 2) не оказывать системного влияния на организм
- 3) иметь сложные инструкции применения
- 4) обладать необратимым действием

### **НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гордая походка беременной
- 2) чувство голода
- 3) выпадение полей зрения
- 4) усталость

### **БЕРЕМЕННЫМ ПОСЛЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ**

- 1) длительных поездок на любом виде транспорта
- 2) прогулок в парке
- 3) сбалансированного питания
- 4) общения с родственниками

### **ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) президентом РФ
- 2) Правительством РФ
- 3) местной администрацией
- 4) Государственной думой РФ

### **ВАРИАНТОМ НОРМАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 1-Е СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тромбозы и эмболии
- 2) субфебрильная температура
- 3) острое кровотечение
- 4) парез кишечника

### **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА БЕРЕМЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В ГРАММАХ НА ЛИТР НИЖЕ**

- 1) 130
- 2) 140
- 3) 120
- 4) 110

### **ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- 1) врожденному кретинизму
- 2) гипотрофии плода
- 3) гипогликемии плода
- 4) пиелонефриту

### **ЦЕЛЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) знакомство с семьей будущего новорожденного
- 2) обучение женщины уходу за новорожденным
- 3) контроль состояния беременной
- 4) информирование о заболеваниях у детей раннего возраста

### **ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ**

- 1) прелиминарным
- 2) предвестниковым
- 3) раскрытия
- 4) изгнания

### **ВТОРОЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) положение, позицию, вид плода
- 2) предлежащую часть
- 3) высоту стояния дна матки
- 4) вставление головки

### **ПРЕДСУДОРОЖНЫЙ ПЕРИОД ЭКЛАМПСИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ**

- 1) фибриллярными подергиваниями мышц лиц и фиксированным взглядом в одну сторону
- 2) клоническими судорогами
- 3) тоническими судорогами
- 4) отсутствием дыхания

### **СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 7-10
- 2) 3-4
- 3) 15-20
- 4) 25-30

### **ВЗНОС НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- 1) работающими гражданами
- 2) работодателями
- 3) из бюджета РФ
- 4) администрацией муниципального образования

## **ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ ГЕПАТИТА А ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРИОД**

- 1) осенне-зимний
- 2) зимне-весенний
- 3) весенне-летний
- 4) летне-осенний

## **ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) размягчении перешейка матки
- 2) сокращении матки при пальпации
- 3) усиленном перегибе матки кпереди
- 4) асимметрии матки

## **РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) снижением числа экстрагенитальных заболеваний
- 2) снижением числа инфекционных заболеваний
- 3) увеличением рождаемости
- 4) увеличением числа заболеваний с хроническим и рецидивирующим течением

## **ХЕНОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ХЕНОФАЛЬК) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) анальгетики
- 2) холеретики
- 3) уросептики
- 4) спазмолитики

## **ДОСТУПНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) развитием широкой сети учебно-методических медицинских центров
- 2) финансированием научно-исследовательского сектора
- 3) производством и закупкой недостающих медикаментов за рубежом
- 4) развитием широкой сети медицинских организаций и наличием необходимого количества медицинских работников

## **ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИФЕНГИДРАМИНА (ДИМЕДРОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) крапивница
- 2) ринит
- 3) головная боль
- 4) судороги

## **САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЖИМОМ ПРИЕМА КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) 26+2
- 2) непрерывный
- 3) 24+4

4) 21+7

**ВХОДИТ В СОСТАВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КИШКА**

- 1) подвздошная
- 2) 12-перстная
- 3) тощая
- 4) ободочная

**ТЕРМИН «...CARDITIS» (ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ**

- 1) para
- 2) peri
- 3) sub
- 4) pan

**ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) ватные жгутики, смоченные растительным маслом
- 2) сухие ватные жгутики
- 3) ватные шарики
- 4) марлевые шарики

**ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ МЕЖДУ**

- 1) прогестероном в крови и антисывороткой
- 2) хорионическим гонадотропином в моче и антисывороткой
- 3) плацентарным лактогеном и антисывороткой
- 4) эстрогеном и антисывороткой

**НАЗВАНИЕ СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА**

- 1) интоксикационный
- 2) гепатолиенальный
- 3) гипертонический
- 4) диспепсический

**СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
- 2) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете
- 3) проводится при инфекционных заболеваниях
- 4) проводится по показаниям

**ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) понижение артериального давления, головокружение
- 2) рвота «кофейной гущей» и «дегтеобразный стул»
- 3) слабость, головокружение, обморок
- 4) нитевидный пульс, слабость

### **К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОТНОСИТСЯ**

- 1) повозрастная смертность в детском возрасте
- 2) младенческая смертность
- 3) перинатальная смертность
- 4) летальность

### **ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фестал
- 2) галидор
- 3) омез
- 4) пепсин

### **ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ**

- 1) профилактики предлежания плаценты
- 2) профилактики респираторных расстройств новорожденного
- 3) лечения аномалий родовых сил
- 4) профилактики кровотечения во втором периоде родов

### **ЦЕЛЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 3 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ**

- 1) нижних конечностей
- 2) грудных
- 3) верхнего плечевого пояса
- 4) промежности, спины

### **ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСОВ В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ**

- 1) порока сердца
- 2) пневмонии новорожденного
- 3) асфиксии новорожденного
- 4) гемолитической болезни новорожденного

### **ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ ПОКАЗАНО**

- 1) согревающий компресс
- 2) физиолечение
- 3) подавление лактации
- 4) активное кормление и сцеживание

### **ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предупреждение обострений заболевания
- 2) предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний
- 3) предупреждение возникновения инвалидности
- 4) все вышеперечисленное

## **ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ В**

- 1) санитарной комнате
- 2) кабинете сестры хозяйки
- 3) кладовой для чистого белья
- 4) помещении для грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей

## **ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) косое положение плода
- 2) поперечное положение плода
- 3) безводный промежуток 12 часов
- 4) повышение температуры в родах

## **ИЗЖОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода
- 2) забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера
- 3) повышенной кислотности желудочного сока
- 4) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной кислоты

## **ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) вызвать родственников
- 2) проветрить помещение
- 3) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- 4) накормить беременную

## **СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

- 1) здоровая женщина в возрасте от 17 до 50 лет
- 2) имеющая не менее двух собственных детей, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте до 40 лет
- 3) имеющая собственного здорового ребенка, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте 20 – 35 лет
- 4) здоровая женщина в возрасте от 20 – 35 лет

## **ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ**

- 1) не имеет значения
- 2) согнута вперед
- 3) запрокинута назад
- 4) повернута на бок

## **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5-6
- 2) 7-8

- 3) 1-2
- 4) 3-4

### **ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫВАЕТ НИЖЕ**

- 1) утром
- 2) днем
- 3) вечером
- 4) после физической нагрузки

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) фенотерол (партусистен)
- 2) папазол
- 3) прогестерон
- 4) неостигмина метилсульфат (прозерин)

### **ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ОБЫЧНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода
- 2) перед выпиской из стационара
- 3) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- 4) к 3-6-м суткам послеоперационного периода

### **ВО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ТУАЛЕТА НОВОРОЖДЕННОГО ГЛАЗА ОБРАБАТЫВАЮТ**

- 1) кипяченой водой
- 2) ретинолом
- 3) раствором сульфацида (альбуцида)
- 4) 3% раствором перекиси водорода

### **ПОНИМАЮТ ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ**

- 1) науку о социальных проблемах медицины
- 2) систему социально-экономических мероприятий по охране здоровья
- 3) систему лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
- 4) медико-демографическую и социальную категорию, отражающую физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социально-экономических систем

### **К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) кровохарканье, головная боль, одышка
- 2) головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами
- 3) отрыжка, слабость
- 4) изжога, рвота, шум в ушах

### **ЖЕНЩИНЫ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И БЕСПЛОДИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- 1) I

- 2) IV
- 3) II
- 4) V

### **ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- 1) исчерпанная заболеваемость населения
- 2) удельный вес того или иного заболевания среди населения
- 3) степень изменения уровня заболеваемости во времени
- 4) распространенность заболеваний среди населения

### **ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ**

- 1) большим косым размером
- 2) малым поперечным размером
- 3) малым косым размером
- 4) большим поперечным размером

### **ПОД ФИБРИНОГЕНОМ В КРОВИ ПОНИМАЮТ БЕЛОК, КОТОРЫЙ**

- 1) содержится в лейкоцитах
- 2) способствует кровотечению
- 3) содержится в эритроцитах
- 4) растворен в плазме

### **«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) измерение истинной конъюгаты
- 2) цервикометрия и определение фетального фибронектина
- 3) доплерометрия
- 4) определение высоты стояния дна матки

### **ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) начала потужных схваток
- 2) полного раскрытия шейки матки
- 3) появления схваток через 3 минуты по 40 сек
- 4) отхождения вод

### **СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

- 1) участвует в аттестации медицинских работников
- 2) участвует в лицензировании медицинской организации
- 3) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб от пациентов
- 4) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи

### **ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) 2-3 дня
- 2) 4-6 недель
- 3) 6-8 месяцев

4) 2-3 месяца

### **ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ПАЛАТЫ**

- 1) от четырехместных до пятиместных
- 2) от четырехместных до шестиместных
- 3) трех или четырехместные
- 4) одно или двухместные

### **ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) диспансеризацию
- 2) рациональное питание
- 3) физическую активность
- 4) охрану окружающей среды

### **ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) увеличить прием белков и жиров
- 2) ограничить прием белков и жиров
- 3) ограничить прием жидкости и соли
- 4) увеличить прием жидкости и соли

### **ЭКСТРЕННАЯ СМЕНА ПОВЯЗКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ**

- 1) незначительном промокании серозным экссудатом
- 2) болезненности краев раны
- 3) повышении температуры тела
- 4) пропитывании повязки кровью

### **ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 5 ПЛОДАМИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) редуцирование лишних плодов в первые недели
- 2) проведение сохраняющей терапии без редуцирования
- 3) наблюдение без сохраняющей терапии
- 4) прерывание беременности

### **ИНСУЛИН ВВОДЯТ В ОРГАНИЗМ**

- 1) после того как место инъекции просохло от антисептика
- 2) через 15 секунд после обработки антисептиком
- 3) сразу же
- 4) через 30 секунд после обработки антисептиком

### **КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ**

- 1) туберкулезом
- 2) экстрагенитальной
- 3) гепатитом В

4) гепатитом А

**БУКВОСОЧЕТАНИЕ «TI» ЧИТАЕТСЯ КАК (ЦИ) В СЛОВЕ**

- 1) mixtio
- 2) fonticulus
- 3) solutio
- 4) tibia

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 30
- 4) 40

**ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СУХОЙ КАШЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) либексин
- 2) тавегил
- 3) мукалтин
- 4) гентамицин

**ТОКОЛИТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пахикарпин гидройодид (пахикарпин)
- 2) динопростон (простенон)
- 3) фенотерол (партусистен)
- 4) неостигмина метилсульфат (прозерин)

**КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) два
- 2) один
- 3) четыре
- 4) три

**ПРИЧИНОЙ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) накопление в организме кристаллов мочевой кислоты
- 2) воспалительный процесс
- 3) недостаток железа
- 4) недостаток кальция и фосфора

**ОСНОВНАЯ РОЛЬ АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) оказании помощи только женщине
- 2) оказании помощи всей семье
- 3) оказании помощи, связанной с рождением ребенка

4) борьбе с материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью

### **ПЛОДОВЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) спонгиозная и компактная
- 2) децидуальная и водная
- 3) ворсистая и водная
- 4) децидуальная и ворсистая

### **ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение матки
- 2) появление пигментации
- 3) нарушение обоняния
- 4) тошнота

### **ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ОТРАЖАЕТ**

- 1) соотношение длины тела ( $m^2$ ) к массе тела (кг)
- 2) соотношение массы тела (кг) к длине тела ( $m^2$ )
- 3) соотношение длины тела ( $m^2$ ) к возрасту (лет)
- 4) соотношение массы тела (кг) к возрасту (лет)

### **ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТенок СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение
- 2) некоторое понижение
- 3) существенное понижение
- 4) остается без изменений

### **ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ**

- 1) активный, искусственный
- 2) активный, естественный
- 3) пассивный, естественный
- 4) пассивный, искусственный

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) потеря массы тела
- 2) повышение артериального давления
- 3) боль в животе
- 4) диарея

### **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) магния сульфат
- 2) препарат железа

- 3) сульфаниламид
- 4) преднизолон

### **ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) положение
- 2) предлежание
- 3) позиция
- 4) вид

### **РЕАНИМАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ**

- 1) проблемы оживления организма
- 2) профилактику экстремальных ситуаций
- 3) функционирование основных жизненных систем
- 4) физиологию человека

### **ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) ввести кровоостанавливающие средства
- 2) начать переливать кровь
- 3) наложить кровоостанавливающий жгут
- 4) вызвать акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога

### **К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ**

- 1) страдающие гипертонией
- 2) работающие в детских лечебных учреждениях
- 3) ведущие беспорядочную половую жизнь
- 4) не живущие половой жизнью

### **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ ГРУДИ МАТЕРИ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 60
- 4) 40

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лейомиома матки
- 2) кровотечение
- 3) эрозия шейки матки
- 4) бартолинит

### **КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) по строгим показаниям

- 2) однократно во II триместре
- 3) трижды в I, II и III триместрах беременности
- 4) однократно в I триместре

**СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВАЛИДОЛ» ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пероральный
- 2) сублингвальный
- 3) внутривенный
- 4) ректальный

**ВНУТРИМАТОЧНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ**

- 1) резус-отрицательной принадлежности крови пациента
- 2) воспалительных заболеваниях половых органов
- 3) ожирении
- 4) низкой массе тела

**ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) амбулаторно-поликлинический
- 2) санаторно-курортный
- 3) стационарный
- 4) превентивный

**ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) крепитация
- 2) абсолютное укорочение конечности
- 3) отек мягких тканей в зоне перелома
- 4) деформация

**ДЛЯ ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНО**

- 1) оседание эритроцитов
- 2) выход эритроцитов из сосудов
- 3) склеивание эритроцитов
- 4) разрушение эритроцитов

**ТОКОЛИТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ- ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) парацетамол и атропина сульфат
- 2) нефедипин и трактоцил (атосибан)
- 3) магния сульфат и окситоцин
- 4) клонидин и тримеперидин (промедол)

**«РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) сухом плеврите
- 2) бронхиальной астме
- 3) пневмонии
- 4) остром бронхите

**НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С**

- 1) циститом
- 2) пиелонефритом
- 3) гломерулонефритом
- 4) мочекаменной болезнью

**ПОСЛЕРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ**

- 1) 86
- 2) 110
- 3) 84
- 4) 70

**БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 5 лет
- 2) 1 года
- 3) 2 лет
- 4) 6 месяцев

**К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ГАСТРАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ**

- 1) боль в животе
- 2) головная боль
- 3) загрудинная боль
- 4) приступ удушья

**К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В ОТНОСИТСЯ**

- 1) хеликобактериальная инфекция
- 2) аутоиммунные нарушения
- 3) нерациональное питание
- 4) отравление

**ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) гипертемия
- 4) гипертензия

**С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ РОДОВ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) минизистон
- 2) мифепристон
- 3) фторхинолоны
- 4) макролиды

### **НАГНОЕНИЕ РАНЫ ОБЫЧНО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- 1) перед выпиской из стационара
- 2) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- 3) на 6-7-е сутки после операции
- 4) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода

### **ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО**

- 1) 1 года
- 2) 15 лет
- 3) 7 лет
- 4) 3 лет

### **ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 54 УДАРОВ В МИНУТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) экстрасистолия
- 4) норма

### **ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОМЫ**

- 1) почечной
- 2) гипергликемической
- 3) гипогликемической
- 4) уремической

### **ПРИСТУП ЭКЛАМПСИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ**

- 1) только в родах
- 2) только в послеродовом периоде
- 3) только во время беременности
- 4) во время беременности, в родах и в послеродовом периоде

### **ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ ПЛОДА**

- 1) фетотоксическое
- 2) эмбриолетальное
- 3) эмбриотоксическое
- 4) мутагенное

### **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ**

- 1) зависят от диагноза
- 2) в ближайшие часы
- 3) в течение месяца
- 4) в течение недели

**ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОМИМО ЯИЧНИКОВ,  
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ**

- 1) плацентой
- 2) гипофизом
- 3) гипоталамусом
- 4) щитовидной железой

**ГЛУБОКИМ СВОДОМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) задний
- 2) передний
- 3) правый боковой
- 4) левый боковой

**ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ АНЕСТЕЗИЮ**

- 1) эпидуральную
- 2) проводниковую
- 3) внутрикостную
- 4) парацервикальную

**ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)
- 2) пропранолол (анаприлин)
- 3) бупивакаина гидрохлорид (бупивакаин)
- 4) лидокаин

**СИМПТОМЫ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК ОБЪЯСНЯЮТСЯ**

- 1) высоким содержанием белка
- 2) выделением билирубина с мочой
- 3) примесью крови в моче
- 4) высоким содержанием мочевой кислоты

**К ПРИЧИНАМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) хронический гломерулонефрит
- 2) пневмония
- 3) обширные ожоги
- 4) хронический цистит

**АДАПТИРОВАННОЙ СМЕСЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ СМЕСЬ**

- 1) которая нравится ребенку
- 2) приближенная по составу к женскому молоку
- 3) обогащенная жирами
- 4) обогащенная белками

**ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  
ПАРАЦЕТАМОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) противоаллергический
- 2) антибактериальный
- 3) желчегонный
- 4) анальгезирующий

#### **СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) ранним вступлением в брак
- 2) поздним деторождением
- 3) уменьшением количества половых партнеров
- 4) преобладанием контрацепции над абортами

#### **ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) неблагоприятная внешняя среда
- 2) наследственность
- 3) модифицированные продукты питания
- 4) санитарное неблагополучие населения

#### **КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) быть низкоэффективным
- 2) быть доступным для любых социальных групп
- 3) иметь сложные инструкции применения
- 4) обладать необратимым действием

#### **КАРДИОГЕННЫЙ ШОК МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) воздействия бактериальных токсинов
- 2) кровотечения
- 3) инфаркта миокарда
- 4) обширных ожогов

#### **ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 2-Х ИЛИ БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЁТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 90 дней со дня рождения детей
- 2) 110 дней со дня рождения детей
- 3) 70 дней со дня рождения детей
- 4) 156 дней со дня рождения детей

#### **К ВИДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) йога
- 2) плавание
- 3) дыхательная гимнастика
- 4) бег

#### **СЕРИЮ ПРИСТУПОВ ЭКЛАМПСИИ НАЗЫВАЮТ**

- 1) тонусом
- 2) тетанусом
- 3) эклампсическим статусом
- 4) клонусом

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ВАННА НОВОРОЖДЕННОМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) через три дня
- 2) по мере необходимости
- 3) через день
- 4) ежедневно

**НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПРАКТИКОЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плавание
- 2) ходьба
- 3) баня
- 4) сочетание различных форм физической подготовки

**ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА РЕБЕНКУ ВВОДЯТ**

- 1) декстрозу (глюкозу)
- 2) инсулин короткого действия
- 3) инсулин пролонгированного действия
- 4) хлоропирамин (супрастин)

**К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ, НЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- 2) многоводие
- 3) несвоевременное вскрытие плодного пузыря
- 4) разрыв матки

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 110
- 2) 70
- 3) 80
- 4) 84

**КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ**

- 1) изменение сердцебиения плода
- 2) излитие околоплодных вод
- 3) боли внизу живота
- 4) кровотечения различной интенсивности

## **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипогликемия
- 2) уменьшение лактации
- 3) усиление лактации
- 4) повышение артериального давления

## **ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ**

- 1) 22-24
- 2) 38-39
- 3) 34-35
- 4) 36-37

## **КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ НАЧИНАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) все ответы верны
- 2) боли в поясничной области и нижней части живота
- 3) выраженные схваткообразные боли внизу живота или схватки
- 4) регулярная родовая деятельность и раскрытие маточного зева более 3 см

## **РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ**

- 1) хромоцистоскопия
- 2) ирригоскопия
- 3) томография
- 4) экскреторная урография

## **НЕОТЛОЖНЫЕ (ЭКСТРЕННЫЕ) ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ**

- 1) через 8-10 дней после поступления в стационар
- 2) через 48-72 часа после поступления в стационар
- 3) через 24-48 часов после поступления в стационар
- 4) немедленно или через 2-4 часа после поступления в стационар

## **К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ОТНОСИТСЯ**

- 1) отравление алкоголем
- 2) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками
- 3) отравление грибами
- 4) желудочное кровотечение

## **СКУДНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) гиперменореей
- 2) гипоменореей
- 3) альгоменореей
- 4) полименореей

**БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) фенилкетонурии
- 2) болезни Дауна
- 3) рахита
- 4) гемофилии

**РЕЗУС-КОНФЛИКТ МАТЕРИ И ПЛОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- 1) врожденным уродствам
- 2) выкидышу, мертворождению
- 3) олигофрении
- 4) хромосомным аномалиям

**ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 30
- 2) 20
- 3) 12
- 4) 24

**ОМЕЗ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) ингибитор протонной помпы
- 2) блокатор H<sub>2</sub>-рецепторов гистамина
- 3) M-холиноблокаторы
- 4) блокаторы H<sub>1</sub>-рецепторов гистамина

**АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) укус клещей
- 2) ужаление пчел
- 3) укус вшей
- 4) укус комаров

**ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дыхательная
- 2) выработка антител
- 3) выделительная
- 4) свертывающая

**АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД**

- 1) новорожденности
- 2) внутриутробный
- 3) грудной
- 4) пубертатный

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ**

## **ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) старческий возраст
- 2) алкоголизм, наркомания
- 3) онкологические заболевания
- 4) травмы не совместимые с жизнью

## **К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ**

- 1) снижение аппетита и массы тела
- 2) тошнота, рвота
- 3) загрудинная боль, нарушение ритма сердца
- 4) головная боль, ухудшение памяти

## **СИМПТОМОКОМПЛЕКС, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БЕШЕНСТВА, ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) розеолезную сыпь, артралгию, распространенные отеки
- 2) тошноту, повторную рвоту, жидкий стул
- 3) гидрофобию, аэрофобию, фотофобию, акустикофобию
- 4) гиперемию зева, плотные налёты серого цвета

## **НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЦЕНЫ**

- 1) бюджетные
- 2) договорные
- 3) тарифные
- 4) свободные

## **НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА**

- 1) спазмолитики
- 2) эпидуральная анестезия
- 3) физиопсихопрофилактика
- 4) психотропные средства

## **ПРОФИЛАКТИКА ГИПОТИРЕОЗА ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ**

- 1) диетотерапии
- 2) антибиотикотерапии
- 3) препаратов железа
- 4) препаратов йода

## **К НИТРАТУ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нитрогранулонг
- 2) нитроглицерин
- 3) оликард
- 4) сустак-форте

## **ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ**

- 1) тугое бинтование, слабокислое питье, согревание
- 2) наложение жгута, сосудорасширяющие вмешательства, согревание, слабокислое питье
- 3) обезболивание, тугое бинтование, иммобилизацию конечности, щелочное питье
- 4) обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье

**ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В УЗКОЙ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дополнительное разгибание
- 2) разгибание
- 3) внутренний поворот
- 4) сгибание

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО СРОКА В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 14
- 4) 16

**КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) каждые 2 часа
- 2) каждый час
- 3) каждые 4 часа
- 4) каждые 3 часа

**ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С КРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ**

- 1) Шульцца
- 2) Шредера
- 3) Дункана
- 4) Гентера

**ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ТАЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вставление головки
- 2) предлежание головки
- 3) разгибание головки
- 4) сгибание головки

**БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК**

- 1) гематурию
- 2) глюкозурию
- 3) пиурию
- 4) полиурию

**СИМПТОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гектическая лихорадка
- 2) боль в правом подреберье
- 3) слабость
- 4) мелена

**СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЕТ ПЛОД ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАЗ И РОДОВЫЕ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) биомеханизмом родов
- 2) асинклитизмом
- 3) конфигурацией головки
- 4) течением родов

**АЛЬМАГЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) блокаторы H<sub>2</sub>-рецепторов гистамина
- 2) антацидные средства
- 3) антигистаминные средства
- 4) ненаркотические анальгетики

**СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ**

- 1) легких
- 2) почек
- 3) печени
- 4) сердца

**ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) утром на ногах
- 2) вечером на ногах
- 3) утром на лице
- 4) вечером на лице

**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нарушение мочеиспускания
- 2) гипотермия
- 3) нарушение гемодинамика
- 4) угнетение центральной нервной системы

**УДАЛЕНИЕ СЛИЗИ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭЛЕКТРООТСОСОМ У ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИИ (СЕК)**

- 1) не более 5
- 2) не более 15
- 3) 20-30
- 4) не более 20

**ПЕРИОД ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, КОГДА ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ,**

**ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) беременность
- 2) детство
- 3) климакс
- 4) старость

**МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭУТИРЕОИДНОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) йодированной соли
- 2) сахара
- 3) клетчатки
- 4) кисломолочных продуктов

**ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- 1) предположительных признаков беременности
- 2) сомнительных признаков беременности
- 3) вероятных признаков беременности
- 4) достоверных признаков беременности

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА УСТАНОВЛИВАЕТ**

- 1) медицинский регистратор
- 2) акушерка
- 3) врач соответствующего профиля
- 4) медицинская сестра

**ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 24
- 2) 20
- 3) 26
- 4) 22

**НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 37 НЕДЕЛЬ И ПРЕЭКЛАМПСИИ**

- 1) ожидание срочных родов
- 2) контроль функции почек
- 3) лечение в дневном стационаре
- 4) подготовку к досрочному родоразрешению

**ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сайтотек
- 2) фамотидин
- 3) дротаверин (но-шпа)
- 4) солкосерил

**АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) крепитация
- 2) отек мягких тканей сустава
- 3) гематома в зоне перелома
- 4) нахождение суставного конца в необычном месте

**ПОД РЕФЛЕКСОМ ПОЛЗАНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС**

- 1) Моро
- 2) Бауэра
- 3) Робинсона
- 4) Бабкина

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ**

- 1) 120-140
- 2) 110-120
- 3) 90-100
- 4) 70-80

**НЕОБХОДИМО, ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЬ**

- 1) осмотр в зеркалах
- 2) бимануальное исследование
- 3) взвешивание и пельвиометрию
- 4) взвешивание и тонометрию

**ПИУРИЯ И БАКТЕРИУРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ У БЕРЕМЕННОЙ ПРИЗНАКОМ**

- 1) раннего гестоза
- 2) позднего гестоза
- 3) сахарного диабета
- 4) пиелонефрита

**ЗА 30 МИНУТ ДО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ВВОДЯТ**

- 1) неостигмина метилсульфат (прозерин) и окситоцин
- 2) метилэргометрин
- 3) атропина сульфат и дефенгидрамин (димедрол)
- 4) питуитрин

**ПЕРЕД СНОМ БЕРЕМЕННОЙ ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ**

- 1) бутерброд с колбасой
- 2) кефир, фрукты
- 3) пирожное
- 4) жареный картофель

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) развитие хронического цистита

- 2) эндоцервицит
- 3) переход в хроническую форму
- 4) развитие хронического кольпита

**В РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ АКУШЕРКИ НА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В МЕСЯЦ ОТВОДИТСЯ ЧАСОВ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

**РЕННЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОВЫШАЕТ**

- 1) риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем
- 2) качество половой жизни
- 3) уровень сексуальной культуры
- 4) уровень репродуктивного здоровья

**ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) приготовить теплую грелку
- 2) оповестить операционных сестер
- 3) ввести анальгетики
- 4) дать слабительное

**ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ПРИМЕНЯЮТ СПОСОБ**

- 1) Довженко
- 2) Малиновского
- 3) Шредера
- 4) Абуладзе

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эндоскопическое исследование с биопсией
- 2) ирригоскопия
- 3) ультразвуковое исследование
- 4) желудочное зондирование

**АКУШЕРКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ИМЕЕТ ПРАВО ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- 1) наложение акушерских щипцов
- 2) кесарево сечение
- 3) рассечение промежности в родах
- 4) прерывание беременности

**НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЪЮГАТЫ**

- 1) прибавить 1,5-2 см к диагональной конъюгате

- 2) отнять 9 см от диагональной конъюгаты
- 3) отнять 1,5-2 см от наружной конъюгаты
- 4) отнять 1,5-2 см от диагональной конъюгаты

### **НА СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ**

- 1) тепло
- 2) дренирование
- 3) разрез
- 4) холод

### **ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗЫ**

- 1) поджелудочной
- 2) щитовидной
- 3) вилочковой
- 4) гипофиза

### **ДЕМОГРАФИЯ — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ**

- 1) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии
- 2) факторную обусловленность здоровья
- 3) здоровье населения
- 4) вопросы брака и плодовитости

### **ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) введение внутривенно 0,9% раствора натрия хлорида (физиологического раствора)
- 2) введение подкожно неостигмина метилсульфата (прозерина)
- 3) рациональное обезболивание
- 4) введение подкожно 0,1% раствора атропина сульфата

### **НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

- 1) подкожно
- 2) внутривенно
- 3) сублингвально
- 4) внутримышечно

### **ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) сухом плеврите
- 2) бронхиальной астме
- 3) пневмонии
- 4) остром бронхите

### **ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ**

- 1) проверить наружными приемами положение и предлежание плода

- 2) ввести внутривенно метилэргометрин
- 3) произвести влагалищное исследование
- 4) произвести амниотомию

### **ПЕРВЫЙ ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНИКА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕ**

- 1) шейном
- 2) грудном
- 3) поясничном
- 4) крестцовом

### **ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ О**

- 1) медицинской организации
- 2) результатах проведенных анализов, обследований, а также диагноз
- 3) угрозе массового распространения инфекционного заболевания
- 4) противоправных действиях в отношении пациента

### **СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г, В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 35
- 2) 30
- 3) 26
- 4) 28

### **ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К**

- 1) бронхоскопии
- 2) томографии
- 3) рентгеноскопии
- 4) флюорографии

### **К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ОТНОСЯТ**

- 1) инфаркт миокарда
- 2) ревматизм
- 3) гипертоническую болезнь
- 4) ишемическую болезнь сердца (стенокардию)

### **ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

- 1) 4 раз в год
- 2) 2 раз в год
- 3) 1 раз в год
- 4) 3 раз в год

### **РАБОТУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ БЕРЕМЕННЫМ НЕОБХОДИМО**

- 1) увеличить
- 2) сократить
- 3) не изменять

4) запретить

**НЕОБХОДИМЫМ АКУШЕРСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА "ОСТРЫЙ ЖИВОТ" ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аускультация сердца
- 2) определение тургора тканей
- 3) пальпация живота
- 4) перкуссия грудной клетки

**К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ АЛЬБУМИНА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) антикоагулянты
- 2) ненаркотические анальгетики
- 3) плазмозаменители
- 4) антибиотики

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) гипотензивные, диуретики
- 2) ганглиоблокаторы, диуретики
- 3) анальгетики, наркотики
- 4) нитраты, бета-адреноблокаторы

**К МУКОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ**

- 1) кодеин
- 2) кромогликат натрия
- 3) сальметерол
- 4) ацетилцистеин

**НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ**

- 1) закаливание
- 2) нормализация массы тела
- 3) устранение гиподинамии
- 4) рациональное питание

**НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГРУДИ К КОРМЛЕНИЮ**

- 1) смазывать соски детским кремом
- 2) контрастный душ
- 3) массаж груди
- 4) физиопроцедуры

**ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ МАТКИ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пропитывание стенки матки кровью
- 2) перерастяжение матки
- 3) гипотония матки

4) наличие добавочного рога матки

### **СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА ЭПИТЕЛИЕМ**

- 1) цилиндрическим мерцательным
- 2) зародышевым
- 3) кубическим
- 4) многослойным плоским

### **ОПРЕЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В**

- 1) паховых складках
- 2) локтевых сгибах
- 3) подмышечных впадинах
- 4) области коленного сустава

### **ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ НОВОРОЖДЕННОГО -**

- 1) короткая и узкая
- 2) короткая и широкая
- 3) длинная и узкая
- 4) длинная и широкая

### **ПОСЛЕ КУПАНИЯ КОЖНЫЕ СКЛАДКИ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ**

- 1) хлоргексидином
- 2) стерильным растительным маслом
- 3) спиртовым раствором
- 4) фукарцином

### **ДЛЯ БРУЦЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО**

- 1) спонтанная ремиссия во время беременности
- 2) тяжелое течение в послеродовом периоде
- 3) развитие преэклампсии и эклампсии
- 4) привычное невынашивание беременности

### **ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) удушье
- 2) кровотечение в раннем послеродовом периоде
- 3) гипертонический криз
- 4) приступ стенокардии

### **НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ РАВНА В САНТИМЕТРАХ**

- 1) 40
- 2) 30
- 3) 50
- 4) 70

### **КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) обладать необратимым действием
- 2) иметь сложные инструкции применения
- 3) быть низкоэффективным
- 4) быть экономически выгодным

**МИНИМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2700
- 2) 2000
- 3) 2500
- 4) 2300

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН В СМОТРОВЫХ КАБИНЕТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) онколог
- 2) акушерка
- 3) терапевт
- 4) медицинская сестра

**КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА ТРИЖДЫ ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СДАЕТ**

- 1) мазки на гормональную угрозу
- 2) кровь на группу и резус-фактор
- 3) кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоциты
- 4) мазки на скрытые инфекции

**МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) повышение социального благополучия
- 2) проведение медицинских осмотров
- 3) повышения материального благосостояния
- 4) улучшение условий труда и отдыха

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРАМИД (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипотензивное
- 2) диуретическое
- 3) антиаритмическое
- 4) противорвотное

**СИМПТОМ НЕРОВНОСТЕЙ КОНТУРОВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- 1) Пискачека
- 2) Снегирева
- 3) Горвица-Гегара
- 4) Отта

**ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК ПЕРЕНЕСШИХ АБДОМИНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бледность
- 2) сонливость
- 3) похудение
- 4) внутрибрюшинное кровотечение

**ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- 1) запорами
- 2) трихомонадным кольпитом
- 3) язвой желудка
- 4) бронхиальной астмой

**ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) появление отеков
- 2) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- 3) острая задержка мочи более 6 часов
- 4) недержание мочи

**ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ 1 СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРЯ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1,0
- 2) 0,5
- 3) 2,0
- 4) 1,5

**РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- 1) 30
- 2) 15
- 3) 60
- 4) 40

**ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ**

- 1) крестца, копчика
- 2) подвздошной, седалищной и лобковой
- 3) бедренной, симфиза
- 4) крестцового мыса, лобковой

**ВЫЯВЛЕНИЕ ЯИЦ В СОСКОБАХ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) лямблиоза
- 2) описторхоза
- 3) аскаридоза
- 4) энтеробиоза

**СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТСРОЧЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ**

- 1) часами после поступления в стационар
- 2) днями после поступления в стационар
- 3) минутами после поступления в стационар
- 4) неделями после поступления в стационар

**ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отхождение околоплодных вод
- 2) появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей
- 3) усиление шевеления плода
- 4) регулярное сокращение матки

**СРЕДИ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЛИДИРУЮТ**

- 1) уровень организации медицинской помощи
- 2) биологические
- 3) образ жизни
- 4) экологические

**БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕЕТ ФОРМУ**

- 1) округлую
- 2) треугольную
- 3) овальную
- 4) ромбовидную

**ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ, НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК, С КРОВОПОТЕРЕЙ БОЛЕЕ 150 МЛ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) гипоменореей
- 2) олигоменореей
- 3) гиперменореей
- 4) альгоменореей

**ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ**

- 1) 2 раза за беременность
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 2 раза в триместр
- 4) 1 раз в 2 месяца

**ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) гексопреналин (гинипрал)
- 2) динопрост
- 3) гексэстрол (синэстрол)
- 4) кальция хлорид

**ПРИОРИТЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКУШЕРКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТКИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ**

- 1) направление на консультацию к онкологу
- 2) проведение кольпоскопии
- 3) проведение лабораторного исследования
- 4) приглашение на повторный прием

### **ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- 1) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- 2) международная номенклатура заболеваний
- 3) международная классификация заболеваний и травм
- 4) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти

### **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- 1) создание оптимальных условий труда и отдыха
- 2) расширение ассортимента продуктов питания
- 3) гигиеническое воспитание подрастающего поколения
- 4) обеспечение высокого уровня общественного здоровья

### **ВОЗРАСТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 15-18 лет
- 2) 25-35 лет
- 3) 20-25 лет
- 4) 35-45 лет

### **ЗА ТРИ ДНЯ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) мясо, рыбу, творог
- 2) гречневую кашу, гранат
- 3) молоко, овощи, черный хлеб
- 4) яйца, белый хлеб, шоколад

### **В СЛУЧАЕ РОДОВ ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ И МАССЕ ПЛОДА 3800 ГРАММ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) классического акушерского пособия
- 2) родостимуляции
- 3) операции кесарево сечение
- 4) перенеотомии

### **КАРДИАЛЬНЫЙ СФИНКТЕР НОВОРОЖДЕННОГО РАЗВИТ**

- 1) удовлетворительно
- 2) хорошо
- 3) плохо
- 4) очень хорошо

### **К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТЕРОЛА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ОТНОСЯТ**

- 1) угрожающие преждевременные роды
- 2) маточные кровотечения, вызванные атонией матки
- 3) слабость родовой деятельности
- 4) прерывание беременности

### **ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- 1) на уровне дна матки
- 2) на уровне пупка
- 3) в положении лежа на боку
- 4) в положении стоя

### **ЖЕНЩИНА 35 ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ПЕРИОДЕ**

- 1) климактерическом
- 2) параменопаузальном
- 3) пубертатном
- 4) репродуктивном

### **НЕДОСТАТОЧНО ОБРАБОТАННЫЕ РУКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) фактором и источником передачи инфекции
- 2) источником инфекции
- 3) фактором передачи инфекции
- 4) механизмом передачи инфекции

### **ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отек
- 2) патологическая подвижность
- 3) боль
- 4) отсутствие активных движений в суставе

### **ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперлипидемия
- 2) переохлаждение
- 3) гиповитаминоз
- 4) гипотония

### **ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ФЕНКАРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лихорадка
- 2) алопеция
- 3) запор
- 4) сонливость

### **БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В**

- 1) толще малых половых губ

- 2) толще больших половых губ
- 3) шейке матки
- 4) влагалище

### **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ**

- 1) после нескольких абортов
- 2) при первой беременности
- 3) при второй беременности после нормальных первых родов
- 4) у первородящей без отягощенного анамнеза

### **ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- 1) недостаточности кровообращения
- 2) инфаркта миокарда
- 3) стенокардии
- 4) гипертонической болезни

### **ПРИ НАГРУБАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ**

- 1) обезболивающую мазь
- 2) спиртовой компресс
- 3) сцеживание груди
- 4) орошение фурациллином

### **ПРИЧИНОЙ ТРЕЩИН НА СОСКАХ У РОДИЛЬНИЦЫ ЧАЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) гипогалактия
- 2) неправильное прикладывание ребенка к груди
- 3) несоблюдение женщиной гигиены
- 4) нагрубание молочных желез

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАМКАХ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГТОВКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ**

- 1) фолиевую кислоту
- 2) витамин С
- 3) рыбий жир
- 4) витамин В12

### **ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) выплату материнского капитала
- 2) трудовой отпуск
- 3) безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности
- 4) отпуск по уходу за ребенком

### **РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- 1) преждевременным родам

- 2) запоздалым родам
- 3) слабой родовой деятельности
- 4) не оказывает влияние на беременность

**ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «РЕБРНЫЙ» ИМЕЕТ СЛОВАРНУЮ ФОРМУ**

- 1) costalis, e
- 2) costalis, a, um
- 3) costalis, is
- 4) costalis, ior

**ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 1
- 4) 3

**К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) боли в икроножных мышцах при ходьбе, зябкость конечностей
- 2) отеки, повышение артериального давления
- 3) одышка, аритмия
- 4) слабость, тахикардия

**ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ КРОВОХАРКАНИИ И ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

- 1) положить пузырь со льдом на грудную клетку
- 2) приподнять головной конец туловища
- 3) усадить и успокоить пациента
- 4) ставить банки и горчичники на грудную клетку

**СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2500-3000
- 2) 3500-4000
- 3) 2000-2500
- 4) 3000-3500

**СОХРАНЯЮЩИЙСЯ НА 3-4-Й ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ**

- 1) кишечной непроходимости
- 2) послеоперационного перитонита
- 3) формировании свища
- 4) расхождении швов

**АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ**

- 1) кори
- 2) полиомиелита
- 3) гриппа
- 4) дифтерии

**В ОТЛИЧИЕ ОТ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ РОДОВЫХ ПУТЕЙ  
МАТКА**

- 1) дряблая
- 2) плотная
- 3) асимметричная
- 4) мягкая

**ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ринит
- 2) отит
- 3) ларингит
- 4) трахеит

**СРОКИ ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШЕЕЧНОГО ЗЕВА ПОСЛЕ РОДОВ В ДНЯХ  
СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 14
- 2) 20
- 3) 3
- 4) 7

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) травма мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
- 2) появление отеков
- 3) острая задержка мочи более 6 часов
- 4) недержание мочи

**ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ КАК**

- 1) дегтеобразный
- 2) кровянистый
- 3) обесцвеченный
- 4) жирный

**ЧАЩЕ ВСЕГО У БЕРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- 1) гемолитическая анемия
- 2) постгеморрагическая анемия
- 3) железодефицитная анемия
- 4) апластическая анемия

**ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ  
ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) скудные, безболезненные менструации
- 2) обильные длительные, болезненные менструации
- 3) обильные пенистые выделения из половых путей
- 4) межменструальные кровянистые выделения

#### **ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) не проводится
- 2) вечером накануне операции и утром в день операции
- 3) только утром в день операции
- 4) за два дня до операции

#### **МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рефлексотерапия
- 2) эпидуральная анестезия
- 3) аудиоанальгезия
- 4) гидротерапия

#### **ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дисменореей
- 2) аменореей
- 3) меноррагией
- 4) ациклическим маточным кровотечением

#### **ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- 1) стерильной пробиркой
- 2) стерильной банкой
- 3) сухой пробиркой
- 4) сухой банкой

#### **ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутривенное введение преднизолона и адреналина
- 2) наложение жгута
- 3) подготовка аптечки для оказания помощи при анафилактическом шоке
- 4) введение антигистаминных препаратов

#### **«МАТКА КУВЕЛЕРА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) многоводии
- 2) предлежании плаценты
- 3) преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты
- 4) слабости родовой деятельности

#### **НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМ БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) серозный менингит
- 2) увеличение селезёнки
- 3) интоксикация

4) параличи

**ПОЛОЖЕНИЕМ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лежа с опущенным головным концом
- 2) лежа на спине без подушки, голова повернута набок
- 3) лежа на боку без подушки
- 4) полусидя, с опорой на подушку

**К ПРЕПАРАТАМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) железа сульфат + аскорбиновая кислота (ферроплекс)
- 2) мальтофер
- 3) тотема
- 4) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)

**ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) ограничение жидкости и соли
- 2) увеличение жидкости и белков
- 3) ограничение жиров и углеводов
- 4) увеличение жиров и белков

**РАСТВОР БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) противовирусные
- 2) антигистаминные
- 3) антибиотики
- 4) красители

**ЛИХОРАДКА, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) мимолетная
- 2) острая
- 3) хроническая
- 4) подострая

**СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) 48-72 часа после поступления в стационар
- 2) 8-10 дней после поступления в стационар
- 3) 2-4 часа после поступления в стационар
- 4) 24-48 часов после поступления в стационар

**БОЛЕЗНЬ «БЕРИ-БЕРИ» РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА**

- 1) рибофлавин
- 2) тиамин бромид
- 3) цианокобаламин
- 4) эргокальциферол

### **ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ ЧЕРЕЗ**

- 1) 1-2 недели
- 2) 3-4 дня
- 3) 1-2 дня
- 4) 1-2 месяца

### **НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ**

- 1) от 0 до 15 лет и 50 лет и старше
- 2) от 1 до 10 лет и от 10 до 15 лет
- 3) от 19 до 59 лет и 50 лет и старше
- 4) от 15 до 49 лет и 60 лет и старше

### **ТЕРМИН «ANGI...» (СОСУДИСТАЯ ОПУХОЛЬ) ИМЕЕТ СУФФИКС**

- 1) -iasis
- 2) -ismus
- 3) -itis
- 4) -oma

### **ЦЕЛЮ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спасение жизни человека
- 2) борьба с факторами риска
- 3) завершение патологического процесса
- 4) профилактика рецидивов болезни

### **АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНА**

- 1) только при высокой температуре
- 2) для профилактической меры
- 3) только при длительном безводном периоде
- 4) только при абсолютных показаниях

### **«ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ**

- 1) легких
- 2) почек
- 3) сердца
- 4) центральной нервной системы (ЦНС)

### **БИОМЕХАНИЗМ РОДОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) дополнительный внутренний поворот плечиков
- 2) запрокидывание головки кзади
- 3) запрокидывание ручек
- 4) сгибание и внутренний поворот головки

### **ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) шигелла
- 2) эшерихия
- 3) сальмонелла
- 4) энтеровирус

### **ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПОКАЗАНО**

- 1) применение антибиотиков широкого спектра действия
- 2) проведение регидратации
- 3) введение антитоксической сыворотки по методу Безредко
- 4) прерывание беременности

### **КУРЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- 1) не оказывает влияния на беременность
- 2) гипертрофии плода
- 3) гипотрофии плода
- 4) чрезмерной родовой деятельности

### **НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ**

- 1) до 12 недель беременности
- 2) во 2-м и 3-м триместрах беременности и в родах
- 3) в первый месяц беременности
- 4) в первую неделю беременности

### **ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) прерывание беременности
- 2) роды
- 3) миому матки
- 4) кисту яичника

### **ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) кисломолочных продуктов
- 2) отварного мяса
- 3) хлеба грубого помола
- 4) легкоусвояемых углеводов

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) органами местного самоуправления
- 2) Правительством РФ
- 3) коллективным договором
- 4) правилами внутреннего распорядка

### **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ НЕ**

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом периоде
- 2) прием антиретровирусных препаратов во время
- 3) грудное вскармливание
- 4) плановое кесарево сечение

### **СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) за сутки до операции
- 2) накануне операции
- 3) непосредственно перед операцией
- 4) в день операции

### **ПОД ГЕМАТОКРИТОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ К**

- 1) тромбоцитам
- 2) лейкоцитам
- 3) плазме
- 4) сыворотке

### **УДАЛЕНИЕ РОДИВШЕГОСЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ОТНОСЯТ К**

- 1) средним гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) малым гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

### **НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 25-28-31-20
- 2) 22-25-28-18
- 3) 28-29-32-15
- 4) 20-23-25-17

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) утеротоническую терапию
- 2) физические факторы воздействия
- 3) гормонотерапию
- 4) антибактериальную терапию

### **К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ОТНОСЯТ**

- 1) недомогание, моноартрит с деформацией
- 2) повышение температуры, стойкая деформация суставов
- 3) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
- 4) поражение мелких суставов, скованность

### **КАБИНЕТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ВРАЧ ОСМАТРИВАЕТ ПАЦИЕНТА, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) диагностическая
- 2) санпропускник
- 3) смотровой
- 4) клизменная

#### **ГРАНИЦЫ СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (°С) ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 38,1-40
- 2) 36,1-37,3
- 3) 39,1-40
- 4) 37,1-38

#### **ПРИ ОПЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОБЯЗАННОСТЬ АКУШЕРКИ ВХОДИТ**

- 1) обезболивание пациентки
- 2) подготовка беременной
- 3) беседа с родственниками
- 4) наложение на шейку матки циркулярного шва в области внутреннего зева

#### **СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) можно не учитывать для прогноза родов
- 2) понижены
- 3) повышены
- 4) не изменены

#### **К АДАптиРОВАННЫМ КИСЛЫМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) «Хипп комбиотик»
- 2) цельный кефир
- 3) «Бифилакт»
- 4) «Симилак»

#### **ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ**

- 1) прогестерон
- 2) эстрадиол
- 3) инсулин
- 4) окситоцин

#### **В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО МОЛОКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) фруктовые соки
- 2) молочные смеси
- 3) молочные каши
- 4) овощные отвары

#### **К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КРАПИВНИЦЫ ОТНОСЯТ**

- 1) тошнота, рвота

- 2) боль за грудиной, одышка
- 3) одышка, сухой кашель
- 4) сыпь, кожный зуд

### **СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ**

- 1) временным
- 2) сезонным
- 3) обратимым
- 4) необратимым

### **ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость
- 2) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость, смертность
- 3) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- 4) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость

### **ГРАНИЦАМИ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
- 2) проекции вертлужных впадин, середина крестца
- 3) низ симфиза, седалищные ости, мыс
- 4) низ симфиза, седалищные бугры, край копчика

### **ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 100-110
- 2) 120-160
- 3) 105-110
- 4) 170-180

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ХОРИОНКАРЦИНОМА ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ**

- 1) абортов
- 2) пузырного заноса
- 3) выкидышей
- 4) родов

### **НОРМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ. РТ. СТ.) ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) 140-159
- 2) 100-139
- 3) 90-100
- 4) 60-89

### **ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- 1) бронхиальной астмой
- 2) язвой желудка
- 3) запорами
- 4) нейроэндокринными синдромами

### **МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН - ОТДЫХ ПОКАЗАН**

- 1) всем роженицам без исключения
- 2) во втором периоде родов
- 3) при патологическом прелиминарном периоде
- 4) в раннем послеродовом периоде

### **АСПИРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) лапароскопическим гинекологическим операциям
- 4) средним гинекологическим операциям

### **БЕРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАН**

- 1) азитромицин
- 2) ванкомицин
- 3) стрептомицин
- 4) умифеновир (арбидол)

### **ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) через два посещения
- 2) при каждом посещении
- 3) только при наличии показаний
- 4) через одно посещение

### **ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) безопасную беременность и уход до родов, в период родов и после родов
- 2) трудовой отпуск
- 3) отпуск по уходу за ребенком
- 4) выплату материнского капитала

### **К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ДВС-СИНДРОМА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дефицит VII фактора свертывания крови
- 2) массивное кровотечение
- 3) выделение в кровь фибринолитических веществ
- 4) преэклампсии и эклампсии

### **ЧИСЛО АБОРТОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УРОВЕНЬ**

- 1) материальной обеспеченности
- 2) отношений в паре

- 3) тяжелой заболеваемости беременных
- 4) фертильности

### **ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) динамометр
- 2) тонометр
- 3) весы
- 4) урومتر

### **СРОКАМИ ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 22-27
- 2) 28-33
- 3) 34-37
- 4) 38-42

### **ДЛЯ МЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РОЖЕ ХАРАКТЕРНЫ**

- 1) гиперемия с чёткими контурами
- 2) рыхлый отёк
- 3) колликвационный некроз
- 4) кольцевидная эритема

### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗЕРВОМ**

- 1) снижения частоты вирусных инфекций
- 2) повышения госпитализаций
- 3) снижения онкологических заболеваний женских половых органов
- 4) повышения иммунизации

### **ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) судороги
- 2) непроизвольное мочеиспускание
- 3) кожный зуд
- 4) асфиксия

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЙОДИРОВАТЬ**

- 1) сахар, конфеты
- 2) крупы, молоко
- 3) хлеб, поваренную соль
- 4) растительное масло, маргарин

### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРЕДНИЗОЛОН ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) местноанестезирующее
- 2) гемостатическое
- 3) иммуномодулирующее
- 4) противовоспалительное

**ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ**

- 1) три дополнительных выходных дня
- 2) один выходной без сохранения заработной платы
- 3) один оплачиваемый выходной день
- 4) три оплачиваемых дня

**ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бициллин 1
- 2) рифампицин
- 3) амоксициллин
- 4) азитромицин

**К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- 1) инсульт, инфаркт миокарда
- 2) обморок, коллапс
- 3) ревматизм, порок сердца
- 4) пневмония, плеврит

**ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) себорея
- 2) милия
- 3) лануго
- 4) склерема

**В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФУНКЦИЮ**

- 1) социальную
- 2) репродуктивную
- 3) воспитательную
- 4) психоэмоциональную

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) разрыв промежности
- 2) лактастаз и трещины сосков
- 3) асимметрия молочных желез
- 4) низкий вес плода

**ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) амоксициллин
- 2) азитромицин
- 3) рифампицин
- 4) бициллин 1

**ЖЕНЩИНЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕСЯ ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ**

## **ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- 1) I
- 2) V
- 3) III
- 4) II

## **ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ**

- 1) редкое, с длительным апноэ
- 2) поверхностное, неритмичное
- 3) частое, глубокое
- 4) не нарушено

## **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 30-32
- 2) 28-29
- 3) 20-21
- 4) 25-26

## **К СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ОТНОСЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В**

- 1) Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством
- 2) Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- 3) Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством.
- 4) Фонд обязательного медицинского страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

## **ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА БОБРОВА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) дистиллированную воду
- 2) 5% раствор калия перманганата
- 3) 3% раствор перекиси водорода
- 4) 0,9% раствор натрия хлорида

## **ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С ЦЕНТРА НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ**

- 1) Шредера
- 2) Гентера
- 3) Дункана

4) Шульца

**РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ**

- 1) от 15 до 20 лет
- 2) от 15 до 49 лет
- 3) от 15 до 30 лет
- 4) от 15 до 40 лет

**ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА В ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ КАТЕТЕР НЕОБХОДИМО**

- 1) промыть и закрыть катетер
- 2) закрыть катетер пробкой и этим ограничиться
- 3) поставить «гепариновую пробку» и закрыть катетер
- 4) поставить «гепариновую пробку» и этим ограничиться

**В ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ**

- 1) бруцеллёз
- 2) туляремия
- 3) чума
- 4) сальмонеллёз

**«ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) применение гипотензивных средств
- 2) внутривенное введение 25% раствора магния сульфата
- 3) применение диуретиков
- 4) переливание 10-20% раствора альбумина с целью восполнения дефицита белка

**КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА СИФИЛИС В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 1

**ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) горчичники
- 2) обильное питье
- 3) обливание прохладной водой
- 4) оксигенотерапию

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 40 дней
- 2) 120 дней

- 3) 20 дней
- 4) 80 дней

**СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В**

- 1) гипофизе
- 2) яичниках
- 3) надпочечниках
- 4) синцитиотрофобласте

**ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ**

- 1) бесплодии
- 2) эрозии шейки матки
- 3) внематочной беременности
- 4) кисте яичника

**К ОСОБЕННОСТЯМ ТКАНИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) мало соединительной ткани
- 2) много эластической ткани
- 3) большое количество альвеол
- 4) малая воздушность

**МЕТОДОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биологический метод
- 2) барьерный метод
- 3) внутриматочная контрацепция
- 4) метод гормональной контрацепции

**НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (В ГР)**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 20

**ПОЛИМОРФИЗМ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) скарлатины
- 2) кори
- 3) ветряной оспы
- 4) краснухи

**ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ ТУБЕРКУЛИН РЕБЕНКУ ВВОДЯТ**

- 1) внутривенно
- 2) подкожно
- 3) внутрикочно
- 4) внутримышечно

**ПРИ МНОГОВОДИИ В РОДАХ ВСКРЫТИЕ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ**

- 1) на высоте схватки
- 2) не раньше раскрытия шейки матки на 8 см
- 3) при полном раскрытии
- 4) при раскрытии шейки на 3-4 см вне схватки

**МЕКОНИЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) до 2 недель жизни
- 2) в течение первого месяца жизни
- 3) в течение первой недели
- 4) в первые 2-3 дня

**РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА ГОЛОВКИ ПЛОДА ДО ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- 1) малым косым
- 2) вертикальным
- 3) большим косым
- 4) прямым

**ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЁННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ**

- 1) раствором новокаина
- 2) жиром
- 3) 96% этиловым спиртом
- 4) холодной водой до онемения

**ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) постоянное применение гинекологических орошений
- 2) ограничение двигательной активности
- 3) профилактический прием антибактериальных препаратов
- 4) своевременное лечение последствий родовых травм

**СОГЛАСИЕ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- 1) необязательно получать
- 2) обязательно получать в любом случае
- 3) необязательно, если имеется угроза его жизни
- 4) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием

**ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) общий цианоз кожи
- 2) бледность, «мраморный» рисунок
- 3) желтушное окрашивание

4) гиперемия и шелушение кожи

**ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) кровоизлиянии в жизненно важные органы
- 2) прибавке веса
- 3) похудении
- 4) изменении настроения

**ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ИМЕЮЩИМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ УРОДСТВА ПЛОДА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ СРОКЕ 13-14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острый ринит
- 2) краснуха
- 3) острый трахеит
- 4) ветрянка

**ТРИСОМИЯ ПО 13 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- 1) синдрома Эдвардса
- 2) синдрома Дауна
- 3) синдрома Патау
- 4) «кошачьего крика»

**ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С АЦИКЛИЧЕСКИМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) полименореей
- 2) менометроррагией
- 3) гипоменореей
- 4) альгоменореей

**ПЕРВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**

- 1) ногах
- 2) туловище
- 3) лице
- 4) руках

**ОКРУЖНОСТЬ 33 СМ ПРИ ДИАМЕТРЕ 10 СМ ИМЕЕТ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА**

- 1) средний косой
- 2) прямой
- 3) большой косой
- 4) малый косой

**ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА ПРОТИВОПОКАЗАНА**

- 1) у беременных с миопией средней степени
- 2) при сроке беременности 30-35 недель
- 3) при рубце на матке

4) у беременных старше 30 лет

### **ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОКСИТОЦИНА**

- 1) кровотечение во время родов с нарушением сократительной способности матки
- 2) купирование приступа стенокардии
- 3) купирование приступа бронхиальной астмы
- 4) купирование приступа судорог

### **ФАКТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) характер заболевания
- 2) особенности начала заболевания
- 3) объем предстоящей операции
- 4) время поступления в стационар

### **ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) дивигеля
- 2) дексаметазона
- 3) перорального приема микронизированного прогестерона
- 4) эндовагинального применения микронизированного прогестерона

### **ЖЕНЩИНА, В АНАМНЕЗЕ У КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА, ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТА**

- 1) нефролога
- 2) невропатолога
- 3) венеролога
- 4) онколога

### **ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) вертикальное ношение на руках
- 2) кормление, лежа в кроватке
- 3) частое пеленание
- 4) сон без подушки

### **ОПРЕЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) воспалением подкожно- жировой клетчатки
- 2) некротическим повреждением ткани
- 3) воспалением кожи в области естественных складок
- 4) воспалением мышечной ткани

### **ПРИ ОСМОТРЕ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МОЖНО ВЫЯВИТЬ**

- 1) рак кожи
- 2) рак эндометрия
- 3) опухоль яичников

4) рак мочевого пузыря

### **ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЮТ**

- 1) предвестниковым
- 2) послеродовым
- 3) последовым
- 4) прелиминарным

### **ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЯМОЙ КИШКЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)**

- 1) 5-6
- 2) 3-5
- 3) 11-12
- 4) 7-10

### **ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ С ОТСЛОЙКОЙ ЭПИДЕРМИСА И ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ СО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ**

- 1) 1 степени
- 2) 2 степени
- 3) 4 степени
- 4) 3 степени

### **РАЗВИТИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОБЫЧНО СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- 1) стрептококковыми
- 2) вирусными
- 3) паразитарными
- 4) грибковыми

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ОРВИ) У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лейкоз
- 2) пневмония
- 3) туберкулез
- 4) сахарный диабет

### **ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ**

- 1) необходима за 1 час
- 2) необходима непосредственно перед операцией
- 3) необходима в любом случае
- 4) противопоказана

### **КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ**

- 1) щитовидной железой

- 2) гипофизом
- 3) плацентой
- 4) гипоталамусом

**ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 9,5-11
- 2) 12
- 3) 12,5
- 4) 11

**ПРЕПАРАТ ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) гомеопатические средства
- 2) противовирусные средства
- 3) антибиотики
- 4) витамины

**ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ, ЕЁ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) уменьшить физические нагрузки
- 2) наблюдать амбулаторно
- 3) госпитализировать для обследования
- 4) прервать беременность

**РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) консультирование по физиотерапии
- 2) консультирование по лечебной гимнастике
- 3) консультирование по санаторно-курортному лечению
- 4) мониторинг репродуктивного поведения женщин после родов и искусственного прерывания беременности

**СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПАТРОНАЖА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДДОМА В ДНЯХ**

- 1) 8-10
- 2) 4-6
- 3) 1-3
- 4) 5-7

**ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА**

- 1) горизонтальное
- 2) горизонтальное с приподнятыми ногами
- 3) сидя, с упором на руки
- 4) лежа на боку

### **ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительный постельный режим
- 2) диарея
- 3) запор
- 4) чрезмерная физическая нагрузка

### **ДЛЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ ОСОБЕННОСТИ**

- 1) хорошо развиты
- 2) не сформированы
- 3) не имеют протоков
- 4) развиты, но не функционируют

### **ГИПЕРЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) увеличением кровенаполнения ткани
- 2) сдавлением ткани
- 3) уменьшением кровенаполнения ткани
- 4) нарушением восстановления структур ткани

### **ПОД ПОЗИЦИЕЙ ПЛОДА ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) отношение головки плода к входу в таз
- 2) отношение спинки плода к боковым стенкам матки
- 3) взаимоотношение различных частей плода
- 4) отношение оси плода к оси (длиннику) матки

### **КЛЕТКИ КРОВИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НОСЯТ НАЗВАНИЕ**

- 1) эритроциты
- 2) лейкоциты
- 3) фибриноген
- 4) тромбоциты

### **К ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТСЯ ПРИЗНАКИ**

- 1) носовые ходы узкие, слабая васкуляризация
- 2) носовые ходы узкие, хорошая васкуляризация
- 3) носовые ходы широкие, слабая васкуляризация
- 4) носовые ходы широкие, хорошая васкуляризация

### **ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) напоить пациентку
- 2) побеседовать с родственниками
- 3) накормить пациентку
- 4) получить письменное согласие пациентки на экстренное оперативное вмешательство

### **ПРИ СИНДРОМЕ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ**

- 1) наблюдается гипертензия
- 2) самочувствие не страдает
- 3) повышается объем циркулирующей крови
- 4) затруднен возврат крови к сердцу из нижних конечностей

### **БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 12
- 2) 14
- 3) 16
- 4) 20

### **ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) надропарин кальция (фраксипарин)
- 2) цетиризин (зиртек)
- 3) нитрофурил
- 4) амоксициллин (амосин)

### **К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТ**

- 1) лихорадка, нарушение слуха
- 2) головная боль, снижение артериального давления
- 3) повышение артериального давления, гипергликемия, синдром Иценко-Кушинга
- 4) одышка, легочное кровотечение

### **ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) интерферон
- 2) папаверин
- 3) холосас
- 4) пенициллин

### **ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) сальбутамол
- 2) магния сульфат
- 3) энзапрост (динопрост)
- 4) эргометрина малеат

### **ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ**

- 1) для лучшего отхождения мокроты
- 2) облегчения боли
- 3) в силу ослабленного состояния
- 4) для удобства проведения манипуляции

### **ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) температура тела 40 градусов, озноб

- 2) умеренное нагрубание молочных желез
- 3) повышение артериального давления
- 4) свободное отделение молока

### **ОСОБЕННОСТЬЮ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поясничный лордоз
- 2) шейный лордоз
- 3) отсутствие изгибов
- 4) грудной кифоз

### **ПОРЦИИ КАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ СОБИРАЕТСЯ ИЗ**

- 1) четырех мест
- 2) одного места
- 3) трех мест
- 4) двух мест

### **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ АНАЛИЗИРУЮТ ПО ДАННЫМ**

- 1) санаторно-курортного лечения
- 2) профилактической работы и ее результатов
- 3) паллиативного лечения
- 4) физиотерапевтического лечения

### **ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ ПРОЛАКТИНА ПРИ ЛАКТАЦИОННОМ МАСТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бромокриптин
- 2) азитромицин (сумамед)
- 3) окситоцин
- 4) метилэргометрин

### **ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЗОНДА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) газоотводную трубку
- 2) дуоденальный зонд
- 3) тонкий желудочный зонд
- 4) толстый желудочный зонд

### **ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) предупредить западение языка, аспирацию рвотными массами
- 2) держать руки беременной
- 3) осуществить переливание плазмы крови
- 4) ничего не делать

### **К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) цетиризин (зиртек)
- 2) нодропарин кальция (фраксипарин)

- 3) амоксициллин (амосин)
- 4) нитрофурил

### **ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) улучшение состояния пациентки
- 2) санация очагов инфекции
- 3) обследование сердечно-сосудистой системы
- 4) комплексная подготовка пациентки к операции

### **ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕЛКА В МОЧЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать родственников
- 2) назначить диуретики
- 3) повторить анализ
- 4) собрать анамнез

### **К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИТОВ ОТНОСЯТ**

- 1) курение
- 2) бактериальную и вирусную инфекцию
- 3) переохлаждение
- 4) алкоголизм

### **У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ У МАТЕРИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ**

- 1) необходимо исследовать кровь на сахар
- 2) чаще всего бывает гипергликемия
- 3) обычно выражена гипотрофия
- 4) кожные покровы, как правило, бледные

### **ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 32
- 2) 34
- 3) 36
- 4) 26

### **С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОГО РОДРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) кесарево сечение
- 2) экстракцию плода за тазовый конец
- 3) вакуум-экстракцию плода
- 4) плодоразрушающую операцию

### **ВО ВРЕМЯ ПОТУГ ХАРАКТЕРНО**

- 1) расслабление мышц брюшного пресса
- 2) расслабление мышц тазового дна
- 3) уменьшение внутрибрюшного давления
- 4) повышение внутрибрюшного давления

### **ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) окситоцин
- 2) прогестерон
- 3) метамизол натрия (анальгин)
- 4) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)

### **ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бактериоскопия
- 2) лапароскопия
- 3) биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием
- 4) пункция заднего свода влагалища

### **К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ**

- 1) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях
- 2) отсутствие сознания, дыхания, аритмия
- 3) нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз
- 4) отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия

### **ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПОСЛЕ ОТХОЖДЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 20-30
- 2) 30-40
- 3) 15-20
- 4) 5-10

### **К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) восходящая инфекция мочевых путей
- 3) стресс
- 4) переохлаждение

### **ВЛИЯНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ**

- 1) угнетают
- 2) понижают
- 3) не изменяют
- 4) повышают

### **ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) поставить горчичники
- 2) провести кровопускание
- 3) поставить банки
- 4) напоить пациента крепким горячим чаем

**ИСТИННАЯ ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – ЭТО ДЕФЕКТ ЭПИТЕЛИЯ**

- 1) мерцательного
- 2) цилиндрического
- 3) многослойного плоского
- 4) кубического

**ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 30
- 2) 26
- 3) 32
- 4) 27

**ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) остановка сердца
- 2) нагноение раны
- 3) лигатурные свищи
- 4) плевропневмония

**ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) гангреной, омертвением всех тканей
- 2) отеком, покалыванием
- 3) гиперемией, болью
- 4) мраморностью кожи

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В МЕСЯЦАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 6

**ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 40-60
- 2) 16-20
- 3) 30-35
- 4) 100-120

**В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РОДАХ ПОКАЗАНО**

- 1) кесарево сечение
- 2) перенеотомия
- 3) акушерские щипцы
- 4) проведение родостимуляции

**ГОМК – СОКРАЩЁННОЕ НАЗВНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

- 1) гаммаоксимасляная кислота
- 2) аминокaproновая кислота
- 3) этамзилат натрия
- 4) оксипрогестеронакапронат

#### **БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ**

- 1) 220
- 2) 280
- 3) 260
- 4) 300

#### **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА СМЕШАННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дисфагия
- 2) паратрофия
- 3) недокорм
- 4) срыгивание

#### **ВТОРАЯ ФАЗА ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) патологическим типом дыхания
- 2) апноэ
- 3) дыханием форсированным
- 4) дыханием нормальным

#### **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ СЕРОЗНОГО МАСТИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) холод, поддерживающую повязку
- 2) обработку железы этиловым спиртом
- 3) повязку с хлоргексидином
- 4) разрез, поддерживающую повязку

#### **БЕРЕМЕННОСТЬ, НАСТУПИВШАЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «В»,**

- 1) приводит к спонтанному выздоровлению
- 2) способствует формированию токсического гепатита
- 3) не влияет на течение гепатита
- 4) повышает риски обострения гепатита

#### **«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) УЗИ и определение хорионального гонадотропина человека в сыворотке крови
- 2) бимануальное исследование
- 3) осмотр в зеркалах
- 4) кульдоцентез

#### **СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К СРЫГИВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) слабым развитием кардиального сфинктера
- 2) хорошим развитием кардиального сфинктера

- 3) слабым развитием пилорического сфинктера
- 4) хорошим развитием пилорического сфинктера

**ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К ГРУДИ**

- 1) через 2 час
- 2) через 1 день
- 3) через 1 час
- 4) сразу после родов

**ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «Е» У БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) преобладанием безжелтушных форм
- 2) развитием печеночной недостаточности
- 3) замедленным антителообразованием
- 4) наиболее тяжелым течением в 1 триместре

**ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) угнетение сосудодвигательного центра
- 2) снижение сократительной способности миокарда
- 3) расширение венозного отдела сосудистого русла
- 4) уменьшение объема циркулирующей крови

**ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) медицинское свидетельство о рождении ребенка
- 2) свидетельство о браке
- 3) заявление 2 свидетелей
- 4) свидетельство о рождении

**РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРАВИЛОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дробное и частое питание (5-6 раз в день)
- 2) редкое питание утром и вечером (2 раза в день)
- 3) перенос основного объема пищи на ужин
- 4) перенос основного объема пищи на завтрак

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 37
- 2) 38
- 3) 35
- 4) 40

**ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) улучшение подвижности крестцово-подвздошных сочленений

- 2) укрепление мышц живота и промежности
- 3) укрепление мышц верхнего плечевого пояса
- 4) укрепление грудных мышц

### **АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ ДЕТЯМ**

- 1) туберкулином
- 2) сывороткой
- 3) человеческим иммуноглобулином
- 4) живой коревой вакциной

### **ЦЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- 1) лишение человека способности к воспроизводству потомства
- 2) лишение человека способности к воспроизводству при психических заболеваниях
- 3) только как метод контрацепции
- 4) лишение человека способности к воспроизводству потомства и как метод контрацепции

### **КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) 2 раза в месяц
- 2) 1 раз в 2 месяца
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 3 раза за беременность

### **РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гидроперикард
- 2) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
- 3) гидроторакс
- 4) увеличение живота

### **НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) синтетических аналогов женских половых гормонов
- 2) антибиотиков широкого спектра действия
- 3) антиретровирусных препаратов
- 4) цитостатиков

### **К СТЕПЕНИ "ГЛУБОКОГО" ОЖОГА ОТНОСИТСЯ СТАДИЯ**

- 1) IIIa
- 2) II
- 3) IIIб
- 4) I

### **ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сердечно-сосудистый фактор
- 2) эндокринный фактор
- 3) нервно-мышечный фактор
- 4) желудочно-кишечный фактор

**К АГГЛЮТИНОГЕНАМ I ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСЯТ**

- 1) АВ
- 2) 0
- 3) В
- 4) А

**НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- 1) винпоцетин (кавинтон)
- 2) хлоропирамин (супрастин)
- 3) валидол
- 4) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)

**ПОЛОСТЬ РТА ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИРАЮТ**

- 1) только при крайней необходимости
- 2) один раз в день
- 3) три раза в день
- 4) после каждого кормления

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ ДО (%)**

- 1) 14
- 2) 8
- 3) 30
- 4) 20

**СМЕСЬ ИЗ СОСКИ ДОЛЖНА ВЫТЕКАТЬ**

- 1) быстро
- 2) редкими каплями
- 3) тонкой струйкой
- 4) обильно

**ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЖЕНЩИН, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) федеральный научно-исследовательский центр
- 2) отделение гинекологии
- 3) женская консультация
- 4) перинатальный центр

**ПРИ ПОПАДНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) некроз мягких тканей

- 2) тромбофлебит
- 3) абсцесс
- 4) инфильтрат

**К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дексаметазон
- 2) триамцинолон (полькортолон)
- 3) преднизолон
- 4) беклометазон

**РОДЫ СЧИТАЮТСЯ ЗАПОЗДАНЫМИ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ (-ЛИ)**

- 1) 40
- 2) 39
- 3) 41
- 4) 43

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 120
- 2) 180
- 3) 60
- 4) 15

**ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) гистероскопии
- 2) вагиноскопии
- 3) лапароскопии
- 4) санитарно-просветительной работы

**ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) матка Кувелера
- 2) пельвиоперитонит
- 3) острая анемия
- 4) абсцесс

**ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) досрочное вскрытие плодного пузыря
- 2) плановую госпитализацию за 2 недели до родов
- 3) экстренную операцию кесарева сечения
- 4) поворот плода на ножку

**К ОПЕРАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧАВАЮЩИМ ТОЛЬКО ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) пробные

- 2) радикальные
- 3) симптоматические
- 4) паллиативные

#### **ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЮ ОТНОСЯТ К**

- 1) большим гинекологическим операциям
- 2) малым гинекологическим операциям
- 3) средним гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

#### **К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) отрыв конечностей
- 2) угнетение дыхания
- 3) фибрилляция желудочков сердца
- 4) кровотечения и переломы

#### **ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ**

- 1) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- 2) на уровне пупка
- 3) достигает мечевидного отростка
- 4) на середине расстояния между пупком и лоном

#### **СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ**

- 1) только в ситуациях, возникших неожиданно
- 2) только в следствии стихийных бедствий
- 3) при утрате имущества
- 4) в определенных случаях изменения социального или материального положения

#### **К ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**

- 1) повторное заражение
- 2) применение антибиотиков
- 3) хирургическое лечение карбункула
- 4) введение противосибирязвенного иммуноглобулина

#### **К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ**

- 1) сухой кашель, одышка
- 2) снижение памяти, запоры
- 3) отеки, боли в пояснице
- 4) жажда, кожный зуд

#### **ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОЗЖЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) гаметопатии
- 2) фетопатии
- 3) зиготопатии

4) эмбриопатии

### **ТИП ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ**

- 1) стабильный
- 2) регрессивный
- 3) смешанный
- 4) прогрессивный

### **НОВОРОЖДЕННОМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВСКАРМЛИВАНИЕ**

- 1) естественное
- 2) смешанное
- 3) искусственное
- 4) парентеральное

### **К НАРУЖНОМУ СЛОЮ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ АППАРАТ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ**

- 1) подвздошно- копчиковые
- 2) седалищно- копчиковые
- 3) лобково-копчиковые
- 4) седалищно-пещеристые

### **ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 0,5%
- 2) 0,6%
- 3) 1%
- 4) 5%

### **ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический гастрит
- 2) перенесенная ранее венозная тромбоэмболия
- 3) бронхиальная астма
- 4) хронический пиелонефрит

### **К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
- 2) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
- 3) длительный субфебрилитет, утомляемость
- 4) отеки, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца

### **ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРОВОДИТСЯ ПРИ**

- 1) чисто ягодичном предлежании плода
- 2) ножном предлежании плода
- 3) поперечном положении плода
- 4) косом положении плода

### **ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) близкому родственнику
- 2) только матери ребенка
- 3) отцу ребенка
- 4) члену семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком

### **КОНТРОЛЬ КРОВИ НА АНТИТЕЛА ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДЯТ**

- 1) 3 раза
- 2) 2 раза
- 3) 1 раз
- 4) 1 раз в месяц

### **КОСТНАЯ ТКАНЬ НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) содержит мало воды
- 2) бедна органическими веществами
- 3) плохо кровоснабжена
- 4) склонна к деформации

### **ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать родственников
- 2) проинформировать врача о сложившейся ситуации
- 3) изменить диету
- 4) изолировать пациентку

### **КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ**

- 1) коллапса
- 2) острой дыхательной недостаточности
- 3) острой коронарной недостаточности
- 4) легочному кровотечению

### **ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АНЕМИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) сроки определяются по желанию женщины
- 2) чаще обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- 3) в обычные сроки по стандарту наблюдения за беременной
- 4) реже обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной

### **СЫПЬ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ НА**

- 1) конечностях
- 2) лице
- 3) туловище
- 4) любых участках тела

**СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 26
- 2) 28
- 3) 30
- 4) 35

**ВРЕМЯ ПОЛНОГО СВЕРТЫВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- 1) 5-7
- 2) 7-9
- 3) 1-3
- 4) 3-5

**ЧИСЛО САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН К**

- 1) контрацепции
- 2) родам
- 3) вынашиванию беременности
- 4) овуляции

**ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) половых гормонов
- 2) гормонов щитовидной железы
- 3) антигипертензивные препараты
- 4) антибактериальные препараты

**ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ НА ПОЛОВОЙ ЧЛЕН**

- 1) перед эякуляцией
- 2) до полового акта
- 3) после эякуляции
- 4) после полового акта

**ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 80-100
- 2) 20-40
- 3) 40-60
- 4) 60-80

**ПРИ ВВЕДЕНИИ БЕТА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ**

- 1) поражение кожных покровов

- 2) геморрагический синдром
- 3) потеря слуха
- 4) гипотрофия плаценты и плода

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертоническая болезнь
- 2) атеросклероз коронарных артерий
- 3) ревматизм
- 4) пороки сердца

**К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) анаферон
- 2) осельтамивир
- 3) ацикловир
- 4) антигриппин

**ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МЕНИНГОКОККЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) геморрагическая сыпь
- 2) симптом Кернига
- 3) ригидность затылочных мышц
- 4) длительный субфебрилитет

**МОЧА ЦВЕТА "МЯСНЫХ ПОМОЕВ" ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА**

- 1) лейкоцитов
- 2) эритроцитов
- 3) бактерий
- 4) цилиндров

**ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПАЗМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) отеки
- 2) судороги
- 3) кровоизлияния
- 4) запоры

**ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ВЛАГАЛИЩЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) цилиндрический
- 2) многослойный плоский
- 3) призматический мерцательный
- 4) кубический

**ПАРЕНТЕРАЛЬНО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТ**

- 1) внутривенно, внутримышечно
- 2) через дыхательные пути
- 3) в прямую кишку

4) через рот

**ОСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) физиологической аменореей
- 2) фармакологической аменореей
- 3) ложной аменореей
- 4) психогенной аменореей

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОКОРМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) овощное пюре
- 2) яблочный сок
- 3) молочная каша
- 4) молочная смесь

**НА ВТОРОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) обучение гимнастике
- 2) контроль выполнения всех манипуляций по уходу
- 3) сбор анамнеза
- 4) обучение правилам контрастного обливания ног

**ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) окситоцин
- 2) метамизол натрия (анальгин)
- 3) магния сульфат
- 4) дротаверин (но-шпа)

**К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) мази
- 2) капсулы
- 3) стерильные растворы
- 4) драже

**ПУЛЬСОКСИМЕТР, КАПНОГРАФ, ВОЛЮМОСПИРОМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ**

- 1) работы аппарата ИВЛ
- 2) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- 3) оксигенации, пульса, вентиляции
- 4) ЭКГ, АД, центрального венозного давления, электроэнцефалограммы, температуры

**ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- 1) средним гинекологическим операциям
- 2) малым гинекологическим операциям

- 3) большим гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

**ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА (ЛЕВОМИЦЕТИНА) У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дисбактериоз
- 2) угнетение функции почек
- 3) «серый синдром»
- 4) угнетение функции печени

**КРАТНОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) ежедневно
- 2) один раз в три дня
- 3) один раз в два дня
- 4) не реже одного раза в неделю

**ОТНОСЯТСЯ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ЖЕНЩИНЫ**

- 1) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- 2) матка, яичники, мочевого пузыря, влагалище
- 3) влагалище, матка, мочевого пузыря
- 4) яичники, маточные трубы, матка, влагалище

**НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гордая походка беременной
- 2) чувство голода
- 3) мелькание мушек перед глазами
- 4) усталость

**РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) потерей веса
- 2) появлением отеков
- 3) гипертензией
- 4) брадикардией

**ПОД РАЗОВОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ПРИНЯТОЕ**

- 1) в удвоенной средней терапевтической дозе принятой за один прием
- 2) в течение суток
- 3) за один прием
- 4) за три приема

**МЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВВЕДЕННЫЕ**

- 1) под язык
- 2) через рот

- 3) в ухо
- 4) посредством лекарственной клизмы

### **РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) амнезией
- 2) апатией
- 3) булимией
- 4) анорексией

### **ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СРОКИ**

- 1) до 22 недель беременности
- 2) до 28 недель беременности
- 3) до 12 недель беременности
- 4) в любые сроки беременности

### **ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СПИСКИ**

- 1) всех жителей прикрепленного района
- 2) женщин прикрепленного района
- 3) инвалидов прикрепленного района
- 4) детей прикрепленного района

### **ТРИСОМИЯ ПО 18 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- 1) синдрома Эдвардса
- 2) синдрома Дауна
- 3) «кошачьего крика»
- 4) синдрома Патау

### **ПОД АМПУТАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) удаление инородного тела
- 2) полное удаление органа
- 3) удаление периферической части тела
- 4) удаление любой части органа

### **ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) средним гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) малым гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

### **К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) диклофенак натрия
- 2) ибупрофен + парацетамол (ибуклин)
- 3) ацетилсалициловая кислота

4) гепарин натрия

**ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

- 1) муниципальное управление здравоохранением
- 2) медицинское страхование граждан
- 3) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- 4) государственное управление здравоохранением

**В МЕСТАХ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ**

- 1) родинок
- 2) пигментных пятен
- 3) волосяного покрова
- 4) гиперемии, припухлости

**ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ПЛАЗМА СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 50-54
- 2) 55-60
- 3) 66-70
- 4) 61-65

**ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА:**

- 1) головное и тазовое
- 2) переднее и заднее
- 3) косое и поперечное
- 4) продольное, поперечное, косое

**МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) использование тестов на овуляцию
- 2) метод лактационной аменореи
- 3) календарный метод (по точному дню овуляции)
- 4) абстиненция (половое воздержание)

**ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты
- 2) марлевая повязка, смоченная содовым раствором
- 3) промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты
- 4) сухая марлевая повязка

**ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) боль в грудной клетке
- 2) кашель
- 3) боль в ухе

4) одышка

**ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И РАЗМЕРОВ ТАЗА В РОДАХ НАЗВАН ИМЕНЕМ**

- 1) Шредера
- 2) Вастена
- 3) Цовьянова
- 4) Отта

**СПИРОНОЛАКТОН (ВЕРОШПИРОН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) спазмолитиков
- 2) диуретиков
- 3) ненаркотических анальгетиков
- 4) транквилизаторов

**ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

- 1) один оплачиваемый выходной день
- 2) три дополнительных выходных дня
- 3) один выходной без сохранения заработной платы
- 4) три оплачиваемых дня

**КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 7
- 4) 6

**ЦИМЕТИДИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) холинолитики
- 2) блокаторы H<sub>2</sub>-рецепторов гистамина
- 3) анальгетики
- 4) спазмолитики

**ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭТАМЗИЛАТ НАТРИЯ (ДИЦИНОН) ПРОЯВЛЯЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

- 1) иммуномодулирующее
- 2) диуретическое
- 3) желчегонное
- 4) гемостатическое

**В ПОНЯТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДЯТ ПЕРИОДЫ**

- 1) интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный
- 2) антенатальный + интранатальный

- 3) антенатальный + интранатальный + ранний неонатальный
- 4) антенатальный + неонатальный

### **К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) железы внутренней секреции
- 2) лимфатические узлы
- 3) сальные железы
- 4) слюнные железы

### **ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ**

- 1) эргометрина малеат
- 2) динопрост
- 3) сальбутамол
- 4) магния сульфат

### **ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) хромосомной патологии
- 2) синдромов с множественными врожденными пороками развития
- 3) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом
- 4) мультифакториальных болезней

### **ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ОТ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) в 1 триместре
- 2) во 2 и 3 триместре
- 3) непосредственно перед родоразрешением
- 4) только по жизненным показаниям

### **ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗА СЧЕТ**

- 1) орехов
- 2) кондитерских изделий
- 3) хлеба грубого помола
- 4) кисломолочных продуктов

### **ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН**

- 1) минеральный
- 2) углеводный
- 3) липидный
- 4) белковый

### **ДЛЯ УГРОЖАЮЩЕГО РАЗРЫВА МАТКИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) затрудненное мочеиспускание
- 2) отсутствие продвижения головки плода, бурная родовая деятельность
- 3) слабость родовой деятельности
- 4) признак Вастена отрицательный

**ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К**

- 1) прямой кишке
- 2) шейке матки и влагалищу
- 3) слепой кишке
- 4) сигмовидной кишке

**В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ**

- 1) нуклеиновые кислоты
- 2) углеводы
- 3) белки
- 4) жиры

**ВСЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЛАМПСИИ НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ**

- 1) пареза кишечника
- 2) следующего приступа судорог
- 3) печеночной комы
- 4) почечной колики

**НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПОСТРАДАВШЕМУ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) с опущенной вниз головой
- 2) с приподнятым ножным концом
- 3) произвольном
- 4) лежа на спине, на твердой поверхности

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 86
- 2) 70
- 3) 84
- 4) 80

**ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) диуретический
- 2) желчегонный
- 3) антиангинальный
- 4) кардиотонический

**НЕЗАВИСИМЫМ ДЕЙСТВИЕМ АКУШЕРКИ ПРИ МАТОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ввести кровоостанавливающие препараты
- 2) произвести выскабливание полости матки
- 3) положить холод на низ живота
- 4) ввести сокращающие матку средства

## **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ**

- 1) жаропонижающее
- 2) антимикробное
- 3) адсорбирующее
- 4) противоаллергическое

## **НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ**

- 1) не применяют после кесарева сечения
- 2) не угнетают дыхательный центр
- 3) вводятся только по назначению врача и подлежат строгому учету
- 4) не применяются для обезболивания родов

## **ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН СЕРДЦА**

- 1) пульмональный
- 2) трехстворчатый
- 3) аортальный
- 4) митральный

## **ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- 1) запорами
- 2) доброкачественными заболеваниями шейки матки
- 3) язвой желудка
- 4) бронхиальной астмой

## **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) ощелачивающие растворы
- 2) лекарственную глюкозу
- 3) лекарственную целлюлозу
- 4) водную нагрузку

## **ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН К РОДАМ**

- 1) конференции
- 2) семинары
- 3) тестирование
- 4) лекции, беседы

## **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) кровь
- 2) меконий
- 3) мочу
- 4) слюну

## **ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) врачи центра медицинской профилактики

- 2) врачи психоневрологического диспансера
- 3) специалисты центров Роспотребнадзора
- 4) участковые врачи и специалисты среднего медицинского звена поликлиники

### **НА ПЕРВОМ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЁННОГО МАТЬ ОБУЧАЮТ**

- 1) проведению ножных ванн
- 2) постановке горчичников
- 3) проведению гигиенической ванны
- 4) измерению артериального давления

### **К АГГЛЮТИНОГЕНАМ II ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) B
- 2) AB
- 3) A
- 4) O

### **РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) росту маститов у матери
- 2) снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
- 3) уменьшению лактостаза
- 4) увеличению послеродовых осложнений

### **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ АСТМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приступ удушья
- 2) загрудинная боль
- 3) боль в животе
- 4) головная боль

### **ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- 1) воздействия факторов риска на развитие хронических заболеваний
- 2) воздействия факторов риска на развитие острых заболеваний
- 3) обострений заболевания
- 4) возникновения инвалидности

### **К ДЕЗАГРЕГАНТУ, УЛУЧШАЮЩЕМУ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ, ОТНОСЯТ**

- 1) ацетилсалициловую кислоту
- 2) пропранолол (анаприлин)
- 3) морфин
- 4) азитромицин (сумамед)

### **ЖЕНЩИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 1 РАЗ В**

- 1) 2 месяца
- 2) месяц
- 3) 2 недели
- 4) 10 дней

### **ОСНОВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тренирующее
- 2) противовоспалительное
- 3) гипотензивное
- 4) иммуностимулирующее

### **К СИМПТОМУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ОТНОСИТСЯ**

- 1) дизурия
- 2) гематурия
- 3) пиурия
- 4) никтурия

### **ПОЛНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) обмывание или обтирание отдельных частей тела
- 2) дезинсекцию, дезинфекцию, обмывание частей тела
- 3) дезинсекцию, дезинфекцию, гигиеническую ванну или душ
- 4) дезинсекцию, дезинфекцию, обтирание частей тела

### **ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) акроцианоз
- 2) диффузный цианоз
- 3) кольцевидная эритема
- 4) \"сосудистые звездочки\"

### **ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) дать слабительное
- 2) ввести анальгетики
- 3) приготовить теплую грелку
- 4) по показаниям провести пункцию и катетеризацию второй периферической вены

### **ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ, НАЧИНАЯ СО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ (ДН)**

- 1) 250
- 2) 295
- 3) 280
- 4) 270

### **НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) шум в ушах
- 2) чувство голода

- 3) усталость
- 4) гордая походка беременной

### **АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ**

- 1) постоянство температуры тела
- 2) сохранение постоянства осмотического давления
- 3) фагоцитоз
- 4) поддержание онкотического давления

### **К ФАКТОРУ, ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) прием алкоголя
- 2) повышение потребления поваренной соли
- 3) уменьшение объема циркулирующей крови
- 4) применение сосудосуживающих средств

### **КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ УБОРОК В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

### **ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) преэклампсии тяжелой степени
- 2) эклампсии
- 3) отеков
- 4) остеомаляции

### **К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ**

- 1) приступ удушья
- 2) кашель с гнойной мокротой
- 3) кровохарканье
- 4) инспираторная одышка

### **К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ УГЛЕВОДАМИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) молочные продукты
- 2) овощи
- 3) мясо
- 4) мучные изделия

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) нитраты
- 2) нестероидные противовоспалительные препараты
- 3) мочегонные
- 4) анальгетики

### **ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ «МАТКИ КУВЕЛЕРА» ПОКАЗАНО**

- 1) консервативное наблюдение
- 2) кесарево сечение
- 3) экстирпация матки
- 4) выскабливание полости матки

### **ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (В ЧАСАХ)**

- 1) 15-18
- 2) 20-24
- 3) 6-8
- 4) 10-12

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) кларитромицин (кларид), омепразол (омез)
- 2) атропина сульфат, пирензепин (гастроцепин)
- 3) викалин, циметидин
- 4) панкреатин (панзинорм, фестал)

### **ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ С ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ПРОВОДЯТ**

- 1) большие гинекологические операции
- 2) малые гинекологические операции
- 3) средние гинекологические операции
- 4) лапароскопические гинекологические операции

### **ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) роды
- 2) миому матки
- 3) опухоль яичника
- 4) прерывание беременности

### **ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) длительности безводного периода
- 2) длительности первого периода родов
- 3) наличия признаков отделения плаценты
- 4) длительности второго периода родов

### **ПОЯВЛЕНИЕ УДУШЬЯ, ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) пневмонии
- 2) отека легких
- 3) легочного кровотечения

4) кровохарканья

**САМОЙ ВАЖНОЙ ТЕМОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уход за новорожденным
- 2) внутриутробное развитие плода
- 3) физиология родов
- 4) медикаментозное обезболивание родов

**КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спирт 70%
- 2) хлоргексидин
- 3) спирт 40%
- 4) перекись водорода

**НОЖЕВУЮ БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) средним гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) малым гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

**ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) санитарная обработка не производится
- 2) частичная санитарная обработка
- 3) полная санитарная обработка
- 4) обтирание кожи и смена белья

**ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ**

- 1) средним косым размером
- 2) малым косым размером
- 3) большим косым размером
- 4) прямым размером

**СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) значительным понижением
- 2) незначительным понижением
- 3) повышением
- 4) остаются без изменений

**ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) изучение анамнеза заболеваний
- 2) профилактику респираторных инфекций новорожденного
- 3) выяснение предпочтений в духовной сфере

4) профилактику генетической патологии

**СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ**

- 1) 750
- 2) 800
- 3) 1200
- 4) 700

**ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА**

- 1) лор-врачом, инфекционистом
- 2) терапевтом, хирургом
- 3) терапевтом, стоматологом, отоларингологом, офтальмологом
- 4) хирургом, венерологом

**ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ**

- 1) 10 литров воды
- 2) 1 литр воды
- 3) 2 литров воды
- 4) 5 литров воды

**К ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ОБЛАДАЮЩЕЙ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) порошок
- 2) карамель
- 3) паста
- 4) мазь

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

- 1) до 12 недель беременности
- 2) до 28 недель беременности
- 3) в любые сроки беременности
- 4) до 22 недель беременности

**БИЙОХИНОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) анальгетики
- 2) антигистаминные
- 3) препараты висмута
- 4) антибиотики

**ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) женская консультация

- 2) отделение гинекологии
- 3) перинатальный центр
- 4) федеральный научно-исследовательский центр

**В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЧАСТОТА СТУЛА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 20-25
- 2) 1-2
- 3) 4-6
- 4) 10-12

**МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 13
- 2) 12
- 3) 11
- 4) 8

**К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) индивидуальное
- 2) профессиональное
- 3) коллективное
- 4) обязательное

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В 400 МЛ**

- 1) протеинурия
- 2) анурия
- 3) олигурия
- 4) полиурия

**ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИПИЧНОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) артериальная гипертензия
- 2) артериальная гипотензия
- 3) нарушение ритма сердца
- 4) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут

**ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ ОТХОЖДЕНИЯ ВОД ПРИ**

- 1) смешанном тазовом предлежании
- 2) чисто ягодичном предлежании
- 3) головном предлежании
- 4) поперечном положении плода

**МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение психотерапии
- 2) нормализация сна

- 3) профилактика запоров
- 4) проведение физиотерапии

### **К СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) ко-тримоксазол (бисептол)
- 2) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)
- 3) пропранолол (анаприлин)
- 4) бисакодил

### **ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) воротником Шанца
- 2) шиной Дитерихса
- 3) шиной Крамера
- 4) гипсовой повязкой

### **ФАКТОРАМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИМИ СОСАНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) комочки Биша, большой язык
- 2) комочки Биша, маленький язык
- 3) обильное слюноотечение, большой язык
- 4) обильное слюноотечение, маленький язык

### **ДОЛЖНЫ ЛИ В ПСИХОПРОФИЛАКТИКУ ВХОДИТЬ ЛЕКЦИИ О ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ**

- 1) грудное вскармливание - это естественный процесс, он не требует подготовки
- 2) нет, важно думать о родах
- 3) должны
- 4) все вопросы надо решать по мере поступления

### **ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НУЖНО**

- 1) произвести экстраперитонеальное кесарево сечение
- 2) вести роды через естественные родовые пути
- 3) выполнить интраперитонеальное кесарево сечение
- 4) наложить акушерские щипцы

### **НИТРОГЛИЦЕРИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) нитраты
- 2) антикоагулянты
- 3) антибиотики
- 4) анальгетики

### **ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ**

- 1) на 3-и сутки заболевания
- 2) на 4-е сутки заболевания

- 3) на 2-е сутки заболевания
- 4) в первые часы заболевания

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО ЗИМНИЦКОМУ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ \_\_\_\_\_  
ПОРЦИЙ МОЧИ**

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 12

**РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ**

- 1) фиброгастродуоденоскопия
- 2) желудочное зондирование
- 3) лапароскопия
- 4) рентгенография желудка

**К ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) преждевременное прерывание беременности
- 2) маловодие
- 3) ангиопатия сетчатки
- 4) раннее развитие позднего гестоза

**ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ У ДЕТЕЙ («РЕКТАЛЬНЫЙ  
ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) энтеровирусной инфекции
- 2) сальмонеллеза
- 3) дизентерии
- 4) эшерихиоза

**ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ**

- 1) ретракция, контракция мышечных волокон
- 2) расслабление миометрия
- 3) неравномерное сокращение миометрия
- 4) сокращение нижнего сегмента матки

**ЦЕЛЮЮ ВВЕДЕНИЯ ДОКОРМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение поступления жиров
- 2) уменьшение количества материнского молока
- 3) увеличение поступления соли в организм
- 4) обеспечение недостающего суточного и разового объема питания

**ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ**

- 1) строгий постельный
- 2) постельный

- 3) палатный
- 4) общий

### **ЭКЛАМПСИЯ БЕЗ СУДОРОГ**

- 1) существует
- 2) не существует
- 3) обсуждается
- 4) не известно

### **КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ**

- 1) на ночь
- 2) после завтрака
- 3) утром натощак
- 4) в любое время дня

### **УРОВЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) психологического климата семьи
- 2) взаимоотношения партнеров
- 3) грамотного регулирования деторождения
- 4) регулярности половой жизни

### **ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗАНИМАЕТ**

- 1) врожденные пороки
- 2) внутричерепная родовая травма
- 3) гнойно-септические заболевания новорожденных
- 4) сепсис

### **ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) запор
- 2) алопеция
- 3) сонливость
- 4) лихорадка

### **ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ**

- 1) кувшин, корнцанг, таз, раствор антисептика, кружку Эсмарха
- 2) таз, раствор антисептика, шприц Жане, ватные тампоны, корнцанг
- 3) клеенку, судно, салфетки, кувшин, корнцанг, воду
- 4) грушевидный баллон, корнцанг, ватные тампоны, раствор антисептика

### **ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ангинозная
- 2) абдоминальная
- 3) астматическая
- 4) безболевая

## **БОРЬБА С ФАКТОРАМИ РИСКА ПРОВОДИТСЯ НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**

- 1) стационарном
- 2) превентивном
- 3) санаторно-курортном
- 4) амбулаторно-поликлиническом

## **НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПРИ РАННЕМ ТОКСИКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биохимический анализ крови
- 2) анализ мочи на наличие кетоновых тел
- 3) офтальмоскопия
- 4) ультразвуковое исследование

## **БАРТОЛИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ**

- 1) молочных желез
- 2) параректальной клетчатки
- 3) яичниковой ткани
- 4) желез предверия влагалища

## **ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) количеством половых партнеров
- 2) социальными условиями
- 3) наличием половой жизни
- 4) показателями рождаемости

## **БЕРЕМЕННОЙ С ДИАГНОЗОМ: БЕРЕМЕННОСТЬ 33 НЕДЕЛИ, ПРЕЭКЛАМПСИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ, АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) операции кесарево сечение в экстренном порядке
- 2) плодоразрушающая операция
- 3) операция кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- 4) вакуум-экстракция плода

## **ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К БОКОВЫМ СТЕНКАМ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) позиция
- 2) вид
- 3) предлежание
- 4) вставление

## **ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) Законом РФ «О медицинском страховании»
- 2) страховой компанией
- 3) медицинской организацией

4) территориальной программой ОМС

**МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА**

- 1) борьбу с абортами
- 2) снижение летальности
- 3) сохранение здоровья
- 4) увеличение рождаемости

**АЛЬБУМИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) антибиотики
- 2) антикоагулянты
- 3) ненаркотические анальгетики
- 4) плазмозаменители

**ПРОНИЦАЕМОСТЬ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) слегка понижена
- 2) повышена
- 3) не изменена
- 4) существенно понижена

**ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ ПРОВОДЯТ**

- 1) через 24 часа
- 2) через 6 часов
- 3) сразу после рождения
- 4) через 12 часов

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гепатитом
- 2) ЕРН-синдромом
- 3) HELLP-синдромом
- 4) остеопорозом

**ПРЕДНИЗОЛОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) антигистаминные средства
- 2) мочегонные средства
- 3) глюкокортикостероиды
- 4) снотворные средства

**ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ ХАРАКТЕРНО**

- 1) разрушение кожного покрова, жидкие выделения из раны
- 2) устойчивая гиперемия, не проходящая после прекращения давления, кожный покров не нарушен

- 3) образование полости с повреждением в ней нижележащих тканей
- 4) нарушение целостности кожи, отслойка эпидермиса

**ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) удобство применения
- 2) соблюдение стерильности
- 3) быстрое воздействие на организм
- 4) медленное постепенное влияние на организм

**ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ТАЗА РОДЫ ЗАКАНЧИВАЮТ ПУТЕМ**

- 1) наложения акушерских щипцов
- 2) операции кесарева сечения
- 3) вакуум-экстракции плода
- 4) родостимуляции

**ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ВВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ**

- 1) подкожно в предплечье
- 2) внутримышечно в ягодичу
- 3) внутрикожно в плечо
- 4) внутримышечно в переднебоковую часть бедра

**НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ В ГРАММАХ НА ЛИТР СЧИТАЕТСЯ**

- 1) 102
- 2) 120
- 3) 100
- 4) 110

**РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

- 1) № 323-ФЗ
- 2) № 273-ФЗ
- 3) № 152-ФЗ
- 4) № 52-ФЗ

**К МЕТОДУ АНТРОПОГЕНЕТИКИ, ОСНОВАННОМУ НА ПРОСЛЕЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ, ОТНОСЯТ**

- 1) генеалогический
- 2) биохимический
- 3) близнецовый
- 4) цитологический

**ОПЕРАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сальпингоэктомия
- 2) тубэктомия

- 3) миомэктомия
- 4) овариоэктомия

**СВОЕВРЕМЕННЫМ ДЛЯ ПЕРВЫХ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД ПРИ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ В САНТИМЕТРАХ**

- 1) 7-8
- 2) 3-4
- 3) 5-6
- 4) 1-2

**УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) добровольное согласие пациента
- 2) информированное добровольное согласие пациента
- 3) согласие пациента не требуется
- 4) согласие пациента, заверенное нотариусом

**ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА**

- 1) гипотрофия плода
- 2) макросомия плода
- 3) крупный плод
- 4) перенашивание

**ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ ПРИВОДИТ К**

- 1) нормализации дыхания
- 2) ранней эпителизации пупочной ранки
- 3) получению материнской микробной флоры
- 4) исчезновению физиологической эритемы

**ПОД ВНЕДРЕНИЕМ ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В ЭНДОМЕТРИЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) овуляцию
- 2) имплантацию
- 3) менструацию
- 4) секрецию

**ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) прием пищи из одной посуды
- 2) рукопожатие
- 3) переливание крови
- 4) укус насекомых

**КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ БЕЗЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА, (Л)**

- 1) 0,1-0,5
- 2) 2-3
- 3) 5-10
- 4) 3-5

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОСТАВЛЯЮТ (°С)**

- 1) 0,8-1,0
- 2) 0,1-0,3
- 3) 1,0-1,5
- 4) 0,2-0,5

**УВЕЛИЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) кори
- 2) ветряной оспы
- 3) краснухи
- 4) эпидемического паротита

**МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТЕКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лицо
- 2) правая рука
- 3) отеки поясница и передняя брюшная стенка
- 4) голени

**ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Фонд социального страхования
- 2) Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 3) Роспотребнадзор
- 4) страховая медицинская организация

**ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ СПАЗМАТИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) эпидемического паротита
- 2) риновирусной инфекции
- 3) ветряной оспы
- 4) коклюша

**ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нарушение роста плода
- 2) генетические мутации
- 3) проявление наследственных заболеваний
- 4) соматические заболевания матери

**КРАТНОСТЬ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ РОДИЛЬНИЦАМ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) ежедневно
- 2) по мере загрязнения
- 3) 1 раз в семь дней
- 4) 1 раз в три дня

**ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕБНУЮ**

### **ГИМНАСТИКУ МОЖНО НАЧИНАТЬ**

- 1) через 4 часа после родов
- 2) через неделю после родов
- 3) сразу после родов
- 4) на вторые сутки после родов

### **ПОД ОСЛОЖНЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ**

- 1) изменение взаимоотношений в паре
- 2) нарушение социальной адаптации
- 3) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем
- 4) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма

### **ПАТРОНАЖ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОБУЧАЮТ МАМУ УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) первый дородовый
- 2) первый врачебно-сестринский
- 3) целевой патронаж
- 4) второй дородовый

### **ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) насыщенных жиров
- 2) иммуноглобулина М
- 3) иммуноглобулина А
- 4) свободного билирубина

### **ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- 1) достоверных признаков беременности
- 2) предположительных признаков беременности
- 3) сомнительных признаков беременности
- 4) вероятных признаков беременности

### **АГГЛЮТИНОГЕНЫ СОДЕРЖАТСЯ В**

- 1) сыворотке
- 2) тромбоцитах
- 3) эритроцитах
- 4) плазме

### **НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ КРОВЬ И МОЧУ НА САХАР У БЕРЕМЕННЫХ, ИМЕВШИХ**

- 1) запоздалые роды
- 2) быстрые роды
- 3) два аборта
- 4) роды крупным плодом

### **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ ПРИВОДИТ К**

- 1) увеличению веса плода
- 2) уменьшению веса плода
- 3) не влияет на вес плода
- 4) перенашиванию беременности

### **ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВЕН**

- 1) пенициллин
- 2) фамотидин
- 3) фуразидин (фурагин)
- 4) амоксициллин

### **ТАКТИКА АКУШЕРКИ В ПЕРИОД КЛОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ У ПАЦИЕНТКИ С ЭКЛАМПСИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) введение литической смеси
- 2) катетеризацию периферической вены
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) профилактику ушибов и прикусывания языка

### **ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ (ДЕ-НОЛ) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) гепатопротекторы
- 2) гастропротекторы
- 3) слабительные
- 4) холинолитики

### **ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) симптоматические
- 2) пробные
- 3) паллиативные
- 4) радикальные

### **МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перенос оплодотворенных яйцеклеток в матку
- 2) стимуляция овуляции и сперматогенеза
- 3) введение нативной или криоконсервированной спермы
- 4) манипуляции с зародышевым материалом

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- 2) определить рост и вес пациента
- 3) по назначению врача сделать очистительную клизму
- 4) обеспечить прием пациентом гигиенической ванны

## **В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ В РОДАХ НЕОБХОДИМО**

- 1) выполнять операцию кесарева сечения
- 2) применить акушерские щипцы
- 3) назначить родостимуляцию
- 4) применить бинт Вербова

## **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) иррадиация боли в прямую кишку
- 2) резкая боль внизу живота
- 3) изменение цикличности, объема и длительности менструального кровотечения
- 4) патологические выделения из половых путей

## **ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 20-30
- 2) 15-20
- 3) 30-40
- 4) 5-10

## **ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- 1) положение, величину, болезненность матки
- 2) степень развитости мышц брюшного пресса
- 3) состояние лимфатических узлов
- 4) состояние прямой кишки

## **СТРАХОВЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гражданин обладатель страхового полиса
- 2) страховая медицинская организация
- 3) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС
- 4) тот, кто уплачивает страховые взносы

## **ПРИРАЩЕНИЮ ПЛАЦЕНТЫ СПОСОБСТВУЮТ**

- 1) пониженный уровень ХГ
- 2) осложненные аборты
- 3) пониженный уровень окситоцина
- 4) назначение прогестерона во время беременности

## **НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ МАТКИ**

- 1) корпоральный
- 2) продольный в области нижнего сегмента
- 3) поперечный в области нижнего сегмента
- 4) Т-образный

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 24
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 6

**ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) гипостенурия
- 2) изостенурия
- 3) полиурия
- 4) олигурия

**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) накормить беременную
- 2) вызвать родственников
- 3) проветрить помещение
- 4) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи

**РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В**

- 1) сменной одежде и сменной обуви
- 2) сменной одежде, халате, маске, обуви и бахилах
- 3) в обычной одежде
- 4) обычной одежде и сменной обуви

**ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) отделения патологии беременных специализированных родильных домов
- 2) отделения патологии беременных не специализированных родильных домов
- 3) отделения больниц по профилю патологии
- 4) санатории-профилактории

**ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ФОРМОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) трубная беременность
- 2) яичниковая беременность
- 3) брюшная беременность
- 4) межсвязочная беременность

**ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) продольных складок
- 2) кишечных ворсинок, пейеровых бляшек, круговых складок
- 3) полулунных складок

4) кишечных полей

**ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) позиция
- 2) положение
- 3) предлежание
- 4) вид

**РЕФЛЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА**

- 1) на орган через рефлекторную дугу
- 2) в месте его нанесения
- 3) в токсических дозах
- 4) после накопления в организме

**К ВИТАМИНАМ , НАЗНАЧАЕМЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) эргокальциферол
- 2) ретинол
- 3) аскорбиновая кислота
- 4) пиридоксина гидрохлорид

**МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ**

- 1) ампициллина
- 2) окситоцина
- 3) неостигмина метилсульфата (прозерина)
- 4) дефенгидрамина (димедрола)

**АНТИСЕПТИК, КОТОРЫЙ ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА**

- 1) борная кислота
- 2) хлоргексидин
- 3) перекись водорода
- 4) бриллиантовый зеленый

**ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) трудовой отпуск
- 2) лечение бесплодия
- 3) выплату материнского капитала
- 4) отпуск по уходу за ребенком

**К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ**

- 1) грибковая инфекция
- 2) бета-гемолитический стрептококк
- 3) микобактерии
- 4) кишечная палочка

### **К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСЯТ**

- 1) головную боль
- 2) лихорадку
- 3) отеки
- 4) асцит

### **ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ**

- 1) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число лиц, прошедших медицинский осмотр
- 2) число заболеваний, выявленных впервые в данном году; среднегодовая численность населения
- 3) число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за медицинской помощью
- 4) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

### **ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 15 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ**

- 1) гинекологические отделения взрослых поликлиник
- 2) школьные врачи
- 3) диспансеры
- 4) детские поликлиники, женские консультации

### **ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ**

- 1) трилен
- 2) морфин
- 3) триквилар
- 4) тримекаин

### **К СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) гепатит В
- 2) токсоплазмоз
- 3) пневмоцистная пневмония
- 4) саркома Капоши

### **ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поликлиника
- 2) станция скорой медицинской помощи
- 3) женская консультация
- 4) диспансер

### **В ЭТУ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНОВЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

- 1) не зависит от фазы

- 2) вторая
- 3) первая
- 4) середина цикла

**ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ**

- 1) наркотические анальгетики
- 2) антибиотики и сокращающие средства
- 3) гипотензивные и мочегонные средства
- 4) ненаркотические анальгетики

**К ПРЕПАРАТУ, ПРИМЕНЯЕМОМУ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) фуросемид
- 2) метамизол натрия (анальгин)
- 3) мезатон
- 4) эпинефрин (адреналин)

**НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ**

- 1) после прекращения пульсации сосудов пуповины
- 2) сразу после рождения ребенка
- 3) после отделения последа
- 4) после кормления ребенка

**ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ СНОТВОРНОЕ**

- 1) до еды
- 2) за 30 мин до сна
- 3) за 2 часа до сна
- 4) после еды

**ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОДГОТОВИТЬ РОДИЛЬНИЦУ С НОВОРОЖДЕННЫМ К**

- 1) переводу в инфекционное отделение
- 2) переводу в детское отделение
- 3) переводу в наблюдательное акушерское отделение
- 4) выписке домой

**СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) преобладанием контрацепции над абортами
- 2) уменьшением количества половых партнеров
- 3) ранним вступлением в брак
- 4) поздним вступлением в брак

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) перевести больного на парентеральное питание

- 2) обеспечить соблюдение строгого постельного режима
- 3) регулярно промывать желудок
- 4) изолировать в отдельную палату

#### **БИОМЕХАНИЗМОМ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) совокупность движений плода по родовому каналу
- 2) врезывание головки плода
- 3) поворот плода «на ножку»
- 4) внутренний поворот головки

#### **ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ**

- 1) сахаропонижающие препараты группы сульфаниламидов
- 2) диетотерапию с ограничением углеводов и жиров, инсулинотерапию
- 3) бигуаниды
- 4) диетотерапию с ограничением белков

#### **БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖИТСЯ В ПРОДУКТАХ**

- 1) крупы, бобовые
- 2) овощи, фрукты
- 3) яйца, икра
- 4) рыба, ягоды

#### **БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) железам внутренней секреции женщин
- 2) наружным половым органам женщин
- 3) железам внутренней секреции мужчин
- 4) внутренним половым органам женщин

#### **ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ**

- 1) хламидии
- 2) бифидобактерии
- 3) энтерококки
- 4) пневмококки

#### **ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ АППАРАТ БОБРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) раствором фурацилина
- 2) раствором хлоргексидина
- 3) изотоническим раствором натрия хлорида
- 4) 40% раствором этилового спирта

#### **КОНТРАПЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) обладать необратимым действием
- 2) иметь сложные инструкции применения
- 3) оказывать системное влияние на организм

4) быть высокоэффективным

**СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Фонд социального страхования
- 2) Пенсионный фонд
- 3) Фонд обязательного медицинского страхования
- 4) Фонд регионального развития

**БЕРЕМЕННОМ С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ**

- 1) 70
- 2) 56
- 3) 86
- 4) 84

**ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) сепсис
- 2) HELLP-синдром
- 3) экстрагенитальная патология
- 4) акушерские кровотечения

**ЭЛЕМЕНТОМ УХОДА ЗА РОДОВОЙ ОПУХОЛЬЮ У НОВОРОЖДЁННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постоянная смена положения
- 2) покой
- 3) обработка хлоргексидином
- 4) положение на пораженной стороне

**ПОТЕРЯ 50% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1) стадии необратимого шока
- 2) стадии компенсированного шока
- 3) обратимой стадии шока
- 4) синдрому малого выброса

**РАЗРЫВ ЯИЧНИКА, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРЫВОМ ФОЛЛИКУЛА В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ ИЛИ РАЗРЫВОМ ЖЕЛТОГО ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) апоплексия яичника
- 2) киста яичника
- 3) опухоль яичника
- 4) яичниковая беременность

**БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- 2) подбородком и затылочным бугром
- 3) теменными буграми

4) наиболее отдаленными точками венечного шва

### **ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ**

- 1) негативно высказывается в его адрес
- 2) держит ребенка на некотором расстоянии от себя
- 3) осторожно берет на руки, гладит, целует
- 4) пытается командовать ребенком

### **ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВПОКАЗАН**

- 1) пefлоксацин
- 2) гентамицин
- 3) прометазин (пипольфен)
- 4) стрептомицин

### **ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
- 2) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
- 3) гиперемия лица, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен
- 4) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус

### **ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) назначение лечения
- 2) профилактика осложнений и реабилитация
- 3) беседы с пациенткой
- 4) общение с родственниками

### **ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (°C)**

- 1) 22-25
- 2) 18-20
- 3) 15-18
- 4) 27-28

### **ОБИЛЬНАЯ ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) кровохарканья
- 2) пневмонии
- 3) отека легких
- 4) легочного кровотечения

### **ПОД РАСТРОЙСТВОМ ПРОЦЕССА МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) полиурия

- 2) никтурия
- 3) олигоурия
- 4) дизурия

#### **НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) средним гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

#### **ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР**

- 1) хлоргексидина (гибитана)
- 2) калия перманганат
- 3) йодоната
- 4) пероксида водорода

#### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ В МОМЕНТ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) фамотидин (маммафизин)
- 2) прегнантол
- 3) этамзилат (дицинон)
- 4) окситоцин

#### **ОДНОРАЗОВЫЙ ПУПОЧНЫЙ ЗАЖИМ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ПУПОВИНУ ОТ ГРАНИЦЫ КОЖИ НА РАССТОЯНИИ**

- 1) 1 мм
- 2) 3 см
- 3) 4 мм
- 4) 1 см

#### **К АНТИГИСТАМИННЫМ СРЕДСТВАМ, БЛОКИРУЮЩИМ H1-ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) валериана
- 2) лоратадин
- 3) глюкоза
- 4) каптоприл (капотен)

#### **ДЕЛЕЦИЯ КОРОТКОГО ПЛЕЧА 5 ХРОМОСОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- 1) синдрома Эдвардса
- 2) синдрома Патау
- 3) «кошачьего крика»
- 4) синдрома Дауна

#### **ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- 1) вероятных признаков беременности
- 2) предположительных признаков беременности
- 3) сомнительных признаков беременности
- 4) достоверных признаков беременности

### **К ВЕДУЩЕМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ ЗЕВА ОТНОСЯТ**

- 1) распространение налётов за пределы миндалин
- 2) отёк подкожной клетчатки шеи
- 3) поражение глаз
- 4) увеличение регионарных лимфатических узлов

### **К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) ранняя неонатальная смертность
- 2) мертворождаемость
- 3) младенческая смертность
- 4) перинатальная смертность

### **РАННЯЯ БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ЕДЫ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 4 часов до еды
- 2) 2 часов после еды
- 3) 30 минут после еды
- 4) 3 часов до еды

### **ГЕПАТИТ А ВЫЗЫВАЕТСЯ**

- 1) бактериями
- 2) вирусами
- 3) простейшими
- 4) грибами

### **ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ**

- 1) государством
- 2) фондами ОМС
- 3) страховыми организациями
- 4) медицинскими учреждениями

### **ДИАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) антибиотики
- 2) анальгетики
- 3) транквилизаторы
- 4) муколитики

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» АКУШЕРКА ДОЛЖНА ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ**

- 1) ввести, назначенные анестезиологом лекарственные препараты и способствовать

обеспечению сна и покоя женщины перед операцией

- 2) дать женщине слабительное
- 3) подробно рассказать обо всех этапах операции
- 4) накормить женщину ужином

#### **В РАЦИОНЕ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ**

- 1) мясо
- 2) растительные жиры
- 3) продукты, богатые углеводами
- 4) кофе, чай

#### **МЕСТОМ УСТАНОВКИ ГРУДНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ЗАПИСИ ОТВЕДЕНИЯ V4 ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пятое межреберье по левой среднеключичной линии
- 2) четвертое межреберье слева от грудины
- 3) пятое межреберье слева от грудины
- 4) четвертое межреберье справа от грудины

#### **МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1 час после введения препарата
- 2) 15 минуты после введения препарата
- 3) 3 минуты после введения препарата
- 4) 30 минут после введения препарата

#### **УКОРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) острого панкреатита
- 2) острого воспаления с явлениями пельвиоперитонита
- 3) миомы матки
- 4) кишечной непроходимости

#### **АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТИТА У ДЕТЕЙ**

- 1) короткая и широкая
- 2) короткая и узкая
- 3) длинная и широкая
- 4) длинная и узкая

#### **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постинъекционный инфильтрат
- 2) кровотечение
- 3) гипотензия
- 4) аппендицит

#### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА**

### **СОСТАВЛЯЕТ ОТ**

- 1) нескольких дней до месяца
- 2) одного до нескольких месяцев
- 3) 50 минут до нескольких дней
- 4) нескольких минут до 50 минут

### **КРИТЕРИЕМ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР**

- 1) от 1,1 до 3,0
- 2) от 7,1 до 10,0
- 3) от 5,1 до 7,0
- 4) от 3,1 до 10,0

### **БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕПАТИТА «А» ПРОТИВОПОКАЗАНО**

- 1) употребление в пищу кисломолочных продуктов
- 2) проведение любых лабораторных исследований
- 3) прерывание беременности
- 4) применение глюкозо-солевых растворов

### **К ОСТРЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) перекрут ножки опухоли яичника
- 2) эндометрит
- 3) бартолинит
- 4) внематочная беременность

### **ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вирус
- 2) стафилококк
- 3) стрептококк
- 4) протей

### **НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) бронхиальной астме
- 2) абсцессе легкого
- 3) пневмонии
- 4) экссудативном плеврите

### **ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
- 2) магния гидроксид (гастал)
- 3) омепразол
- 4) ранитидин

## **ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отказ от спазмолитиков
- 2) отказ от алкоголя
- 3) раннее выявление и лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
- 4) наличие постоянного полового партнёра

## **ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- 1) бесплодием
- 2) запорами
- 3) бронхиальной астмой
- 4) язвой желудка

## **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2
- 2) 6
- 3) 3
- 4) 4

## **ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- 1) времени излития околоплодных вод
- 2) длительности родов
- 3) частоте и продолжительности схваток
- 4) темпу сглаживания и раскрытия шейки матки

## **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) дифтерии
- 2) гепатита С
- 3) гепатита А
- 4) дизентерии

## **РОДОВЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ**

- 1) костный таз, матку, влагалище, мышцы тазового дна
- 2) матку, мышцы тазового дна, пристеночные мышцы таза
- 3) матку, влагалище, мышцы тазового дна
- 4) тело матки, нижний сегмент матки, влагалище

## **ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ**

- 1) малого родничка к передней или задней стенке таза
- 2) стреловидного шва к мысу и симфизу
- 3) большого родничка к правой или левой стенке таза
- 4) малого родничка к правой или левой стенке таза

## **МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ**

## **МЕЖДУ**

- 1) переносицей и затылочным бугром
- 2) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- 3) наиболее отдаленными точками венечного шва
- 4) теменными буграми

## **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) накормить беременную
- 2) вызвать родственников
- 3) проветрить помещение
- 4) немедленно госпитализировать

## **ПРИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УБЫЛИ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перестройка обменных процессов
- 2) разрушение эритроцитов
- 3) потеря жидкости
- 4) накопление билирубина в крови

## **ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) загрудинная боль, которая не купируется нитроглицерином
- 2) загрудинная боль, которая купируется нитроглицерином
- 3) колющая боль в области сердца
- 4) ноющая боль в области сердца

## **СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО КРИЗА У НОВОРОЖДЕННОГО В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 5-6
- 2) 6-7
- 3) 3-4
- 4) 2-3

## **НАЛОЖЕНИЕ ШВА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ**

- 1) на сроке беременности 11-14 недель
- 2) до беременности
- 3) сразу после задержки месячных
- 4) на сроке беременности 18-26 недель

## **ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) данные переписи населения
- 2) листки нетрудоспособности
- 3) данные медицинских осмотров
- 4) статистические талоны

### **МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) барьерный метод
- 2) прерванный половой акт
- 3) подкожный имплант
- 4) спермицид

### **ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) головная боль
- 2) судорожное сокращение икроножных мышц
- 3) учащенное мочеиспускание
- 4) тошнота

### **К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) введение азаметония бромида (пентамина)
- 2) проведение оксигенотерапии через пеногасители
- 3) введение фенилэфрина (мезатона)
- 4) рефлекторное воздействие нашатырного спирта

### **ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) социальный выбор
- 2) политический выбор
- 3) моральный выбор
- 4) репродуктивный выбор

### **К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ОТНОСЯТ**

- 1) транспортную
- 2) внутреннюю
- 3) диагностическую
- 4) эвакуационно-транспортную, внутрипунктовую

### **БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ**

- 1) послушать истории родов своих знакомых
- 2) выбрать роддом и пройти курс дородовой подготовки
- 3) посетить несколько родов в родильном зале
- 4) прочитать учебник акушерства для специалистов

### **ПОВТОРОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 20
- 2) 22
- 3) 14
- 4) 18

### **ФИБРИЛЛЯРНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ МЫШЦ ВЕК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ФАЗУ ЭКЛАМПСИИ**

- 1) клонические судороги
- 2) разрешение припадка
- 3) тонические судороги
- 4) предсудорожную

**СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) водным балансом
- 2) суточным диурезом
- 3) дневным диурезом
- 4) никтурией

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вильпрофен солютаб (джозамицин)
- 2) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)
- 3) эбастин (кестин)
- 4) метформин (глюкофаж)

**ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ НА УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) риновирусной инфекции
- 2) кори
- 3) коклюше
- 4) ветряной оспе

**ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ В РАБОТЕ АКУШЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внедрение хозрасчета и расширение сферы услуг
- 2) забота об имидже акушерки
- 3) обеспечение безопасности материнства и соблюдение прав пациентки
- 4) выполнение всех желаний роженицы

**К КОЖНОМУ АНТИСЕПТИКУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) этиловый спирт 40%
- 2) перекись водорода
- 3) фурацилин
- 4) этиловый спирт 70%

**МОЛОЗИВО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ**

- 1) микроэлементов
- 2) жира
- 3) иммуноглобулинов
- 4) углеводов

**КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) свечей с папаверином
- 2) мазей и свечей, содержащих прокаин, бензокаин, белладонну, трибенозид
- 3) ограниченного питания
- 4) обильного питья

**ИНВАЗИВНЫЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ**

- 1) без прикрытия наркозом
- 2) только после введения в наркоз
- 3) только в родильном зале
- 4) в соответствии со стадией эклампсии

**МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10,5
- 2) 9,5
- 3) 11
- 4) 12

**ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРОВИ У БЕРЕМЕННОЙ**

- 1) всегда назначается стерильная пункция
- 2) роды проводить в наблюдательном отделении
- 3) родоразрешение только методом кесарева сечения
- 4) план ведения беременности и родов после заключения гематолога и данных коагулограммы

**ПРИ БОТУЛИЗМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО**

- 1) параличом дыхательной мускулатуры
- 2) поражением паренхимы лёгких
- 3) закупоркой дыхательных путей фибринозными плёнками
- 4) выраженной интоксикацией

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 35
- 2) 36
- 3) 39
- 4) 38

**ТЕРМИН «...CORPORA» (АНТИТЕЛА) СОДЕРЖИТ ПРИСТАВКУ**

- 1) contra
- 2) anti
- 3) endo

4) гипо

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) преэклампсия
- 2) тяжёлый токсикоз
- 3) угроза прерывания беременности
- 4) нормально протекающая беременность

**К СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) таблетки валерианы
- 2) настойка женьшеня
- 3) настойка календулы
- 4) таблетки левзеи

**ПРИЗНАКОМ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) побледнение краев
- 2) промокание повязки кровью
- 3) гиперемия, отек, усиление боли
- 4) выхождение кишечных петель под кожу

**К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) некроз
- 2) гематома
- 3) воздушная эмболия
- 4) сепсис

**ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) дать слабительное
- 2) ввести анальгетики
- 3) приготовить теплую грелку
- 4) установить катетер в мочевого пузырь

**ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВИДИМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ**

- 1) 200
- 2) 800
- 3) 350
- 4) 500

**К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- 1) метеоризм
- 2) половой криз

- 3) гипертонус мышц
- 4) диарея

### **ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ**

- 1) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского страхования
- 2) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных программой ОМС
- 3) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского страхования
- 4) может осуществляться только региональными фондами ОМС

### **ТЕРМИН «...URIA» (НАРУШЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ**

- 1) hyper
- 2) dys
- 3) anti
- 4) hypo

### **ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) трудовой отпуск
- 2) возможность доступа и выбор методов и средств контрацепции
- 3) выплату материнского капитала
- 4) отпуск по уходу за ребенком

### **РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА**

- 1) влагалищем, маткой, мочевым пузырем
- 2) яичниками, маткой, маточными трубами, влагалищем, вульвой
- 3) маткой, яичниками, прямой кишкой, влагалищем
- 4) яичниками, мочеиспускательным каналом, маткой

### **ТИПИЧНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) карбункул
- 2) уртикарная сыпь
- 3) кольцевидная эритема
- 4) очаговая склеродермия

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) дигоксин, дифенгидрамин (димедрол)
- 2) эналаприл, атенолол
- 3) атропина сульфат, калия аспарагинат + магния аспарагинат (аспаркам)
- 4) ланатозид с (целанид), этил альфа-бромозовалерат + фенобарбитал (корвалол)

### **ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 70 дней со дня рождения ребенка
- 2) 90 дней со дня рождения ребенка
- 3) 156 дней со дня рождения ребенка
- 4) 56 дней со дня рождения ребенка

### **К ПОСЛЕДСТВИЮ ВВЕДЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) гипотрофия плаценты и плода
- 2) потеря слуха
- 3) поражение кожных покровов
- 4) геморрагический синдром

### **БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРОВОДИТСЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) столбняка
- 2) Rh-конфликта
- 3) полиомиелита
- 4) дифтерии

### **ПУПОВИНА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) две артерии и одну вену
- 2) две вены и одну артерию
- 3) одну вену и одну артерию
- 4) две вены и две артерии

### **ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) наличие регулярных схваток
- 2) излитие околоплодных вод
- 3) недостаточная динамика раскрытия маточного зева
- 4) изменение сердцебиения плода

### **ДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) гиперменореей
- 2) полименореей
- 3) гипоменореей
- 4) альгоменореей

### **КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) на 12-е сутки
- 2) перед выпиской
- 3) на 5-е сутки
- 4) уже в 1-е сутки после операции

### **ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плохое кровоснабжение

- 2) нежная, легкоранимая, сухая
- 3) плохая регенерация
- 4) бедна водой

### **ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) диарея
- 2) рвота
- 3) учащенное мочеиспускание
- 4) боль

### **ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ**

- 1) нижний край симфиза, подвздошные ямки, крестцовый мыс
- 2) середину внутренней поверхности симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- 3) верхний край симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- 4) верхний край симфиза, безымянные линии, первый поясничный позвонок

### **К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) клитор
- 2) бартолиновые железы
- 3) уретра
- 4) матка

### **ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение сроков лечения
- 2) отсутствие побочных эффектов
- 3) отсутствие необходимости дальнейшего врачебного наблюдения
- 4) расширение спектра применяемых лекарственных препаратов

### **ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутренний поворот головки
- 2) разгибание головки
- 3) сгибание головки
- 4) дополнительное сгибание головки

### **ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) приготовить теплую грелку
- 2) через третье лицо вызвать врача
- 3) ввести анальгетики
- 4) дать слабительное

### **ПРИ ДЕФЕКТЕ ПЛАЦЕНТЫ ПОКАЗАНО**

- 1) внутривенное введение окситоцина

- 2) проведение вакуум-аспирации
- 3) выскабливание стенок полости матки
- 4) ручное обследование стенок полости матки

**ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ КРИТЕРИЯ ИЗЛЕЧЕННОСТИ ПОСЛЕ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ**

- 1) крови на сахар
- 2) мочи и крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)
- 3) крови на реакцию Вассермана (RW)
- 4) мочи на наличие лейкоцитов

**ТЕРМИН «...URIA» (МАЛОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ) СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ-ПРИСТАВКУ**

- 1) olig
- 2) sym
- 3) ran
- 4) meso

**ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) не очищают
- 2) жгутики, смазанные стерильным маслом
- 3) марлевые шарики
- 4) жгутики с хлоргексидином

**НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ ДО**

- 1) 38
- 2) 37
- 3) 40
- 4) 39

**ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО**

- 1) дицинон
- 2) преднизолон
- 3) эпинефрин (адреналин)
- 4) ацетилсалициловую кислоту

**КАРДИОМОНИТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ**

- 1) электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), частоты дыхательных движений (ЧДД), центрального венозного давления, температуры, дыхания
- 2) оксигенации, вентиляции и кровообращения
- 3) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- 4) работы аппарата ингаляционного наркоза

**НАИБОЛЬШИЙ ОЦК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) в конце второго триместра
- 2) в середине третьего триместра
- 3) в конце первого триместра
- 4) во время родов

**УШИВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ РОДИЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) перинеотомия
- 2) витректомия
- 3) эпизиотомия
- 4) перинеорафия

**ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ (ЧАСОВ)**

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 10
- 4) 14

**СИМПТОМ ЛЕГКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- 1) Пискачека
- 2) Отта
- 3) Горвица-Гегара
- 4) Снегирева

**ВСЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД УСЛОВНО ДЕЛЯТ НА**

- 1) ранний и поздний
- 2) диагностический и лечебный
- 3) диагностический и подготовительный
- 4) лечебный и дооперационный

**ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (ЧАСОВ)**

- 1) 1-2
- 2) 6-10
- 3) 10-12
- 4) 4-6

**ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ**

- 1) дни
- 2) часы
- 3) месяцы
- 4) недели

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЛОДА ПО МЕТОДУ ЖОРДАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- 2) разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- 3) от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки
- 4) к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мастит
- 2) эндометрит
- 3) тромбофлебит
- 4) перитонит

### **ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В**

- 1) брюшной полости
- 2) яичнике
- 3) маточной трубе
- 4) матке

### **БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ**

- 1) вероятных
- 2) предположительных
- 3) сомнительных
- 4) достоверных

### **ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мазь
- 2) порошок
- 3) таблетка
- 4) раствор

### **ПОД ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОНИМАЮТ**

- 1) комплекс мероприятий, направленный на предотвращение заболевания
- 2) комплекс мероприятий, направленный на предупреждение рождения или зачатия больного ребенка
- 3) фенотипическая коллекция дефекта
- 4) генотипическая коллекция дефекта

### **ПРИЧИНОЙ ПОЛОВОГО КРИЗА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перестройка обменных процессов
- 2) переход гормонов матери к ребенку
- 3) потеря жидкости
- 4) разрушение эритроцитов

### **НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) криминальные аборты

- 2) легальные аборты
- 3) перенашивание беременности
- 4) крупные дети

### **ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 36-38
- 2) 32-40
- 3) 30-32
- 4) 26-28

### **ПРИНЦИПОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) самостоятельное передвижение
- 2) передвижение в сопровождении медицинского работника
- 3) в кресле-каталке
- 4) транспортировка на носилках

### **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СРОКОМ ДО 12 НЕД ОТНОСЯТ К**

- 1) лапароскопическим гинекологическим операциям
- 2) средним гинекологическим операциям
- 3) большим гинекологическим операциям
- 4) малым гинекологическим операциям

### **К ОСЛОЖНЕНИЯМ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ**

- 1) асцит, анасарка
- 2) инсульт, инфаркт миокарда
- 3) пневмония, бронхит
- 4) пиелонефрит, цистит

### **УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ**

- 1) несоответствии размеров матки и гестационного срока
- 2) миоме матки
- 3) угрозе прерывания беременности
- 4) яичниковых новообразованиях

### **СЫПЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ИМЕЕТ ХАРАКТЕР**

- 1) розеолезно-петехиальный на туловище и верхних конечностях
- 2) розеолезный, появляется на 8-10 день болезни в области живота и нижней части грудной клетки
- 3) скарлатиноподобный со сгущением в естественных складках
- 4) геморрагическая на бёдрах и пояснице

### **ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 110 УДАРОВ В МИНУТУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- 1) норма
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) экстрасистолия

#### **ПРИ ОСТРОМ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) прерывание беременности
- 2) сохранение беременности
- 3) амбулаторное наблюдение
- 4) интенсивное лечение

#### **ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) вставление головки
- 2) позицию
- 3) предлежащую часть
- 4) вид

#### **НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ДОКОРМ НАЗНАЧАЮТ ПРИ**

- 1) расстройстве питания
- 2) избытке веса
- 3) недостатке витаминов
- 4) гипогалактии

#### **К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК (ММОЛЬ/Л) ОТНОСЯТ**

- 1) 1,1-2,2
- 2) 6,6-8,8
- 3) 2,2-3,3
- 4) 3,3-5,5

#### **РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) лапароскопическим гинекологическим операциям
- 4) средним гинекологическим операциям

#### **ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА БОЛЬНОМУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПИТЬ ЧЕРЕЗ**

- 1) 2 часа после операции
- 2) 6 часов после операции
- 3) 24 часа после операции
- 4) 12 часов после операции

#### **ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рефлюксный фактор
- 2) антиперистальтический фактор
- 3) сфинктерный фактор
- 4) шеечный фактор

### **НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АКУШЕРКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) оказании помощи пациенту в самообслуживании
- 2) постановке инъекции антибиотиков каждые 4 часа
- 3) смене дренажа
- 4) назначении пациенту рациональной диеты

### **В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ**

- 1) психические расстройства и расстройства поведения
- 2) болезни органов дыхания
- 3) врожденные аномалии
- 4) болезни нервной системы

### **ЗДОРОВЫЕ ДЕВОЧКИ, ИМЕЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) IV
- 2) II
- 3) I
- 4) III

### **РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ**

- 1) на период декретного отпуска
- 2) в течение пяти лет после родов
- 3) в течение года после родов
- 4) в течение трех лет после родов

### **ПОТЛИВОСТЬ И ОБЛЫСЕНИЕ ЗАТЫЛКА У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ**

- 1) опрелости
- 2) менингите
- 3) потнице
- 4) рахите

### **МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ**

- 1) аорты
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) наружной подвздошной артерии
- 4) половой артерии

### **СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО ПО МЕТОДУ ШИРОДКАРА, ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ**

## **В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 36
- 2) 39
- 3) 30
- 4) 32

## **УХОД ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) смазывание кожи стерильным растительным маслом
- 2) обработку кожи 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- 3) обильное питье
- 4) свободное пеленание

## **В ГРУППЕ ПОВТОРОРОДЯЩИХ БЫСТРЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ С ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (Ч)**

- 1) от 4 до 2
- 2) от 6 до 4
- 3) менее 2
- 4) менее 3

## **ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) несоответствующий медицинским стандартам аборт
- 2) опасный аборт
- 3) внебольничный криминальный аборт
- 4) домашний аборт

## **ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) симптоматическая
- 2) заместительная
- 3) патогенетическая
- 4) этиотропная

## **ХОРИОНАМНИОНИТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) воспалением брюшины
- 2) противопоказанием к операции «кесарево сечение»
- 3) относительным показанием к операции «кесарево сечение»
- 4) абсолютным показанием к операции «кесарево сечение»

## **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ**

- 1) мочи и крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)
- 2) крови на реакцию Вассермана (RW)
- 3) мочи на белок
- 4) крови на белок

## **ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ**

- 1) только по желанию гражданина
- 2) по усмотрению лечащего врача
- 3) с согласия родственников
- 4) в любом случае

**ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) остеохондрозе
- 2) инфаркте миокарда
- 3) ревмокардите
- 4) стенокардии

**УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ СВЯЗАНО С**

- 1) длительности безводного промежутка
- 2) наличием очагов хронической инфекции у женщины
- 3) длительности родов
- 4) качеством шовного материала

**ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 20
- 2) 24
- 3) 16
- 4) 28

**МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 36
- 2) 38
- 3) 40
- 4) 32

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИНФОРМИРУЕТ**

- 1) санитарка
- 2) главный врач
- 3) лечащий врач
- 4) акушерка

**ДЛЯ ПРЕРВАВШЕЙСЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ РАЗРЫВА ТРУБЫ ХАРАКТЕРНО**

- 1) отеки нижних конечностей
- 2) приступ резких болей внизу живота с иррадиацией в прямую кишку в сочетании с задержкой менструации

- 3) увеличение живота
- 4) диарея

**РЕЗКОЕ УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ БЫСТРОМ СНЯТИИ ПАЛЬПИРУЮЩЕЙ РУКИ С ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ НАДАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ**

- 1) Раздольского
- 2) Щёткина-Блюмберга
- 3) Мерфи
- 4) Образцова

**НАЧАЛО БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- 1) деления зиготы
- 2) продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе
- 3) имплантации бластоцисты
- 4) оплодотворения яйцеклетки

**ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО НАБЛЮДАЕТСЯ В ДНИ ЖИЗНИ**

- 1) 1-2
- 2) 7-8
- 3) 5-6
- 4) 3-4

**ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ**

- 1) азитромицин (сумамед)
- 2) пропранолол (анаприлин)
- 3) ацетилсалициловую кислоту
- 4) морфин

**ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ**

- 1) муж женщины
- 2) донор
- 3) донор или муж женщины
- 4) никто не записывается

**ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) трудовой отпуск
- 2) лечение заболеваний, передающихся половым путем
- 3) выплату материнского капитала
- 4) отпуск по уходу за ребенком

**ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ**

- 1) 22

- 2) 16
- 3) 20
- 4) 18

#### **ТУБЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- 1) средним гинекологическим операциям
- 2) малым гинекологическим операциям
- 3) большим гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

#### **ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ПРАВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД**

- 1) красный
- 2) желтый
- 3) зеленый
- 4) черный

#### **ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ АНТИДОТ**

- 1) бемеград
- 2) атропина сульфат
- 3) димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол)
- 4) налорфин

#### **СЦЕЖИВАНИЕ ОСТАТКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) повышения иммунитета
- 2) профилактики гипотрофии
- 3) профилактики гипогалактии
- 4) снижения иммунитета

#### **ПРЕДВЕСТНИКАМИ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) частые мочеиспускания
- 2) кровянистые выделения из половых путей
- 3) отхождение околоплодных вод
- 4) ложные схватки и опущение дна матки

#### **В НОРМЕ ПОТУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА**

- 1) в плоскости входа в малый таз
- 2) над входом в малый таз
- 3) в широкой полости таза
- 4) не выше узкой части полости малого таза

#### **К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) цефазолин
- 2) фенотерол + ипратропия бромид (беродуал)
- 3) винпоцетин
- 4) азитромицин (сумамед)

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ УРОСЕПТИК**

- 1) ципрофлоксацин
- 2) фуросемид (лазикс)
- 3) гепарин натрия
- 4) метамизол натрия (баралгин)

### **ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ.РТ.СТ.)**

- 1) 40-50
- 2) 60-89
- 3) 80-100
- 4) 100-139

### **ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ В КИЛОГРАММАХ**

- 1) 10-12
- 2) 5-6
- 3) 7-8
- 4) 13-14

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) побеседовать с родственниками
- 2) дать женщине слабительное
- 3) выполнить назначенную анестезиологом премедикацию
- 4) вечером перед сном накормить женщину ужином

### **ФУНКЦИЯМИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) экспертиза временной нетрудоспособности, консультации врачей, выдача рекомендаций о переводе на щадящую работу, контроль качества лечения, направление на МСЭ в случае возникновения признаков стойкой утраты трудоспособности
- 2) консультации врачей, направление на МСЭ, экспертиза стойкой нетрудоспособности, профессиональной непригодности
- 3) консультации врачей, выдача листка нетрудоспособности всем больным, экспертиза временной нетрудоспособности
- 4) выдача листка нетрудоспособности, справок о профессиональной непригодности, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача заключения о переводе на другую работу беременных

### **НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тримеперидин (промедол)
- 2) омнопон
- 3) морфина гидрохлорид

4) метамизол натрия (анальгин)

**К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ХОЛЕРЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) выраженная дегидратация
- 2) стул в виде «малинового желе»
- 3) схваткообразные боли по ходу кишечника
- 4) повышение температуры тела

**ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ (МЛ)**

- 1) 500-700
- 2) 250-500
- 3) 1000-1300
- 4) 100-200

**ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 12-15
- 2) 10-12
- 3) 28-30
- 4) 30-32

**ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) выдачу листка нетрудоспособности, экспертизу стойкой нетрудоспособности
- 2) установление факта стойкой нетрудоспособности, выдачу направления на врачебную комиссию
- 3) выдачу листка нетрудоспособности, направление на медико-социальную экспертизу
- 4) установление факта временной нетрудоспособности

**ОТЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ (РАБОТОДАТЕЛЯ) НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)**

- 1) 26,0
- 2) 2,9
- 3) 5,1
- 4) 3,1

**СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ЗРЕЛОГО МОЛОКА» У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 3-4
- 2) 1-3
- 3) 2-3
- 4) 4-5

**ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фонды обязательного медицинского страхования
- 2) индивидуальный бюджет
- 3) инвестиции
- 4) федеральный бюджет

**ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) переносицей и затылочным бугром
- 2) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- 3) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- 4) серединой большого родничка и подъязычной костью

**ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ В ДНЯХ**

- 1) 12-16
- 2) 3-5
- 3) 6-9
- 4) 8-10

**К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) ранитидин
- 2) рифампицин
- 3) домперидон (мотилиум)
- 4) алгелдрат + бензокаин + магнезия гидроксид (альмагель)

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) анальгетики, спазмолитики
- 2) антибиотики, гормоны, дезагреганты
- 3) сульфаниламиды, нитрофураны
- 4) нитраты, сердечные гликозиды

**ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) кардиогенном шоке
- 2) гипертоническом кризе
- 3) обмороке
- 4) коллапсе

**РОДИЛЬНИЦЕ СО ШВАМИ НА ПРОМЕЖНОСТИ ПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК В ДНЯХ**

- 1) 70
- 2) 56
- 3) 86
- 4) 84

**СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) субфебрилитет

- 2) фебрилитет
- 3) лизис
- 4) кризис

**ОСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) физиологической аменореей
- 2) фармакологической аменореей
- 3) ложной аменореей
- 4) психогенной аменореей

**КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ НА ГОНОКОККИ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 3

**ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) отхаркивающие
- 2) жаропонижающие
- 3) противокашлевые
- 4) противовирусные

**В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНИМАЮТ**

- 1) заболевания периферической нервной системы
- 2) травмы, отравления и несчастные случаи
- 3) острые респираторные заболевания
- 4) заболевания сердечно-сосудистой системы

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дисменорея
- 2) железодефицитная анемия
- 3) рак молочных желез
- 4) нерегулярный менструальный цикл

**НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение оксигенотерапии
- 2) освобождение от стесняющей одежды
- 3) введение глюкокортикоидов
- 4) введение бронхолитиков

**К АГГЛЮТИНИНАМ IV ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) бета

- 2) альфа, бета
- 3) 0
- 4) альфа

**ДЛЯ РАЗЖИЖЕНИЯ СЛИЗИ В ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО ЗАКАПАТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР**

- 1) 1% р-р новокаина
- 2) 10% р-р натрия хлорида
- 3) 3% р-р перекиси водорода
- 4) 0,9% р-р натрия хлорида

**ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ**

- 1) моча соломенно-желтого цвета
- 2) увеличение суточного диуреза
- 3) боль, ощущение жжения при мочеиспускании
- 4) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время

**ОСНОВНЫМ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) санация трахеобронхиального дерева
- 2) противокашлевые средства
- 3) профилактика пролежней
- 4) питание через зонд

**ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПОКАЗАНО**

- 1) при отравлениях кислотами и щелочами
- 2) при бессознательном состоянии больного
- 3) если прошло не больше 2 часов после приема яда
- 4) при любых острых пероральных отравлениях

**ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 80-100
- 2) 50-70
- 3) 30-50
- 4) 70-80

**ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗАКРЕПЛЕНО**

- 1) Уголовным кодексом Российской Федерации
- 2) Конституцией Российской Федерации
- 3) Кодексом об административных правонарушениях
- 4) Гражданским кодексом Российской Федерации

**ПРИЗНАКОМ «ЗРЕЛОЙ» ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проходимость наружного зева для кончика пальца
- 2) длина шейки 3 см

- 3) укорочение шейки до 1 см
- 4) отклонение шейки кзади

### **СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) один раз в 7 дней
- 2) 4-5 раз в сутки
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) систематически, до прекращения выделений из ран

### **ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) спазмолитикам
- 2) блокаторам H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов
- 3) анальгетикам
- 4) ферментам

### **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ**

- 1) фуразидин (фурагин)
- 2) флуконазол (дифлюкан)
- 3) фуросемид (лазикс)
- 4) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)

### **ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ**

- 1) наложения акушерских щипцов
- 2) ручного обследования матки
- 3) вакуум-аспирации
- 4) вакуум-экстракции плода

### **К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СРЕДИ РОДИЛЬНИЦ ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ С**

- 1) многоплодной беременностью
- 2) преэклампсией
- 3) хориоамнионитом в родах
- 4) хроническим гастритом

### **С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПРИ ВТОРОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 74 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ ИЛИ АБОРТА ВВОДЯТ**

- 1) глюкокортикоиды
- 2) антибиотики
- 3) антирезус иммуноглобулин
- 4) гемостатические средства

### **ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫМ В СОСТОЯНИИ ШОКА**

- 1) первая
- 2) отсроченная
- 3) не подлежат эвакуации
- 4) вторая

**СПОСОБОМ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД БИМАНУАЛЬНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обработка ладонной поверхности антисептиком
- 2) хирургический
- 3) гигиенический
- 4) не требует обработки

**ПРИЗНАКОМ НЕДОКОРМА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) частое мочеиспускание
- 2) выраженное беспокойство
- 3) повышение температуры
- 4) обильный стул

**НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА В ГРАММАХ МЕНЕЕ**

- 1) 2300
- 2) 2000
- 3) 2700
- 4) 2500

**ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАПОРЫ ВОЗНИКАЮТ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 17-36
- 2) 7-10
- 3) 12-20
- 4) 37-40

**ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) лечение заболеваний репродуктивной сферы
- 2) трудовой отпуск
- 3) отпуск по уходу за ребенком
- 4) выплату материнского капитала

**К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- 1) острую сердечную недостаточность
- 2) легочное кровотечение
- 3) острую сосудистую недостаточность
- 4) хроническую дыхательную недостаточность

**ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ МНОГОПЛОДИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С**

- 1) 28

- 2) 30
- 3) 34
- 4) 38

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 20-21
- 2) 25-26
- 3) 28-29
- 4) 30-31

**РОЖЕНИЦЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТУЖИТЬСЯ**

- 1) при прорезывании теменных бугров
- 2) при наружном повороте головки
- 3) после рождения головки
- 4) при положительных признаках отделения последа

**К АДАПТИРОВАННЫМ СЛАДКИМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) «Хипп комбиотик»
- 2) «Наринэ»
- 3) коровье молоко
- 4) «Бифилакт»

**ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛНОТЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- 1) срочных больных
- 2) детей
- 3) плановых больных
- 4) экстренных больных

**ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) диффузный токсический зоб
- 2) сахарный диабет
- 3) эндемический зоб
- 4) гипотиреоз

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПАЦИЕНТКИ**

- 1) словесную благодарность
- 2) карту больного
- 3) денежное вознаграждение
- 4) письменное согласие

**ОБКЛАДОЧНЫЕ КЛЕТКИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ВЫРАБАТЫВАЮТ**

- 1) мукоидный секрет
- 2) гастрин
- 3) соляную кислоту
- 4) пепсиноген

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА СПИНЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) на боку
- 2) сидя
- 3) на животе
- 4) стоя

**ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ**

- 1) число женщин, состоявших в браке
- 2) численность брачных пар в населении
- 3) общее число родившихся живыми и мертвыми
- 4) число женщин детородного возраста

**К СРЕДСТВУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) будаксим (афин)
- 2) йодид калия
- 3) перфеназин (этаперазин)
- 4) апрофен (тарен)

**ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ**

- 1) 9
- 2) 13
- 3) 10
- 4) 11

**ЦЕЛЮ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (ЛФК) ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) похудение
- 2) увеличение мышечной массы
- 3) ликвидация спаек
- 4) улучшение настроения

**АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пefлоксацин
- 2) карбенициллин
- 3) рифампицин
- 4) стрептомицин

**ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО**

- 1) вокруг дугласова углубления
- 2) вокруг прямой кишки
- 3) вокруг мочевого пузыря
- 4) между листками широких связок

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1-4
- 2) 5-7
- 3) 12-15
- 4) 8-11

**К ГЛАВНОМУ ПРИЗНАКУ ОТЕКА ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) kloкочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой
- 2) систолические шумы
- 3) эмфизема легких
- 4) набухшие вены

**БЕРЕМЕННАЯ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ**

- 1) большом
- 2) шумном
- 3) тихом
- 4) ярком

**ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ ТАЗОВОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД**

- 1) Креде-Лазаревича
- 2) Мориссо-Левре
- 3) Уилта-Иванова
- 4) Кюстнера-Чукалова

**СЛИЗИСТАЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖИТ**

- 1) солитарные фолликулы, бокаловидные клетки
- 2) пейеровы бляшки
- 3) круговые складки
- 4) пилорические железы

**ЖЕНЩИНЫ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- 1) V
- 2) II
- 3) I
- 4) IV

**К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ**

### **ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) увеличение объема циркулирующей крови
- 2) понижение количества эритроцитов
- 3) повышение количества лейкоцитов
- 4) понижение количества тромбоцитов

### **НАРУШЕНИЕ РОСТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) джозамицина
- 2) ампициллина
- 3) тетрациклина
- 4) цефтриаксона

### **К ПРЕПАРАТАМ, ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, ОТНОСЯТ**

- 1) цитостатики
- 2) диуретики
- 3) антибиотики
- 4) гипотензивные

### **ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПОД СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПАЦИЕНТКУ ПОДГОТАВЛИВАЮТ**

- 1) подготовка не нужна
- 2) так же, как для обследования
- 3) так же, как для наркоза
- 4) так же, как для местной анестезии

### **ИСХОДОМ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) невозможность родоразрешений через естественные родовые пути
- 2) гипотрофия плода
- 3) увеличение процента оперативных вмешательств
- 4) увеличение количества вод

### **ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ (%)**

- 1) 35-39
- 2) 40-45
- 3) 51-55
- 4) 46-50

### **СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МОЛОКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

- 1)  $\frac{1}{5}$  от массы тела
- 2)  $\frac{1}{6}$  от массы тела
- 3)  $\frac{1}{7}$  от массы тела
- 4)  $\frac{1}{8}$  от массы тела

### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 10

**ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) высокая
- 2) незначительная
- 3) слабая
- 4) не выражена

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) хлорид натрия
- 2) полиглюкин
- 3) хлоргексидин
- 4) тетрациклиновую мазь

**ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН**

- 1) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- 2) мышцами диафрагмы таза
- 3) подвздошно-поясничной мышцей
- 4) продольным слоем мышц стенки прямой кишки

**НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РОДАХ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выпадение петель пуповины
- 2) выпадение ножки плода
- 3) слабость родовой деятельности
- 4) несвоевременное излитие околоплодных вод

**ТЕРМИН «...CARDIUM» (ОКОЛОСЕРДЕЧНАЯ СУМКА) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ**

- 1) peri
- 2) epi
- 3) endo
- 4) sym

**В КОЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ВИТАМИН**

- 1) D
- 2) A
- 3) B
- 4) C

**К ВОЗМОЖНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) непроизвольное мочеиспускание
- 2) кожный зуд
- 3) асфиксия
- 4) судороги

**РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 4-6
- 2) 12-16
- 3) 17-18
- 4) 8-10

**ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В СВЯЗИ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В**

- 1) приемном покое
- 2) предродовой палате
- 3) женской консультации
- 4) развернутой операционной

**ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5
- 2) 8
- 3) 1
- 4) 3

**СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) рисковый случай
- 2) страховой риск
- 3) типовой случай
- 4) страховой случай

**К ИНГИБИТОРАМ АПФ ОТНОСИТСЯ**

- 1) каптоприл
- 2) пропранолол (анаприлин)
- 3) нитроглицерин (глицерил тринитрат)
- 4) ацетазоламид (диакарб)

**ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ**

- 1) на улицу
- 2) оставаться на месте
- 3) на верхние этажи зданий
- 4) на нижние этажи и в подвалы

**НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

### **ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1 триместр беременности
- 2) послеродовой период
- 3) 3 триместр беременности
- 4) 2 триместр беременности

### **ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕСЕДУ О**

- 1) половой гигиене во время беременности
- 2) хромосомных заболеваниях
- 3) пороках развития плода
- 4) заболеваниях детского возраста

### **КОМПЛЕКС НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) визуальное и мониторное наблюдение
- 2) визуальное, мониторное, лабораторное наблюдение
- 3) интенсивное наблюдение
- 4) мониторное и лабораторное наблюдение

### **ВАНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) пенициллины
- 2) гликопептиды
- 3) аминогликозиды
- 4) макролиды

### **К ВОЗРАСТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, ОТНОСЯТ**

- 1) 15-18 лет
- 2) 25-35 лет
- 3) 20-25 лет
- 4) 35 -45 лет

### **ОПРЕДЕЛИТЬ СТАДИЮ СВЕРТЫВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ**

- 1) проба Шиллера
- 2) проба Ли-Уайта
- 3) артериальное давление
- 4) пульс

### **БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 1 раз в 2 недели
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 2 раза в триместр
- 4) 1 раз в месяц

### **НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ СЛИЯНИИ ВЕН**

- 1) селезеночных
- 2) печеночных
- 3) поясничных
- 4) общих подвздошных

### **НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дыхание увлажнённым кислородом
- 2) гипербарическая оксигенация
- 3) искусственная вентиляция лёгких
- 4) применение ноотропов

### **ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ СЛЕПОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) физическая перегрузка матери в период беременности
- 2) многоплодная беременность
- 3) тазовое предлежание плода
- 4) острая вирусная инфекция

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИНСУЛИН ВВОДИТСЯ**

- 1) внутривенно
- 2) подкожно
- 3) внутрикожно
- 4) внутримышечно

### **К ВОЗМОЖНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- 1) гиповитаминоз
- 2) переохлаждение
- 3) очаг хронической инфекции
- 4) нервно-психическое перенапряжение

### **ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постановка на учет в женской консультации
- 2) выяснение анамнеза беременности
- 3) обучение созданию благоприятных условий для новорожденного дома
- 4) выяснение профессиональных вредностей у родителей

### **ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) укладывании пациента на левый бок
- 2) постановке очистительной клизмы
- 3) применении пузыря со льдом на область эпигастрия
- 4) постановке горячей грелки на область эпигастрия

**НАГРУБАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ РОДОВ ЧАЩЕ ВСЕГО НАСТУПАЕТ С СУТОК**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**ПЕРЕД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ**

- 1) гелем, мазью
- 2) эфиром
- 3) спиртом
- 4) йодонатом

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хеликобактериальная инфекция
- 2) переохлаждение, переутомление
- 3) физическая перегрузка, переохлаждение
- 4) вирусная инфекция, переохлаждение

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) влагалищная диафрагма
- 2) шеечные колпачки
- 3) прерванный половой акт
- 4) презерватив

**ПОД ОБМОРОКОМ ПОНИМАЮТ ФОРМУ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

- 1) правожелудочковой
- 2) коронарной
- 3) левожелудочковой
- 4) сосудистой

**В НОРМЕ СОЗРЕВАНИЕ ШЕЙКИ К РОДАМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ, НАЧИНАЯ С НЕДЕЛИ**

- 1) 34
- 2) 36
- 3) 38
- 4) 35

**РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В**

- 1) специализированном родильном доме
- 2) родильном доме общего профиля
- 3) наблюдательном отделении родильного дома
- 4) эндокринном отделении стационара

**НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гордая походка беременной
- 2) чувство голода
- 3) ощущение тяжести в области лба, затылка
- 4) усталость

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) нежирное мясо
- 2) гречневую крупу
- 3) кефир
- 4) конфеты

**С ЦЕЛЬЮ РОДОСТИМУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)
- 2) эссенциале форте Н
- 3) динопрост (энзопрост)
- 4) аминофиллин (эуфиллин)

**ОСНОВНОЙ СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) висцеральный
- 2) базальный
- 3) ворсинчатый
- 4) корковый

**К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) метилэргометрин
- 2) гепарин натрия
- 3) дротаверин (но-шпа)
- 4) лоратадин (кларитин)

**ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ ПУЛЬМОНОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вирусные гепатиты
- 2) ревматизм
- 3) бронхиальная астма
- 4) пороки сердца

**ПО ТЕОРИИ ВЕРБОВА Я.Ф. И ИВАНОВА Н.З. ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВА МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) патологические изменения в мускулатуре матки
- 2) бурная родовая деятельность
- 3) клиническое несоответствие головки плода и таза женщины
- 4) крупный плод

## **РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЛОРИЯХ**

- 1) 1500-2000
- 2) 4000-4500
- 3) 1000-1500
- 4) 2500-3000

## **ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) дать слабительное
- 2) ввести анальгетики
- 3) приготовить теплую грелку
- 4) осуществить забор крови для анализов

## **К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) вальпроевая кислота (конвулекс)
- 2) гепарин натрия
- 3) метилэргометрин
- 4) аскорбиновая кислота

## **ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ**

- 1) поперечный размер плоскости выхода из малого таза
- 2) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза
- 3) поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза
- 4) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза

## **БЕРЕМЕННЫМ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЗДА НА**

- 1) общественном транспорте
- 2) железнодорожном транспорте
- 3) автомобиле
- 4) велосипеде

## **ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ, ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ БАЗОВОЙ ТЕРАПИЕЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ**

- 1) магния сульфат
- 2) фуросемид
- 3) фенobarбитал
- 4) 0,9% раствор натрия хлорид

## **ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 8-9

4) 6-7

**К ЗАРАЖЕНИЮ ЛЕПТОСПИРОЗОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**

- 1) купание в непроточном водоёме
- 2) укус клеща
- 3) беспорядочные половые связи
- 4) употребление в пищу вяленой рыбы

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) избыточное употребление углеводов
- 2) избыточное употребление белков
- 3) дефицит витаминов
- 4) хроническая кровопотеря

**В НОРМЕ В 1 МКЛ КРОВИ ЖЕНЩИНЫ СОДЕРЖИТСЯ В СРЕДНЕМ \_\_\_\_\_МЛН, ЭРИТРОЦИТОВ**

- 1) 4,0-4,5
- 2) 3,0-4,0
- 3) 6,0-7,0
- 4) 7,0-8,0

**ИЗДЕЛИЕМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дуоденальный зонд
- 2) система для инфузионной терапии
- 3) поильник
- 4) катетер

**ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОПУСКАЮТСЯ**

- 1) клининговые компании
- 2) младший медицинский персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности
- 3) лица, достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности
- 4) технический персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности

**ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение гистероскопии
- 2) проведение вагиноскопии
- 3) проведение лапароскопии
- 4) выявление визуальных форм онкологических заболеваний

**ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО НОМЕР**

- 1) 3

- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) противоаллергическое
- 2) адсорбирующее
- 3) жаропонижающее
- 4) антимикробное

**РАСТЯЖКИ НА КОЖЕ У БЕРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О**

- 1) достоверности беременности
- 2) избытке веса
- 3) пониженной сопротивляемости организма
- 4) недостаточной эластичности кожи

**ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, РАССЛАБЛЯЮЩИМ МИОМЕТРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) динопрост
- 2) мидекамицин (макропен)
- 3) окситоцин
- 4) гексопреналин (гинипрал)

**РАССТОЯНИЕ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ГОЛОВКИ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- 1) прямым
- 2) средним косым
- 3) малым косым
- 4) вертикальным

**50% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛКОВ В ПИТАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬСЯ НА БЕЛКИ**

- 1) растительного происхождения
- 2) животного происхождения
- 3) генномодифицированные белки
- 4) химического происхождения

**ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (УДАРОВ В МИН)**

- 1) 60-80
- 2) 90-100
- 3) 40-60
- 4) 100-110

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) динамическое наблюдение
- 2) восстановительное лечение

- 3) борьбу со стрессом
- 4) вакцинацию

### **ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВЕН**

- 1) изониазид
- 2) омепразол
- 3) нитрофурантоин (фурадонин)
- 4) амоксициллин

### **ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО**

- 1) после перевода в послеродовое отделение
- 2) в родильном зале
- 3) на вторые сутки после родов
- 4) через 6 часов после родов

### **НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН**

- 1) мышцами диафрагмы таза
- 2) подвздошно-поясничной мышцей
- 3) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- 4) продольным слоем мышц стенки прямой кишки

### **СЕРДЦЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) с наклоном вправо
- 2) вертикальное
- 3) с наклоном влево
- 4) горизонтальное

### **ПРИ МИОПИИ 2-ОЙ СТЕПЕНИ (-5 - -6 ДИОПТРИЙ) У БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО**

- 1) укорочение периода изгнания путем перинеотомии
- 2) кесарево сечение
- 3) естественное родоразрешение без оперативных вмешательств
- 4) исключение потуг методом наложения акушерских щипцов

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ЭТИОТРОПНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) фуразидин (фурагин)
- 2) нитроглицерин
- 3) амоксициллин
- 4) метамизол натрия

### **БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) наиболее отдаленными точками венечного шва
- 2) границей волосистой части лба и затылочным бугром
- 3) теменными буграми

4) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) получить письменное согласие пациентки на плановое оперативное вмешательство
- 2) накормить пациентку
- 3) напоить пациентку
- 4) побеседовать с родственниками

**ДОСТОВЕРНЫМ (АБСОЛЮТНЫМ) ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отек
- 2) патологическая подвижность
- 3) боль
- 4) местное повышение температуры

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) противоаллергическое
- 2) нейролептическое
- 3) гипотензивное
- 4) обезболивающее

**В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 30-31
- 2) 25-26
- 3) 28-29
- 4) 20-21

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) быстрое поступление молока
- 2) самопроизвольное истечение молока
- 3) отсутствие молока
- 4) затруднение выделения молока

**ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) достоверных
- 2) предположительных
- 3) вероятных
- 4) сомнительных

**] ПАЦИЕНТА С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) лежа на спине
- 2) лежа на животе

- 3) сидя
- 4) с приподнятым изголовьем

**ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 20-25
- 2) 30-40
- 3) 10-15
- 4) 1-3

**СОЧЕТАНИЕ МАТОЧНОЙ И ВНЕМАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА НАЗЫВАЕТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ**

- 1) гетеротопической
- 2) эктопической
- 3) истмической
- 4) фимбриальной

**НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В КРОВОТОК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) под корень языка
- 2) эндотрахеально
- 3) через периферическую вену
- 4) через магистральную вену

**АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 19-20
- 2) 5-6
- 3) 15-16
- 4) 9-10

**ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ ПРОВОДЯТ С ГЛЮКОЗОЙ В КОЛИЧЕСТВЕ**

- 1) 5 г
- 2) 75 г
- 3) 25 г
- 4) 50 г

**НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ БОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) предлежания плаценты
- 2) отслойки плаценты
- 3) начавшегося выкидыша
- 4) угрожающего выкидыша

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 24

- 2) 6
- 3) 12
- 4) 2

### **ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) ингаляция кислорода, введение полиглюкина внутривенно капельно
- 2) внутримышечное введение инсулина 20 ЕД, внутривенное введение гемодеза
- 3) внутривенное введение инсулина 40 ЕД, ингаляция кислорода, введение 0,9% р-р натрия хлорида внутривенно капельно
- 4) туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, внутривенное введение 0,9% р-р натрия хлорида

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) физиологическая желтуха новорожденного
- 2) отсутствие молока
- 3) гипогалактия
- 4) экстрагенитальное заболевание в стадии декомпенсации

### **ФАКТОРОМ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИМ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) здоровый образ жизни
- 2) злоупотребление алкоголем
- 3) острые кишечные инфекции
- 4) физическая активность

### **В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ \_\_\_\_\_ ПЕРИОДА**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

### **ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ**

- 1) 2% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид
- 2) 0,25% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид
- 3) 0,25% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид
- 4) 2% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид

### **ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ**

- 1) цирроз печени
- 2) рак желудка
- 3) холецистит
- 4) язвенная болезнь

### **ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ**

- 1) пролактин
- 2) прогестерон
- 3) вазопрессин
- 4) окситоцин

### **ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРИ**

- 1) иксодовом клещевом боррелиозе – укусы комаров
- 2) малярии – употребление сырого молока
- 3) дизентерии – употребление немых овощей и фруктов
- 4) сыпном тифе – употребление некипяченой воды

### **ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ У БЕРЕМЕННОЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ**

- 1) отеки
- 2) головные боли и ухудшение зрения
- 3) тошнота и изменение вкуса
- 4) шевеление плода

### **ОБЪЕМ ВОЗДУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ**

- 1) 20-30
- 2) 50-60
- 3) 80-100
- 4) больше 100

### **ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) оксаладина цитрат (тусупрекс)
- 2) преноксдиазин (либексин)
- 3) сальбутамол
- 4) кодеин

### **ПО СРОЧНОСТИ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА**

- 1) неотложные, срочные и плановые
- 2) несрочные и быстрые
- 3) внеплановые и отсроченные
- 4) внеплановые и запланированные

### **ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЮТ**

- 1) ограничение белков
- 2) прием пряностей за 20 минут до кормления
- 3) ограничение жидкости
- 4) прием жидкости за 20 минут до кормления

## **К ОСЛОЖНЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) легочное кровотечение
- 2) гипертонический криз
- 3) кетоацидотическая кома
- 4) отек легких

## **ЭКСТИРПАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) средним гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

## **МЕРОПРИЯТИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительная контрацепция
- 2) прерывание беременности в острой фазе
- 3) обследование и раннее выявление хронических вирусных заболеваний печени
- 4) введение антибактериальных препаратов

## **В ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ВХОДЯТ ПРАВИЛА**

- 1) «вечером - легкий ужин, утром – натощак»
- 2) «вечером - очистительная клизма»
- 3) «вечером и утром - очистительная клизма»
- 4) подготовки не требуется

## **ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- 1) болевой синдром
- 2) наличие или отсутствие лейкоцитурии
- 3) острое повышение температуры тела
- 4) кровь в моче

## **НА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ С ЦЕЛЬЮ УВЛАЖНЕНИЯ НАКЛАДЫВАЮТ САЛФЕТКУ, СМОЧЕННУЮ**

- 1) дистиллированной водой
- 2) 0,5% раствором калия перманганата
- 3) 3% раствором перекиси водорода
- 4) 0,9% раствором натрия хлорида

## **ПАТРОНАЖ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 2 раза в месяц
- 4) 1 раз в месяц

**ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 20-30
- 2) 80-90
- 3) 15-20
- 4) 40-60

**ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) боль в грудной клетке
- 2) одышка
- 3) слабость
- 4) лихорадка

**ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ**

- 1) всем, опираясь на индивидуальные особенности каждой женщины
- 2) всем без исключения
- 3) по желанию
- 4) по особым показаниям

**АМЕНОРЕЯ ПРИ АТРЕЗИИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) физиологической аменореей
- 2) психогенной аменореей
- 3) фармакологической аменореей
- 4) ложной аменореей

**СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеспечение комфортных условий для мочеотделения
- 2) обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания
- 3) своевременное опорожнение дренажного мешка
- 4) промывание катетера 2 раз в день

**КАЖДУЮ ОБНАРУЖЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК**

- 1) доброкачественную
- 2) злокачественную
- 3) воспалительную
- 4) потенциально злокачественную

**ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЕЕ ПОЛУЧЕНИИ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА**

- 1) дефекты в оформлении медицинской документации
- 2) имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью
- 3) халатное отношение со стороны медицинских работников
- 4) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи

### **К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- 1) повышение температуры
- 2) головную боль
- 3) недомогание
- 4) одышку

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР**

- 1) фуросемид
- 2) атенолол
- 3) верапамил (изоптин)
- 4) омепразол

### **ЕМКОСТЬ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 100-155
- 2) 250-300
- 3) 50-55
- 4) 30-35

### **ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ**

- 1) в обмывании или обтирании особенно загрязненных участков тела
- 2) в гигиеническом душе
- 3) в купание в ванне
- 4) обработка не производится

### **РАДИОВОЛНОВУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- 1) лапароскопическим гинекологическим операциям
- 2) средним гинекологическим операциям
- 3) большим гинекологическим операциям
- 4) малым гинекологическим операциям

### **ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ (МЕДИЦИНЫ) В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эпидемиология заболеваний
- 2) здоровье работающего населения
- 3) здоровье индивидуума
- 4) общественное здоровье и факторы, влияющие на него

### **К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) гопантенная кислота (пантогам)
- 2) омнопон
- 3) пираретам
- 4) флуконазол (дифлюкан)

**ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рефлюксный фактор
- 2) антиперистальтический фактор
- 3) сфинктерный фактор
- 4) трубно-перитонеальный фактор

**САМЫМ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) метод Постникова
- 2) правило \"девяток\"
- 3) правило ладони
- 4) спиртовая проба

**ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) желтушное окрашивание кожи
- 2) вялость
- 3) темное окрашивание мочи
- 4) отказ от груди

**ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- 1) стационара
- 2) поликлиники
- 3) родильного дома
- 4) женской консультации

**ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДИАГНОСТИРОВАНА С ПОМОЩЬЮ**

- 1) гистероскопии
- 2) выскабливания стенок полости матки
- 3) лапароскопии
- 4) пункции брюшной полости через задний свод влагалища

**ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ**

- 1) ветряной оспы
- 2) скарлатины
- 3) гриппа
- 4) кори

**НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) амниоскопия
- 2) биопсия хориона
- 3) ультразвуковое исследование
- 4) электрокардиография

**ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические показатели
- 2) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
- 3) показатели соотношения, наглядности, инвалидности
- 4) демографические показатели, физического развития, обеспеченности кадрами

**ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОБА**

- 1) Шуварского
- 2) Шиллера
- 3) Гентера
- 4) Шредера

**ЦЕЛЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА К БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) знакомство с семьей
- 2) подготовка женщины к достаточной лактации
- 3) обучение уходу за ребенком
- 4) выяснение состояния здоровья отца ребенка

**В ТРИАДУ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА ВХОДЯТ СИМПТОМЫ**

- 1) судороги, олигурия, отеки
- 2) артериальная гипотония, протеинурия, отеки
- 3) артериальная гипертензия, протеинурия, отеки
- 4) артериальная гипертензия, гематурия, отеки

**ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ГЕМОГЛОБИН В Г/Л**

- 1) 96
- 2) 112
- 3) 118
- 4) 120

**ПОСЛЕ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАСТОТА ИММУНИЗАЦИИ У RH (-) –ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТАХ В СРЕДНЕМ**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 50
- 4) 30

**МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ**

- 1) влагалищным доступом с обезболиванием
- 2) влагалищным доступом без обезболивания
- 3) трансабдоминальным путем под обезболиванием
- 4) трансабдоминальным путем без обезболивания

### **СЕКСУАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) состояние, позволяющее испытывать половое влечение и реализацию его, получая при этом удовольствие
- 2) наличие ежедневной половой жизни
- 3) воздержание от беспорядочных половых связей
- 4) наличие нескольких половых партнеров

### **ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фамотидин
- 2) мизопростол (сайтотек)
- 3) солкосерил
- 4) дротаверин (но-шпа)

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) глаукома
- 2) заболевание печени
- 3) нерегулярная половая жизнь
- 4) возраст младше 35 лет

### **ПАТРОНАЖ, НА КОТОРОМ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ГОТОВЯТ К ДОСТАТОЧНОЙ ЛАКТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) второй дородовый
- 2) первый дородовый
- 3) первичный врачебно-сестринский
- 4) целевой патронаж

### **В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- 1) бесплатные образцы искусственной смеси
- 2) плакаты, рекламирующие пустышки, соски
- 3) плакаты, рекламирующие детское питание
- 4) плакаты с принципами успешного грудного вскармливания

### **ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 28 – 30
- 2) 38 – 42
- 3) 35 – 37
- 4) 32 – 34

### **ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ**

- 1) инсулина, глюкагона
- 2) гемоглобина, цветового показателя
- 3) гормонов Т3, Т4, ТТГ
- 4) лейкоцитов, СОЭ

### **ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая дыхательная недостаточность
- 2) лихорадка
- 3) боль в грудной клетке
- 4) легочное кровотечение

### **ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение выработки простагландинов
- 2) повышение концентрации эстрадиола
- 3) снижение концентрации эстрадиола
- 4) снижение концентрации прогестерона

### **К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)
- 2) фуросемид (лазикс)
- 3) фуразидин (фурагин)
- 4) флуконазол (дифлюкан)

### **ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) лейкоциты
- 2) эластические волокна
- 3) эозинофилы
- 4) атипичные клетки

### **ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ РЕБЕНКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ**

- 1) молочную смесь
- 2) кипяченую воду
- 3) манную кашу
- 4) картофельное пюре

### **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ОСНОВАНА НА**

- 1) оценке цвета мочи
- 2) результатах общего анализа мочи
- 3) микробиологическом исследовании мочи
- 4) анализа мочи по Нечипоренко

### **НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) запор
- 2) диарея
- 3) метеоризм
- 4) парез кишечника

### **СПОСОБ АБУЛАДЗЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ**

- 1) задержки в матке дольки плаценты
- 2) задержки в матке оболочек
- 3) кровотечения из влагалища
- 4) наличии признаков отделения плаценты и отсутствии самостоятельного рождения последа

### **ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) положительный симптом Щеткина-Блюмберга
- 2) положительный симптом Ортнера
- 3) болезненность в эпигастральной области
- 4) положительный симптом Пастернацкого

### **ОСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) психогенной аменореей
- 2) фармакологической аменореей
- 3) физиологической аменореей
- 4) ложной аменореей

### **ПРОМЕДОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) муколитиков
- 2) транквилизаторов
- 3) наркотических анальгетиков
- 4) антибиотиков

### **ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наблюдение
- 2) выкопировка данных из первичных документов
- 3) тестирование
- 4) анкетирование

### **ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) III
- 2) IV
- 3) II
- 4) I

### **ТАУРИН ЖЕНСКОГО МОЛОКА УЧАСТВУЕТ В**

- 1) переваривании жиров
- 2) регуляции работы желудочно-кишечного тракта
- 3) развитию нервной системы
- 4) формированию флоры кишечника

## **ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И ТАЗА МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие хорошей родовой деятельности
- 2) запоздалое излитие околоплодных вод
- 3) признак Вастена отрицательный
- 4) задержка мочеиспускания

## **ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК НЕ ИМЕЕТ**

- 1) ворсинок
- 2) сальниковых отростков
- 3) гаустр
- 4) продольных мышечных лент

## **КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ИМЕЕТ**

- 1) неблагоприятный прогноз для течения беременности
- 2) благоприятный прогноз для физиологического течения беременности
- 3) показания для прерывания беременности
- 4) крайне неблагоприятный прогноз для течения беременности

## **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА**

- 1) с приподнятым ножным концом
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) положение не имеет значения
- 4) с приподнятым ножным и головным концом

## **АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) над лобком
- 2) чуть ниже пупка со стороны позиции
- 3) на уровне пупка
- 4) выше пупка

## **РАЗМЕР ТАЗА, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) прямой
- 2) правый косой
- 3) левый косой
- 4) прямой и поперечный

## **ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- 1) 15-19
- 2) 1-3
- 3) 3-7
- 4) 8-12

**ПОД ТАХИКАРДИЕЙ ПОНИМАЮТ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ (В МИН)**

- 1) 50
- 2) 60
- 3) 80
- 4) 70

**ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО ЗА СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 15-20
- 2) 20-25
- 3) 6-8
- 4) 8-10

**ДЛЯ ИСХОДА РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ХАРАКТЕРНО**

- 1) кровоизлияние в полость сустава
- 2) анкилоз
- 3) деформация сустава
- 4) отсутствие остаточных деформаций

**САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) серозная
- 2) флегмонозная
- 3) застойная
- 4) инфильтративная

**ОСНОВНЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ибупрофен
- 2) метамизол натрия (анальгин)
- 3) ацетилсалициловая кислота
- 4) эпинефрин (адреналин)

**ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кумулятивное
- 2) резорбтивное
- 3) местное
- 4) рефлекторное

**ПОД ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ**

- 1) через желудочный зонд
- 2) минуя желудочно-кишечный тракт
- 3) через гастростому
- 4) с помощью питательных клизм

**СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гематурия
- 2) дизурия
- 3) никтурия
- 4) пиурия

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бактерия
- 2) вирус
- 3) микоплазма
- 4) хламидия

**НОВорожденный при оценке по шкале Апгар на 5 баллов находится в состоянии асфиксии**

- 1) нет асфиксии
- 2) тяжелой степени
- 3) средней степени
- 4) легкой степени

**Гной при пункции заднего свода влагалища указывает на**

- 1) внематочную беременность
- 2) острый эндометрит
- 3) пельвиоперитонит
- 4) гиперплазию эндометрия

**Внутренним половым органом является**

- 1) уретра
- 2) матка
- 3) бартолинова железа
- 4) клитор

**Статистика населения изучает**

- 1) рождаемость, смертность и воспроизводство населения
- 2) миграцию в различных регионах страны
- 3) общую и по возрастной плодovitость
- 4) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам

**Достоверным признаком беременности является**

- 1) отсутствие менструации
- 2) наличие плода в полости матки
- 3) увеличение живота
- 4) увеличение размеров матки

**К препарату выбора для лечения дизентерии у беременных относится**

- 1) цiproфлоксацин
- 2) цефтриаксон

- 3) гентамицин
- 4) тетрациклин

### **РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ ПОД**

- 1) местная инфильтрационной анестезией
- 2) парацервикальной анестезией
- 3) внутривенным наркозом
- 4) пудендальной анестезией

### **ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПАЦИЕНТКИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ**

- 1) увеличение массы тела
- 2) лихорадка
- 3) дисбактериоз
- 4) отеки

### **У НОВОРОЖДЕННОГО ПЛОХО РАЗВИТА ФУНКЦИЯ КОЖИ**

- 1) защитная
- 2) дыхательная
- 3) выделительная
- 4) образовательная

### **АГГЛЮТИНИНЫ СОДЕРЖАТСЯ В**

- 1) эритроцитах
- 2) плазме
- 3) лейкоцитах
- 4) тромбоцитах

### **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) оформление медицинских документов
- 2) клиника «острого живота»
- 3) неэффективность амбулаторного лечения
- 4) необходимость консультации узкого специалиста

### **ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ НАЧАЛА ФЕРРОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) 3 триместр
- 2) перед родами
- 3) 2 триместр
- 4) 1 триместр

### **ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ НАЗЫВАЮТ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД**

- 1) при открытии шейки 6 см
- 2) с началом родовой деятельности

- 3) до начала родовой деятельности
- 4) при открытии шейки 3 см

**ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК РОДРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 30-32
- 2) 33-34
- 3) 36-37
- 4) 39-40

**СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение матки
- 2) отсутствие менструации
- 3) нарушение обоняния
- 4) увеличение молочных желез

**ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ МЕНСТРУАЦИИ ДО ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) физиологической аменореей
- 2) фармакологической аменореей
- 3) ложной аменореей
- 4) психогенной аменореей

**ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- 1) приготовить теплую грелку
- 2) вызвать дополнительных сотрудников
- 3) ввести анальгетики
- 4) дать слабительное

**ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) анатаксины
- 2) антибиотики
- 3) иммуноглобулины
- 4) сыворотки

**ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ 70 Г/Л БЕРЕМЕННУЮ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ**

- 1) в дневной стационар
- 2) на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам
- 3) на санаторно-курортное лечение
- 4) на госпитализацию в стационар

**ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОСТРАДАВШЕГО (ПАЦИЕНТА) С ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) с приподнятым изголовьем

- 2) на боку
- 3) с приподнятыми конечностями
- 4) полусидя

### **ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) пункция заднего свода влагалища
- 2) бактериоскопия
- 3) лапароскопия
- 4) цитологическое исследование аспирата из полости матки

### **ЗАРАЖЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РОДАМИ ПРИВОДИТ К**

- 1) порокам развития плода
- 2) врожденной ветрянке
- 3) формированию вторичного иммунодефицита у новорожденного
- 4) гипотрофии плода

### **К ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) менингококковый назофарингит
- 2) менингококкцемия
- 3) смешанная форма
- 4) менингококковый менингит

### **КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- 1) быть простым в применении
- 2) быть низкоэффективным
- 3) обладать необратимым действием
- 4) иметь сложные инструкции применения

### **СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ В ДНЯХ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 5-6
- 2) 3-4
- 3) 7-8
- 4) 10-12

### **СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) бронхиальной астмой
- 2) удушьем
- 3) сердечной астмой
- 4) диспноэ

### **К КРИСТАЛЛОИДНЫМ ИНФУЗИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) полиглюкин

- 2) реополиглюкин
- 3) желатиноль
- 4) 0,9% раствор натрия хлорида

### **ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 3 ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) продолжительности 1 и 2 периода родов
- 2) величины и размеров последа
- 3) состояния плода
- 4) наличия признаков отделения плаценты

### **ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- 1) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; среднегодовая численность населения
- 2) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году
- 3) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения
- 4) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году

### **РЕАКЦИЯ СРЕДЫ В ПОЛОСТИ МАТКИ**

- 1) слабокислая
- 2) кислая
- 3) щелочная
- 4) нейтральная

### **ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**

- 1) туловище
- 2) конечностях
- 3) лице
- 4) слизистой щек

### **ПОД РЕФЛЕКСОМ БАБКИНА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС**

- 1) хватания
- 2) ладонно-ротовой
- 3) охватывания
- 4) ползания

### **МАССА МАТКИ В ГРАММАХ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ**

- 1) 60-70
- 2) 30-40
- 3) 40-50
- 4) 50-60

### **МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ,**

## **НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) специализированная
- 2) медико-социальная
- 3) паллиативная
- 4) квалифицированная

## **ДЫХАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК**

- 1) аритмичное глубокое
- 2) ритмичное глубокое
- 3) аритмичное поверхностное
- 4) ритмичное поверхностное

## **ПОЛОВОЙ КРИЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) снижением температуры тела
- 2) повышением температуры тела
- 3) увеличением грудных желез
- 4) увеличением массы тела

## **ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ**

- 1) «рисового отвара»
- 2) «болотной тины»
- 3) «горохового пюре»
- 4) «крахмальных зерен»

## **КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) тахикардия, тремор, экзофтальм
- 2) лихорадка, кашель с мокротой, одышка
- 3) полифагия, полидипсия, полиурия
- 4) боль в пояснице, отеки, лихорадка

## **МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- 1) серединой большого родничка и подъязычной костью
- 2) затылочным бугром и подбородком
- 3) переносицей и затылочным бугром
- 4) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой

## **К МЕТОДУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ**

- 1) близнецовый
- 2) биохимический
- 3) цитологический
- 4) дерматоглифический

## **К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) хлоргексидин

- 2) перекись водорода
- 3) диакарб
- 4) омепрозол

**НИЖНЕЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) аритмическим
- 2) диастолическим
- 3) систолическим
- 4) пульсовым

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 60
- 2) 50
- 3) 40
- 4) 25

**ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) санация очагов стафилококковой инфекции
- 2) занятия спортом
- 3) витаминизированное питание
- 4) бициллинопрофилактику

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) антирабическая вакцина
- 2) лечение больных бешенством животных
- 3) экстренная антибиотикопрофилактика
- 4) антирабический анатоксин

**СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ СТИМУЛИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ**

- 1) бромокриптина (парлодела)
- 2) прогестерона
- 3) простагландинов
- 4) партусистена

**ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) показатель рождаемости
- 2) темп прироста населения
- 3) абсолютный прирост населения
- 4) темп роста

**ЗАПОДОЗРИТЬ НЕКРОЗ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) кисту яичника

- 2) прерывание беременности
- 3) миому матки
- 4) роды

### **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ**

- 1) только законодательными актами субъектов РФ
- 2) законодательством РФ, на региональном уровне уменьшается
- 3) только законодательством РФ
- 4) законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться

### **К ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- 2) статистический талон
- 3) талон на прием к врачу
- 4) амбулаторную карту

### **ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ СХВАТОК ПРЕПАРАТЫ**

- 1) простагландины
- 2) гемостатики
- 3) спазмолитики
- 4) антибиотики

### **ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ**

- 1) суточный диурез и водный баланс
- 2) продолжительность сна
- 3) время прогулок
- 4) время общения с родственниками

### **МЕЖМЕНСТРУАЛЬНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) метроррагией
- 2) менометроррагией
- 3) полименореей
- 4) альгоменореей

### **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) необходимость дополнительных методов обследования
- 2) клиника «острого живота»
- 3) необходимость консультации узкого специалиста
- 4) оформление медицинских документов

### **ВЕЛИЧИНА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТА ПУЛЬСА РОДИЛЬНИЦЫ**

### **ПОМОГАЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНИТЬ**

- 1) стадии геморрагического шока
- 2) стадии ДВС-синдрома
- 3) аномалию родовой деятельности
- 4) степень гипоксии плода

### **НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОРМЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) «по требованию»
- 2) через 4 часа
- 3) через 3 часа
- 4) через 2 часа

### **ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИЗНАКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПО МЕТОДУ ШРЕДЕРА СЛЕДУЕТ**

- 1) надавить ребром ладони над лобком
- 2) определить изменение стояния высоты дна матки
- 3) предложить роженице подышать
- 4) проверить пульсацию сосудов пуповины

### **НОВОРОЖДЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО ДНЯ**

- 1) 14
- 2) 7
- 3) 30
- 4) 29

### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КРАСНУХОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) исключение из пищи облигатных аллергенов
- 2) применение фолиевой кислоты
- 3) постановка прививки от краснухи во время беременности
- 4) вакцинация от краснухи до начала беременности и предотвращение контактов с больными краснухой

### **К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- 1) головная боль
- 2) слабость
- 3) кашель с мокротой
- 4) легочное кровотечение

### **К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТ**

- 1) высокий уровень холестерина
- 2) занятия физической культурой
- 3) неотягощенная наследственность
- 4) рациональное питание

### **ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ**

### **НАЗНАЧАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ДНЕЙ)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 2

### **ЧЕТВЕРТЫМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) отношение подлежащей части к плоскостям малого таза
- 2) местонахождение головки по отношению ко входу в малый таз
- 3) положение, позицию плода
- 4) массу плода

### **АНТИТЕЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЛКИ**

- 1) альбумины
- 2) глобулины
- 3) фибриноген
- 4) ферменты

### **СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭПИТЕЛИЕМ**

- 1) железистым
- 2) цилиндрическим мерцательным
- 3) плоским
- 4) кубическим

### **ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) респираторный дистресс-синдром плода
- 2) генерализованная инфекция
- 3) врожденные пороки развития
- 4) гипоксия плода

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) задержка стула более 48 часов
- 2) подготовка к инструментальному исследованию
- 3) постановка лекарственной клизмы
- 4) первые дни после операции на желудочно-кишечном тракте

### **АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ложной аменореей
- 2) фармакологической аменореей
- 3) физиологической аменореей
- 4) психогенной аменореей

### **МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 50
- 2) 47
- 3) 46
- 4) 49

**К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ СОСАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- 1) маленький язык
- 2) сухость слизистой
- 3) обильное слюнотечение
- 4) валикообразное утолщение десен

**ПАЦИЕНТКЕ, ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ, АКУШЕРКА ЗАПЛАНИРУЕТ БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

- 1) на операционном столе
- 2) вечером накануне операции
- 3) утром в день операции
- 4) за 1 сутки до операции

**ПОТЕРЯ КРОВИ В 750-1500 МЛ (15-30% ОЦК) СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ**

- 1) 4-ой
- 2) 1-ой
- 3) 2-ой
- 4) 3-ой

**ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННЫХ В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 18-19
- 2) 24-25
- 3) 20-21
- 4) 22-24

**ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- 1) запорами
- 2) неправильным положением половых органов
- 3) язвой желудка
- 4) бронхиальной астмой

**ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 2-3 МИНУТЫ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 50-60
- 2) 30-40
- 3) 20-30
- 4) 15-20

## **ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА КОНТРОЛИРУЮТСЯ**

- 1) после каждой потуги
- 2) через каждые 15 минут
- 3) через каждые 10 минут
- 4) через каждые 5 минут

## **МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10-15
- 2) 1-5
- 3) 20-30
- 4) 30-60

## **ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ, ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ, СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эклампсия
- 2) преэклампсия
- 3) ДВС-синдром
- 4) Hellp-синдром

## **ПРИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРМОН**

- 1) прогестерон
- 2) плацентарный лактоген
- 3) альфа-фетопротеин
- 4) эстриол

## **АЛЛОХОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- 1) гемостатические
- 2) антисептики
- 3) противорвотные
- 4) желчегонные

## **ОВАРИЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) средним гинекологическим операциям
- 4) лапароскопическим гинекологическим операциям

## **К ОСЛОЖНЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ВОЗНИКЛО БАГРОВОЕ ПЯТНО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) тромбофлебит
- 2) некроз
- 3) медикаментозная эмболия
- 4) гематома

**СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ В ЛИТРАХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ**

- 1) 3,0-3,5
- 2) 0,5-1,0
- 3) 2,0-2,5
- 4) 1,0-1,5

**ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРЕД КОРОВЬИМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокая калорийность
- 2) высокое содержание белка
- 3) оптимальное соотношение пищевых веществ
- 4) высокое содержание витаминов

**ГИПЕРПЛАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) восстановлением структуры элементов ткани
- 2) снижением массы органа или ткани
- 3) увеличением массы органа или ткани
- 4) увеличением количества клеток

**К МЯГКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) аэрозоль
- 2) таблетка
- 3) паста
- 4) раствор

**СБОР МОЧИ ДЛЯ ИСЛЕДОВАНИИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАЖДЫЕ (Ч)**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 3

**ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРИЧИНОЙ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) прервавшаяся внематочная беременность
- 2) цистаденома яичника
- 3) гиперплазия эндометрия
- 4) кандидамикоз

**ПРИЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ПАЦИЕНТОМ ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В**

- 1) день
- 2) 10 дней
- 3) 2 недели
- 4) 7 дней

## **СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) только здоровьем матери
- 2) состоянием здоровья матери и ребенка
- 3) массой тела ребенка
- 4) только здоровьем ребенка

## **У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ВСЕГДА ОТКРЫТ РОДНИЧОК**

- 1) правый боковой
- 2) левый боковой
- 3) малый
- 4) большой

## **К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ОТНОСИТСЯ**

- 1) послеродовая гипотония матки
- 2) удушье
- 3) приступ стенокардии
- 4) гипертонический криз

## **К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ**

- 1) 14-16 недель
- 2) 4-6 недель
- 3) 10-13 недель
- 4) 7-9 недель

## **ПОЛИПЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- 1) малым гинекологическим операциям
- 2) большим гинекологическим операциям
- 3) лапароскопическим гинекологическим операциям
- 4) средним гинекологическим операциям

## **НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ**

- 1) излитие околоплодных вод шейки
- 2) отхождение слизистой пробки
- 3) прижатие головки к входу в малый таз
- 4) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки

## **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рвота 5-10 раз в день, протеинурия, лейкоцитоз
- 2) рвота до 5 раз в день, отсутствие аппетита
- 3) непрекращающаяся рвота, прогрессирующая кетонурия в течении 3-4 дней, выраженная тахикардия, желтушное окрашивание склер и кожного покрова
- 4) дерматоз, температура 37,5°C, ЧДД 21 – 22

## **ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР В БАЛЛАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5 – 7
- 2) 10 – 12
- 3) 2 – 4
- 4) 8 – 10

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЕ ПЛОДА В ОСНОВНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) женской консультации
- 2) акушерском отделении родильного дома
- 3) отделении новорожденных родильного дома
- 4) поликлинике для взрослого населения

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) наружной конъюгатой
- 2) индексом Соловьева
- 3) истинной конъюгатой
- 4) диагональной конъюгатой

**АКУШЕРКА, ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ НЕ ПРИШЛА НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ПРОВОДИТ ПАТРОНАЖ**

- 1) только по назначению врача
- 2) в течение недели
- 3) в этот же или на следующий день
- 4) в течение месяца

**ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ КРОВИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ**

- 1) язв
- 2) тромбозов и тромбоэмболий
- 3) кровотечений
- 4) пролежней

**У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) низкое расположение пупочного кольца
- 2) громкий крик
- 3) непропорциональное телосложение
- 4) мышечная гипотония

**К ПРИЗНАКУ ЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ**

- 1) анасарка
- 2) тахикардия
- 3) тонические и клонические судороги
- 4) обезвоживание

**ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение концентрации кальция
- 2) повышение концентрации простагландинов
- 3) понижение выработки окситоцина
- 4) повышение выработки эстрадиола

**ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ**

- 1) 11-11,5
- 2) 12,5-13
- 3) 20-21
- 4) 9-10

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ**

- 1) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности
- 2) получение медицинской помощи минимального объема
- 3) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- 4) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи

**ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10,5
- 2) 13
- 3) 11
- 4) 11,5

**ПРИ ВЫРАЖЕННОМ МНОГОВОДИИ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1-1,5
- 2) 2-3
- 3) 5-7
- 4) 3-4

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение скелетного вытяжения
- 2) наложение жгута
- 3) наложение гипсовой повязки
- 4) транспортная иммобилизация

**К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) коммерческие секс работники
- 2) потребители инъекционных наркотиков
- 3) беременные женщины
- 4) мужчины, имеющие секс с мужчинами

## **НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проводниковая анестезия
- 2) эпидуральная анестезия
- 3) самомассаж
- 4) ингаляционная анестезия

## **РЕГЕНЕРАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) восстановлением структуры элементов ткани
- 2) снижением массы органа или ткани
- 3) увеличением массы органа или ткани
- 4) увеличением количества клеток

## **ИНФОРМАЦИЮ О СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ**

- 1) фракционное желудочное зондирование
- 2) общий анализ кала
- 3) рентгенологическое исследование
- 4) дуоденальное зондирование

## **ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАРУЖНОЙ КОНЪЮГАТЫ ТАЗА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ НА**

- 1) спине с согнутыми ногами
- 2) боку с согнутой вышележащей ногой
- 3) боку с согнутой нижележащей ногой
- 4) спине с вытянутыми ногами

## **ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ**

- 1) 6 часов
- 2) 3 часов
- 3) 5 часов
- 4) 4 часов

## **ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ**

- 1) на 8-12 день
- 2) на 15-19 день
- 3) на 3-7 день
- 4) в первые 12 часов жизни

## **К ЭЛЕМЕНТУ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- 1) симпатические и парасимпатические нервы
- 2) синусовый узел, предсердно-желудочковый узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье
- 3) сосочковые мышцы, сухожильные нити
- 4) венечный синус, ушки предсердий

## **В ТРЕТЬЕМ МОМЕНТЕ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ**

- 1) разгибание головки
- 2) дополнительное сгибание головки
- 3) боковое сгибание туловища
- 4) внутренний поворот головки

## **СНИМАЮТ ШВЫ НА ПРОМЕЖНОСТИ, ОЧИЩАЮТ РАНУ ОТ ГНОЙНОГО ОТДЕЛЯЕМОГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЯЮТ УЧАСТКИ НЕКРОТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ В**

- 1) обсервационном акушерском отделении
- 2) родильном зале
- 3) приемном отделении
- 4) выписной комнате

## **РАЗВИТИЕ ОТЁКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) аскаридоза
- 2) трихинеллёза
- 3) дифиллоботриоза
- 4) энтеробиоза

## **ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) набухшие сосуды
- 2) головная боль
- 3) клочущее дыхание
- 4) судороги, рвотные движения

## **ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) экстрагенитальная патология в стадии компенсации
- 2) пороки развития плода несовместимые с жизнью
- 3) рубец на матке
- 4) предлежание плаценты

## **ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО**

- 1) жидкий, обильный, зловонный стул, имеющий вид «болотной тины»
- 2) инкубационный период 10-14 суток
- 3) увеличение печени и селезенки
- 4) нормальная температура тела

## **К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) эссенциале форте Н
- 2) ацетилсалициловая кислота
- 3) парацетам
- 4) амброксол (лазолван)

### **ПЯТЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) регулирование потуг
- 2) рассечение промежности
- 3) бережное выведение головки вне потуг
- 4) освобождение плечевого пояса и рождение туловища

### **АДРЕНОБЛОКАТОРОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фуросемид
- 2) атенолол
- 3) изоптин
- 4) омепрозол (омез)

### **ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) изменении настроения
- 2) прибавке веса
- 3) нарушении маточно-плацентарного кровообращения
- 4) похудении

### **ПРИ НАЛОЖЕНИИ ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ РОДИЛЬНИЦЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ**

- 1) 1 месяц
- 2) 2 дня
- 3) 2 недели
- 4) 5 дней

### **К САМОМУ ЧАСТОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- 1) кахексию
- 2) желудочное кровотечение
- 3) кишечную непроходимость
- 4) обезвоживание

### **ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ДЛЯ ЕГО КОРРЕКЦИИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ (ЛФК) ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 1) 30-35
- 2) 20-26
- 3) 36-38
- 4) 22-24

### **СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ ПРИ**

- 1) появлении потуг
- 2) опущении головки плода в полость малого таза
- 3) образовании пояса прилегания
- 4) полном или почти полном открытии маточного зева

## **К ОСЛОЖНЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С РЕЗКО СНИЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) холецистит
- 2) рак желудка
- 3) язвенная болезнь
- 4) цирроз печени

## **ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИБАВКА ЗА НЕДЕЛЮ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 100-200
- 2) 300-400
- 3) 700-800
- 4) 500-600

## **БЕРЕМЕННОЙ С ДИАГНОЗОМ: БЕРЕМЕННОСТЬ 34 НЕДЕЛИ. ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) вакуум-экстракция плода
- 2) плодоразрушающая операция
- 3) операции кесарево сечение в экстренном порядке
- 4) операция кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки

## **ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать мочеиспускание рефлексорно
- 2) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- 3) ввести мочегонные средства
- 4) применить теплую грелку на низ живота

## **К ПОКАЗАНИЮ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) маточное кровотечение
- 2) опухоль яичников
- 3) острый гнойный сальпингоофорит
- 4) хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии

## **ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ**

- 1) отсутствие рефлексов
- 2) отсутствие сердечной деятельности
- 3) отсутствие самостоятельного дыхания
- 4) появление на коже трупных пятен

## **ИСТИННУЮ КОНЪЮГАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕМ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА**

- 1) наружной конъюгаты
- 2) размера Франка
- 3) индекса Соловьева

4) диагональной конъюгаты

**ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ**

- 1) бифидобактерии
- 2) кишечная палочка
- 3) энтерококки
- 4) протей

**СРЕДНЯЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 46-49
- 2) 42-45
- 3) 55-59
- 4) 50-54

**ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- 1) В12-дефицитная анемия
- 2) хронический лейкоз
- 3) железодефицитная анемия
- 4) острый лейкоз

**ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАНИМАЮТ БОЛЕЗНИ**

- 1) воспалительные
- 2) врожденные аномалии
- 3) осложнения беременности
- 4) онкологические

**ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ**

- 1) проводится, если есть подозрения на опухолевидные разрастания в верхних дыхательных путях, пневмонию, туберкулёз, жалобы на инородное тело в лёгких
- 2) назначается в первой и второй половине беременности
- 3) назначается однократно при постановке на учет
- 4) назначается трижды за беременность