

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в педиатрии» для аккредитации медиков**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:  
[https://medik-otvet.ru/product/medsestra\\_pediatriya/](https://medik-otvet.ru/product/medsestra_pediatriya/)

### **ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕПОДОГРЕТЫХ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ**

- 1) инфильтрата
- 2) тромба
- 3) эмбола
- 4) волдыря

### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ\_ МЕ В СУТКИ**

- 1) 200
- 2) 1000
- 3) 1500
- 4) 800

### **КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) появление пульса на сонной артерии
- 2) вздутие эпигастральной области
- 3) бледность кожных покровов
- 4) экскурсия грудной клетки

### **ПРИ АНЕМИЯХ В ОБЩЕМ КЛИНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ**

- 1) эозинофилов
- 2) лейкоцитов, нейтрофилов
- 3) эритроцитов, гемоглобина
- 4) тромбоцитов

### **ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 1 ГОДА В ОДНУ МИНУТУ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 16-18
- 2) 30-35
- 3) 40-60

4) 20-25

**ЧАЩЕ ВСЕГО ОМФАЛИТ У НОВОРОЖДЕННОГО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) пневмококк
- 2) золотистый стафилококк
- 3) протей
- 4) кишечная палочка

**РАННИМ СИМПТОМОМ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение температуры
- 2) косоглазие
- 3) энофтальм
- 4) задержка роста

**ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) эритроцитов
- 2) лейкоцитов
- 3) билирубина
- 4) глюкозы

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ**

- 1) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- 2) первичную доврачебную медико-санитарную помощь
- 3) специализированную медицинскую помощь
- 4) первичную специализированную медико-санитарную помощь

**ЭПИНЕФРИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА \_ МЛ НА КГ ВЕСА**

- 1) 0,5-0,7
- 2) 1-2
- 3) 0,01-0,03
- 4) 0,1

**ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) \_ЦВЕТА**

- 1) желтого
- 2) белого
- 3) черного
- 4) красного

**В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ ВЛАЖНОСТЬ В ИНКУБАТОРЕ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ НА УРОВНЕ \_**

**ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 85
- 2) 100
- 3) 95
- 4) 90

**ПОЛИМОРФНАЯ СЫПЬ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) НАБЛЮДАЕТСЯ В ПЕРИОДЕ РАЗГАРА ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) скарлатина
- 2) корь
- 3) ветряная оспа
- 4) краснуха

**ЗА ЛИЦАМИ, ОБЩАВШИМИСЯ С БОЛЬНЫМИ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ \_ (ДЕНЬ) С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОЧАГЕ**

- 1) 21
- 2) 7
- 3) 14
- 4) 36

**ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ К \_ ЧАСУ ЖИЗНИ**

- 1) 10-12
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 3-4

**К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) радиоактивные отходы
- 2) пищевые отходы инфекционных отделений
- 3) отходы микробиологических лабораторий
- 4) пищевые отходы соматических отделений

**К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) избыточный вес
- 2) курение
- 3) возраст
- 4) артериальная гипертензия

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 30-40 секунд
- 2) 10-15 секунд

- 3) 3-4 минуты
- 4) 1-2 минуты

**К ПРЕПАРАТАМ СУРФАКТАНТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) порактант альфа
- 2) эпинефрин
- 3) дексаметазон
- 4) преднизолон

**ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКСИГЕНАЦИИ НЕДОНОШЕННОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КЮВЕЗЕ, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ \_ %**

- 1) 70
- 2) 60
- 3) 40
- 4) 20

**ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) воздушно-капельный
- 2) алиментарный
- 3) контактный
- 4) трансмиссивный

**ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) одного года
- 2) одного месяца
- 3) трех месяцев
- 4) шести месяцев

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ КРОВИ В ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ВЫПОЛНЯЮТ В СРОК ДО \_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 15
- 4) 20

**ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СЫПИ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) папула
- 2) бугорок
- 3) пузырек
- 4) волдырь

**НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 Г СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ**

- 1) 2
- 2) 0,1
- 3) 1,5
- 4) 0,5

**В ТЕЧЕНИЕ 6 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАНОВКИ ПРОБЫ МАНТУ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ДЕТИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЛУЧАЕ**

- 1) с отрицательной реакцией
- 2) с инфильтратом 8-10 мм
- 3) с инфильтратом 4-6 мм
- 4) с инфильтратом более 17 мм

**БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ, ВЫЯВЛЕННОЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) цилиндрурия
- 2) гематурия
- 3) лейкоцитурия
- 4) пиоурия

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) выполнение диагностических процедур
- 2) проведение профилактических осмотров
- 3) проведение диспансерного наблюдения
- 4) информирование о факторах риска для здоровья

**У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, В ПОТЕ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИОНОВ**

- 1) кальция
- 2) железа
- 3) калия
- 4) натрия

**ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ \_ ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- 1) на четвертый
- 2) на восьмой
- 3) в первый
- 4) на второй

**УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) полиурия
- 2) олигурия

- 3) ишурия
- 4) поллакиурия

**У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ \_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 32-34
- 2) 38-40
- 3) 28-30
- 4) 26-28

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЛИ АБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) при посещении участкового педиатра
- 2) при очередном проведении медико-социальной экспертизы
- 3) при патронаже медицинской сестрой
- 4) при патронаже социальным работником

**НАЧАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ШУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ДБ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (УЗБ)**

- 1) 90
- 2) 60
- 3) 150
- 4) 50

**В СЛУЧАЕ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ**

- 1) на период до 7 дней включительно
- 2) на весь период лечения ребенка
- 3) на период до 15 дней включительно
- 4) на период до 10 дней включительно

**ПРИ ОЖИДАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ ТЕМПЕРАТУРА В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 26-28
- 2) 18-20
- 3) 20-22
- 4) 22-24

**ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У**

- 1) цистита
- 2) гломерулонефрита
- 3) нефроптоза
- 4) пиелонефрита

**ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ \_ ЧАСОВ С МОМЕНТА ПОПАДАНИЯ ЯДА**

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА \_ МЛ НА КГ ВЕСА**

- 1) 15
- 2) 20
- 3) 5
- 4) 10

**К ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дивертикул чашечки
- 2) уретероцеле
- 3) стриктура мочеточника
- 4) цистинурия

**ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ РАСШИРЕННОГО НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕСТ-БЛАНКИ С \_ ПЯТНАМИ КРОВИ.**

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 8

**НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дача информированного добровольного согласия родителей или законного представителя
- 2) измерение роста и веса
- 3) оплата медицинских вмешательств
- 4) проведение пробы манту или диаскин теста

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) терморегистраторы
- 2) термографы
- 3) термометры
- 4) термоиндикаторы

**МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ НЕДОНОШЕННОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 ГРАММ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ**

- 1) 2
- 2) 0,1
- 3) 1
- 4) 0,5

**ПРИЗНАКОМ ТРАВМЫ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спазм мышц нижних конечностей
- 2) вялое свисание руки
- 3) поперхивание при глотании
- 4) отсутствие движения в одной кисти

**ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ \_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 170 -190
- 2) 120-140
- 3) 80-100
- 4) 100-120

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ:**

- 1) вздутие эпигастральной области
- 2) бледность кожных покровов
- 3) экскурсия грудной клетки
- 4) появление пульса на сонной артерии

**ПРЕПАРАТ СУРФАКТАНТА ВВОДЯТ ИЗ РАСЧЕТА \_ МГ НА КГ ВЕСА НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) 200
- 2) 250
- 3) 300
- 4) 350

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У**

- 1) инсоляция
- 2) переохлаждение
- 3) инфекционное заболевание
- 4) наследственность

**НЕДОНОШЕННЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАН ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ИМ МАССЫ\_ ГРАММ**

- 1) 3000

- 2) 3500
- 3) 2000
- 4) 2500

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДЯТ ИНСТРУКТАЖ ПО ВЗЯТИЮ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ДИФТЕРИЮ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В \_**

- 1) 12 месяцев
- 2) в 2 года
- 3) 3 месяца
- 4) 6 месяцев

**МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НЕДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хорошее развитие подкожной жировой клетчатки
- 2) закрытый малый родничок
- 3) тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком
- 4) расположение ногтей до краев ногтевого ложа

**ПАЛАТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЗАПОЛНЯЮТ СИНХРОННО С ПАЛАТАМИ ПОСЛЕРОДОВОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ \_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) воду
- 2) раствор хлорида натрия
- 3) раствор перманганата калия
- 4) раствор глюкозы

**ДО ДВУХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА У РЕБЕНКА ОТМЕЧАЕТСЯ \_ ДЫХАНИЕ**

- 1) диафрагмальное
- 2) грудное
- 3) брюшное
- 4) диафрагмально-грудное

**МАССА ТЕЛА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДИН ГОД В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ \_ КГ**

- 1) 10-11
- 2) 19-20
- 3) 14-15
- 4) 7-8

**К ТРАНЗИТОРНЫМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) простая эритема
- 2) гемолитическая болезнь новорожденных
- 3) омфалит
- 4) пузырчатка новорожденных

**ВСЕМ ДЕТЯМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) снижение потребления углеводов
- 2) увеличение потребления молочных продуктов
- 3) увеличенное количество белка
- 4) потребление жидкости в большом количестве

**ПЕРЕНОСЧИКОМ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) животные
- 2) вши
- 3) клещи
- 4) птицы

**ГРУБЫЙ КАШЕЛЬ, ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) трахеита
- 2) ларинготрахеита
- 3) фарингита
- 4) бронхита

**ОПТИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ ПЕРВОГО ПРИКЛАДЫВАНИЯ ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) первые 12 часов
- 2) вторые сутки
- 3) первые сутки
- 4) первые 30 минут

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА К КОРИ, КРАСНУХЕ, ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ ПАРОТИТУ, ОХВАТ ДЕТЕЙ В ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ВОЗРАСТАХ ВАКЦИНАЦИЕЙ И РЕВАКЦИНАЦИЕЙ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 98
- 2) 95
- 3) 92
- 4) 90

**ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ СТУЛ ИМЕЕТ ВИД**

- 1) болотной тины
- 2) ректального плевка
- 3) рисового отвара
- 4) горохового пюре

**КУРАРЕПОДОБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) периферическими параличами
- 2) клоническими судорогами
- 3) гиперкинезами
- 4) гиперсаливацией

**ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ДОЛЖЕН ПРИБАВИТЬ В ВЕСЕ НЕ МЕНЕЕ \_ ГРАММ**

- 1) 600
- 2) 200
- 3) 400
- 4) 300

**УСИЛЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) при наклоне вперед
- 2) после приема пищи
- 3) перед актом дефекации
- 4) при изменении положения тела

**В МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБОЙ ИНЪЕКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДИТ**

- 1) кожный антисептик
- 2) жгут венозный
- 3) подушечка из влагостойкого материала
- 4) стойка-штатив

**КИСЛОРОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ НОВОРОЖДЕННОМУ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ ПОДОГРЕВАЮТ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 32
- 2) 37
- 3) 34
- 4) 40

**ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 18
- 4) 12

**УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕПАТИТЕ В СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ\_ МКМОЛЬ/ Л**

- 1) 170-200
- 2) 100-170

- 3) 80-100
- 4) 200-250

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ \_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 10
- 3) 28
- 4) 3

**У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ, КАТЕТЕРОВ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) гидроколлоидного покрытия
- 2) пектинового барьера
- 3) лейкопластыря
- 4) гидрогеля

**ПОЯВЛЕНИЕ ВОДОБОЯЗНИ, ВОЗБУЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ**

- 1) столбняка
- 2) бешенства
- 3) коклюша
- 4) дифтерии

**МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ \_ КОЙКИ**

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА**

- 1) «ЭпиВакКорона»
- 2) «Спутник Лайт»
- 3) «Гам-КОВИД-Вак-М»
- 4) «КовиВак»

**ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одышка
- 2) боль в животе
- 3) слабость
- 4) утренняя скованность мелких суставов

**КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КРУПА- ОСИПЛОСТЬ, ГРУБЫЙ НАВЯЗЧИВЫЙ КАШЕЛЬ,**

**ВЫРАЖЕННАЯ ОДЫШКА, ВОЗБУЖДЕНИЕ, ДЫХАНИЕ С УЧАСТИЕМ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ,**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**ОПИСТОТОНУС, ТРИЗМ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ**

- 1) коклюша
- 2) дифтерии
- 3) бешенства
- 4) столбняка

**В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЛЯ РЕБЕНКА С НОРМАЛЬНЫМ ВЕСОМ  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ НАЗНАЧАТЬ**

- 1) молочную кашу
- 2) кефир
- 3) творог
- 4) овощное пюре

**МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 8
- 2) 10
- 3) 14
- 4) 12

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия кожных покровов
- 2) высокий мышечный тонус
- 3) цианоз кожных покровов
- 4) пульсация пуповины

**ОХВАТ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ ГРИППА В ГРУППАХ РИСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ  
\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 75
- 2) 25
- 3) 95
- 4) 90

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ**

- 1) операция
- 2) запор
- 3) метеоризм
- 4) непроходимость кишечника

**ОТ РЕБЕНКА С ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ**

- 1) сладковатый
- 2) аммиака
- 3) ацетона
- 4) «мышинный»

**РАХИТ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА**

- 1) D
- 2) A
- 3) B
- 4) C

**РИСК ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ**

- 1) корью
- 2) эпидемическим паротитом
- 3) краснухой
- 4) ветряной оспой

**ХОЛОДОВОЙ СТРЕСС У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО НАЧИНАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА МЕНЕЕ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 36,7
- 2) 36,5
- 3) 36,9
- 4) 36,8

**КАЛ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ \_(ЧАС) ПОСЛЕ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТЕКА МОЗГА ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ**

- 1) нитроглицерин
- 2) глюкозу
- 3) маннитол
- 4) инсулин

**ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ячейка
- 2) столбец
- 3) лист
- 4) строка

**К ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) менингит
- 2) менингоэнцефалит
- 3) менингококкемия.
- 4) назофарингит

**ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ДЕТЕЙ ПРОВОЦИРУЕТ ПРИЕМ**

- 1) жидкости
- 2) жирной пищи
- 3) витаминов
- 4) углеводов

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) спирометр
- 2) тонометр
- 3) динамометр
- 4) плантограф

**С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) мониторинг медико-социального благополучия детей
- 2) санитарно-гигиеническое просвещение
- 3) реализация индивидуальных комплексных программ
- 4) разработка индивидуальных комплексных программ

**К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ 1 РЯДА ОТНОСИТСЯ**

- 1) меропенем
- 2) канамицин
- 3) изониазид
- 4) теризидон

**ЛЮМБАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО**

- 1) сидя
- 2) стоя
- 3) лежа на животе
- 4) лежа на боку

**МИНИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ УБОРКИ ТУАЛЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) два раза в неделю
- 2) один раз в день
- 3) два раза в день

4) один раз в два дня

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО О**

- 1) измерения пульса
- 2) внутримышечной инъекции
- 3) измерения артериального давления
- 4) регистрации ЭКГ

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ ДЛИТСЯ \_ (ДЕНЬ)**

- 1) 35-36
- 2) 11-21
- 3) 5-7
- 4) 2-3

**СИМПТОМ ХВОСТЕКА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) муковисцидоза
- 2) рахита
- 3) спазмофилии
- 4) фенилкетонурии

**КО 2 ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЕ**

- 1) с пренатальной гипотрофией 2 степени
- 2) с гемолитической болезнью
- 3) недоношенные
- 4) с риском развития заболеваний

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ КИНЕЗОТЕРАПИИ В ПЕДИАТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кровотечение
- 2) детский церебральный паралич
- 3) болезнь Дауна
- 4) парезы

**МЕСТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ СОБРАННЫХ ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пробирка
- 2) бумажный тест-бланк
- 3) капилляр
- 4) предметное стекло

**КОНКРЕМЕНТОМ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА ПРИ РАЗВИТИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фосфаты магния
- 2) оксалаты кальция
- 3) фосфаты кальция

4) мочева́я кислота

**ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ (СО СТОРОНЫ ПЛОДА) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предлежание плаценты
- 2) патология плаценты
- 3) врожденные пороки развития
- 4) выпадение петель пуповины

**ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предотвращение плазмопотери
- 2) создание депо венозной крови
- 3) остановка венозного кровотечения
- 4) предотвращение токсемии

**ПРОБУ МАНТУ ПРОВОДЯТ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_ ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ВАКЦИНАЦИИ**

- 1) 20 дней
- 2) 2 месяца
- 3) 10 дней
- 4) 1 месяц

**ЭРИТЕМА НА ЛИЦЕ, НАПОМИНАЮЩАЯ БАБОЧКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) острой ревматической лихорадки
- 2) системной красной волчанки
- 3) узелкового периартериита
- 4) системной склеродермии

**ПРОДУКТОМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФЕНИЛАЛАНИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сыр
- 2) говядина
- 3) капуста
- 4) шоколад

**ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ НИЖЕ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 18
- 2) 16
- 3) 26
- 4) 24

**МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ САМОРАСПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ МЕШКА ПРИ ПРИВЕДЕНИИ ИВЛ НОВОРОЖДЕННЫМ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ**

- 1) 240

- 2) 350
- 3) 400
- 4) 440

**ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ДЕТЯМ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) дексаметазон
- 2) преднизолон
- 3) левотироксин натрия
- 4) тиамазол

**НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ \_ ПРОБЫ**

- 1) лакмусовой
- 2) судановой
- 3) азопирамовой
- 4) фенолфталеиновой

**ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) срочная госпитализация
- 2) направление в поликлинику
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) выполнение физиотерапевтических процедур

**АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ**

- 1) перенесенного инфекционного заболевания
- 2) приёма препаратов интерферона
- 3) вакцинации
- 4) введения иммуноглобулина

**ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) рефлексия
- 2) эмпатия
- 3) рационализация
- 4) экспрессивность

**ПРИЗНАКОМ ГИПОТЕРМИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ**

- 1) желтушные
- 2) бледные с цианозом
- 3) синюшные
- 4) гиперемированные

**ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СРЕДИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫХ НА \_ %**

- 1) 60
- 2) 30
- 3) 90
- 4) 20

**ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) энцефалит
- 2) артрит
- 3) регионарный лимфаденит
- 4) тромбоцитопения

**В ПЕРИОД ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕБЕНКУ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТЬЕ ИЗ РАСЧЕТА \_ МЛ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 40
- 4) 50

**МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_ ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_ МЛ**

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 20
- 4) 10

**РАСШИРЕННЫЙ ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОТЕРМИИ ПРОВОДИТСЯ НЕДОНОШЕННЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ВОЗРАСТЕ МЕНЕЕ \_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 25
- 2) 28
- 3) 24
- 4) 26

**ПРИ НАБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА ВО ФЛАКОН ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ \_**

## **ГРАДУСОВ**

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 90

**НА ЧЕТВЕРТОМ УРОВНЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ВСЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В ПРЕДЕЛАХ ОТ \_ °С ДО \_ °С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

- 1) +6 +10
- 2) +2 +8
- 3) -1 0
- 4) +8 +12

**РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСКАРИДОЗА НАЗНАЧАЮТ**

- 1) альбендазол
- 2) пирантел
- 3) левамизол
- 4) мебендазол

**МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЯТЕН БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПРИ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лицо
- 2) живот
- 3) слизистая щеки
- 4) спина

**ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ \_ ЧАСОВ ЖИЗНИ**

- 1) 144-168
- 2) 72-96
- 3) 6-12
- 4) 24-48

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЕ**

- 1) 800
- 2) 1000
- 3) 200
- 4) 500

**СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) правила организации деятельности медицинской организации
- 2) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

- 3) рекомендуемые штатные нормативы
- 4) оснащение медицинской организации

**ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ У НОВОРОЖДЕННОГО ЕГО УКЛАДЫВАЮТ**

- 1) на здоровый бок
- 2) на бок со стороны перелома
- 3) на живот
- 4) на спину

**ДАнные О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 030-ПО/γ-12
- 2) 030-ПО/о-12
- 3) 030-ПО/о-17
- 4) 030-ПО/γ-17

**ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА НАД ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА  
БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ \_СМ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ПРИ ОЖОГАХ В КАЧЕСТВЕ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ПРИВИТЫМ  
ДЕТЯМ ВВОДЯТ**

- 1) сыворотку противостолбнячную
- 2) столбнячный анатоксин и сыворотку противостолбнячную
- 3) иммуноглобулин человека противостолбнячный
- 4) столбнячный анатоксин

**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  
ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ \_**

- 1) 0-1-6
- 2) 0-3-12
- 3) 0-6-12
- 4) 0-1-12

**ТЕСТ-БЛАНКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ  
НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ДОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВИВШЕЙ ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ, В  
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ 1 РАЗ В \_ ДНЯ (ДНЕЙ)**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**К ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) буметанид
- 2) индапамид
- 3) амилорид
- 4) фуросемид

**К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) паровой
- 2) газовый
- 3) воздушный
- 4) плазменный

**ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) А,Б и В
- 3) любого
- 4) А

**К ПРИОБРЕТЕННОМУ ПОРОКУ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- 1) дефект межпредсердной перегородки
- 2) дефект межжелудочковой перегородки
- 3) тетрада Фалло
- 4) митральный стеноз

**СМЕНА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ НА ПОСТОЯННЫЕ НАЧИНАЕТСЯ У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ  
\_(ЛЕТ)**

- 1) 7–10
- 2) 5–7
- 3) 2–5
- 4) 10–13

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) заинтересованность в результате труда
- 2) высокая работоспособность
- 3) отстраненность от пациентов и работы
- 4) активное участие в жизни коллектива

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ПОСЕЩАЕТ РЕБЕНКА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СО ВТОРОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ**

- 1) раз в три месяца
- 2) еженедельно

- 3) 1 раз в месяц
- 4) два раза в месяц

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА НЕ ПОЗДНЕЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 36
- 4) 6

**РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 2) одышка, \"ржавая\" мокрота
- 3) длительный субфебрилитет, покашливание
- 4) приступ удушья, стекловидная мокрота

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИЩИ В ТЕЧЕНИЕ 7-10 ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_ ДОЛЖНОГО ОБЪЕМА**

- 1) половину
- 2) на треть больше
- 3) одну треть
- 4) две трети

**ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ РОЖДЕНИИ ОЦЕНИВАЮТ ПО ШКАЛЕ**

- 1) Глазго
- 2) Апгар
- 3) SCORE
- 4) Ross

**ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) пинцет с ватным шариком
- 2) палочки с ватой
- 3) ватные жгутики
- 4) марлевые салфетки

**ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА \_**

- 1) Г
- 2) А
- 3) В
- 4) Б

**ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ДЕТАМ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ НА КГ ВЕСА**

- 1) 15
- 2) 25
- 3) 5
- 4) 50

**ДЛЯ ЗАПРАВКИ САЛАТОВ В СТОЛОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ**

- 1) уксус
- 2) лимонный сок
- 3) сметана
- 4) майонез

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ДЕТЯМ ДО С 4 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бетаметазона дипропионат
- 2) мометазон
- 3) клобетазон
- 4) метилпреднизолона ацепонат

**ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ У ДЕТЕЙ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) протромбина
- 2) непрямого билирубина
- 3) прямого билирубина
- 4) общего белка

**ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ \_- ЧАСОВ С МОМЕНТА ПОПАДАНИЯ ЯДА**

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ПРИ НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОТЕКОВ**

- 1) увеличить прием жидкости и соли
- 2) ограничить прием жидкости и соли
- 3) ограничить прием белков и жиров
- 4) увеличить прием белков и жиров

**ВЫЯВЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В СЫВОРОТКЕ ПРИ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) нарушения обмена билирубина
- 2) цитолиза гепатоцитов
- 3) внутрипеченочного билистаза
- 4) холестаза

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОСЛЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ  
УДАЛЯЮТ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА**

- 1) А
- 2) Б
- 3) Г
- 4) В

**В СТОЛОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОТОВЫЕ ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ  
БЛЮДА МОГУТ НАХОДИТЬСЯ НА ГОРЯЧЕЙ ПЛИТЕ НЕ БОЛЕЕ \_ ЧАСОВ С МОМЕНТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

**ПРИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ ДЕФИЦИТ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 5-10
- 2) 10-15
- 3) 21-30
- 4) более 30

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА**

- 1) В
- 2) Д
- 3) С
- 4) А

**ВЫПИСКА БОЛЬНОГО ДИФТЕРИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОГО  
КЛИНИЧЕСКОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И \_-КРАТНОГО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ  
РЕЗУЛЬТАТОМ.**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ) ДЛЯ  
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ФАП
- 2) детская поликлиника
- 3) врачебная амбулатория
- 4) хоспис

**СТАТИСТИЧЕСКОМУ УЧЕТУ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ, РОДИВШИЕСЯ С**

**МАССОЙ ОТ \_ ГРАММ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ИМИ 168 Ч ЖИЗНИ**

- 1) 500
- 2) 400
- 3) 750
- 4) 1000

**ПЕРВЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ \_(МЕСЯЦ)**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В ВОЗРАСТЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ**

- 1) с токсической эритемой
- 2) здоровым доношенным
- 3) с ВИЧ-инфекцией
- 4) с физиологической желтухой

**СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) коллапс
- 2) сопор
- 3) кома
- 4) обморок

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЕМКостей для сбора медицинских отходов КЛАССА Б ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ \_**

- 1) ежедневно
- 2) один раз в неделю
- 3) один раз в три дня
- 4) два раза в день

**ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертонус мышц разгибателей
- 2) обычный мышечный тонус
- 3) мышечная гипотония
- 4) гипертонус мышц сгибателей

**ОСМОТР НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕДИКУЛЕЗ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ И НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В\_ ДНЕЙ**

- 1) 10

- 2) 14
- 3) 7
- 4) 5

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ АТОНИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 23-25
- 2) 16-20
- 3) 37-38
- 4) 20-25

**ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 5 МЕСЯЦЕВ, ЕГО УКЛАДЫВАЮТ**

- 1) на правый бок
- 2) на живот
- 3) на спину
- 4) на левый бок

**АВТОРОМ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА К ВВЕДЕНИЮ ЧУЖЕРОДНОГО БЕЛКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Мечников
- 2) Нечипоренко
- 3) Безредка
- 4) Пастер

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОПУЩЕННЫЕ К ВЗЯТИЮ И ПОСЕВУ МАТЕРИАЛА НА ДИФТЕРИЮ, ПРОХОДЯТ ИНСТРУКТАЖ НЕ РЕЖЕ \_ В БАКЛАБОРАТОРИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИФТЕРИЮ**

- 1) 1 раза в год
- 2) 3 раз в год
- 3) 1 раза в полгода
- 4) 1 раза в месяц

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 20-25
- 2) 16-20
- 3) 37-38
- 4) 23-25

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дезинфекция
- 2) стерилизация
- 3) антисептика

4) асептика

#### **ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ МОКРОТА**

- 1) вязкая, стекловидная
- 2) жидкая, слизистая,
- 3) пенистая, розовая
- 4) желто-зеленая, жидкая

#### **ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) избыточная инсоляция
- 3) гиподинамия
- 4) избыточная масса тела

#### **ПРИ ОБМОРОКЕ РЕБЕНКУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА**

- 1) горизонтально
- 2) полусидя
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с приподнятым ножным концом

#### **ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ С \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 2
- 2) 12
- 3) 4
- 4) 6

#### **В ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ**

- 1) молоко
- 2) чеснок
- 3) яблоки
- 4) говядину

#### **ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ СОБРАННЫХ ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 10-12
- 2) 18-20
- 3) 0-1
- 4) 2-8

#### **У НОВОРОЖДЕННОГО С ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИЕЙ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ**

- 1) бледные
- 2) розовые
- 3) гиперемированы
- 4) цианотичные

**РЕБЕНКУ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) сальбутамола
- 2) фенотерола
- 3) парацетамола
- 4) ацетилсалициловой кислоты

**КАБИНЕТ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ СОЗДАЕТСЯ НА БАЗЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

- 1) паллиативную
- 2) скорую
- 3) первичную медико-санитарную
- 4) специализированную

**В СТОЛОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОТОВЫЕ БЛЮДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ \_ ЧАСОВ С МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.**

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**АВТОР МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА К ВВЕДЕНИЮ ЧУЖЕРОДНОГО БЕЛКА**

- 1) Пастер
- 2) Мечников
- 3) Нечипоренко
- 4) Безредка

**ВСЕМ ДЕТЯМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) бактериологическое обследование носоглоточной слизи
- 2) клиническое исследование цереброспинальной жидкости
- 3) электронейромиограмма
- 4) ультразвуковое исследование головного мозга

**ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ \_ САНТИМЕТРОВ ОТ УХА**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 15

**ПИТАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ В**

**ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) парентерально
- 2) с ложечки
- 3) из бутылочки
- 4) грудью

**ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СЧИТАЕТСЯ НЕ ДОСТИГНУТЫМ ПРИ СУММАРНОЙ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В \_ БАЛЛОВ**

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 10
- 4) 14

**ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 8
- 2) 12
- 3) 4
- 4) 6

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) перцентильные диаграммы
- 2) индекс массы тела
- 3) круговые диаграммы
- 4) индекс Брока

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) стерилизация
- 2) антисептика
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

**УЧЕТНАЯ ФОРМА "КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО" ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ \_ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА**

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 20
- 4) 10

**СИМПТОМ «ПРИЛИПШЕЙ» ПЯТКИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПЕРЕЛОМА**

- 1) костей стопы
- 2) позвоночника

- 3) шейки бедра
- 4) костей голени

### **ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ**

- 1) белками
- 2) калием
- 3) углеводами
- 4) клетчаткой

### **ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ УМЕНЬШИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) поваренной соли
- 2) углеводов
- 3) жидкости
- 4) жиров

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ**

- 1) сифонную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 4) масляную клизму утром

### **МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ**

- 1) лица, не достигшего 15-летнего возраста
- 2) лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами
- 3) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным
- 4) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ДЕТАМ ДО 1 ГОДА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) мометазон
- 2) клобетазон
- 3) метилпреднизолона ацепонат
- 4) бетаметазона дипропионат

### **РЕАКЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НА ПРОВОДИМЫЕ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ**

- 1) в первую и пятую минуты
- 2) каждые 30 секунд
- 3) каждую минуту
- 4) через 10 минут

### **МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО**

**ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_ ПОСЛЕ ЕДЫ**

- 1) 1 час
- 2) 2 часа
- 3) 4 часа
- 4) 3 часа

**ОДНИМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острый трахеит
- 2) острый ринит
- 3) синдром ДВС
- 4) острый фарингит

**К МОЧЕГОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) фуросемид
- 2) фурагин
- 3) фурадонин
- 4) фуразолидон

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОХВАТ ПРОБОЙ МАНТУ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 95
- 2) 100
- 3) 98
- 4) 90

**ПРИЧИНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гастрит
- 2) желчекаменная болезнь
- 3) язвенная болезнь желудка
- 4) панкреатит

**КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У РЕБЕНКА 1 ГОДА**

- 1) 10
- 2) 4
- 3) 8
- 4) 6

**В ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) клобетазон
- 2) бетаметазон
- 3) преднизолон
- 4) дексаметазон

**ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертоническая болезнь
- 2) инфекционный миокардит
- 3) врожденный порок сердца
- 4) инфекционный эндокардит

**ВЕДУЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) судорожная готовность
- 2) экспираторная одышка
- 3) гипертермия
- 4) инспираторная одышка

**ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) омфалит
- 2) везикулопустулез
- 3) парапроктит
- 4) сепсис

**ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ**

- 1) фосфорорганическими соединениями
- 2) атропином
- 3) этанолом
- 4) метанолом

**К МЕНИНГИАЛЬНЫМ ОТНОСИТСЯ СИМПТОМ**

- 1) Мерфи
- 2) Василенко
- 3) Лассега
- 4) Брудзинского

**В СОСТАВ ТРАВЯНОГО ЛАКТОГЕННОГО ЧАЯ ВХОДИТ**

- 1) подорожник
- 2) ландыш
- 3) зверобой
- 4) Melissa

**ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУГОУХОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) многоплодная беременность
- 2) компенсированная гипертензия у матери
- 3) асфиксия новорожденного
- 4) анемия легкой степени у матери

**ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ПРОТЕКАЕТ \_ ФОРМА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) отечная
- 2) желтушная
- 3) анемическая
- 4) смешанная

**ПОЭТАПНОЕ ВЫСЫПАНИЕ ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНОЙ СЛИВНОЙ СЫПИ С 4 - 5 ДНЯ  
БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) краснуха
- 2) ветряная оспа
- 3) корь
- 4) эпидемический паротит

**ВСЕМ ДЕТЯМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) исследование кала на скрытую кровь
- 2) общий анализ крови
- 3) определение рН в желудочном содержимом
- 4) исследование уровня гастрин в сыворотке крови

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ КРОВИ В ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ  
ТЕСТ-БЛАНКОВ**

- 1) 10 дней
- 2) 5 дней
- 3) 24 часов
- 4) 72 часов

**ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_  
ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 16-18
- 2) 24-28
- 3) 20 - 24
- 4) 18-20

**ОВОЩИ УРОЖАЯ ПРОШЛОГО ГОДА (КАПУСТУ, РЕПЧАТЫЙ ЛУК, КОРНЕПЛОДЫ) В  
ПЕРИОД ПОСЛЕ 1 \_ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ**

- 1) мая
- 2) февраля
- 3) марта
- 4) апреля

**ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ**

**УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН В ТЕЧЕНИЕ \_ ЧАСОВ ПОДРЯД**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**К КРИТЕРИЯМ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОТНОСЯТ**

- 1) ожирение
- 2) высокую физическую активность
- 3) частые респираторные заболевания
- 4) заболевания ЖКТ в анамнезе

**КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ**

- 1) Амбюрже
- 2) Аддиса-Каковского
- 3) Нечипоренко
- 4) Зимницкого

**ЗА ЛИЦАМИ, ПЕРЕБОЛЕВШИМИ СКАРЛАТИНОЙ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ \_ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА**

- 1) 1 месяца
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 года
- 4) 3х лет

**ПРИ УХОДЕ ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ, ЕГО ПРОМЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ \_ ЧАСА (ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА D РЕБЕНКУ ДО 3 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЕ**

- 1) 600
- 2) 1000
- 3) 200
- 4) 500

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПАСТЕРИЗОВАННОГО ГРУДНОГО МОЛОКА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 18

4) 24

**ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) крупяные супы
- 2) молочные продукты
- 3) молочные каши
- 4) мясные бульоны

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИЕМА СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) синусовая тахикардия
- 2) экстрасистолия
- 3) пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
- 4) фибрилляция предсердий

**СЕАНС МАССАЖА ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ НАЧИНАЕТСЯ С**

- 1) вибрации
- 2) разминания
- 3) поглаживания
- 4) растирания

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) ежедневно
- 2) один раз в семь дней
- 3) один раз в месяц
- 4) один раз в три дня

**НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПРОВОДИТСЯ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ ДО \_ (МЕСЯЦ) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ВАКЦИНЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРИВИВОЧНОЙ БРИГАДЫ ХРАНЯТСЯ**

- 1) в специальном холодильнике
- 2) на процедурном столе
- 3) в шкафу процедурного кабинета
- 4) в обычной медицинской сумке

**ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ**

- 1) головная боль
- 2) повышение температуры
- 3) одышка

4) сонливость

**ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ ДО 1,5 ЛЕТ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ**

- 1) разгибательных поверхностей конечностей
- 2) живота
- 3) сгибательных поверхностей конечностей
- 4) спины

**АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) на второй день после рождения
- 2) на четвертый день после рождения
- 3) сразу после рождения
- 4) перед выпиской из родильного отделения

**В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ОСМАТРИВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ КАЖДЫЕ \_ (ЧАС)**

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

**СИНДРОМ АРЛЕКИНА У НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) нарушения микроциркуляции
- 2) снижения терморегуляции
- 3) нарушения функции ЦНС
- 4) мышечной гипотонии

**СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ БРЮШНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кишечное кровотечение
- 2) инфекционно-токсический шок
- 3) судороги
- 4) гипертермия

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ВЫРАЖЕННОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТСЯ К \_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЮНОШЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) скрининг-тесты
- 2) осмотр педиатра
- 3) лабораторное обследование
- 4) инструментальное обследование

**ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ \_ ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- 1) на второй
- 2) на четвертый
- 3) на седьмой
- 4) в первый

**НАЗНАЧЕНИЕ ДЖОЗАМИЦИНА ДЕТЯМ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ОСТРЫЙ БРОНХИТ ВЫЗВАН**

- 1) вирусом парагриппа
- 2) аденовирусом
- 3) риновирусом
- 4) хламидиями

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обострение хронического заболевания не чаще 1 раза в год
- 2) достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания
- 3) обострение хронического заболевания не чаще 2 раз в год
- 4) достижение частичной компенсации физиологических функций хронического заболевания

**ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ \_ % ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) 25
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 20

**В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЛАЖНАЯ УБОРКА РЕКРЕАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) по окончании занятий
- 2) утром, перед занятиями
- 3) два раза в день
- 4) после каждой перемены

**ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 2-3 ЛЕТ СТРОИТСЯ В ВИДЕ**

- 1) лекции
- 2) игры
- 3) уроки
- 4) беседы

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ НА \_ ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- 1) 8
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 10

**ДОНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_ (НЕДЕЛЯ)**

- 1) 38-42
- 2) 35-37
- 3) 32-34
- 4) 28-30

**ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ СУРФАКТАНТА В ПЕРВЫЕ \_ МИНУТ ЖИЗНИ РЕБЕНКА**

- 1) 15
- 2) 20
- 3) 25
- 4) 30

**ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) в палате для отдельного пребывания послеродового отделения
- 2) в наблюдательном отделении
- 3) в отделении патологии новорожденных
- 4) в палате для совместного пребывания послеродового отделения

**БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- 1) фенилкетонурии
- 2) болезни Дауна
- 3) галактоземии
- 4) муковисцидоза

**МОНИТОРИНГ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) калориметром
- 2) капнографом
- 3) пульсоксиметром
- 4) спирометром

**ПРОБУ МАНТУ СЧИТАЮТ СОМНИТЕЛЬНОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ПАПУЛЫ \_ ММ**

- 1) 10
- 2) 18
- 3) 1
- 4) 3

**ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИВЛ У НОВОРОЖДЕННОГО ПОДСЧЕТ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_ СЕКУНД**

- 1) 20
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 12

**К КОНЦУ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ \_ ЗУБОВ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 4
- 4) 8

**ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ \_ СУТКИ ЖИЗНИ**

- 1) на четвертые
- 2) на седьмые
- 3) на вторые
- 4) в первые

**РАХИТ У РЕБЕНКА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА**

- 1) С
- 2) А
- 3) Д
- 4) В

**МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ БОЛЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) левое подреберье
- 2) правое подреберье
- 3) эпигастральная область
- 4) околопупочная область

**ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ**

- 1) непрокалываемый контейнер
- 2) мешок красного цвета
- 3) бумажный контейнер
- 4) мешок желтого цвета

**К СОЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) повышение качества жизни населения
- 2) улучшение медицинского обслуживания
- 3) сокращение убытков от временной нетрудоспособности
- 4) консолидация общества

**ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) запоры, боли в животе
- 2) отеки, боль в пояснице
- 3) полидипсия, полиурия
- 4) сухой кашель, одышка

**МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) для предупреждения западения языка
- 2) для обеспечения проходимости дыхательных путей
- 3) при оксигенотерапии
- 4) при искусственной вентиляции лёгких

**НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА \_ МЛ НА КГ ВЕСА**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 8

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НОВОРОЖДЕННОМУ, РОДИВШЕМОУСЯ В АСФИКСИИ, ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ \_ МИНУТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) одну и пять
- 2) одну и две
- 3) пять и десять
- 4) три и пять

**САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) омфалит
- 2) токсическая эритема
- 3) пузырьчатка новорожденных
- 4) потница

**ПЕРВАЯ РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 20
- 2) 15
- 3) 18

4) 12

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ КОРИ ДЛИТСЯ \_ (ДЕНЬ)**

1) 7-21

2) 5-7

3) 5-14

4) 35-36

**АДЕКВАТНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И**

1) суточное мониторирование АД

2) регистрация ЭКГ

3) измерение АД утром и вечером

4) подсчет пульса утром и вечером

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА НЕ ПОЗДНЕЕ \_ ЧАСОВ**

1) 6

2) 36

3) 24

4) 12

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО НАСТУПАЕТ К \_ ДНЮ ЖИЗНИ**

1) 10-12

2) 14-15

3) 2-3

4) 6-7

**ОБРАЗЦЫ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ДОСТАВЛЯЮТСЯ В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ \_ ЧАСОВ**

1) 72

2) 94

3) 60

4) 48

**БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК, ЯВЛЯЕТСЯ**

1) кальций

2) билирубин

3) креатинин

4) глюкоза

**СРЕДНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ПРОЦЕНТОВ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ**

1) 6-8

- 2) 12-15
- 3) 1-2
- 4) 14-18

**ЭПИНЕФРИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА \_ МЛ НА КГ ВЕСА**

- 1) 0,1-0,3
- 2) 0,01-0,03
- 3) 0,5-0,7
- 4) 1-2

**ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ**

- 1) на бок
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) с приподнятым ножным концом
- 4) строго горизонтально

**ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ I ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ \_ РАБОЧИХ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 24
- 3) 10
- 4) 20

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У РЕБЕНКА МОМЕТАЗОН МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ С \_ ЛЕТ(ГОДА)**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 15
- 4) 12

**КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РАНЕЕ \_ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ**

- 1) 2
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 8

**СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 030/у
- 2) 030-ПО/у-17
- 3) 030-ПО/0-17
- 4) 030-ПО/у-13

**ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ \_**

- 1) детского невролога
- 2) травматолога-ортопеда
- 3) детского стоматолога
- 4) эндокринолога

**ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ СЫПЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ В 10-15 ПРОЦЕНТАХ СЛУЧАЕВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфекционный мононуклеоз
- 2) корь
- 3) ветряная оспа
- 4) скарлатина

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 40
- 2) 37
- 3) 25
- 4) 30

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТАНОЛОМ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) атропин
- 2) унитиол
- 3) налоксон
- 4) этанол

**ШУМ И БОЛЬ В УШАХ У РЕБЕНКА С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) синусита
- 2) фарингита
- 3) евстахеита
- 4) назофарингита

**НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ И ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЦИРОВАННОСТИ H. PYLORI У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) гистологического анализа
- 2) бактериологического анализа
- 3) иммуноферментного анализа
- 4) 13C-уреазного дыхательного теста

**МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКОЙ**

## **СЕСТРОЙ**

- 1) операционной
- 2) палатной детского отделения
- 3) палатной терапевтического отделения
- 4) по массажу

## **СПЕЦИФИЧЕСКИМ АНТАГОНИСТОМ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) налоксон
- 2) унитиол
- 3) атропин
- 4) апоморфина гидрохлорид

## **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЛИСТНУЮ ИНВАЗИЮ \_ ,ПРОВОДЯТ СОСКОБ С ПЕРИАНАЛЬНЫХ СКЛАДОК**

- 1) эхинококкоз
- 2) аскаридоз
- 3) энтеробиоз
- 4) трихоцефалез

## **У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ \_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 34-36
- 2) 40-42
- 3) 30-32
- 4) 28-30

## **СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эмболия
- 2) абсцесс
- 3) гиперемия
- 4) тромбоз

## **ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ**

- 1) бледность, носовые кровотечения, поражение суставов
- 2) гиперемия лица, ускоренный рост волос
- 3) бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса
- 4) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь

## **ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 18
- 2) 24
- 3) 28
- 4) 22

**ДЛЯ ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ЧЕРЕЗ \_ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ**

- 1) 2-5 минут
- 2) 1,5-2 часа
- 3) 15-20 минут
- 4) 3-4 часа

**ПРИ ОЖИДАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 22
- 2) 30
- 3) 26
- 4) 24

**АЛАЯ ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ \_ КРОВОТЕЧЕНИЯ**

- 1) артериального
- 2) венозного
- 3) смешанного
- 4) капиллярного

**РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 9
- 2) 15
- 3) 12
- 4) 18

**ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ**

- 1) класса А,Б и В
- 2) любого класса
- 3) только класса А
- 4) только класса Б

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_ (ЧАС) С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА (ПО ТЕЛЕФОНУ)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 72
- 2) 36
- 3) 24
- 4) 48

**ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО, РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ЧЕРЕЗ \_ МИН**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 20

**ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ГРИППА У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) арбидол
- 2) гриппферон
- 3) кагоцел
- 4) осельтамивир

**ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ишурия
- 2) никтурия
- 3) полиурия
- 4) поллакиурия

**В КЛАССИФИКАЦИИ TNM ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ БУКВА N ОЗНАЧАЕТ**

- 1) поражение лимфатических узлов
- 2) размер опухоли
- 3) наличие метастазов
- 4) распространение опухоли

**ОТДЕЛОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮЩИМСЯ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сигмовидная и прямая кишка
- 2) желудок
- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) ободочная кишка

**В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВСЕМ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ \_ (МЕСЯЦ) ПРОВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ**

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 12

4) 3

**РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 1,5 ЛЕТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ АНТИГИСТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ**

- 1) лоратадин
- 2) дезлоратадин
- 3) фексофенадин
- 4) левоцетиризин

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) глюкоза
- 2) белок
- 3) билирубин
- 4) уробилин

**В ГРУППУ ПРОДУКТОВ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИХ ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ У ДЕТЕЙ ВХОДИТ**

- 1) яблоко
- 2) коровье молоко
- 3) груша
- 4) говядина

**ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА**

- 1) прямой кишки
- 2) мочевого пузыря
- 3) ободочной, сигмовидной и прямой кишки
- 4) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

**В СООТВЕТСТВИИ С «ФОРМУЛОЙ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ» У РЕБЁНКА 12-и МЕСЯЦЕВ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ**

- 1) 10 зубов
- 2) 4 зуба
- 3) 8 зубов
- 4) 6 зубов

**КАБИНЕТ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СОЗДАЕТСЯ НА БАЗЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

- 1) специализированную
- 2) паллиативную
- 3) скорую
- 4) первичную медико-санитарную

**В ЭТИОЛОГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) хеликобактерии
- 2) кишечной палочке

- 3) стафилококку
- 4) иерсинии

**ЗАКРЫТЫЕ ЕМКОСТИ С ЗАМОРОЖЕННЫМ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ МОРОЗИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ МИНУС 18 °С В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 6

**ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ**

- 1) камфорным спиртом
- 2) 2% водным раствором бриллиантового зеленого
- 3) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- 4) 5% спиртовым раствором йода

**ИЗОЛЯЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР В 5 БАЛЛОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ \_ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО**

- 1) умеренной
- 2) легкой
- 3) тяжелой
- 4) очень тяжелой

**ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИВЛ У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТАНИЕ ЧСС БОЛЕЕ \_ УДАРОВ В МИН.**

- 1) 90
- 2) 140
- 3) 70
- 4) 100

**ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ \_ (НЕДЕЛЬ)**

- 1) 22-24
- 2) 30-32
- 3) 26-28
- 4) 38-40

## **ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕСТА ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА**

- 1) дует на место венепункции для быстрого высыхания
- 2) протирает место венепункции сухим марлевым тампоном
- 3) протирает место венепункции сухим ватным тампоном
- 4) ждет полного самостоятельного высыхания

## **ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРЕБЫВАНИИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 48
- 3) 24
- 4) 72

## **ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С**

- 1) ламивудин
- 2) декстроза
- 3) преднизолон
- 4) метоклопрамид

## **ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ СУРФАКТАНТА В ПЕРВЫЕ \_ МИНУТ ЖИЗНИ РЕБЕНКА**

- 1) 15
- 2) 40
- 3) 25
- 4) 30

## **МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А ПОДЛЕЖАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА**

- 1) в 2 недели
- 2) в 3 недели
- 3) в месяц
- 4) в неделю

## **ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» У РЕБЕНКА МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ**

- 1) острой пневмонии
- 2) бронхоэктатической болезни
- 3) острого бронхита
- 4) сухого плеврита

## **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

- 1) бронхографию
- 2) флюорографию
- 3) рентгенографию органов грудной клетки
- 4) спирометрию

**ПРИ ЧЕСОТКЕ ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ НАЗНАЧАЮТ ЭМУЛЬСИЮ БЕНЗИЛБЕНЗОАТА В КОНЦЕНТРАЦИИ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 20

**ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН**

- 1) кабинетами медико-социальной помощи
- 2) региональным центром медико-социальной помощи
- 3) отделениями медико-социальной помощи
- 4) межмуниципальными отделениями медико-социальной помощи

**В СТРУКТУРЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ПРЕОБЛАДАЕТ**

- 1) стеноз
- 2) кровотечение
- 3) перфорация
- 4) пенетрация

**КАЧЕСТВО ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОТ КРОВИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ \_ ПРОБЫ**

- 1) судановой
- 2) фенолфталеиновой
- 3) азопирамовой
- 4) лакмусовой

**ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЮНОШЕЙ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ \_ (ЭТАП)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ**

- 1) бледный
- 2) желтушный
- 3) цианотичный
- 4) гиперемированный

**ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ \_ ( ЧАС) ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ**

- 1) 3

- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

**ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение реабилитационных мероприятий
- 2) уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
- 3) подтверждение диагноза заболевания
- 4) проведение радикальных оперативных вмешательств

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 90
- 2) 25
- 3) 45
- 4) 10

**КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО ПСИХИАТРА В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ (МЕСЯЦ)**

- 1) 24
- 2) 36
- 3) 18
- 4) 12

**ВАКЦИНАЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНОЙ**

- 1) ассоциированной
- 2) живой
- 3) инактивированной
- 4) комбинированной

**ТЕМПЕРАТУРА В КЮВЕЗЕ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО С МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 1500 ГРАММ В ВОЗРАСТЕ 3Х ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 35
- 2) 37
- 3) 32
- 4) 30

**МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ МЕНЯЕТ ПЕРЧАТКИ**

- 1) через 6 часов
- 2) каждые 2 часа
- 3) каждый час
- 4) ежедневно

**МЕСТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ \_ КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ**

- 1) нижний внутренний
- 2) верхний внутренний
- 3) верхний наружный
- 4) нижний наружный

**ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ С НОВОРОЖДЕННЫМ ДОПУСТИМЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) -10
- 2) -15
- 3) 0
- 4) -20

**ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 025/у
- 2) 030-ПО/у-17
- 3) 030-ПО/у-12
- 4) 025-1/у

**ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА**

- 1) ободочной и прямой кишки
- 2) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- 3) мочевого пузыря
- 4) прямой кишки

**ПРИ ГИПОТРОФИИ I СТЕПЕНИ ДЕФИЦИТ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 21-30
- 2) 5-7
- 3) 10-15
- 4) 15-20

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СРЕДНЕМ \_ ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 14-21
- 2) 7-10
- 3) 7-14
- 4) 10-14

**ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК САМОСТОЯТЕЛЬНО СИДИТ С ВОЗРАСТА \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 8

4) 12

**ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО МЕСЯЦА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА**

- 1) травматолога
- 2) невролога
- 3) психиатра
- 4) оториноларинголога

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО**

- 1) регистрации ЭКГ
- 2) измерения артериального давления
- 3) измерения пульса
- 4) внутримышечной инъекции

**ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КОНТРОЛИРУЮТ И ФИКСИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ**

- 1) каждые 2 часа
- 2) один раз в день
- 3) два раза в день
- 4) каждые 3 часа

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) ревакцинация против туберкулеза
- 2) вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 3) третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 4) ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

**НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕТЯМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кумуляция
- 2) антагонизм
- 3) синергизм
- 4) полипрагмазия

**ДЕТЯМ ДО 10 ЛЕТ ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ \_ СМ**

- 1) 15-30
- 2) 6-15
- 3) 15-20
- 4) 2-6

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ \_ ДНЕЙ**

- 1) 14-21
- 2) 7-10
- 3) 35-36
- 4) 1-7

**ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО**

- 1) разводит лекарственное средство физиологическим раствором
- 2) проводит пробу на наличие аллергической реакции
- 3) подогревает лекарственное средство
- 4) проверяет срок годности

**В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» И НЕЭФФЕКТИВНОСТИ**

- 1) переливание эритроцитарной массы
- 2) глюкокортикоиды
- 3) плазмоферез
- 4) переливание плазмы

**В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ**

- 1) дифтерии
- 2) кори
- 3) туберкулеза
- 4) полиомиелита

**К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ**

- 1) тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций
- 2) повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3) крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения
- 4) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения

**ТАМПОНЫ С ВЗЯТЫМ МАТЕРИАЛОМ ОТ ПАЦИЕНТА С ДИФТЕРИЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТАВЛЕНЫ В ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_ ЧАСА ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5

**НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 Г СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ**

- 1) 1
- 2) 0,5
- 3) 0,1
- 4) 2

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 40
- 2) 39
- 3) 37
- 4) 34

**ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 50 КУБИЧЕСКИХ ДЕЦИМЕТРОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 34 ГРАДУСА НЕ МЕНЕЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 24
- 2) 8
- 3) 12
- 4) 36

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ РАНЕЕ \_ДНЕЙ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ АНТИБИОТИКОВ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 2

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБКАХ, ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ \_ ЧАСОВ ПОСЛЕ ИХ ВСКРЫТИЯ**

- 1) 8
- 2) 6
- 3) 3
- 4) 10

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КРУПА ЭФФЕКТИВНО ИНГАЛЯЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ**

- 1) фенотерола
- 2) эуфиллина
- 3) будесонида
- 4) сальбутамола

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) антацидные препараты
- 2) блокаторы H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов
- 3) ингибиторы протонного насоса
- 4) препараты висмута трикалия дицитрата

**ПРИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ НЕДОНОШЕННОСТИ МАССА ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАММОВ**

- 1) 1001-1500
- 2) менее 1000
- 3) 1501-2000
- 4) 2001-2500

**ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ КОЖА РЕБЕНКА**

- 1) цианотичная, влажная
- 2) розовая, сухая
- 3) бледная, влажная
- 4) желтушная, сухая

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ГЕПАТИТЕ «А» ДЛИТСЯ \_ (ДЕНЬ)**

- 1) 7-21
- 2) 35-36
- 3) 5-14
- 4) 5-7

**ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МЕНЕЕ\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 60
- 2) 80
- 3) 90
- 4) 100

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие пузырей или их остатков
- 2) гиперемия кожи
- 3) некроз тканей
- 4) отек тканей

**ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфекционный миокардит
- 2) перикардит
- 3) инфекционный эндокардит
- 4) врожденный порок сердца

**В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА ОСМОТР НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕДИКУЛЕЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 1 - 3 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И 1 РАЗ В \_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 10

**ПРИ ГАЛАКТОЗЕМИИ У РЕБЕНКА ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ В ВИДЕ**

- 1) катаракты
- 2) глаукомы
- 3) экзофтальма
- 4) энофтальма

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) ежедневно
- 2) один раз в неделю
- 3) один раз в месяц
- 4) один раз в три дня

**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ноющие боли в эпигастрии
- 2) рвота накануне съеденной пищей
- 3) изжога
- 4) нарушение стула

**В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ \_ ЗАПАС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАСЧЕТНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ**

- 1) месячный
- 2) недельный
- 3) пятидневный
- 4) годовой

**МЕСТОМ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) надлопаточная область
- 2) внутренняя поверхность плеча
- 3) наружная поверхность плеча
- 4) внутренняя поверхность бедра

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРИВИВКИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-ВАКЦИНАТОР**

- 1) сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача
- 2) проводит осмотр ребенка
- 3) делает заключение о возможности вакцинации
- 4) организует работу иммунологической комиссии

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ВИРУС**

- 1) Коксаки
- 2) Эпштейна-Барр
- 3) ЕСНО

4) Ласса

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К РАННЕМУ ПРИКЛАДЫВАНИЮ К ГРУДИ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тугие соски
- 2) компенсированная артериальная гипертензия
- 3) избыточная масса тела
- 4) открытая форма туберкулеза

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ**

- 1) сифонную клизму за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 4) масляную клизму утром

**ПРИ ПОПАДАНИИ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ В КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ**

- 1) эмболии
- 2) флегмоны
- 3) кровотечения
- 4) спазма сосуда

**К СЕРДЕЧНЫМ ГЛИКОЗИДАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ**

- 1) атенолол
- 2) каптоприл
- 3) ибупрофен
- 4) коргликон

**ПАЛЛИАТИВНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) врачом-педиатром
- 2) медицинской сестрой
- 3) врачом-хирургом
- 4) врачом-онкологом

**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ**

- 1) вторичная профилактика
- 2) первичная профилактика
- 3) реабилитация
- 4) третичная профилактика

**ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ (БОЛЕЗНЬ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА) СЫПЬ**

- 1) в виде хаотичных геморрагий разных размеров

- 2) мелкопятнистая, геморрагическая симметричная
- 3) пятнисто папулезная, с характерной этапностью высыпаний
- 4) геморрагическая звездчатая хаотичная

**ОБИЛЬНАЯ РВОТА «ФОНТАНОМ», СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У ГРУДНОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) перекармливания
- 2) эзофагита
- 3) пилороспазма
- 4) пилоростеноза

**ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ**

- 1) экссудативный плеврит
- 2) абсцесс легкого
- 3) бронхоэктатическая болезнь
- 4) острая пневмония

**МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИВИТЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_ МИНУТ**

- 1) 5
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 15

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЖЕГОДНО ДО \_ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ**

- 1) 20 февраля
- 2) 30 января
- 3) 15 февраля
- 4) 20 января

**ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_ МЛ**

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 20
- 4) 2

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХОЕ ПЕРЕВАРИВАНИЕ**

- 1) жира
- 2) белка
- 3) лактозы
- 4) глюкозы

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) проведение диспансерного наблюдения
- 2) информирование о факторах риска для здоровья
- 3) проведение профилактических осмотров
- 4) выполнение диагностических процедур

**ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕСТ-БЛАНКИ С \_ПЯТНАМИ КРОВИ**

- 1) 9
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 8

**ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) при выписке из родильного отделения
- 2) в первые 24 часа после рождения
- 3) на седьмой день жизни
- 4) на третий день жизни

**ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ РЕБЕНКУ ВВОДЯТ**

- 1) натрия хлорид
- 2) преднизолон
- 3) диазепам
- 4) глюкозу

**УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ишурия
- 2) олигурия
- 3) полиурия
- 4) поллакиурия

**НАЧАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ШУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ДБ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (УЗД)**

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 50
- 4) 150

**УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДНЕ-ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) дифтерии
- 2) кори
- 3) краснухи
- 4) ветряной оспы

**В ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) пневмококку
- 2) энтерококку
- 3) стрептококку
- 4) стафилококку

**ВМЕСТИМОСТЬ ЖЕЛУДКА В ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ/КГ, УМНОЖЕННЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 5

**УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ГРИППОМ И ОРВИ ПРЕВЫШАЕТ \_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 20
- 4) 10

**БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ ИЗОЛИРУЮТ НА \_ ДНЕЙ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) 5
- 2) 15
- 3) 30
- 4) 20

**ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА В 5 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ \_ В МИНУТУ**

- 1) 20-25
- 2) 16-18
- 3) 30-35
- 4) 40-60

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) узелковый периартериит
- 2) эссенциальная артериальная гипертензия
- 3) стеноз почечных артерий
- 4) паренхиматозные заболевания почек

**ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ**

- 1) боли в эпигастральной области
- 2) боли в околопупочной области
- 3) нарушение стула
- 4) дисфагия

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_  
(ДЕНЬ)**

- 1) 5-7
- 2) 35-36
- 3) 14-21
- 4) 1-10

**ИНСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) бронхиальной астмы
- 2) острого обструктивного ларингита (круп)
- 3) острого бронхита
- 4) острой пневмонии

**МЕСТОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДАТЧИКА ПУЛЬСОКСИМЕТРА НОВОРОЖДЕННОМУ С  
ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) правая щиколотка
- 2) правое запястье
- 3) левая щиколотка
- 4) левое запястье

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) желудочное кровотечение
- 2) отравление грибами
- 3) отравление алкоголем
- 4) эндогенная интоксикация

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ  
ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ  
СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1:15
- 2) 1:20
- 3) 2:15
- 4) 2:30

**К АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМУ ВЕЩЕСТВУ (АХОВ) УДУШАЮЩЕГО  
ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) хлор
- 2) аммиак

- 3) оксид углерода II (угарный газ)
- 4) карбофос

**В ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ВХОДИТ**

- 1) печень
- 2) майонез
- 3) хлеб
- 4) сливочное масло

**СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ**

- 1) Росс
- 2) Глазго
- 3) Роттердам
- 4) Апгар

**ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПОКСИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) головное предлежание
- 2) продолжительность первых родов 10 часов
- 3) срочные роды
- 4) длительный безводный период

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) шагомер
- 2) секундомер
- 3) весы
- 4) динамометр

**АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОРМЛЕНИЮ ГРУДЬЮ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

- 1) метотрексат
- 2) бифиформ
- 3) апилак
- 4) витамина Д

**ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) частота дыхания
- 2) частота сердечных сокращений
- 3) индекс пикфлоуметрии
- 4) мышечная сила

**УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) утром, натощак
- 2) через 1 час после еды

- 3) через 2 часа после еды
- 4) сразу после еды

### **ПРОБА МАНТУ ПРОВОДИТСЯ 2 РАЗА В ГОД ДЕТЯМ**

- 1) посещающим образовательные организации
- 2) привитым, но из социально неблагополучных семей
- 3) часто болеющим
- 4) получающим кортикостероидную терапию

### **В АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) билирубин
- 2) уробилин
- 3) белок
- 4) ацетон

### **ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 1 раз в день
- 4) 1 раз в неделю

### **ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведении желудочного зондирования
- 2) проведении УЗИ желудочно-кишечного тракта
- 3) определение инфицированности *H. pylori*
- 4) проведении рентгенологического исследования желудка

### **ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ**

- 1) крестообразную
- 2) восьмиобразную
- 3) спиральную
- 4) варежку

### **ДЛЯ ОЦЕНКИ БОЛИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ, А ТАКЖЕ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) цветная шкала Эланда
- 2) визуально-аналоговая шкала
- 3) рейтинговая шкала Вонга-Бейкера
- 4) метод наблюдения

### **ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ДЫХАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АПНОЭ У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) эпинефрин
- 2) кофеин-бензоат натрия

- 3) порактант альфа
- 4) преднизолон

**В ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЮНОШЕЙ 12 ЛЕТ НЕ ВХОДИТ**

- 1) флюорография
- 2) общий анализ крови
- 3) электрокардиография
- 4) анализ кала

**ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ \_ ЛЕТ**

- 1) 12 и 14
- 2) 15 и 17
- 3) 13 и 17
- 4) 16 и 17

**МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЕТОДА РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ НОВОРОЖДЕННОГО С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

- 1) частоты сердечных сокращений менее 60 в мин
- 2) частоты сердечных сокращений менее 100 в мин
- 3) гестационного возраста 27-32 недели
- 4) отсутствия регулярного спонтанного дыхания

**ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) демографическим взрывом
- 2) отрицательным естественным приростом
- 3) положительным естественным приростом
- 4) нулевым естественным приростом

**ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОТМЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) эритроцитов
- 2) лейкоцитов
- 3) глюкозы
- 4) белка

**ЗНАМИВИР ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ ГРИППА У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ВОЗРАСТА \_ ЛЕТ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 12
- 4) 5

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2:15
- 2) 2:30
- 3) 1:20
- 4) 1:15

**«РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) бронхиальной астмы
- 2) острой пневмонии
- 3) острого бронхита
- 4) острого плеврита

**ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФАКТ, СОБЫТИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) справка
- 2) акт
- 3) приказ
- 4) протокол

**ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ \_ И \_ МИНУТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) три и пять
- 2) одну и две
- 3) одну и пять
- 4) пять и десять

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕТЯМ СО СЛЕДУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- 1) распространенные формы злокачественных новообразований в стадии клинико-лабораторной ремиссии
- 2) неоперабельные врожденные пороки развития
- 3) соматические заболевания в стадии компенсации
- 4) последствия травм с благоприятным прогнозом

**ПРИ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ РЕБЕНКУ НАЗНАЧАЮТ**

- 1) цетиризин
- 2) эпинефрин
- 3) дезлоратадин
- 4) фексофенадин

**ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫШЦЫ ГОЛОВА НОВОРОЖДЕННОГО НАКЛОНЕНА**

- 1) назад
- 2) в здоровую сторону
- 3) в больную сторону
- 4) вперед

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ \_ ЛЕТ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО РЕЦИДИВА**

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 3

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) антидот
- 2) сорбент
- 3) реагент
- 4) катализатор

**ОДНИМ ИЗ СИМПТОМОВ ГИПОГАЛАКТИИ СО СТОРОНЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) жидкий стул
- 2) уменьшение суточного объема мочи
- 3) нормальная прибавка массы тела
- 4) спокойный сон

**РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЗАНОСЯТСЯ В ФОРМУ**

- 1) 030-ПО/о-17
- 2) 030-Д/с/о-13
- 3) 030-ПО/у-17
- 4) 030-Д/с/у-13

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ**

- 1) мышечная слабость
- 2) язва желудка
- 3) артериальная гипертензия
- 4) кандидоз полости рта

**ВТОРЫМ ЭТАПОМ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий
- 2) определение реабилитационного и абилитационного прогноза
- 3) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики
- 4) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала

**ДЕЗИНФЕКЦИЮ КУВЕЗОВ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ**

- 1) альдегиды
- 2) хлор
- 3) кислород
- 4) фенолы

**К РОДОВОЙ ТРАВМЕ ОТНОСЯТ**

- 1) гемолитическую болезнь новорожденного
- 2) кефалогематому
- 3) физиологическую эритему
- 4) бронхолегочную дисплазию

**ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая ревматическая лихорадка
- 2) инфекционный миокардит
- 3) гипертрофическая кардиомиопатия
- 4) инфекционный эндокардит

**ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) положить грелку на живот
- 2) положить пузырь со льдом на живот
- 3) поставить масляную клизму
- 4) промыть желудок

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) Ross
- 2) Апгар
- 3) Глазго
- 4) SCORE

**ДЕТЯМ, ИЗ ГРУППЫ РИСКА (РОДИВШИМСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА В) ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ (МЕСЯЦ)**

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 12

**С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ \_ (ЧАС) ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 4

4) 3

**В ГРУППУ ПРОДУКТОВ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИХ ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ У ДЕТЕЙ, ВХОДИТ**

- 1) коровье молоко
- 2) яблоко
- 3) говядина
- 4) груша

**ПРИ РАХИТЕ ДЕТЯМ С ПОВЫШЕННОЙ ВОЗБУДИМОСТЬЮ ПОКАЗАНЫ \_ ВАННЫ**

- 1) радоновые
- 2) хвойные
- 3) углекислые
- 4) сероводородные

**ОДНИМ ИЗ ОБЩЕМОЗГОВЫХ СИМПТОМОВ ПРИ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) парез
- 2) монотонный крик
- 3) опущение угла рта
- 4) паралич

**АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА ГРУДНЫМ МОЛОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФИЦИРОВАНИЕ МАТЕРИ ВИРУСОМ**

- 1) иммунодефицита человека
- 2) коревой краснухи
- 3) ветряной оспы
- 4) эпидемического паротита

**ПРИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ ОТ РЕБЕНКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ**

- 1) чесночный
- 2) ацетона
- 3) аммиака
- 4) мышинный

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ СОСТАВЛЯЕТ \_ ЧЕЛОВЕК**

- 1) 700
- 2) 800
- 3) 1200
- 4) 900

**РЕЗУЛЬТАТ ПРОБЫ МАНТУ ОЦЕНИВАЮТ ЧЕРЕЗ \_ (ЧАС)**

- 1) 72
- 2) 48

3) 144

4) 36

**ВНУТРИКОЖНАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С ТУБЕРКУЛИНОМ ПРОВОДИТСЯ**

1) один раз в 2 года

2) ежеквартально

3) один раз в три года

4) ежегодно

**ДЛЯ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ В ПОТЕ  
КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ**

1) фосфора

2) калия

3) хлора

4) кальция

**ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ КУПАЮТ**

1) через день

2) ежедневно

3) один раз в неделю

4) один раз в три дня

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ПРИ ОСТРОМ  
ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГИТЕ ПРИМЕНЯЮТ**

1) пикфлоуметрию

2) пульсоксиметрию

3) спирографию

4) спирометрию

**В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ КАРАНТИН ПО ДЕТСКИМ  
ИНФЕКЦИЯМ, ПРОБА МАНТУ ПРОВОДИТСЯ**

1) через 3 месяца по окончании карантина

2) в период карантина

3) по окончании карантина

4) через 6 месяцев по окончании карантина

**ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
НА 5 ОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА \_ ПРОЦЕНТОВ**

1) 65-70

2) 85-95

3) 80-85

4) 70-75

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ПОСЕЩАЕТ ЗДОРОВОГО  
ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ НЕ МЕНЕЕ \_ РАЗ**

- 1) 8
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**ГИПЕРТОНУС МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ СОХРАНЯЕТСЯ У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДО ВОЗРАСТА \_ (МЕСЯЦ)**

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) окружность головы 40 см
- 2) рост 65 см
- 3) закрытый большой родничок
- 4) масса тела 8,0 кг

**ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТА ДЕ-НОЛ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРЕДУПРЕДИТЬ ПАЦИЕНТА О ВОЗМОЖНОСТИ**

- 1) развития тахикардии
- 2) появления повышенного потоотделения
- 3) повышения температуры
- 4) появления темного стула

**К ЯДАМ ГЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) угарный газ
- 2) алкоголь
- 3) резерпин
- 4) атропин

**ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ДОСТАТОЧНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ\_ С ПИЩЕЙ**

- 1) кальция
- 2) натрия
- 3) фтора
- 4) йода

**ПРИ ИНВАЗИИ АСКАРИДАМИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) базофилов
- 2) эозинофилов
- 3) моноцитов
- 4) лимфоцитов

**ПРИЕМ АЛЬМАГЕЛЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) за полчаса до приема пищи
- 2) во время еды
- 3) сразу после еды
- 4) за два часа до приема пищи

**МЕТОДОМ ИНТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гемосорбция
- 2) плазмаферез
- 3) перитонеальный диализ
- 4) гемодиализ

**ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕЧЕНИИ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) глобулин
- 2) сыворотка
- 3) вакцина
- 4) глюкокортикоиды

**ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА (КРУПА) ПО ШКАЛЕ WESTLEY ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) артериальное давление
- 2) втяжение уступчивых мест грудной клетки
- 3) частота дыхательных движений
- 4) частота сердечных сокращений

**РЕЗУЛЬТАТЫ ФЛЮОРОГРАФИИ ЛЕГКИХ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, УЧИТЫВАЮТСЯ, ЕСЛИ ИХ ДАВНОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ \_ ( МЕСЯЦ) С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**

- 1) 36
- 2) 18
- 3) 12
- 4) 24

**ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ РОДИЛЬНИЦЕ МЕНЯЕТСЯ**

- 1) ежедневно
- 2) раз в три дня
- 3) раз в 10 дней
- 4) раз в неделю

**ВЕДУЩЕЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) головокружение
- 2) повышение температуры
- 3) снижение слуха
- 4) головная боль

**ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) биохимический анализ крови
- 2) УЗИ селезенки
- 3) УЗИ печени
- 4) стерильная пункция

**ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЛАВАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) экзофтальм
- 2) астигматизм
- 3) нистагм
- 4) анизокория

**ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СЧИТАЕТСЯ НЕ ДОСТИГНУТЫМ ПРИ СУММАРНОЙ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ \_ БАЛЛОВ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 10

**ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СУСТАВЫ**

- 1) коленный и голеностопный
- 2) тазобедренный и коленный
- 3) тазобедренный, коленный и голеностопный
- 4) тазобедренный и голеностопный

**ЗДОРОВЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ИМЕЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К \_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 2

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ДЕТАМ В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 2) третья ревакцинация против полиомиелита
- 3) третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 4) ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

**В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ \_ ТЕРАПИИ**

- 1) антидотной
- 2) регидратационной

- 3) протившоковой
- 4) антисекреторной

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ВЫРАЖЕННОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ТРЕБУЮЩИМИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К \_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) III
- 2) V
- 3) II
- 4) IV

**ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) описторхоза
- 2) энтеробиоза
- 3) трихоцефалеза
- 4) аскаридоза

**ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ**

- 1) одышка смешанного характера
- 2) инспираторная одышка
- 3) кашель с выделением пенистой мокроты
- 4) приступ удушья с затрудненным выдохом

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРОБОДЕНИИ ЯЗВЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА**

- 1) вводит метамизол натрия
- 2) промывает желудок
- 3) кладет грелку на живот
- 4) обеспечивает полный покой пациенту

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРЕБУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПО ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ**

- 1) 1
- 2) 3Б
- 3) 3А
- 4) 2

**У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, ОПТИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) весом новорожденного
- 2) оценкой в баллах по шкале Апгар
- 3) степенью морфо-функциональной зрелости легких
- 4) частотой дыхательных движений

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ НОВОРОЖДЕННЫМ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, НАХОДЯЩИМСЯ НА ИВЛ БОЛЕЕ 7 СУТОК ЖИЗНИ, ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) дексаметазона
- 2) эпинефрина
- 3) натрия хлорида
- 4) кофеин-бензоат натрия

**ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ВВОДИТСЯ ДЕТЯМ**

- 1) по просьбе родителей
- 2) через определенные интервалы времени
- 3) один раз в сутки
- 4) в зависимости от состояния ребенка

**К ТРАНЗИТОРНЫМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- 1) муковисцидоз
- 2) гормональный криз
- 3) пузырчатка новорожденных
- 4) фенилкетонурия

**МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ ПРИ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ноги
- 2) живот
- 3) лицо
- 4) руки

**НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления
- 2) длительное бодрствование
- 3) длительный сон
- 4) мышечная гипотония

**ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_НЕДЕЛЬ**

- 1) 8
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАМНЕЙ В МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) аминокацидурия
- 2) фенилкетонурия
- 3) гомоцистинурия
- 4) муковисцидоз

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИПЯЧЕНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЖНА КИПЯТИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ \_ МИНУТ**

- 1) 2
- 2) 10
- 3) 8
- 4) 5

**СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 10 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 90
- 2) 70
- 3) 100
- 4) 85

**В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В ПЕРВЫЕ 48 Ч ЖИЗНИ ВХОДИТ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ**

- 1) билирубина
- 2) глюкозы
- 3) натрия
- 4) креатинина

**НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПРОВОДЯТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ**

- 1) тиреотоксикоза
- 2) гомоцистинурии
- 3) фенилкетонурии
- 4) мукополисахаридоза

**СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАММ**

- 1) 2500-3000
- 2) 2000-2500
- 3) 4500-5000
- 4) 3000-3500

**В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С COVID-19 В СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕПАРАТ**

- 1) фавипиравир
- 2) интерферон альфа
- 3) нирматрелвир+ритонавир
- 4) молнупиравир

**ПРОВЕРКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ**

- 1) 14
- 2) 6
- 3) 3
- 4) 5

**ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ**

- 1) внутривенно
- 2) внутримышечно
- 3) подкожно
- 4) внутрикожно

**К ЯДАМ ГЕПАТОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) соль свинца
- 2) коргликон
- 3) анилин
- 4) уксусная кислота

**ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ У РЕБЕНКА В КРОВИ ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ \_ ГОРМОНА**

- 1) соматотропного
- 2) фолликулстимулирующего
- 3) адренотропного
- 4) тиреотропного

**ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ШИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ**

- 1) костей голени
- 2) костей предплечья
- 3) ребер
- 4) поясничного отдела позвоночника

**У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ \_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 170 -190
- 2) 120-140
- 3) 80-100
- 4) 100-120

**К ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ОТНОСИТСЯ ОСТРЫЙ**

- 1) миокардит
- 2) бронхит
- 3) фарингит
- 4) ларингит

**К ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОТНОСЯТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ**

- 1) здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное физическое и психическое

развитие

- 2) страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии
- 3) с физическими недостатками с выраженным нарушением функций органов и систем
- 4) реконвалесценты, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания

**В ПЕРИОД ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 3 ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ВИДЕ**

- 1) общего анализа крови
- 2) электрокардиографии
- 3) нейросонографии
- 4) эхокардиографии

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) исключение физической нагрузки
- 2) обучение на дому
- 3) кардиопротективную терапию
- 4) рациональное питание

**СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) под язык
- 2) в прямую кишку
- 3) в дыхательные пути
- 4) на кожу

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ НЕ МЕНЕЕ \_ РАЗ В ГОД**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_ - (ДЕНЬ)**

- 1) 2-10
- 2) 14-21
- 3) 5-7
- 4) 35-36

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 16-20
- 2) 23-25
- 3) 39-40

4) 37-38

**СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) на кожу
- 2) в прямую кишку
- 3) под язык
- 4) в дыхательные пути

**ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ НА КОЖЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) бугорки
- 2) язвы
- 3) волдыри
- 4) пузырьки

**РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 18
- 2) 20
- 3) 12
- 4) 15

**СТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ НАКРЫВАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА \_ ЧАСОВ**

- 1) 3
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 10

**ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хлорид калия
- 2) инсулин
- 3) глюкоза
- 4) хлорид натрия

**ВЛАЖНАЯ УБОРКА КАБИНЕТА ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) один раз в день
- 2) два раза в день
- 3) один раз в неделю
- 4) через день

**ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» У РЕБЕНКА МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ**

- 1) сухого плеврита
- 2) острого бронхита
- 3) острой пневмонии

4) бронхоэктатической болезни

**МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ**

- 1) занятия незаконной медицинской деятельностью
- 2) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд
- 3) нарушения требований пожарной безопасности
- 4) нарушения требований санитарных норм и правил

**ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН \_ РЕЖИМ**

- 1) постельный
- 2) строгий постельный
- 3) амбулаторный
- 4) палатный

**ПРИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ**

- 1) почек
- 2) миокарда
- 3) мышечной ткани
- 4) головного мозга

**ТЕСТ-БЛАНК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ВЫСУШИВАЮТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА ЧИСТОЙ, ОБЕЗЖИРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ МЕНЕЕ**

- 1) 40 минут
- 2) 1 часа
- 3) 2 часов
- 4) 20 минут

**ПОЛОЖЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ КАЖДЫЕ\_ (ЧАС)**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 4

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_ ДНЕЙ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ**

- 1) 28
- 2) 14
- 3) 36
- 4) 48

**ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий
- 2) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала
- 3) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики
- 4) определение реабилитационного и абилитационного прогноза

**К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИВОДИТ**

- 1) вирусный гепатит
- 2) родовая травма
- 3) резус-конфликт
- 4) внутриутробное инфицирование

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ \_ ЦВЕТА**

- 1) черного
- 2) красного
- 3) желтого
- 4) зеленого

**УСТРОЙСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ**

- 1) небулайзер
- 2) мешок Амбу
- 3) кислородная лицевая маска
- 4) носовая канюля

**ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ**

- 1) животное
- 2) человек
- 3) птица
- 4) насекомое

**ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НЕ ДОСТИГШЕГО \_ ЛЕТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕГО РОДИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ**

- 1) 16
- 2) 18
- 3) 15
- 4) 17

**В СИСТЕМЕ "ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ" СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОРЕГИСТРАТОРЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИНТЕРВАЛОМ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ НЕ БОЛЕЕ \_ (МИНУТ)**

- 1) 10
- 2) 1
- 3) 2

4) 5

**ЧАШКИ, СТАКАНЫ, БОКАЛЫ В СТОЛОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОЛАСКИВАЮТ ВОДОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ НИЖЕ \_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

1) 65

2) 45

3) 50

4) 80

**ПЕРВЫЙ ПРИКОРМ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ ВВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

1) 5-6

2) 2-3

3) 8-10

4) 10-12

**ВРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ГРУДЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

1) галактоземия

2) болезнь «кленового сиропа»

3) фенилкетонурия

4) родовая травма

**СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ \_ МЛ**

1) 500

2) 1000

3) 200

4) 1500

**ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО МОЛОКА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25 °С В ТЕМНОМ МЕСТЕ НЕ БОЛЕЕ \_ ЧАСОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ КОРМЛЕНИИ РЕБЕНКА**

1) 8

2) 3

3) 2

4) 6

**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗДОРОВОМУ ДОНОШЕННОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ**

1) на 3-7 день жизни

2) в первые 24 часа после рождения

3) в один месяц

4) в полтора месяца

**ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАДЕРЖКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В АСФИКСИИ, СВЯЗАНЫ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ**

- 1) центральной нервной системы
- 2) системы кровообращения
- 3) легких
- 4) почек

#### **ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) утренняя скованность мелких суставов
- 2) боли в крупных суставах вечером
- 3) симптом \"перемежающей хромоты\"
- 4) боль и нарушение подвижности в позвоночнике

#### **ОСМОТР НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕДИКУЛЕЗ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В \_ ДНЕЙ И ЗА 1 - 3 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 7
- 4) 5

#### **К ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
- 2) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными
- 3) пищевые отходы из инфекционных отделений
- 4) ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование

#### **ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА**

- 1) через наиболее выступающую часть затылка
- 2) под затылком
- 3) чуть выше затылка
- 4) чуть ниже теменных бугров

#### **ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ И ИЗМЕНЕНИЙ СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПАЦИЕНТЫ, ПЕРЕНЕСШИЕ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В СНИМАЮТСЯ С УЧЕТА (ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ) НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_ С МОМЕНТА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ**

- 1) 3 месяца
- 2) 2 года
- 3) 1 год
- 4) 6 месяцев

#### **БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ЗАКРЫВАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 12-15
- 2) 10-11

- 3) 15-18
- 4) 18-24

**ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО С БЫСТРЫМ НАРАСТАНИЕМ ЖЕЛТУХИ ПРОВОДЯТ**

- 1) плазмаферез
- 2) заменное переливание крови
- 3) инфузионную терапию
- 4) гемосорбцию

**МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ**

- 1) лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами
- 2) лица, не достигшего 15 летнего возраста
- 3) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
- 4) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

**СРОК ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_ ЧАСОВ**

- 1) 36
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 18

**РАСШИРЕННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ**

- 1) врожденный гипотиреоз
- 2) галактоземия
- 3) муковисцидоз
- 4) болезнь \"кленового сиропа\"

**ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ВИДАМ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) кратность применения медицинской услуги
- 2) этапы оказания медицинской помощи
- 3) виды лечебного питания
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

**ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) острой пневмонии
- 2) отека легких
- 3) бронхиальной астмы
- 4) инородного тела трахеи

**В КАЧЕСТВЕ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА, ПРИ ОЖОГАХ, ПРИВИТЫМ ДЕТЯМ ВВОДЯТ**

- 1) иммуноглобулин человека противостолбнячный
- 2) столбнячный анатоксин
- 3) столбнячный анатоксин и сыворотку противостолбнячную
- 4) сыворотку противостолбнячную

**БОЛЕЗНЬ ДАУНА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ТРИСОМИИ ПО \_ ПАРЕ ХРОМОСОМ**

- 1) 21
- 2) 22
- 3) 20
- 4) 19

**К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ**

- 1) валсартан
- 2) рамиприл
- 3) амлодипин
- 4) пропранолол

**ДЛЯ ПОСТАНОВКИ \_ КЛИЗМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ КРУЖКА ЭСМАРХА**

- 1) масляной
- 2) сифонной
- 3) очистительной
- 4) гипертонической

**К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ**

- 1) гормональный криз
- 2) физиологическую эритему
- 3) физиологическую желтуху
- 4) асфиксию в родах

**МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПИТАНИЯ ПРОДУКТА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО У РЕБЕНКА ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 3 недели
- 2) 6 недель
- 3) 3 месяца
- 4) 6 месяцев