

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело» для аккредитации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-otvet.ru/product/sestrinskoe-delo/>

ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- 1) 10-12 л воды комнатной температуры
- 2) 100-200 мл масляного раствора
- 3) 100 мл 10% раствора хлорида натрия
- 4) 1-1,5 л воды комнатной температуры

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЁННЫМ В ОЧАГЕ ЧС ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) последовательность
- 2) непрерывность
- 3) своевременность и полнота первой помощи
- 4) преемственность

В РОССИИ НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЛЕЧЕТ _____ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) административную
- 2) дисциплинарную
- 3) гражданско-правовую
- 4) уголовную

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

- 1) цистоскопа
- 2) ректороманоскопа
- 3) колоноскопа
- 4) бронхофиброскопа

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ "ХОЛОДНЫХ" И "ГОРЯЧИХ" УЗЛОВ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) пальпацию
- 2) УЗИ щитовидной железы
- 3) рентгенографию
- 4) сцинтиграфию

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) острая ревматическая лихорадка
- 2) гипертоническая болезнь
- 3) инфаркт миокарда
- 4) стенокардия

ИНСУЛИН УЛЬТРАКОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОБЫЧНО ВВОДИТСЯ

- 1) непосредственно до или сразу после приема пищи
- 2) за 1 час до еды
- 3) через 30 минут после еды
- 4) до приема пищи за 30-40 минут

К АНТРОПОЗООНОЗНЫМ ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) куриная холера, грипп
- 2) сальмонеллез, холера
- 3) грипп, корь, рожа свиней
- 4) сибирская язва, бешенство

ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО _____ ПЕРЧАТКИ

- 1) многоразовые
- 2) одноразовые
- 3) стерильные
- 4) чистые

ФУНКЦИИ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА О СОСТОЯНИИ БОЛЬНЫХ ВЫПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ _____ ОТДЕЛЕНИЯ

- 1) хирургического
- 2) терапевтического
- 3) приемного
- 4) реанимационного

НАЛИЧИЕ ДИАРЕИ У ПАЦИЕНТА ЭТО _____ ПРОБЛЕМА

- 1) долгосрочная
- 2) потенциальная
- 3) существующая
- 4) краткосрочная

К МАССОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) лекция для небольшой группы
- 2) инструктаж сотрудников
- 3) диспут в школе здоровья
- 4) демонстрация кинофильмов

ТИПИЧНАЯ ФОРМА ИНФАРКТА МИОКАРДА

- 1) абдоминальная
- 2) ангинозная
- 3) безболевая
- 4) астматическая

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ

- 1) ограниченный инфильтрат кожи
- 2) подергивание мышц
- 3) гиперемия кожи с четкими границами
- 4) разлитое покраснение кожи

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ОБРАЗУЮТ

- 1) все кости предплюсны
- 2) кости плюсны и фаланги пальцев
- 3) пяточная, ладьевидная и кубовидная кости
- 4) таранная, большеберцовая и малоберцовая кости

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ АНЕСТЕЗИН ИСПОЛЬЗУЮТ В ВИДЕ

- 1) растворов
- 2) аэрозолей
- 3) таблеток
- 4) суппозиториев

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) задержка мочи
- 2) недержание мочи
- 3) инфицирование мочевыводящих путей
- 4) бессонница

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ежегодная вакцинация
- 2) применение репеллентов
- 3) ношение закрытой одежды
- 4) регулярная проверка тела на наличие укусов

ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЛЁГОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение артериального давления
- 2) рвота «кофейной гущей»
- 3) кашель с пенистой светло-красной мокротой
- 4) экспираторная одышка

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В

- 1) хеликобактериальная инфекция
- 2) отравление
- 3) аутоиммунные нарушения
- 4) нерациональное питание

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИНОВУЮ ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

- 1) на 1/3 ее объема
- 2) полностью
- 3) на 2/3 ее объема
- 4) наполовину

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП

- 1) грубости
- 2) снисхождения
- 3) высокомерия
- 4) сотрудничества

НА ПАКЕТАХ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- 1) указывает название лечебной организации
- 2) указывает название отделения
- 3) указывает дату и время вскрытия упаковки
- 4) ставит подпись

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) лаборант
- 2) врач
- 3) постовая медицинская сестра
- 4) процедурная медицинская сестра

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПОСРЕДСТВОМ

- 1) проведения ряда лабораторных и инструментальных исследований
- 2) проведения ряда инструментальных исследований
- 3) проведения физикальных методов исследования
- 4) анкетирования пациентов

ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) лигированием сосуда в ране
- 2) наложением сосудистого шва
- 3) давящей повязкой
- 4) протезированием сосуда

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА, ЕСЛИ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ, ЭФФЕКТ НЕ ОТМЕЧАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 30
- 2) 15
- 3) 5-6
- 4) 60

АБСЦЕСС ЛЕГКОГО ФОРМИРУЕТСЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ

- 1) пневмонии
- 2) обструкции бронха инородным телом
- 3) септической эмболии сосудов легких
- 4) поддиафрагмального абсцесса

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) с приподнятым ножным концом кровати
- 2) возвышенное, полусидя
- 3) горизонтальное, с приподнятой головой
- 4) горизонтальное

ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- 1) Г
- 2) Б
- 3) А
- 4) В

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) клеенки
- 2) подлокотники
- 3) одеяла
- 4) подушки

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 1) первичная, вторичная, третичная
- 2) начальная, конечная
- 3) текущая, заключительная
- 4) противоэпидемическая, предварительная

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРСАЛИВАЦИИ ПЕРЕД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ВВОДЯТ

- 1) атропин
- 2) адреналин
- 3) анальгин
- 4) димедрол

ПРИ ОКРАСКЕ ПРЕПАРАТА ПО МЕТОДУ ГРАМА ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ ОКРАШИВАЮТСЯ В _____ ЦВЕТ

- 1) зеленый
- 2) желтый
- 3) красный
- 4) фиолетовый

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОСТОИТ ИЗ _____ ЗВЕНЬЕВ

- 1) пяти
- 2) двух
- 3) трех
- 4) четырех

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ _____ ГРУПП(Ы) ЗДОРОВЬЯ

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПИЕЛОНЕФРИТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) закаливания
- 2) вакцинации
- 3) рациональном питании
- 4) достаточном потреблении жидкости

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) записи в журнале температурного режима холодильника
- 2) этикетка на флаконе
- 3) инструкция к вакцине
- 4) словесное подтверждение медицинской сестры

К КРИТЕРИЯМ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) обострение хронического заболевания
- 2) возникновение заболевания в результате обращения за оказанием медицинской помощи
- 3) закономерное продолжение заболевания, имевшегося у пациента
- 4) отсутствие связи заболевания с оказанием медицинской помощи

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) фурацилин 4%

- 2) протаргол 2%
- 3) перекись водорода 3%
- 4) хлоргексидин 0,5%

НОСИТЕЛЬСТВО - ЭТО ТАКАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО- И МАКРООРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОЙ

- 1) характерна крайне тяжелая степень поражения тканей
- 2) происходит гибель микроорганизма
- 3) возникают патологические изменения в органах и тканях
- 4) микроб не вызывает патологических изменений в тканях

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ

- 1) зафиксированная в медицинской карте стационарного больного
- 2) о диагнозе, лечении и иные сведения, полученные при обследовании и лечении
- 3) о пациенте, которую медицинский работник считает нужным скрыть
- 4) полученная от самого пациента при личной беседе

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

- 1) переломе ключицы
- 2) переломе ребер
- 3) ранении легкого
- 4) ранении сердца

ПРИЗНАКАМИ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ВОЗМОЖНЫМ ПЕРЕЛОМОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) сильная боль в покое и при движениях головы, потеря чувствительности в конечностях
- 2) сильная боль при движениях головы, парестезии
- 3) парез конечностей, невозможность повернуть голову в бок
- 4) потеря чувствительности в конечностях

У ДЕТЕЙ С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИЕМ

- 1) ибупрофена
- 2) метамизола натрия
- 3) парацетамола
- 4) аспирина (ацетилсалициловой кислоты)

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА ___ СМ

- 1) 12-15
- 2) 26-30
- 3) 20-25
- 4) 15-20

ЛИЦА, У КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ НЕ

ЗАТРАГИВАЕТ ЕГО ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ, ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) второй
- 2) третьей
- 3) первой
- 4) четвертой

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 1 раз в день
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в месяц

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) аэрозольная обработка
- 2) УФ-облучение
- 3) кварцевание
- 4) озонирование

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) в течение первого часа
- 2) до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- 3) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи
- 4) до улучшения его самочувствия

В СТРУКТУРЕ ПОТЕРЬ ПРИ КАТАСТРОФАХ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРВОЕ МЕСТО, КАК ПРАВИЛО, ОТВОДИТСЯ

- 1) черепно-мозговой травме
- 2) травмам конечностей
- 3) ранам мягких тканей
- 4) синдрому длительного сдавления ("краш- синдром")

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ЛИЦАМ СТАРШЕ 40 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) один раз в два года
- 2) один раз в три года
- 3) два раза в год
- 4) ежегодно

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ЗА ИСТЕКШИЕ СУТКИ УКАЗЫВАЮТСЯ ЗА ПЕРИОД

- 1) с 10 утра предыдущих суток до 10 утра текущих суток
- 2) с 8 утра предыдущих суток до 8 утра текущих суток
- 3) с 9 утра предыдущих суток до 9 утра текущих суток
- 4) с 7 утра предыдущих суток до 7 утра текущих суток

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО

- 1) подать экстренное извещение в Роспотребнадзор
- 2) ввести противодифтерийную сыворотку
- 3) наблюдение и лечение на дому
- 4) сообщить врачу

ПАЦИЕНТАМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДИЕТА

- 1) с приемом пищи каждые 2 часа небольшими порциями
- 2) с ограничением приправ и поваренной соли
- 3) с исключением животных жиров и свежей выпечки
- 4) включающая механически, термически и химически щадящую пищу

НАПИТКОМ, ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОТСУТСТВИИ РВОТЫ И СОХРАНЁННОМ СОЗНАНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) холодную минеральную воду
- 2) крепкий кофе
- 3) алкогольный напиток
- 4) тёплое сладкое питьё

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С ИНТЕРВАЛОМ _____ ДНЕЙ

- 1) 60
- 2) 15
- 3) 45
- 4) 30

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

- 1) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование
- 2) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
- 3) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- 4) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных или служебных обязанностей, обучении

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОРТИРОВОЧНОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ НОСИЛОЧНЫХ ПОРАЖЕННЫХ

- 1) врач, фельдшер, медицинская сестра, два регистратора и звено носильщиков
- 2) врач, медицинская сестра и регистратор
- 3) фельдшер, медицинская сестра и регистратор
- 4) медицинская сестра и регистратор

КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ _____ ЧАСА(ОВ)

- 1) 10-12
- 2) 2-3
- 3) 4-5
- 4) 6-8

ПОД ЗАКАЛИВАНИЕМ ПОНИМАЮТ

- 1) купание в зимнее время
- 2) длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам
- 3) комплекс мероприятий, направленных на тренировку защитных сил организма
- 4) перечень процедур для воздействия на организм холода

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЕТСЯ ПАЦИЕНТОМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) И

- 1) заведующим отделением
- 2) представителем страховой медицинской организации
- 3) главным врачом
- 4) медицинским работником

К ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- 1) плаксивость
- 2) жар
- 3) приливы
- 4) нарушения сна

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ

- 1) в 7 лет
- 2) в первые 12 часов жизни
- 3) на 3-7 день жизни
- 4) в 3-х месячном возрасте

ПРОДУКЦИЯ ГОРМОНОВ С ВОЗРАСТОМ

- 1) увеличивается
- 2) снижается
- 3) сначала растёт, потом падает
- 4) остаётся неизменной

ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ КОЛОСТОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) спиртовые антисептики
- 2) специальные пасты и мази
- 3) йодная настойка
- 4) безспиртовые антисептики

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- 1) 25-30
- 2) 16-20
- 3) 45-50
- 4) 35-40

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) болевой тризм мускулатуры
- 2) ригидность затылочных мышц
- 3) отечность мягких тканей
- 4) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) метеоризм и вздутие кишечника после употребления молочных продуктов
- 2) тошнота, отрыжка, не связанные с приемом пищи
- 3) приступы билиарной боли в отсутствие явного органического поражения желчных путей
- 4) чувство тяжести в эпигастрии сразу после еды

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) заведующий структурным подразделением (отделением)
- 2) совет медицинских сестер
- 3) врачебная комиссия медицинской организации
- 4) главный врач медицинской организации и уполномоченный им сотрудник

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ

- 1) молоком
- 2) кефиром
- 3) киселем
- 4) водой

ПРИ УБОРКЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ПАР(Ы)

- 1) одной
- 2) двух
- 3) четырех
- 4) трех

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ХРОМОСОМ В КАРИОТИПЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ МУТАЦИЙ

- 1) точечных

- 2) генных
- 3) геномных
- 4) хромосомных

РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС ПРОТЕКАЕТ В _____ ФАЗЫ

- 1) две
- 2) три
- 3) четыре
- 4) одну

ПРИЗНАКАМИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферической артерии
- 2) чувство онемения в конечности
- 3) прекращение кровотечения и онемение конечности
- 4) падение артериального давления

ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ _____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ферментативным
- 2) противорвотным
- 3) гепатопротекторным
- 4) противодиарейным

К ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) использование кислот
- 2) обработка паром
- 3) применение хлора
- 4) обработка спиртом

ПРИ ПОПАДАНИИ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА КОЖУ НЕОБХОДИМО

- 1) протереть кожу спиртовой салфеткой для нейтрализации яда
- 2) обильно промыть кожу проточной водой
- 3) дать антигистаминный препарат
- 4) нанести мазь

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) бактериологическую
- 2) клиническую
- 3) биохимическую
- 4) цитологическую

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атеросклероз
- 2) острый тромбоз артерий
- 3) облитерирующий эндартериит
- 4) варикозное расширение вен

ИНВАЗИВНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) манипуляция, при которой нарушается целостность тканей, сосудов
- 2) наложение повязки на культю
- 3) измерение артериального давления
- 4) пальпация органов брюшной полости

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ СТАРЕНИИ

- 1) повышение тонуса мочеточников
- 2) более редкое мочеиспускание
- 3) увеличение вместимости мочевого пузыря
- 4) снижение тонуса мочеточников

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) муниципальное управление здравоохранением
- 2) медицинское страхование граждан
- 3) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
- 4) государственное управление здравоохранением

СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 400 МЛ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) анурией
- 2) олигурией
- 3) протеинурией
- 4) полиурией

ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ВОДЫ НЕОБХОДИМО

- 1) приступить к непрямому массажу сердца
- 2) очистить ротовую и носовую полость от инородных тел
- 3) дать пострадавшему тёплое питьё, если он в сознании
- 4) согреть пострадавшего, укрыв одеялом

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ДОПУСТИМАЯ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ, СОСТАВЛЯЕТ (°С)

- 1) +20 – +22
- 2) +25 – +28
- 3) +18 – +20
- 4) +22 – +26

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЛОСТЯМ ТЕЛА РАЗЛИЧАЮТ РАНЫ

- 1) проникающие
- 2) колотые
- 3) поверхностные
- 4) резаные

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО

- 1) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом
- 2) надавить на болевые точки
- 3) похлопать его по щекам
- 4) осторожно встряхнуть его за плечи

ВРЕМЯ НА ОЦЕНКУ НАЛИЧИЯ ДЫХАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ____ СЕКУНД

- 1) 25-30
- 2) 30-60
- 3) 15-20
- 4) 5-10

ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гуманное отношение к пациенту
- 2) профессиональная компетентность
- 3) восстановление здоровья пациента
- 4) уважение человеческого достоинства

АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) деформация мягких тканей
- 2) отек
- 3) патологическая подвижность костных отломков
- 4) деформация сустава

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) тонзиллит
- 2) эзофагит
- 3) фарингит
- 4) ларингит

ОСОБЕННОСТЬЮ БЕЗУСЛОВНЫХ, ВРОЖДЕННЫХ РЕФЛЕКСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОНИ

- 1) могут исчезать
- 2) подчиняются воле человека
- 3) передаются по наследству
- 4) формируются в течении жизни

ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ожирение
- 2) дислипидемия
- 3) гиподинамия
- 4) возраст

ДНК-ДИАГНОСТИКА (МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД) ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ

- 1) точечные мутации в конкретных генах
- 2) хромосомные перестройки
- 3) биохимические маркеры
- 4) фенотипические проявления

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) только фельдшер
- 2) только врач
- 3) только медицинская сестра
- 4) врач, медицинская сестра, фельдшер

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ МОКРОТЫ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) стерильной банкой
- 2) стерильной пробиркой
- 3) сухой банкой
- 4) индивидуальной плевательницей

ПОЧКА ИМЕЕТ _____ ФОРМУ

- 1) бобовидную
- 2) округлую
- 3) овальную
- 4) листовидную

ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ МИНУТ

- 1) 30
- 2) 20
- 3) 60
- 4) 45

В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ _____ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- 1) заключительная
- 2) очаговая
- 3) профилактическая
- 4) текущая

ВЕДУЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ГРИППА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лихорадка, катаральные явления

- 2) диспептические расстройства, цианоз
- 3) головная боль, головокружение
- 4) тахикардия, одышка

**ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОЖДЕНИЕ _____
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА**

- 1) специализированного
- 2) периодического
- 3) предварительного
- 4) текущего

РАБОТУ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РЕГУЛИРУЕТ _____ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- 1) вегетативная (автономная)
- 2) соматическая
- 3) центральная
- 4) периферическая

БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) инструментальным
- 2) лабораторным
- 3) рентгенологическим
- 4) радиоизотопным

**НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ
_____ ЛЕЧЕНИЕМ**

- 1) радикальным
- 2) паллиативным
- 3) патогенетическим
- 4) симптоматическим

К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) овощи и фрукты
- 2) сыр, творог
- 3) маргарин, майонез
- 4) крупы, макароны

**ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛЬНОСТИ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИ ДАВЛЕНИИ 1,1
АТМ ЭКСПОЗИЦИИ 45 МИНУТ ЯВЛЯЕТСЯ (°С)**

- 1) ИС- 60
- 2) ИС-180
- 3) ИС-132
- 4) ИС-120

«ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ ЯВЛЯЮТСЯ _____ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ

- 1) спиртовые

- 2) водные
- 3) гелеобразные
- 4) анионные

ЦЕЛЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение реабилитационных мероприятий
- 2) восстановление трудоспособности пациента
- 3) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- 4) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

РЕАКЦИЮ МАНТУ У ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ НАЧИНАЯ С _____ МЕСЯЦЕВ

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 2

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение реабилитационных мероприятий
- 2) определение состояния здоровья пациента
- 3) своевременное выявление инфекционных заболеваний
- 4) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий

К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА СТАРШЕ _____ ЛЕТ

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 16
- 4) 18

ПАЦИЕНТА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ УКЛАДЫВАЮТ

- 1) на левый бок
- 2) на правый бок
- 3) в положение Фаулера
- 4) в положение Симса

БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ КУПИРУЮТСЯ НИТРОГЛИЦЕРИНОМ ЧЕРЕЗ _____ МИНУТ (Ы)

- 1) 20-30
- 2) 50-60
- 3) 10-15
- 4) 1-3

ОТДЕЛОМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА, В КОТОРОМ К ПЕРЕВАРИВАЕМЫМ

ВЕЩЕСТВАМ ДОБАВЛЯЕТСЯ ЖЕЛЧЬ, ЯВЛЯЕТСЯ _____ КИШКА

- 1) слепая
- 2) тощая
- 3) двенадцатиперстная
- 4) толстая

ПРИЗНАКОМ УЧАЩЕНИЯ ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брадипноэ
- 2) тахипноэ
- 3) апноэ
- 4) диспноэ

УРОВНИ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСЯТ ОТ

- 1) вида используемых антисептиков (дезинфектантов)
- 2) наличия перчаток
- 3) степени загрязнения
- 4) характера манипуляции

В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- 1) 1 раз в полгода
- 2) еженедельно
- 3) ежемесячно
- 4) 1 раз в два месяца

УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЗАВИСИТ ОТ

- 1) характера медицинского вмешательства
- 2) вида используемых антисептиков
- 3) наличия перчаток
- 4) степени загрязнения

РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) белки
- 2) жиры
- 3) витамины
- 4) углеводы

ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) недостаточное питание
- 2) гиподинамия
- 3) переохлаждение
- 4) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение

ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) инфильтрацией

- 2) малигнизацией
- 3) рецидивом
- 4) метастазированием

ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО _____ ЛЕТ

- 1) 15
- 2) 14
- 3) 16
- 4) 18

ЦИТОСТАТИКИ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) В
- 2) Д
- 3) Б
- 4) Г

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТСТРАНЯЕТСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР В СЛУЧАЕ

- 1) функциональных нарушений, связанных с анатомическими изменениями
- 2) отсутствия данных о прохождении профилактического осмотра
- 3) отсутствия антител к основным возбудителям инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
- 4) экссудативных повреждений кожи

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) бенциклан (галидор)
- 2) метамизол-натрий (анальгин)
- 3) омепразол
- 4) гемицеллюлаза+желчикокомпоненты+панкреатин (фестал)

ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ РАНЫ ПЕРВИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ ФОРМИРУЕТСЯ _____ РУБЕЦ

- 1) грубый широкий
- 2) тонкий косметический
- 3) гипертрофический
- 4) деформирующий ткани

К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) трехразовое обильное питание, гиподинамия
- 2) режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела
- 3) ограничение физической нагрузки, прием биодобавок
- 4) занятие с анаэробной физической нагрузкой

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА 25 КГ/М² СООТВЕТСТВУЕТ _____ МАССЕ ТЕЛА

- 1) недостаточной

- 2) чрезмерно избыточной
- 3) нормальной
- 4) избыточной

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) вирусы
- 2) платяные вши
- 3) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
- 4) условно-патогенные микроорганизмы

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НЕКОТОРЫЕ ПАЛОЧКОВИДНЫЕ БАКТЕРИИ ОБРАЗУЮТ

- 1) жгутики
- 2) рибосомы
- 3) пили
- 4) споры

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ

- 1) режущая
- 2) стреляющая
- 3) колющая
- 4) давящая

ВИД СТАРЕНИЯ, КОТОРЫЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ РАННИМ РАЗВИТИЕМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ _____ СТАРЕНИЕМ

- 1) физиологическим
- 2) естественным
- 3) замедленным
- 4) преждевременным

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бета-гемолитический стрептококк
- 2) хеликобактер пилори
- 3) кишечная палочка
- 4) золотистый стафилококк

ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ - ЭТО

- 1) диспноэ
- 2) тахипноэ
- 3) апноэ
- 4) брадипноэ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

- 1) фекально-оральный
- 2) трансмиссивный
- 3) половой
- 4) воздушно-капельный

В ГУБЧАТОМ ВЕЩЕСТВЕ МНОГИХ КОСТЕЙ МЕЖДУ КОСТНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ В ЯЧЕЙКАХ СОДЕРЖИТСЯ

- 1) желтый костный мозг
- 2) красный костный мозг
- 3) минеральные соли
- 4) органические вещества

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) целевыми
- 2) предварительными
- 3) периодическими
- 4) текущими

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ОСНОВНАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

- 1) осуществление санитарного ухода
- 2) проведение диагностики и лечения заболеваний
- 3) оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода
- 4) проведение лабораторных исследований биологических материалов пациента

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ГРАММ В СУТКИ

- 1) 150
- 2) 300
- 3) 400
- 4) 250

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ В СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КОРОБКЕ С ФИЛЬТРОМ СОСТАВЛЯЕТ _____ СУТОК

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 20
- 4) 7

ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 2-х недель

- 2) 3-х недель
- 3) 10-ти дней
- 4) 1,5-2-х месяцев

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ

- 1) выполнении оперативного вмешательства
- 2) проведении стерильных эндоскопических вмешательств
- 3) выполнении внутривенных вливаний
- 4) введении стерильного устройства в стерильные полости организма

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воздушный
- 2) газовый
- 3) паровой
- 4) химическими растворами

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) государственное управление здравоохранением
- 2) муниципальное управление здравоохранением
- 3) медицинское страхование граждан
- 4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) очаговую дезинфекцию
- 2) заключительную дезинфекцию
- 3) профилактическую дезинфекцию
- 4) предстерилизационную очистку

ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ _____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) дезинфицирующим и моющим
- 2) только дезинфицирующим
- 3) дезинфицирующим и стерилизующим
- 4) дезинфицирующим и дезодорирующим

ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ СОСТАВЛЯЮТ

- 1) псевдомонады
- 2) протей
- 3) бифидобактерии
- 4) клостридии

ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К

- 1) местным анестетикам
- 2) нейролептикам
- 3) анальгетикам
- 4) гемостатикам

ЭМУЛЬСИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО

- 1) активировать
- 2) взбалтывать
- 3) растворять
- 4) стерилизовать

ЭТИОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НАПРАВЛЕНО НА

- 1) хирургическую коррекцию пороков
- 2) устранение симптомов
- 3) устранение генетического дефекта
- 4) предотвращение осложнений

ПРЕФИКС "ДИС-" (DYS-) В ТЕРМИНЕ "ДИСФАГИЯ" И "ДИСПНОЭ" ОБОЗНАЧАЕТ

- 1) нарушение функции
- 2) отсутствие функции
- 3) повышенное функционирование
- 4) пониженное функционирование

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) ноющая боль в области сердца
- 2) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- 3) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- 4) колющая боль в области сердца

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе
- 2) наличие насморка без температуры
- 3) острое респираторное вирусное заболевание
- 4) сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение

ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) одышка
- 2) боль в животе
- 3) слабость
- 4) утренняя скованность мелких суставов

ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ главного врача медицинской организации
- 2) санитарные правила и нормы
- 3) методические рекомендации Министерства здравоохранения
- 4) технический паспорт установки по обеззараживанию отходов

КОМА ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО ОЦЕНИВАЕТСЯ В ____ БАЛЛОВ

- 1) Б.9-12
- 2) А.3-8
- 3) Г.10-15
- 4) В.13-14

РАСТВОР ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО (°С)

- 1) 37
- 2) 40
- 3) 49
- 4) 24

**УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дератизацией
- 2) стерилизацией
- 3) дезинсекцией
- 4) дезинфекцией

**ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ
НАЧИНАЮТ С**

- 1) маммографии
- 2) флюорографии
- 3) самообследования
- 4) пункционной биопсии

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ БЕЛЬЯ В БИКСЕ, ЗАКРЫТОМ
НА ЗАМОК БЕЗ ФИЛЬТРА, СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)**

- 1) 48
- 2) 96
- 3) 24
- 4) 72

СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (°С)

- 1) 38
- 2) 40
- 3) 34
- 4) 28

ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) отечность мягких тканей
- 2) небольшой инфильтрат
- 3) появление гиперемии кожи
- 4) повышение температуры

НАСТОЙКА – ЭТО ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ

- 1) суспензии
- 2) дистиллированной воды
- 3) масляного раствора
- 4) 70% спиртового раствора

ЧЕХЛЫ МАТРАСОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ И КЛЕЕНКИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

- 1) помещения в камеру для дезинфекции
- 2) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- 3) двукратного протирания с интервалом 15 минут
- 4) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- 1) провести беседу о влиянии алкоголя на организм и развитие заболеваний всех органов и систем
- 2) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма
- 3) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, внушить ему вред алкоголя
- 4) публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса

К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ВОСПРИИМЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ) ОТНОСИТСЯ

- 1) дезинфекция
- 2) изоляция больных
- 3) дератизация
- 4) иммунопрофилактика контактных

АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) для всех гельминтозов
- 2) аскаридоза
- 3) энтеробиоза
- 4) трихоцефалеза

ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА

- 1) назначение антибиотиков
- 2) применение тепловых процедур
- 3) вскрытие и дренаж гнойника
- 4) срочное направление к врачу

ПРОБУ МАНТУ ДЕТЯМ, ВАКЦИНИРОВАННЫМ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПРОВОДЯТ, НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА

- 1) 7 лет
- 2) 3 месяца
- 3) 15 лет
- 4) 12 месяцев

ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- 1) повышении уровня холестерина в крови
- 2) развитии мускулатуры
- 3) развитию молочных желез
- 4) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ КОНТРОЛИРУЕТСЯ

- 1) 1 раз в день
- 2) 2 раза в день
- 3) 2 раза в месяц
- 4) 1 раз в неделю

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) психическое перенапряжение
- 2) систематические занятия физической культурой
- 3) гипокинезия и длительная иммобилизация
- 4) хронический очаг инфекции

КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) биохимическую
- 2) клинико-диагностическую
- 3) цитологическую
- 4) бактериологическую

ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО

- 1) выпрямить конечности
- 2) предотвратить травмы больного
- 3) усадить больного
- 4) к голове приложить холод

ВОСПАЛЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) дуоденит

- 2) энтерит
- 3) проктит
- 4) колит

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ

- 1) не вызывает психологической зависимости
- 2) вызывает психологическую зависимость
- 3) вызывает изменение типа личности человека
- 4) не вызывает физической зависимости

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- 1) вызвать газовую службу
- 2) вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды
- 3) вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду
- 4) вызвать врача, надеть на пострадавшего противогаз

ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У

- 1) инсулин
- 2) тироксин
- 3) эстрадиол
- 4) адреналин

ПРАВО НА ВЫДАЧУ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЕТ

- 1) фельдшер здравпункта
- 2) частнопрактикующий врач
- 3) врач станции скорой медицинской помощи
- 4) врач станции переливания крови

К МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА «РАЗРЫВ» МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) лечение и диспансерное наблюдение
- 2) своевременное выявление больных
- 3) проведение дезинфекционных мероприятий
- 4) экстренная профилактика

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ НАБОР ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) места работы и должности
- 2) возраста и пола
- 3) семейного положения и количества детей
- 4) социального статуса и образования

КЛЕТКАМИ КРОВИ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ЯДРА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лейкоциты

- 2) лимфоциты
- 3) остеоциты
- 4) эритроциты

ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) распределение медицинских отходов в лечебно-профилактическом учреждении
- 2) выдача стерильного инструментария, материала, а также изделий одноразового применения
- 3) обеспечение отделения изделиями медицинского назначения однократного применения
- 4) обеспечение лечебно-профилактического учреждения продезинфицированными изделиями медицинского назначения

РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 2) одышка, \"ржавая\" мокрота
- 3) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 4) длительный субфебрилитет, покашливание

ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВОЗРАСТАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

- 1) тромбоэмболии легочной артерии
- 2) отека легких
- 3) легочного кровотечения
- 4) отека Квинке

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТКАНЕЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) пинцет анатомический
- 2) зажим Кохера
- 3) скальпель
- 4) желобоватый зонд

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО

- 1) сообщить в правоохранительные органы
- 2) предупредить всех людей, имевших с ним контакт
- 3) сохранить врачебную тайну
- 4) назначить принудительное лечение

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) клетчатку
- 2) белки
- 3) углеводы
- 4) железо

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В

- 1) приемном отделении
- 2) каждом отделении
- 3) каждом кабинете
- 4) поликлинике

К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ

- 1) органические операционные отходы
- 2) биологические отходы вивариев
- 3) пищевые отходы инфекционных отделений
- 4) пищевые отходы неинфекционных отделений

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) чистую зону
- 2) процедурный кабинет
- 3) кабинет медсестры
- 4) изолятор

ПРЕДВЕСТНИКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) зуд кожи
- 2) потеря сознания
- 3) судороги
- 4) нитевидный пульс

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ БРОНХОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕПАРАТ

- 1) метронидазол
- 2) эуфиллин
- 3) интал
- 4) глаувент

РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

- 1) имеется только входное отверстие
- 2) имеются входное и выходное отверстия
- 3) повреждена кожа
- 4) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба

ПРИВИВАЮТ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1) родители
- 2) воспитатели
- 3) учителя
- 4) медицинские работники

ПРИ ОЖИРЕНИИ РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) вариант стандартной диеты с повышенным содержанием белка
- 2) вариант стандартной диеты с пониженным содержанием белка

- 3) вариант стандартной диеты с пониженной калорийностью
- 4) основной вариант стандартной диеты

ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) горизонтальное с приподнятым головным концом
- 2) лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами
- 3) полусидя с опущенными вниз ногами
- 4) горизонтальное с приподнятым ножным концом

ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

- 1) экссудативном плеврите
- 2) бронхиальной астме
- 3) бронхоэктатической болезни
- 4) бронхите

ПРОБЛЕМАМИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) диспепсия, боль в правом подреберье
- 2) слабость, кожный зуд, артралгии
- 3) боль в пояснице, дизурия, лихорадка
- 4) жажда, полиурия, полидипсия

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ТОШНОТА, РВОТА, ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ ЭТО - ПРИЗНАКИ

- 1) краснухи
- 2) гепатита А
- 3) бешенства
- 4) СПИД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ХРАНИТСЯ

- 1) в месте приготовления рабочего раствора
- 2) в сейфе
- 3) в кабинете старшей медсестры
- 4) у главного врача

СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ _____ И ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) ежедневно
- 4) 1 раз в неделю

НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Конституция РФ
- 2) Этический Кодекс медсестры России
- 3) Трудовой Кодекс РФ
- 4) СанПиН 2.1.3678-20

ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПАЦИЕНТА МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ _____ НАКАЗАНИЕ

- 1) дисциплинарное
- 2) уголовное
- 3) гражданско-правовое
- 4) административное

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПАКОВЫВАЕТСЯ В _____ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- 1) стерильной
- 2) открытой
- 3) грязной
- 4) чистой

ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- 1) инфекционных заболеваний
- 2) сердечно-сосудистых заболеваний
- 3) психических заболеваний
- 4) ЛОР-заболеваний

ГАСТРОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- 1) желудка
- 2) кишечника
- 3) трахеи
- 4) мочевого пузыря

ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С

- 1) дыханием
- 2) питанием
- 3) питьём
- 4) выделениями

НЕЗАКОННОЕ ЗАНЯТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ _____ И УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

- 1) материальное
- 2) дисциплинарное
- 3) административное
- 4) гражданско-правовое

ЗАКАЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

- 1) охлаждением стоп
- 2) охлаждением
- 3) согреванием
- 4) обливанием холодной водой

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

- 1) боли в области сердца, одышка
- 2) чувство голода, потливость, риск потери сознания
- 3) отеки, головная боль
- 4) одышка, сухой кашель

ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ «С» МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) прямое переливание крови без обследования донора
- 2) употребление просроченных продуктов питания
- 3) употребление недоброкачественной воды
- 4) пользование общей посудой

ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) область ниже затылочных бугров
- 2) затылочные бугры
- 3) теменные бугры
- 4) область над затылочными буграми

БОЛЬШОЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В

- 1) левом желудочке
- 2) правом предсердии
- 3) левом предсердии
- 4) правом желудочке

ПРОГУЛКА ИЛИ БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

- 1) вид спорта
- 2) способ закаливания
- 3) традиционный метод лечения
- 4) нетрадиционный метод лечения

ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ _____ СТЕРИЛИЗАТОР

- 1) паровой
- 2) воздушный
- 3) плазменный
- 4) газовый

ОСНОВНОЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ В ОРГАНИЗМ

- 1) ингаляционный
- 2) трансдермальный
- 3) пероральный
- 4) резорбтивный

ОЖОГ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮЩИЙ В МЕСТАХ ВХОДА И ВЫХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, СООТВЕТСТВУЕТ _____ СТЕПЕНИ

- 1) III-а
- 2) I
- 3) III-б
- 4) II

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ - ЭТО ПРОЦЕСС

- 1) образования плаценты
- 2) образования половых клеток
- 3) передвижения зрелой яйцеклетки в матку
- 4) слияния яйцеклетки и сперматозоида

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ

- 1) микроорганизмов в споровой форме
- 2) механических загрязнений
- 3) остатков стерилизующих агентов
- 4) дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и других загрязнений

У ЖЕНЩИН В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ СЧИТАЕТСЯ НОРМОЙ _____ СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ ВЛАГАЛИЩНОЙ ФЛОРЫ

- 1) только 1
- 2) только 3
- 3) 3 и 4
- 4) 1 и 2

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)
- 2) показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)
- 3) как разница систолического и пульсового давления
- 4) как сумма пульсового и систолического давления

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА

- 1) диабет 1-го типа, ревматоидный артрит, шизофрению, псориаз, ишемическую болезнь сердца
- 2) синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау
- 3) фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию,

адреногенитальный синдром

4) гемофилию, болезнь Тея-Сакса, альбинизм, серповидноклеточную анемию

ДЛЯ ЭПИЦИСТОСТОМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ КАТЕТЕР

- 1) Мерсье
- 2) Тиманна
- 3) Нелатона
- 4) Фолея

ПРИ ИНДЕКСЕ ШОКА АЛЬГОВЕРА РАВНОМ 1,5 ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ СОСТАВЛЯЕТ (В ЛИТРАХ)

- 1) 1,5
- 2) 1,0
- 3) 0,5
- 4) 2,0 и более

ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ

- 1) распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчиненных
- 2) демократизм в отношении коллег
- 3) подчинение коллегам
- 4) неподчинение старшему по должности

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ _____ ИНСТРУКТАЖ

- 1) внеплановый
- 2) первичный
- 3) повторный
- 4) вводный

ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) формирование потребности изменения приоритетов в жизни
- 2) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- 3) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений
- 4) предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье

ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ

- 1) при бытовом загрязнении рук
- 2) перед сменой постельного белья
- 3) перед и после приема пищи
- 4) перед проведением инъекций

ПРИ РАЗРЫВЕ СЕЛЕЗЕНКИ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ЕЕ УШИВАНИЮ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) splenalgia
- 2) splenomegalia

- 3) splenectomy
- 4) splenorrhaphia

ЗАДАЧА ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 1) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
- 2) предупреждение прогрессирования заболевания
- 3) максимальное восстановление качества жизни пациента
- 4) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН

- 1) расширением коронарных артерий
- 2) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
- 3) расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
- 4) урежением сердечного ритма

ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- 1) реконвалесцентам инфекционных заболеваний
- 2) больным инфекционными заболеваниями
- 3) согласно Национального календаря профилактических прививок
- 4) проживающим на территориях с высоким риском заражения

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ЗА ПРИВИТЫМ НАБЛЮДАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ____ МИНУТ

- 1) 5
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 10

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

- 1) дать нитроглицерин под язык
- 2) ввести морфина гидрохлорид
- 3) ввести анальгин в/м
- 4) дать димедрол внутрь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ПРОДУКТИВНОГО ТИПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСОВ С КЛЕТКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лизогения
- 2) репликация вирусных геномов
- 3) интеграция в клеточный геном
- 4) обратная транскрипция

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1) консультация врача уролога
- 2) консультация врача хирурга

- 3) анкетирование
- 4) сканирование брахицефальных артерий

ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО

- 1) следить за активностью пациента
- 2) содержать пациента в тепле
- 3) следить за кровоснабжением поврежденной конечности
- 4) следить за соблюдением диеты

ОБРАБОТКА ПОСУДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) УФ-облучением
- 2) протиранием ветошью в дезинфицирующем растворе
- 3) погружением в дезинфицирующий раствор с последующим ополаскиванием
- 4) обработкой паром

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 160°C – 120 минут
- 2) 180°C – 60 минут
- 3) 1,1 атм – 120°C – 45 минут
- 4) 2 атм – 132°C – 20 минут

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь
- 2) алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
- 3) солкосерил, алазоль, пантенол
- 4) бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь

МУТАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (РАДИАЦИЯ, ХИМИКАТЫ), НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) индуцированными
- 2) спонтанными
- 3) рецессивными
- 4) доминантными

ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРА 6% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ГРАДУСОВ

- 1) 30
- 2) 40
- 3) 12
- 4) 18

ПРИЕМ АНТАЦИДОВ РЕКОМЕНДОВАН

- 1) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь

- 2) за час до еды
- 3) спустя 3 часа после приема пищи
- 4) во время еды

ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) сухими
- 2) мокрыми
- 3) влажными
- 4) сырыми

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ 1%

- 1) каждого наименования инструмента и вида изделий, обработанных в течение суток
- 2) от одновременно обработанной партии изделий медицинского назначения
- 3) от каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 4) одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц

ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

- 1) задержке физического развития
- 2) повышенной утомляемости
- 3) онкологическим заболеваниям
- 4) развитию остеопороза

ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) борьба со стрессом
- 2) соблюдение принципов рационального питания
- 3) борьба с табакокурением
- 4) адекватная физическая нагрузка

ГИПОКСИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) нормальным содержанием кислорода в организме
- 2) отравлением кислородом
- 3) увеличенным количеством кислорода в крови
- 4) недостатком кислорода в тканях

К ГЕМОСТАТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) дицинон
- 2) викасол
- 3) транексамовая кислота
- 4) перекись водорода

ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО

- 1) промыть желудок
- 2) положить грелку на живот
- 3) поставить масляную клизму
- 4) провести дуоденальное зондирование

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ С

- 1) врачом-неврологом
- 2) психологом
- 3) логопедом
- 4) врачом-психиатром

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА _____ ЧАСА (ОВ) ДО СНА

- 1) 2
- 2) 3,5
- 3) 4
- 4) 4,5

РЕЖИМ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 180°C, 30 минут
- 2) 120°C, 45 минут
- 3) 160°C, 150 минут
- 4) 132°C, 100 минут

ДЛЯ ОЦЕНКИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) индекс Алговера
- 2) шкала Глазго
- 3) индекс Франка
- 4) шкала Ватерлоу

ГИПЕРЕМИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) кровопотерей
- 2) лихорадкой
- 3) коллапсом
- 4) обмороком

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ФУРУНКУЛА НА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ НАКЛАДЫВАЕТСЯ _____ ПОВЯЗКА

- 1) спиралевидная
- 2) колосовидная
- 3) восходящая
- 4) крестообразная

АНТИСЕПТИКА - КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) уничтожение болезнетворных микробов
- 2) обеззараживание операционного поля
- 3) предупреждение попадания микробов в рану
- 4) уничтожение микробов в ране, организме

К ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ

- 1) органические операционные отходы
- 2) патологоанатомические отходы
- 3) пищевые отходы инфекционных отделений
- 4) пищевые отходы неинфекционных отделений

ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО

- 1) признаков депрессии
- 2) постепенного угасания сознания
- 3) физической боли
- 4) душевной боли

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ

- 1) пневмоторакса
- 2) туберкулеза
- 3) абсцесса легкого
- 4) кровохарканья

МОТОРНЫЙ ЦЕНТР РЕЧИ (ЦЕНТР БРОКА) РАСПОЛОЖЕН В _____ ДОЛЕ

- 1) теменной
- 2) лобной
- 3) затылочной
- 4) височной

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

- 1) холод на живот, госпитализация
- 2) введение анальгетиков
- 3) введение антибактериальных средств
- 4) грелка на живот

1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА СОДЕРЖИТ _____ МЛ ВОДНОГО РАСТВОРА

- 1) 5
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 7,5

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тревога за будущее

- 2) социальная самоизоляция
- 3) чувство безнадежности
- 4) страх смерти

В НОРМЕ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА _____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1) 16-20
- 2) 40-50
- 3) 10-12
- 4) 60-80

К ОТХОДАМ КЛАССА Д ОТНОСЯТ

- 1) люминесцентные лампы
- 2) строительный мусор
- 3) ртутьсодержащие приборы
- 4) все отходы, содержащие радиоактивные компоненты

ОСЛОЖНЕНИЕ СО СТОРОНЫ КОЖИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У БОЛЬНОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) аллергическим дерматитом
- 2) ихтиозом
- 3) фурункулёзом
- 4) пролежнем

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) допускается при дефиците бирок-стяжек
- 2) допускается в течение смены
- 3) допускается всегда
- 4) не допускается при любых условиях

ВОРСИНКИ ИМЕЮТСЯ В _____ КИШКЕ

- 1) поперечной ободочной
- 2) слепой
- 3) тонкой
- 4) прямой

УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ _____ ПРОФИЛАКТИКИ

- 1) вторичной
- 2) первичной
- 3) третичной
- 4) социальной

ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА-ЭТО

- 1) метод экстренной помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом,

закрывающийся в резких толчках в эпигастральную область (под диафрагму)

2) способ восстановления проходимости дыхательных путей путем запрокидывания головы и выдвижения нижней челюсти

3) метод искусственной вентиляции легких с использованием специального воздуховода и мешка Амбу

4) способ прекардиального удара для восстановления сердечного ритма при фибрилляции желудочков

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В _____ МЕСЯЦА (ЕВ)

1) 5

2) 6

3) 3

4) 7

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

1) онкологическими заболеваниями в фазе ремиссии

2) последствиями травм с временным ограничением функций

3) врожденными пороками сердечно сосудистой системы

4) неоперабельными врожденными пороками развития

К МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

1) кипячение

2) погружение в дезинфицирующее средство

3) ультрафиолетовое облучение

4) влажная уборка

В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО

1) составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы

2) составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы

3) обратиться в Управление Роспотребнадзора

4) обратиться к врачу

ПРИЗНАК КОМЫ

1) спутанность сознания

2) отсутствие сознания

3) сохранение реакции на болевое воздействие

4) сохранность сухожильных рефлексов

СНИЗУ К МОЧЕВОМУ ПУЗЫРЮ У МУЖЧИН ПРИМЫКАЕТ

1) предстательная железа

2) прямая кишка

- 3) тонкая кишка
- 4) семявыносящий проток

К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) растительные масла
- 2) крупы
- 3) морепродукты
- 4) орехи

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- 1) медицинскую и социальную реабилитацию больных
- 2) предотвращение зачатия больного ребенка, проведение ДНК-анализа
- 3) лечение острой фазы болезни
- 4) проведение ДНК-анализа

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ

- 1) тахикардия, экзофтальм
- 2) тошнота, рвота
- 3) желтуха, «сосудистые звездочки»
- 4) снижение температуры и артериального давления

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН

- 1) овощи, фрукты, кисломолочные продукты
- 2) цельное молоко
- 3) газированные напитки, соки
- 4) хлеб белый

1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА СОДЕРЖИТ _____ МЛ ВОДНОГО РАСТВОРА

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 20
- 4) 7

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- 1) галоперидола, дротаверин (но-шпы)
- 2) метамизола натрия + питофенона + фенпивериния бромид (максигана), фуросемида (лазикса)
- 3) фентанила, дроперидола, морфина
- 4) азаметония бромид (пентамина), бендазола (дибазола)

ПЕРВИЧНЫМИ ПИРОГЕНАМИ, ЗАПУСКАЮЩИМИ РАЗВИТИЕ ЛИХОРАДКИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) простагландины E₁, цитокины (интерлейкин-1, интерферон)
- 2) микробные эндотоксины, компоненты бактериальных и вирусных клеток

- 3) продукты распада тканей при травме
- 4) гормоны щитовидной железы (тироксин) и надпочечников (адреналин)

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

- 1) обучение распознаванию признаков заболеваний
- 2) выработка динамического стереотипа поведения в жизни
- 3) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам
- 4) положительные изменения в состоянии здоровья

В ЧЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАКЕТ УПАКОВЫВАЮТ ОТХОДЫ КЛАССА

- 1) Д
- 2) Б
- 3) В
- 4) Г

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1) пневмония
- 2) панкреатит
- 3) ревматизм
- 4) краснуха

ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- 1) почкообразные лотки
- 2) емкости из нержавеющей стали
- 3) вакуумные установки
- 4) ультразвуковые установки

К ОСНОВНОМУ НЕИНВАЗИВНОМУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ МЕТОДУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) трансторакальная эхокардиография
- 2) 12-канальная электрокардиография
- 3) ультразвуковое исследование сонных артерий
- 4) магнитно-резонансное томографическое исследование сердца

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) разрыв аневризмы брюшного отдела аорты
- 2) фибрилляция желудочков
- 3) обструкция дыхательных путей инородным телом
- 4) массивная тромбоэмболия легочной артерии

1 ДЕСЕРТНАЯ ЛОЖКА СОДЕРЖИТ _____ МЛ ВОДНОГО РАСТВОРА

- 1) 15,5
- 2) 7,5

- 3) 20,5
- 4) 5,5

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

- 1) воздушно-пылевой
- 2) воздушно-капельный
- 3) парентеральный
- 4) контактно-бытовой

ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- 1) строгий выговор
- 2) наказание не предусматривается
- 3) выговор
- 4) уголовная ответственность

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТОК ПЛЕВРЫ ПОКРЫВАЕТ

- 1) печень
- 2) сердце
- 3) легкое
- 4) надпочечник

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ

- 1) 13 лет
- 2) 10 лет
- 3) 7 лет
- 4) 15 лет

ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЮТ ОСЛОЖНЕННЫЕ ФУРУНКУЛЫ

- 1) кисти
- 2) стопы
- 3) спины
- 4) лица

АГОНАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ - ЭТО

- 1) редкие нерегулярные вдохи
- 2) громкое шумное дыхание
- 3) громкое дыхание с кашлем
- 4) судорожные вдохи и кашель

К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
- 2) пассивное кормление пациента
- 3) подготовка пациента к исследованию
- 4) проведение в/м, в/в, п/к, инъекций

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ БЦЖ

- 1) граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
- 2) внутренняя поверхность предплечья
- 3) граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча
- 4) наружная поверхность предплечья

«ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ» ПРИНЯТ

- 1) Всемирной организацией здравоохранения
- 2) Международным советом медицинских сестер
- 3) Ассоциацией медицинских сестер России
- 4) Министерством здравоохранения РФ

К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ОТНОСЯТ

- 1) половую принадлежность
- 2) артериальную гипертензию
- 3) отягощенную наследственность
- 4) возраст старше 50 лет

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность
- 2) проведение иммобилизации и транспортировка
- 3) вызов скорой помощи, устранение причины, вызвавшей шок, обезболивание
- 4) транспортировка в травматологическое отделение

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НАРУШЕНА ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ

- 1) поджелудочной железы
- 2) печени
- 3) гипофиза
- 4) щитовидной железы

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) история болезни пациента
- 2) журнал учета работы медсестры
- 3) должностная инструкция
- 4) журнал учета процедур

ГИПОГАЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) непереносимость грудного молока у ребенка
- 2) воспаление молочной железы у женщины
- 3) снижение выработки молока в молочных железах
- 4) снижение потребности ребенка в грудном молоке

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА VIRI НА ПОДЦАРСТВА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) цитопатогенному действию
- 2) морфологическим особенностям
- 3) типу нуклеиновой кислоты
- 4) тинкториальным свойствам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ _____ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- 1) третичной
- 2) медицинской
- 3) вторичной
- 4) первичной

В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПОКАЗАН РЕЖИМ

- 1) постельный
- 2) строгий постельный
- 3) общий
- 4) палатный

ВЛАЖНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАКЛАДЫВАТЬ НА _____ ЧАСА (ЧАСОВ)

- 1) 3-4
- 2) 10-12
- 3) 1-2
- 4) 6-8

ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- 1) гепатита
- 2) гастрита
- 3) бронхита
- 4) ожирения

ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 2 раза в месяц
- 4) 1 раз в месяц

МАЗКИ ИЗ ЗЕВА И НОСА ДОСТАВЛЯЮТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 12
- 4) 6

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

АКТИВНОСТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ХОДЬБА В УМЕРЕННОМ ИЛИ БЫСТРОМ ТЕМПЕ МЕНЕЕ _____ МИНУТ В ДЕНЬ

- 1) 40
- 2) 20
- 3) 30
- 4) 60

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТА С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) проведение медико-генетического консультирования и составление родословной для оценки прогноза потомства
- 2) подбор и коррекцию дозировки препаратов для патогенетической терапии заболевания
- 3) интерпретацию результатов молекулярно-генетических анализов и установление окончательного клинического диагноза
- 4) точное выполнение врачебных назначений (диета, лекарства), уход, обучение семьи, психологическую поддержку

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) наложение стерильной повязки
- 2) сопоставление отломков кости
- 3) иммобилизацию табельными и подручными средствами
- 4) вправление вышедшей наружу кости

ПРИЗНАКОМ ЯВНОЙ СПАЗМОФИЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) апноэ
- 2) бронхоспазм
- 3) ларингоспазм
- 4) пилороспазм

КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ УМЕНЬШАЕТСЯ В _____ ПЕРИОДЕ

- 1) начальном
- 2) олигурическом
- 3) полиурическом
- 4) лихорадочном

ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия
- 2) снижением зрачковых реакций
- 3) кратковременной потерей сознания
- 4) выпадением корнеального рефлекса

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ХАРАКТЕРЕН _____ ПЕРЕЛОМ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1) надмыщелковый

- 2) ротационный
- 3) поднадкостничный
- 4) оскольчатый

ЗАМЕНА ОДНОГО ТИПА ТКАНИ НА ДРУГОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гиперплазия
- 2) дисплазия
- 3) метаплазия
- 4) гипоплазия

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) лоратадин (klaritin)
- 2) нандролон (ретаболил)
- 3) кларитромицин
- 4) натрия фторид

ПРЕФИКС "ГИПЕР-" (HYPER-) В ТЕРМИНЕ " ОЗНАЧАЕТ

- 1) нарушение
- 2) понижение
- 3) повышение
- 4) отсутствие

«КЛАДБИЩЕМ ЭРИТРОЦИТОВ» НАЗЫВАЮТ

- 1) селезенку
- 2) печень
- 3) почки
- 4) поджелудочную железу

ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ НАКЛАДЫВАЮТ

- 1) асептическую повязку
- 2) давящую повязку
- 3) жгут выше места сдавления после освобождения конечности
- 4) жгут выше места сдавления перед освобождением конечности

ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В

- 1) желудок
- 2) двенадцатиперстную кишку
- 3) подвздошную кишку
- 4) тощую кишку

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ _____ СИСТЕМЫ

- 1) нервной системы
- 2) сердечно-сосудистой
- 3) дыхательной

4) эндокринной

ЗАЩИТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ СТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мазь Левомеколь
- 2) линимент Вишневского
- 3) паста Лассара
- 4) мазь Флеминга

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- 1) журнал учета пациентов и отказов от госпитализации (ф 001/у)
- 2) медицинская карта стационарного больного (ф 003/у)
- 3) листок учета движения больных и коечного фонда (ф 007/у)
- 4) статистическая карта выбывшего из стационара (ф 066/у)

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗОТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) операция
- 2) непроходимость кишечника
- 3) запор
- 4) метеоризм

СУСПЕНЗИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО

- 1) взбалтывать
- 2) активировать
- 3) стерилизовать
- 4) растворять

СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ 140/90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пульсовым давлением
- 2) систолическим давлением
- 3) артериальной гипотензией
- 4) артериальной гипертензией

ЗА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ (ТРЕВОГА И СТРАХ) ОТВЕЧАЕТ _____ ОТДЕЛ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- 1) симпатический
- 2) парасимпатический
- 3) метасимпатический
- 4) соматический

СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ (В МЛ)

- 1) 800 - 2000
- 2) 200 - 500
- 3) 500 - 800
- 4) 2000 - 3000

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К
ВРАЧУ**

- 1) хирургу
- 2) гинекологу
- 3) онкологу
- 4) венерологу

**АЛАЯ КРОВЬ, ВЫДЕЛЯЮЩАЯСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
_____ КРОВОТЕЧЕНИЯ**

- 1) венозного
- 2) паренхиматозного
- 3) артериального
- 4) капиллярного

ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ

- 1) объем выдоха
- 2) силу мышц
- 3) количество шагов, сделанных в течение дня
- 4) продолжительность физической нагрузки

**В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) мексидол
- 2) дипиридамол
- 3) прокаинамид
- 4) амиодарон

**УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) соблюдение его избирательного права
- 2) передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям
- 3) отказ от выяснения его семейного статуса
- 4) сохранение тайны о состоянии его здоровья

**САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - ЭТО РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕМ
КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) методы профилактики инфекционных заболеваний
- 2) гигиеническое обучение и воспитание населения
- 3) факторы влияния условий жизни и труда на здоровье человека
- 4) методы профилактики неинфекционных заболеваний

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ РАСПОЛОЖЕН В

- 1) левой подвздошной области
- 2) эпигастрии

- 3) правой подвздошной области
- 4) малом тазу

ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) флуоксетин
- 2) галоперидол
- 3) парацетамол
- 4) хлорпромазин (аминазин)

СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ

- 1) опистотонус
- 2) симптом \"тугой повязки\"
- 3) стихание болей в ране
- 4) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц

ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- 1) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
- 2) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
- 3) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)
- 4) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБХОДИМО

- 1) применять средства индивидуальной защиты
- 2) соблюдать личную гигиену
- 3) делать 15 минутные перерывы
- 4) выходить на свежий воздух

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩАЮТ В ПАКЕТЫ _____ ЦВЕТА

- 1) красного
- 2) черного
- 3) белого
- 4) желтого

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) полуоткрытыми
- 2) неразъемными
- 3) закрытыми
- 4) в разобранном виде

БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ _____

КОСТЯМИ

- 1) затылочной и теменными
- 2) височной и теменной
- 3) теменными
- 4) лобной и теменными

В БИКСЕ С ФИЛЬТРОМ СОДЕРЖИМОЕ СЧИТАЕТСЯ СТЕРИЛЬНЫМ С МОМЕНТА СТЕРИЛИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ _____ (В СУТКАХ)

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 20
- 4) 7

НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 2 часа
- 2) 1 час
- 3) 30 минут
- 4) 3 часа

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ __%

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 10

ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) 2% раствор прокаина (новокаина)
- 2) 0,25% раствор прокаина (новокаина)
- 3) 10% раствор лидокаина
- 4) 1% раствор тримекаина

ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТ ТОНКОЙ КИШКИ ОТТЕКАЕТ В _____ ВЕНУ

- 1) воротную
- 2) верхнюю полую
- 3) нижнюю полую
- 4) общую подвздошную

КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ _____, ГДЕ n – ВОЗРАСТ В МЕСЯЦАХ

- 1) $n - 1$
- 2) $n - 6$
- 3) $4 - n$
- 4) $n - 4$

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нейрон
- 2) нервное волокно
- 3) синапс
- 4) рецептор

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПРОИСХОДИТ В

- 1) влагалище
- 2) матке
- 3) маточной трубе
- 4) яичнике

ДЛЯ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ХАРАКТЕРНА

- 1) высокая чувствительность к антибактериальным средствам
- 2) устойчивость к антибактериальным средствам
- 3) устойчивость к бактериям
- 4) чувствительность к ультрафиолетовому облучению

ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

- 1) темном шкафу при комнатной температуре
- 2) сейфе для медикаментов группы А
- 3) морозильной камере при температуре от -18
- 4) холодильнике при температуре от +2 до +8

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ В

- 1) микробиологическую лабораторию
- 2) бактериологическую лабораторию
- 3) клиническую лабораторию
- 4) биохимическую лабораторию

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ПРЕКРАЩАЮТ, ЕСЛИ

- 1) прошло 10 минут с момента начала реанимации
- 2) спасатель вызвал выездную бригаду скорой медицинской помощи
- 3) выполнено три цикла компрессий и искусственного дыхания
- 4) появились достоверные признаки жизни

К СУБЪЕКТИВНОМУ МЕТОДУ СЕСТРИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) опрос пациента
- 2) измерение артериального давления
- 3) определение скрытых отеков
- 4) знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ВЫПОЛНЯЮТ НА

- 1) любой поверхности при условии высокой частоты компрессий
- 2) мягкой поверхности (диван, кровать с панцирной сеткой)
- 3) твердой ровной поверхности (пол, земля, твердый щит)
- 4) операционном столе с мягким поролоновым матрасом

К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ДИСЛИПЕДЕМИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) отказ от вредных привычек
- 2) коррекция диеты
- 3) прием статинов
- 4) постепенное расширение физической активности

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) диклофенак
- 2) морфин
- 3) парацетамол
- 4) метамизол натрия (анальгин)

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ _____ % РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 33
- 4) 27

СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- 1) потере аппетита
- 2) нарушению функций кишечника
- 3) избыточной массе тела
- 4) дефициту массы тела

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) реабилитацию пациентов с наследственными болезнями
- 2) санитарное просвещение населения
- 3) лечение уже родившегося больного ребенка
- 4) медико-генетическое консультирование и пренатальную диагностику

ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) глюкоза
- 2) белок
- 3) холестерин
- 4) непрямой билирубин

К МЕРОПРИЯТИЯМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) промывание желудка
- 2) согревание в области живота
- 3) постановка масляной клизмы
- 4) проведение дуоденального зондирования

К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ

- 1) спирография
- 2) электрокардиография
- 3) ультразвуковое исследование
- 4) компьютерная томография

ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТ

- 1) медицинский персонал
- 2) родственники пациента
- 3) сам пациент
- 4) врач приемного отделения

ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР В ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ _____ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- 1) текущая
- 2) очаговая заключительная
- 3) очаговая текущая
- 4) профилактическая

ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) препараты крови
- 2) руки
- 3) пищевые продукты
- 4) предметы обихода

РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

- 1) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
- 2) в ней находится инородное тело
- 3) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- 4) повреждены мышцы и кости

ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ТЕРМОМЕТРА ПОДМЫШЕЧНУЮ ВПАДИНУ СЛЕДУЕТ

- 1) вымыть с мылом
- 2) обработать спиртом
- 3) вытереть насухо
- 4) смазать кремом

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- 1) отопления помещения

- 2) вентиляции помещения
- 3) освещения помещения
- 4) обеззараживания воздуха в помещениях

РЕАНИМАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

- 1) дыхания и кровообращения
- 2) работоспособности
- 3) социальных функций организма
- 4) общения

ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ

- 1) эндемический зоб
- 2) флюороз
- 3) анемия
- 4) хрупкость костей

ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ

- 1) объем форсированного выдоха за 1 секунду
- 2) жизненную емкость легких
- 3) пиковую скорость выдоха
- 4) содержание кислорода в выдыхаемом воздухе

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

- 1) рост в м минус 100
- 2) рост в см минус 100
- 3) масса тела в кг разделить на рост, выраженный в метрах, в квадрате
- 4) масса тела в кг разделить на рост в см

ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- 1) рентгенографию
- 2) электрокардиографию
- 3) велоэргометрию
- 4) реоэнцефалографию

СЫПЬ НА КОЖЕ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ОБРАБАТЫВАЮТ РАСТВОРОМ

- 1) соды 2%
- 2) бриллиантового зеленого 1%
- 3) йода 10%
- 4) новокаина 0,5%

ПОЛИСОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) договор между гражданином и медицинской страховой компанией
- 2) бланк, удостоверяющий право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи

- 3) документ, удостоверяющий заключение договора между работодателем и фондом ОМС
- 4) документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное получение медицинской помощи на территории РФ

ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК - ПРИЗНАКИ

- 1) воспаления
- 2) дистрофии
- 3) тромбоза
- 4) склероза

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОЖОГА II СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) появление глубоких язв с гнойным отделяемым
- 2) некроз всех слоёв кожи с обугливанием
- 3) образование пузырей с прозрачным серозным содержимым
- 4) только гиперемия без образования пузырей

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ _____ ДЕЙСТВИЯ

- 1) психохимического
- 2) удушающего
- 3) общетоксического
- 4) кожно-нарывного

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) заполнен только от руки шариковой ручкой, без использования печатающих устройств
- 2) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации
- 3) передан на хранение в архив медицинской организации в течение 5 лет, после чего уничтожен без составления акта
- 4) ежемесячно распечатан (при любой форме ведения) и заверен у нотариуса

В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ

- 1) травмы, несчастные случаи, отравления
- 2) злокачественные образования
- 3) заболевания органов дыхания
- 4) сердечно-сосудистые заболевания

ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ

- 1) перед началом рабочей смены
- 2) 1 раз в неделю

- 3) в конце рабочей смены
- 4) после каждого кварцевания

ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ В _____ КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ

- 1) верхневнутренний
- 2) верхненааружный
- 3) нижневнутренний
- 4) нижненааружный

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) несоблюдение правил личной гигиены
- 2) аномалия развития
- 3) переохлаждение
- 4) умеренная физическая активность

ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ

- 1) перечень срочных назначений
- 2) температурный лист
- 3) паспортные данные пациента
- 4) отказ от госпитализации

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ПО ОРГАНИЗМУ С ОБРАЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ОЧАГОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ПРОЦЕСС

- 1) анаплазии
- 2) рецидивирования
- 3) малигнизации
- 4) метастазирования

ВЫЗЫВАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖЕТ

- 1) лизиноприл
- 2) омепразол
- 3) диазепам
- 4) метформин

КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) тахипноэ
- 2) ортопноэ
- 3) брадипноэ
- 4) апноэ

ПАЦИЕНТЫ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА

- 1) животе на обычных носилках
- 2) боку на щите

- 3) боку на обычных носилках
- 4) спине на щите

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) рациональное питание
- 2) физическая активность
- 3) высокий уровень холестерина
- 4) неотягощенная наследственность

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ

- 1) большое количество белка
- 2) ограниченное количество белков
- 3) большое количество углеводов
- 4) ограниченное количество углеводов

ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ» ЯЗЫК

- 1) сухой, может быть обложен налетом
- 2) влажный, чистый
- 3) малинового цвета с изъязвлениями
- 4) с налетом в виде белых пятен

ВНУТРИМАТОЧНУЮ КОНТРАЦЕПЦИЮ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1) врач в асептических условиях в последний день менструации
- 2) врач в любой день менструального цикла
- 3) женщина самостоятельно в любой день менструального цикла
- 4) женщина самостоятельно в последний день менструации

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГОНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушения сна
- 2) лихорадка
- 3) гнойные выделения из уретры
- 4) зуд гениталий

ВИТАМИН Д СОДЕРЖИТСЯ В

- 1) моркови
- 2) шпинате
- 3) ячневой крупе
- 4) рыбьем жире

ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ____ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) II
- 2) I
- 3) IIIб
- 4) IIIа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЮЮ

- 1) коррекции лечения
- 2) выявления ранних форм заболеваний и факторов риска
- 3) оценки реабилитационного потенциала
- 4) выявления заболеваний на поздних стадиях

СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинское страхование граждан
- 2) доступность и качество медицинской помощи
- 3) муниципальное управление здравоохранением
- 4) государственное управление здравоохранением

ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ

- 1) редкое потребление больших порций еды
- 2) частые небольшие порции пищи
- 3) питание строго по расписанию вне зависимости от желания пациента
- 4) голодание и ограничение приема жидкости

СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) снижением смертности
- 2) воздействием через средства массовой информации
- 3) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
- 4) ранней диагностикой заболеваний

ОБЪЕМ ПРОБНОЙ ДОЗЫ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ МЛ

- 1) 30-35
- 2) 40-45
- 3) 20-25
- 4) 10-15

ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) человек
- 2) животное
- 3) насекомое
- 4) пресмыкающееся

В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОГРАНИЧИВАЮТ

- 1) растительные жиры
- 2) витамины
- 3) белки
- 4) поваренную соль

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫ

- 1) Федеральным законом Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- 2) Трудовым кодексом Российской Федерации
- 3) Уголовным кодексом Российской Федерации
- 4) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта

ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) употребление недоброкачественной воды
- 2) прямое переливание крови без обследования донора
- 3) пользование общей посудой
- 4) употребление просроченных продуктов питания

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ЭМБОЛИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ ИНЪЕКЦИИ

- 1) гепарина
- 2) физиологического раствора
- 3) инсулина
- 4) масляных растворов

ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) проходимость дыхательных путей
- 2) адекватное кровообращение
- 3) устойчивое положение туловища
- 4) адекватный уровень артериального давления

В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ НОГУ СГИБАЕТ

- 1) икроножная мышца
- 2) четырехглавая мышца бедра
- 3) двуглавая мышца бедра
- 4) большая ягодичная мышца

К НЕЗАВИСИМОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) инъекции анальгетиков
- 2) обучение пациента элементам самоухода
- 3) инъекции антибиотиков
- 4) предоперационная подготовка пациента

К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) качество питания
- 2) качество медицинской помощи

- 3) отягощенная наследственность
- 4) организация труда

СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К СРЫГИВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) хорошим развитием кардиального сфинктера желудка
- 2) слабым развитием кардиального сфинктера желудка
- 3) хорошим развитием пилорического сфинктера
- 4) слабым развитием пилорического сфинктера

УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) брадикардией
- 2) тахикардией
- 3) асистолией
- 4) гипертонией

СПОСОБНОСТЬ СВЕРТЫВАТЬСЯ ОБУСЛОВЛЕНА ПРИСУТСТВИЕМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

- 1) гепарина
- 2) фибриногена
- 3) фибринолизина
- 4) фибрина

ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ, ПРИ

- 1) бронхиальной астме
- 2) плеврите
- 3) бронхите
- 4) бронхэктатической болезни

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное переохлаждение
- 2) прием снотворных
- 3) низкое атмосферное давление
- 4) стресс и психическое напряжение

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОПУЩЕНИЕ ОРГАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛАБОСТИ СВЯЗОК, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -stomia
- 2) -pexia
- 3) -plastica
- 4) -ptosis

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) железо
- 2) жиры животного происхождения
- 3) витамин С

4) калий

ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) измерение температуры
- 2) введение сосудосуживающих средств
- 3) холод на грудную клетку
- 4) подготовка набора для плевральной пункции

РАСТВОРОМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) дезинфицирующий раствор
- 3) фурацилин
- 4) стерильная вода

В ПРАВОМ ЛЕГКОМ ИМЕЮТСЯ _____ ДОЛИ

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ _____ ПЕРЧАТКИ

- 1) нестерильные
- 2) стерильные
- 3) кольчужные
- 4) смотровые

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эйфория
- 2) боль в суставах
- 3) снижение артериального давления
- 4) повышение артериального давления

ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО

- 1) исключить физические нагрузки
- 2) ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки
- 3) отказаться от любых видов спорта
- 4) порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях

НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
- 2) вакцинация против полиомиелита
- 3) вакцинация против туберкулеза

4) первая вакцинация против гепатита В

ДЛЯ БЫСТРОЙ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ОЖОГА У ВЗРОСЛЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) визуальный осмотр без расчётов
- 2) пальпаторное определение границ поражения
- 3) измерение линейкой длины и ширины ожога
- 4) правило «девяткок»

ПРИ ВЫБОРЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

- 1) объем средства
- 2) спектр действия
- 3) внешний вид упаковки
- 4) фирму производителя

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗ МЕЖДУ КОМПРЕССИЯМИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ _____ СЕКУНД

- 1) 15-20
- 2) 5-10
- 3) 35-40
- 4) 25-30

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА, НЕОБХОДИМО

- 1) внести изменения непосредственно в исходный файл без отметки
- 2) исправить ошибку устно при следующем визите пациента
- 3) удалить исходный документ, создать новый исправленный электронный документ
- 4) создать новый электронный документ, содержащий внесенные изменения, с указанием его связи с исходным документом

ИСКУССТВЕННЫМ КОЛЛОИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) полиглюкин
- 2) альбумин 5%
- 3) пентаглобин
- 4) антитромбин

ПОСТРАДАВШЕМУ С ОТРАВЛЕНИЕМ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ, ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ

- 1) после установки орофарингеального воздуховода
- 2) перед интубацией трахеи
- 3) после интубации трахеи
- 4) после установки назального воздуховода

НАЗНАЧЕННАЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В

- 1) листе назначений

- 2) требования на лекарственные препараты
- 3) истории болезни
- 4) температурном листе

ПАЦИЕНТ - ЭТО

- 1) физическое лицо, заключившее договор на оказание платных медицинских услуг
- 2) физическое лицо, имеющее полис обязательного медицинского страхования
- 3) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния
- 4) физическое лицо, которому установлен диагноз заболевания

ЭНДОКРИННОЙ ЖЕЛЕЗОЙ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЮ ДРУГИХ ЖЕЛЁЗ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эпифиз
- 2) поджелудочная железа
- 3) надпочечник
- 4) гипофиз

УФ-ЛУЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ В _____ МЕТОДЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- 1) комбинированном
- 2) механическом
- 3) физическом
- 4) химическом

К МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) круговая мышца глаза, круговая мышца рта, мышцы лба
- 2) жевательная, височная, крыловидные мышцы
- 3) грудино – ключично - сосцевидная, трапециевидная
- 4) дельтовидная, большая грудная, передняя зубчатая

ПРИ АТОНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ПОЖИЛЫХ ВОЗНИКАЕТ

- 1) увеличение его сократительной способности
- 2) недержание мочи
- 3) повышенный тонус сфинктера
- 4) учащённое опорожнение без остатка

К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) возраст
- 2) отягощенная наследственность
- 3) табакокурение
- 4) пол

ПАТОЛОГИЧЕСКИ ПОВЫШЕННАЯ И ИЗВРАЩЕННАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ПОВТОРНЫЙ КОНТАКТ С АНТИГЕНОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анафилактическим шоком
- 2) иммунной толерантностью
- 3) иммунодефицитом
- 4) аллергией

К ОСОБЕННОСТЯМ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ

- 1) полное исключение всех углеводов
- 2) наличие диетических ограничений
- 3) увеличение потребления животных жиров для энергии
- 4) неограниченное употребление сахарозаменителей

ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ РЕКОМЕНДУЮТ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ (МЛ/СУТ):

- 1) 1000
- 2) 1500
- 3) 500
- 4) 2500

ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сальбутамол
- 2) эпинефрин
- 3) ранитидин
- 4) хлоропирамин

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ

- 1) антибиотики
- 2) слабительные средства
- 3) ферменты
- 4) антацидные препараты

ЭВЕНТРАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воспаление брюшины
- 2) выход кишечных петель на переднюю брюшную стенку
- 3) выделение кишечного содержимого из раны
- 4) ущемление кишечника в спайках

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТЕРИЛЬНАЯ УПАКОВКА

- 1) фирмы «Винар»
- 2) из крафт-бумаги
- 3) из двухслойной бязи
- 4) производителя

**ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНФЕКЦИИ В ЛЕГОЧНУЮ ТКАНЬ ПРИ ПНЕВМОНИИ ИДЕТ
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ _____ ПУТЁМ**

- 1) бронхогенным
- 2) гематогенным
- 3) лимфогенным
- 4) интраальвеолярным

**СРЕДНЯЯ И УМЕРЕННАЯ АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ
ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)**

- 1) 4-6
- 2) 1-3
- 3) 7-8
- 4) 8-10

**ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ТЕМ, ЧТО**

- 1) определяет наличие инфекционных заболеваний
- 2) периодичность осмотра зависит от вредных факторов
- 3) проводится в течение трудовой деятельности
- 4) оплачивается работником самостоятельно

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО
ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО __ г**

- 1) 15
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 10

**ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ (ИСМП), СПОСОБСТВУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- 1) медицинской аппаратуры
- 2) средств индивидуальной защиты
- 3) средств личной гигиены
- 4) антибиотиков

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) колибактерин
- 2) бактериофаг
- 3) интерферон
- 4) анатоксин

ПРИКОРМ ВВОДИТСЯ

- 1) между кормлениями
- 2) независимо от кормления
- 3) после кормления грудью

4) до кормления грудью

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
- 2) предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи
- 3) регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики
- 4) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

ПРИЗНАКОМ НАРУШЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОГО НАПОЛНЕНИЯ ПРИ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение артериального давления
- 2) симптом «белого пятна»
- 3) потеря сознания
- 4) тахикардия

КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3% одновременно обработанных изделий каждого наименования
- 2) не менее трех единиц, одновременно обработанных изделий
- 3) 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц
- 4) 1% от каждого наименования, обработанных за смену

ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ИНФЕКЦИЙ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинский инструментарий
- 2) пищевые продукты
- 3) кровососущие насекомые
- 4) посуда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОСНОВАНО НА

- 1) частоте гипертонических кризов
- 2) эффективности гипотензивной терапии
- 3) уровне артериального давления
- 4) наличии поражения органов мишеней

СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ (МЕТАНОЛОМ), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слюнотечение
- 2) выраженный цианоз
- 3) нарушение зрения
- 4) судорожный синдром

К ТВЕРДЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) мази
- 2) пасты
- 3) суппозитории
- 4) таблетки

К НЕСПОРООБРАЗУЮЩИМ ПАЛОЧКОВИДНЫМ БАКТЕРИЯМ ОТНОСЯТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ

- 1) дизентерии
- 2) сифилиса
- 3) ботулизма
- 4) возвратного тифа

ОСНОВНЫМИ КЛЕТКАМИ, ФАГОЦИТИРУЮЩИМИ МИКРООРГАНИЗМЫ В ОЧАГЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) эозинофилы
- 2) тучные клетки
- 3) лимфоциты
- 4) нейтрофилы

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

- 1) средней интенсивности
- 2) низкой интенсивности
- 3) умеренной интенсивности
- 4) высокой интенсивности

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА К РАБОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соответствие санитарно-противоэпидемическому режиму
- 2) полная укомплектованность медикаментами и расходными материалами
- 3) исправность и готовность медицинского оборудования к работе
- 4) соответствие параметров микроклимата санитарным нормам

СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК

- 1) лежа на боку
- 2) сидя
- 3) лежа на животе
- 4) в полусидящем положении

ВТОРЫМ ЗВЕНОМ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восприимчивый организм
- 2) возбудитель
- 3) механизм передачи
- 4) инфекционный источник

МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) последняя менструация через 1 год существования стойкой аменореи
- 2) время стабильной менструальной функции
- 3) момент наступления первой менструации
- 4) период времени после окончания репродуктивного возраста

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНЕСТЕЗИИ У ЭКСТРЕННО ОПЕРИРУЕМЫХ БОЛЬНЫХ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА

- 1) острой сердечной недостаточности
- 2) полного желудка
- 3) выраженной интоксикации
- 4) острой дыхательной недостаточности

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- 1) не имеет значения
- 2) обязательно
- 3) оформляется по требованию пациента
- 4) не обязательно

НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ МЕСТОМ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подлопаточная область
- 2) верхненаружный квадрант ягодицы
- 3) внутренняя поверхность предплечья
- 4) наружная поверхность бедра

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ _____ ДНЕЙ

- 1) 14
- 2) 25
- 3) 30
- 4) 28

ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) увеличение потребления жидкости и белков
- 2) ограничение жиров и углеводов
- 3) увеличение потребления жиров и минералов
- 4) ограничение жидкости и соли

НОВОРОЖДЕННОГО НЕОБХОДИМО КУПАТЬ

- 1) ежедневно
- 2) 2 раза в неделю
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 1 раз в 10 дней

ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРОМ ФИКСИРУЕТСЯ ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
- 2) медицинская карта пациента
- 3) заявление о выписке из медицинской организации
- 4) согласие на обработку персональных данных

НЕДОСТАТОК ЙОДА В ВОДЕ, ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К

- 1) снижению функции щитовидной железы
- 2) уменьшению выработки тиреоидных гормонов
- 3) стимуляции выработки глюкокортикоидов
- 4) уменьшению выработки глюкокортикоидов

ЗАРАЖЕНИЕ ГЕПАТИТОМ В ПРОИСХОДИТ _____ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

- 1) воздушно - пылевым
- 2) пищевым
- 3) искусственным
- 4) воздушно - капельным

КОЛИЧЕСТВО МОЧИ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА, СОСТАВЛЯЕТ (МЛ)

- 1) 300
- 2) 5
- 3) 150
- 4) 15

АЛАЯ, ВЫТЕКАЮЩАЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ КРОВЬ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _____ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) артериального
- 2) венозного
- 3) капиллярного
- 4) паренхиматозного

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

- 1) первичная аккредитация
- 2) первичная специализированная аккредитация
- 3) периодическая аккредитация
- 4) аттестация

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ВЗРОСЛОМУ В ОДНУ МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 12-18

- 2) 6-8
- 3) 30-40
- 4) 60-80

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФОРМИРУЮТСЯ

- 1) по группам должностей медицинской организации на основе соответствующего приказа, определяющего качество оказания медицинской помощи
- 2) по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций
- 3) на основании количества жалоб, полученных за истекший отчетный период
- 4) на основании количества пациентов за истекший отчетный период

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) незначительная отечность без ограничения подвижности
- 2) локальное покраснение без деформации
- 3) деформация области сустава
- 4) отсутствие боли при пальпации

К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) увеличение веса
- 2) нарушение менструального цикла
- 3) снижение аппетита
- 4) боль в животе

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ ЗАПИСИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ДИАГНОЗОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОДЕРЖИТ

- 1) направление к врачу-специалисту
- 2) лист временной нетрудоспособности
- 3) медицинская карта амбулаторного больного
- 4) статистический талон

ПЕРВОЙ ФАЗОЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воспаление
- 2) эпителизация
- 3) реорганизации рубца
- 4) регенерация

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА ПРОВОДИТСЯ

- 1) стерильная пункция
- 2) УЗИ печени
- 3) биохимический анализ крови
- 4) пункция лимфоузла

АКТ О МЕДИЦИНСКОЙ АВАРИИ В УЧРЕЖДЕНИИ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) дате начала и окончания приема антиретровирусных препаратов
- 2) проведении инструктажа по охране труда
- 3) предположительном источнике инфекции
- 4) стаже работы работника

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- 1) ультрафиолетовое облучение
- 2) влажная уборка помещений
- 3) использование хлорамина
- 4) фильтрация воздуха

ВОРОТА ЛЁГКИХ НАХОДЯТСЯ НА _____ ПОВЕРХНОСТИ

- 1) диафрагмальной
- 2) междолевой
- 3) реберной
- 4) средостенной

ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – ЭТО

- 1) нарушение желчевыделения
- 2) нарушение всасывания в кишечнике
- 3) увеличение слюнообразования
- 4) расстройство переваривания в желудке

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТВАР ИЗ

- 1) ольховых соплодий
- 2) мяты
- 3) цветов бессмертника
- 4) толокнянки

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение мочеиспускания
- 2) слюноотделение
- 3) повышение артериального давления
- 4) сильная головная боль

ШЛЮЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ВХОДЕ В «СТЕРИЛЬНУЮ» ЗОНУ ОБОРУДУЕТСЯ

- 1) уборочным инвентарем
- 2) УФО облучателем
- 3) раковиной для мытья рук
- 4) приточной вентиляцией

К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ

- 1) тощая кишка
- 2) поджелудочная железа

- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) правая почка

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ, ОСЛОЖНЕННЫМ БРОНХИОЛИТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ

- 1) сухого плеврита
- 2) гидроторакса
- 3) дыхательной недостаточности
- 4) пневмоторакса

В ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛЕ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ РАСПОЛОЖЕНА _____ ЗОНА

- 1) зрительная
- 2) слуховая
- 3) обонятельная
- 4) двигательная

КЛИЗМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1) дезинфекции
- 2) протирацию салфеткой
- 3) обработке спиртом
- 4) мытью под проточной водой

ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ _____ ИММУНИТЕТ

- 1) пассивный приобретенный
- 2) активный приобретенный
- 3) активный естественный
- 4) активный врожденный

ПЕРВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ

- 1) 4 — 5
- 2) 6 — 7
- 3) 10 — 12
- 4) 8 — 9

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устное согласие пациента
- 2) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
- 3) договор на оказание медицинских услуг
- 4) личная анкета пациента

ОДИН РАЗ В 2 ГОДА ИССЛЕДУЕТСЯ КАЛ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ

- 1) 20-29

- 2) 65-75
- 3) 40-64
- 4) 30-39

ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) увеличение потребления жидкости и сладостей
- 2) ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины
- 3) увеличение потребления жиров и пряностей
- 4) ограничение жидкости и соли

ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВУАР И ФАКТОР ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА

- 1) дыхательные пути
- 2) кровь
- 3) руки
- 4) кишечник

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) физиотерапия
- 2) витаминотерапия
- 3) диетотерапия
- 4) гемодиализ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ

- 1) лоперамид
- 2) хилак форте
- 3) панкреатин
- 4) холензим

ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) не менее трех единиц, одновременно обработанных изделий
- 2) 3% одновременно обработанных изделий каждого наименования
- 3) 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 4) 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц

ПАЦИЕНТ – ЭТО

- 1) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
- 2) посетитель медицинской организации
- 3) родственник больного человека
- 4) человек, нуждающийся в социальной защите

ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кровотечение
- 2) перемежающаяся хромота
- 3) сухая гангрена
- 4) отек тканей

КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПРИ ТЯЖЕЛОМ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ОБЫЧНО

- 1) желтушные
- 2) нормальной окраски
- 3) бледные
- 4) цианотичные

РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ УДЕРЖИВАТЬ ГОЛОВУ В _____ МЕСЯЦА (МЕСЯЦЕВ)

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

ТИПОВОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО АГЕНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТКАНИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воспалением
- 2) регенерацией
- 3) дистрофией
- 4) склерозом

МУТАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ И ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) спонтанными
- 2) индуцированными
- 3) соматическими
- 4) генеративными

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) чувство онемения в правой верхней конечности
- 2) быстрое купирование приступа после приема нитроглицерина
- 3) слабая реакция или отсутствие реакции на нитроглицерин
- 4) колющие боли в грудной клетке слева

ГЛУХОТА, ПОРОКИ СЕРДЦА, ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) врожденная краснуха
- 2) ветряная оспа
- 3) эпидемический паротит
- 4) приобретенная краснуха

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О

- 1) лечении
- 2) биологических особенностях возбудителя
- 3) диагностике заболеваний
- 4) симптомах

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ВНУТРИВЕННО ВВОДЯТ

- 1) морфин
- 2) анальгин
- 3) папаверин
- 4) дротаверин

УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА

- 1) никтурия
- 2) полиурия
- 3) пиурия
- 4) дизурия

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ ПИУРИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гломерулонефрит
- 2) пиелонефрит
- 3) хроническая почечная недостаточность
- 4) почечнокаменная болезнь

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ _____ ОКРАШИВАНИЕ РАСТВОРА

- 1) синее, переходящее в фиолетовое
- 2) зелёное, переходящее в фиолетовое
- 3) фиолетовое, переходящее в сиреневое
- 4) фиолетовое, переходящее в зелёное

РОЗОВАЯ ОКРАСКА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК И ВЫРАЖЕННАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) цианидами
- 2) анилиновыми красителями
- 3) угарным газом
- 4) атропином

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ) ВКЛЮЧАЕТ

- 1) только хирургическую коррекцию пороков
- 2) изоляцию больного
- 3) запрет на деторождение
- 4) раннее выявление (скрининг) и раннее начало лечения

МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, ДОСТОВЕРНЫМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫВИХА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рентгенография повреждённого сустава
- 2) ультразвуковое исследование сустава
- 3) динамометрия
- 4) компьютерная томография сустава

УГЛУБЛЕННОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВНЕ РАМОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ

- 1) при ожирении
- 2) с уровнем холестерина 5,6 ммоль/л
- 3) курящим 1-2 сигареты в день
- 4) с низким уровнем физической активности

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ

- 1) АКДС
- 2) анатоксин столбнячный
- 3) пирогенал
- 4) противостолбнячную вакцину

БЕСПОКОЙСТВО, ВЫЗВАННОЕ НЕДОСТАТКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВАНИИ— ЭТО _____ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА

- 1) психологическая
- 2) физиологическая
- 3) социальная
- 4) духовная

РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА

- 1) Б
- 2) В
- 3) А
- 4) Г

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ _____ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- 1) палатная
- 2) процедурная
- 3) операционная
- 4) старшая

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАНЫ ЖИВОТА С ВЫПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НЕОБХОДИМО

- 1) наложить тугую давящую повязку не обрабатывая рану
- 2) попытаться вправить органы в брюшную полость

- 3) накрыть выпавшие органы влажной стерильной салфеткой, не вправляя их
- 4) обработать края раны спиртовым раствором и наложить повязку

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1) стерилизации
- 2) дезинфекции
- 3) предварительной очистке
- 4) предстерилизационной очистке

ПРИ ВАЗОПРЕССОРНОМ ОБМОРОКЕ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ

- 1) приступ кашля
- 2) звуковые и зрительные галлюцинации, судороги
- 3) слабость, тошнота, звон в ушах, потемнение в глазах, головокружение
- 4) перемена положения тела

АХОЛИЯ–ЭТО

- 1) нарушение всасывания в кишечнике
- 2) нарушение поступления желчи в кишечник
- 3) уменьшение слюнообразования
- 4) расстройство переваривания в желудке

К СВОЙСТВУ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СПОСОБНОСТЬЮ ЗАДЕРЖИВАТЬ РОСТ БАКТЕРИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) бактериостатическое
- 2) бактерицидное
- 3) вирулицидное
- 4) спороцидное

ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ МЕТОД

- 1) физический
- 2) химический
- 3) воздушный
- 4) паровой

СОКРАЩАЯСЬ, ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК ВЫБРАСЫВАЕТ КРОВЬ В

- 1) легочную вену
- 2) легочную артерию
- 3) верхнюю полую вену
- 4) аорту

К ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТСЯ

- 1) кровь, лимфа, тканевая жидкость
- 2) внутренние полости тела и органов
- 3) питательные и биологически активные вещества

4) белки, жиры и углеводы

ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УМСТВЕННОМ ТРУДЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) чтение, компьютерные игры
- 2) пассивный отдых
- 3) адекватная физическая нагрузка
- 4) потребление дополнительного количества пищи

С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ НОСОВЫХ ХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) 70% этиловый спирт
- 2) 3% раствор перекиси водорода
- 3) вазелиновое масло
- 4) 10% раствор камфорного спирта

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ У РЕБЕНКА ИЗМЕРЯЮТ ПО

- 1) надбровным дугам и затылочному бугру
- 2) переносице и теменным буграм
- 3) надбровным дугам и теменным буграм
- 4) затылочным и теменным буграм

В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- 1) нарушение липидного обмена
- 2) очаг хронической инфекции
- 3) длительное переохлаждение
- 4) прием снотворных

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭВТАНАЗИЯ, КАК МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- 1) запрещена в любом случае
- 2) осуществляется для лиц, страдающих неизлечимыми заболеваниями
- 3) проводится для новорожденных с врожденными дефектами
- 4) разрешена для преступников по решению суда

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВВЕДЕНИЯ 40% РАСТВОРА ДЕКСТРОЗЫ ПРИ РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ _____ МЛ

- 1) 100-150
- 2) 250-500
- 3) 80 – 120
- 4) 40-100

ОСТРОВКИ ЛАНГЕРГАНСА РАСПОЛОЖЕНЫ В

- 1) поджелудочной железе
- 2) гипофизе
- 3) надпочечниках

4) яичниках

ИНФИЛЬТРАЦИЯ УГЛЕВОДАМИ ЭПИТЕЛИЯ ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ И СИНТЕЗ В НИХ ГЛИКОГЕНА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

- 1) ожирении
- 2) сахарном диабете
- 3) наркомании
- 4) алкоголизме

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) Постановлением Правительства Российской Федерации
- 2) Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
- 3) Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
- 4) Указом Президента Российской Федерации

К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

- 1) ртутьсодержащие предметы
- 2) пищевые отходы инфекционных отделений
- 3) биологические отходы вивариев
- 4) живые вакцины, непригодные к использованию

К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) низкая организация труда
- 2) качество медицинской помощи
- 3) возраст пациента
- 4) загрязнение окружающей среды

КЛЮЧЕВЫМИ КРИТЕРИЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ОЖОГА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) локализация и форма ожоговой раны
- 2) интенсивность болевого синдрома и отек тканей
- 3) цвет раны и наличие пузырей
- 4) площадь и глубина поражения тканей

ТЕКУЩАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ _____ РАЗ В СУТКИ

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- 1) нерациональное питание
- 2) ожирение
- 3) наследственность
- 4) гиподинамия

СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гидронефроз
- 2) гидроцеле
- 3) анасарка
- 4) асцит

О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ «ЛИМОННОЙ» КОРОЧКИ НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ РАЗМЕРОМ (ММ)

- 1) 15-20
- 2) 0-1
- 3) 5-8
- 4) 2-3

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ОБРАЗУЮТ

- 1) локтевая кость и кости запястья
- 2) лучевая кость и проксимальный ряд костей запястья
- 3) кости пясти и фаланги пальцев
- 4) обе кости предплечья и все кости запястья

ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) симптом деформации зрачка
- 2) прекращение дыхания
- 3) расширение зрачка
- 4) прекращение сердечной деятельности

ПРИ КОНТАКТЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ В

- 1) стерильных боксах
- 2) защитных очках
- 3) перчатках
- 4) специально отведённых помещениях

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 года
- 2) 5 лет
- 3) 10 лет
- 4) 1 год

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО ЕГО РАБОТЫ, РАССТАНОВКУ

КАДРОВ ВОЗЛОЖЕНА НА

- 1) главного врача медицинской организации
- 2) заведующего централизованным стерилизационным отделением
- 3) старшую медицинскую сестру централизованного стерилизационного отделения
- 4) главную медицинскую сестру медицинской организации

ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО ДАЕТСЯ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ - СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ

- 1) слуха, двигательной реакции, болевой чувствительности
- 2) зрения, слуха и обоняния
- 3) речи, слуха и зрения
- 4) речевой реакции, двигательной реакции, открывания глаз

КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ С ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ

- 1) I и IIIб
- 2) с любой группой здоровья
- 3) I и IIIа
- 4) I и II

ПРОВОЦИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРИСТУПА АТОПИЧЕСКОЙ АСТМЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) переохлаждение
- 2) психологический стресс
- 3) контакт с домашней пылью
- 4) обильная еда

ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЮ БЕЗ УПАКОВКИ, ХРАНЯТСЯ

- 1) на стерильном столе
- 2) в шкафах
- 3) на рабочих столах
- 4) в стерилизационных коробках

НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) создание покоя
- 2) назначение сокращающих средств
- 3) введение прогестерона, вызов врача
- 4) проведение катетеризации

СМЕШИВАНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

- 1) допустимо
- 2) недопустимо
- 3) допустимо при дефиците одноразовых пакетов
- 4) зависит от класса отходов

ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) только врач
- 2) врач, медицинская сестра
- 3) младший медицинский персонал
- 4) только медицинская сестра

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) грызуны
- 2) больные люди
- 3) бактерионосители
- 4) птицы

У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) костей черепа
- 2) локтевого сустава
- 3) тазовой области
- 4) шейки бедра

В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ

- 1) агрессивность
- 2) равнодушие
- 3) эмпатию
- 4) растерянность

В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

- 1) растительные жиры
- 2) мясо и сливочное масло
- 3) кофе, крепкий чай
- 4) продукты, богатые углеводами

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- 1) вирусного гепатита В
- 2) гриппа
- 3) дифтерии, коклюша, столбняка
- 4) кори, ветряной оспы, краснухи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) эндокринной системы
- 2) нервной системы
- 3) дыхательной системы
- 4) сердечно-сосудистой системы

ОТЕКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА

- 1) руках симметрично

- 2) одной из ног
- 3) ногах симметрично
- 4) лице

ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) ларингит
- 2) фарингит
- 3) тонзиллит
- 4) эзофагит

В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) частоту дыхательных движений
- 2) артериальное давление
- 3) температуру тела
- 4) суточный водный баланс

НЕФРОН СОСТОИТ ИЗ

- 1) почечного тельца и системы канальцев
- 2) почечного тельца и системы чашечек
- 3) больших и малых чашечек
- 4) чашечек и лоханок

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В _____ ОТДЕЛЕНИЕ

- 1) хирургическое
- 2) инфекционное
- 3) неврологическое
- 4) травматологическое

ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

- 1) нейро-сосудистое
- 2) эндокринологическое
- 3) хирургическое
- 4) терапевтическое

ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ХРАНЯТ В

- 1) шкафу
- 2) холодильнике
- 3) контейнере
- 4) сейфе

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ В _____ ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) иммунологическую

- 2) клиническую
- 3) бактериологическую
- 4) вирусологическую

НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ, СМОЧЕННЫЕ

- 1) фурацилином
- 2) спиртом
- 3) физиологическим раствором
- 4) нашатырным спиртом

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение АД
- 2) восстановление сознания
- 3) повышение температуры тела
- 4) порозовение кожных покровов

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) закрутка
- 2) прямое давление на рану
- 3) максимальное сгибание конечности
- 4) давящая повязка

НЕЗАВИСИМЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КОЛЛАПСЕ

- 1) успокоить пациента
- 2) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом
- 3) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом
- 4) вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) одышка
- 2) сердцебиение
- 3) слабость
- 4) давящая боль за грудиной

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) план лечения пациента
- 2) программа борьбы с вредными привычками
- 3) индивидуальная программа здорового образа жизни
- 4) стандартная программа здорового образа жизни

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТИРУЮТ С КРОВЬЮ (СТЕРИЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ), ОТНОСЯТСЯ К РАЗРЯДУ

- 1) полукритических
- 2) критических

- 3) особо опасных
- 4) некритических

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА, НАПРАВЛЕННОЕ НА СНИЖЕНИЕ ТОНУСА ГЛАДКИХ МЫШЦ БРОНХОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) противокашлевым
- 2) муколитическим
- 3) бронхолитическим
- 4) отхаркивающим

К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) гиподинамия
- 2) курение табака
- 3) наследственная предрасположенность
- 4) нерациональное питание

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ЧАСТОТОЙ _____ В МИНУТУ

- 1) 140-160
- 2) 50-70
- 3) 100-120
- 4) 80-90

КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) апноэ
- 2) тахипноэ
- 3) брадипноэ
- 4) ортопноэ

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ СУБФЕБРИЛЬНОЙ, ЕСЛИ ОНА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕДНЕВНО КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (°С)

- 1) 39-40
- 2) 36-37
- 3) 37-38
- 4) 38-39

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) трихоцефалез
- 2) лямблиоз
- 3) аскаридоз
- 4) энтеробиоз

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ ПРОХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ _____ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 30
- 3) 90
- 4) 60

УСТРОЙСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мешок Амбу
- 2) кислородная лицевая маска
- 3) небулайзер
- 4) носовая канюля

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восстановление после заболеваний
- 2) ведение здорового образа жизни
- 3) профилактика осложнений
- 4) лечение обострений заболеваний

КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лихорадка, слабость, боль в грудной клетке
- 2) приступ удушья, сердцебиение, слабость
- 3) снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость
- 4) головокружение, тахикардия, головная боль

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ГАЗАМИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПАРОВ

- 1) глютарового альдегида
- 2) перекиси водорода
- 3) окиси этилена
- 4) этилового спирта

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1) углеводы
- 2) минеральные вещества
- 3) белки
- 4) витамины

ЗАБОЛЕВАНИЕМ СУСТАВОВ, ЧАСТО ПРИВОДЯЩЕЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ ПОДВИЖНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) миозит
- 2) артроз
- 3) бурсит
- 4) тендинит

ПО СПОСОБУ ПИТАНИЯ ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) паразитами
- 2) сапрофитами
- 3) автотрофами
- 4) хемотрофами

ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

- 1) побледнение краев
- 2) гиперемия, отек, усиление боли
- 3) выхождение кишечных петель под кожу
- 4) промокание повязки кровью

ОТХОДЫ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ 3-4 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- 1) В
- 2) Б
- 3) Г
- 4) А

КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) минимизация времени на общение с пациентом
- 2) строгое соблюдение инструкций без учёта индивидуальных особенностей
- 3) внимательное отношение к психологическому состоянию человека
- 4) быстрое выполнение процедур

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- 2) карту стационарного больного полностью
- 3) паспортную часть медицинской карты
- 4) статистическую карту выбывшего из стационара

ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу
- 2) облегчения своего состояния
- 3) уменьшения опасности возникновения пролежней
- 4) более удобного приёма пищи

ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контрольная карта диспансерного наблюдения
- 2) листок временной нетрудоспособности
- 3) медицинская карта стационарного больного
- 4) статистический талон уточненных диагнозов

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- 1) онколога
- 2) офтальмолога
- 3) терапевта
- 4) невролога

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) диафрагма
- 2) внутриматочная спираль
- 3) презерватив
- 4) гормональные препараты

АМПУЛЫ С НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НУЖНО

- 1) сдать ответственному лицу
- 2) поместить в отходы класса Г
- 3) оставить дома у пациента
- 4) сдать хирургу-онкологу

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ИММУНИТЕТ СВЯЗАН С ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1) лейкинов и лизинов
- 2) адаптивных ферментов
- 3) интерферона
- 4) бактериофага

ВЕНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) подкожные и внутримышечные
- 2) наружные и внутренние
- 3) поверхностные и глубокие
- 4) медиальные и латеральные

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- 1) производственной травмы
- 2) вызова скорой медицинской помощи
- 3) выявления инфекционного заболевания
- 4) оказания доврачебной помощи

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО

- 1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
- 2) динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая

посредством адаптации, средство жизни

3) состояние полного физического благополучия

4) отсутствие болезней

ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1) одышка

2) повышение температуры

3) недомогание

4) головная боль

КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

1) соблюдение правил хранения вакцины

2) наличие информированного согласия

3) наличие вакцины с актуальным штаммовым составом

4) доля лиц, получивших вакцинацию и не заболевших гриппом в эпидсезон

КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ

1) раствором хлоргексидина

2) 70% раствором спирта

3) стерильным глицерином

4) раствором фурацилина

ЗАМЕНА ОДНОГО НУКЛЕОТИДА В ГЕНЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

1) хромосомной делеции

2) точечной мутации

3) дупликации хромосомы

4) геномной мутации

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ

1) грануляционным натяжением

2) эпителизацией

3) рубцовым натяжением

4) под струпом

РУКИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ГРУДИ – ЭТО ЖЕСТ

1) пассивности

2) честности и открытости

3) беспокойства

4) упрямства

МОЧЕПРИЕМНЫЕ СОСУДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1) темного цвета, прозрачными

2) бесцветными, непрозрачными

3) темного цвета, непрозрачными

4) бесцветными, прозрачными

ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

- 1) внутримышечно
- 2) перорально
- 3) подкожно
- 4) внутрикожно

КОЛОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- 1) желудка
- 2) мочевого пузыря
- 3) тонкого кишечника
- 4) толстого кишечника

СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипертрофия инсулярного аппарата железы
- 2) увеличение размеров и массы железы
- 3) гипотрофия и уменьшение массы железы
- 4) полное прекращение выработки ферментов

ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

- 1) клубочки
- 2) лоханки
- 3) канальцы
- 4) чашечки

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА, РАВНОВЕСИЕ ТЕЛА МЕДСЕСТРЫ БУДЕТ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВО, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОПАМИ БУДЕТ ___ см

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 10
- 4) 70

К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) школы здоровья
- 2) беседы
- 3) анкетирование
- 4) буклеты

В РОССИИ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ВЛЕЧЕТ _____ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) административную
- 2) дисциплинарную
- 3) гражданско-правовую

4) уголовную

ПРИ ЗАКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ ВОЗДУХ СКАПЛИВАЕТСЯ В

- 1) средостении
- 2) плевральной полости
- 3) мягких тканях грудной стенки
- 4) паренхиме легкого

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ КУРИНЫХ ЭМБРИОНАХ ПРОВОДИТСЯ _____ МЕТОДОМ

- 1) биологическим
- 2) бактериологическим
- 3) серологическим
- 4) микроскопическим

ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ ФОС-ИНСЕКТИЦИДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) расширение зрачков, сухость кожи, тахикардия
- 2) сужение зрачков, возбуждение, слюнотечение, бронхоспазм
- 3) головная боль, головокружение, тошнота, общая слабость
- 4) цианоз, брадикардия, потеря сознания

«БРЮШНОЙ ПРЕСС» ОБРАЗУЮТ

- 1) прямые мышцы живота
- 2) прямые, косые и поперечные мышцы живота
- 3) диафрагма и межреберные мышцы
- 4) мышцы спины и живота

ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ КИСЛОРОДА В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемоглобин
- 2) плазма крови
- 3) лейкоциты
- 4) тромбоциты

ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ В-БЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ

- 1) состояние полости рта
- 2) суточный диурез
- 3) массу тела
- 4) артериальное давление, пульс

СБОР И УТИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) разрыва путей передачи инфекции
- 2) обезвреживания источника инфекции
- 3) повышения невосприимчивости персонала

4) выявления источника инфекции

КОФЕИН

- 1) антибиотик
- 2) антисептик
- 3) местный анестетик
- 4) психостимулятор

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

- 1) при угрозе эпидемии гриппа
- 2) больным гриппом
- 3) переболевшим гриппом
- 4) выезжающим за границу страны

ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) мыльницу с решеткой
- 2) губки с моющим раствором
- 3) индивидуальное мыло
- 4) жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)

В РОССИИ МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРОВОДИТСЯ ДОБРОВОЛЬНО

- 1) гражданином, имеющим медицинские показания, без учета возраста и наличия детей
- 2) по решению суда в случае признания гражданина недееспособным
- 3) гражданином старше 35 лет или имеющим не менее двух детей
- 4) гражданином старше 35 лет или имеющим не менее двух детей

АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) злокачественные опухоли
- 2) ущемлённая грыжа
- 3) острый гастрит
- 4) язвенная болезнь желудка

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛЕДУЕТ

- 1) исключить прием препаратов железа
- 2) соблюдать питьевой режим
- 3) исключить прием препаратов йода и брома
- 4) поставить очистительную клизму

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В

- 1) день
- 2) 7 дней

- 3) месяц
- 4) 2 недели

САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД

- 1) 03.00 – 06.00
- 2) 00.00 – 04.00
- 3) 22.00 – 06.00
- 4) 01.00 – 03.00

МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паспорт здоровья
- 2) медицинская карта стационарного больного
- 3) карта диспансерного наблюдения
- 4) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОМРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО

- 1) часто менять положение головы и туловища
- 2) убрать из-под головы подушку
- 3) приподнять ноги
- 4) избегать изменений положения головы

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) после медицинского вмешательства
- 2) перед постановкой диагноза
- 3) после первичного осмотра врачом
- 4) перед медицинским вмешательством

К РАЗВИТИЮ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

- 1) гиподинамия
- 2) стресс
- 3) нерациональное питание
- 4) очаг хронической инфекции

ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ _____ ШОК

- 1) анафилактический
- 2) геморрагический
- 3) инфекционно-токсический
- 4) гемотрансфузионный

В ПАЛАТАХ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- 1) 2 раза в неделю

- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 1 раз в месяц

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в неделю

К ПОВЫШЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ ПРИЕМ

- 1) ингибиторов протонного насоса
- 2) антиагрегантов
- 3) оральных контрацептивов
- 4) бета-адреноблокаторов

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ ДО ____ МЛ

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 2

К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

- 1) ребра и грудина
- 2) кости черепа
- 3) кости верхних конечностей
- 4) позвонки

ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) организация досуга ребенка
- 2) назначение диеты
- 3) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом по назначению врача
- 4) создание возвышенного положения

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ МОНИТОРА, СВЯЗАНО С

- 1) инфракрасными волнами
- 2) электромагнитными волнами
- 3) альфа-излучением
- 4) ультрафиолетовыми волнами

СРОК ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ ЛЕТ

- 1) 50

- 2) 5
- 3) 25
- 4) 10

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ В ПОКОЕ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРОВОДЯТ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ, ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ И СТАРШЕ, 1 РАЗ В ГОД

- 1) 35
- 2) 25
- 3) 40
- 4) 45

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С)

- 1) 5-10
- 2) 38-42
- 3) 25-30
- 4) 15-20

ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) поильник
- 2) тонкий зонд
- 3) кружка Эсмарха
- 4) катетер

СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) не реже 1 раза в 7 дней
- 2) не реже 1 раза в 2 дня
- 3) не реже 1 раза в 3 дня
- 4) ежедневно

ГИПЕРТРОФИЯ АДЕНОИДОВ – ЭТО _____ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ

- 1) нормальное развитие
- 2) уменьшение размеров
- 3) увеличение размеров
- 4) удаление

ЗА 20-30 МИНУТ ДО ПОСТАНОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТУ СТАВИТСЯ

- 1) гипертоническая клизма
- 2) газоотводная трубка
- 3) очистительная клизма
- 4) сифонная клизма

К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) двукратное протирание дезинфицирующим раствором
- 2) погружение в моющий раствор
- 3) ультрафиолетовое облучение
- 4) кипячение

УМЕНЬШАЕТ ДИУРЕЗ И ПОВЫШАЕТ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГОРМОН ГИПОФИЗА

- 1) вазопрессин
- 2) окситоцин
- 3) интермедин
- 4) пролактин

КОРМЯЩИЕ МАТЕРИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ С ЦЕЛЬЮ КОНТРАЦЕПЦИИ

- 1) комбинированные оральные контрацептивы
- 2) мини-пили
- 3) гормональный пластырь Евра
- 4) гормональное внутривлагалищное кольцо НоваРинг

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ (ЧАС)

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 8
- 4) 2

РАЗВИТИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ, ДЕФОРМИРОВАННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕПОЛНОЦЕННЫХ БРОНХАХ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) абсцесса легкого
- 2) бронхоэктатической болезни
- 3) экссудативного плеврита
- 4) крупозной пневмонии

ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного
- 2) удовлетворение психических, социальных и духовных потребностей пациента
- 3) выполнение любых пожеланий пациента
- 4) облегчение страданий родственников

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАНЫ СОСТАВЛЯЕТ ДО ____ ЧАСОВ

- 1) 6
- 2) 18
- 3) 24
- 4) 12

В СООТВЕТСТВИИ С «ФОРМУЛОЙ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ» У РЕБЁНКА 12-И МЕСЯЦЕВ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) 10 зубов
- 2) 6 зубов
- 3) 4 зуба
- 4) 8 зубов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поликлиника
- 2) хоспис
- 3) станция скорой медицинской помощи
- 4) пансионат

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ УБОРКИ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ

- 1) еженедельно
- 2) 2 раза в неделю
- 3) ежедневно
- 4) через день

СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА - ВОСПИТАНИЕ

- 1) половое
- 2) санитарное
- 3) гигиеническое
- 4) социальное

ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) в неотложной форме
- 2) в экстренной форме
- 3) в порядке очереди
- 4) в виде само- и взаимопомощи

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ

- 1) обследование
- 2) медико-социальную экспертизу
- 3) реабилитацию
- 4) лечение

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ВЫШЕ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гипергликемией
- 2) гипогликемией

- 3) гликемией
- 4) анемией

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЮТ

- 1) дыхательную гимнастику
- 2) интубацию трахеи
- 3) диету, богатую белком
- 4) УВЧ на грудную клетку

К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) газовый
- 2) паровой
- 3) плазменный
- 4) химический

ПРИ ПОДАЧЕ СУДНА ПАЦИЕНТУ НУЖНО _____ КРОВАТИ

- 1) зафиксировать ножной конец
- 2) опустить изголовье
- 3) поднять изголовье
- 4) поднять бортики

ФЕРМЕНТ, КОТОРЫЙ РАСЩЕПЛЯЕТ УГЛЕВОДЫ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) липазой
- 2) протеазой
- 3) пепсином
- 4) амилазой

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В _____ ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) клиническую
- 2) вирусологическую
- 3) биохимическую
- 4) бактериологическую

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ

- 1) пациента и медицинских работников
- 2) только государства
- 3) граждан, государства, общества и медицинских работников
- 4) всего общества

ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С

- 1) прекардиального удара
- 2) непрямого массажа сердца
- 3) прекращения воздействия электрического тока

4) искусственной вентиляции легких

СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ (В ° С)

- 1) 39-39,5
- 2) 37,1-38
- 3) 38,1-38,2
- 4) 38-38,5

ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА ЕГО ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

- 1) только в случае, если пациент находится в бессознательном состоянии
- 2) при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих его полномочия
- 3) при устном обращении законного представителя
- 4) если законный представитель является близким родственником

СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ НАХОДЯТСЯ В

- 1) сердце
- 2) артериях
- 3) венах
- 4) аорте

ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ММ РТ.СТ

- 1) 20-40
- 2) 10-20
- 3) 40-50
- 4) 60-70

ОСНОВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТЕРИЛИЗАЦИЮ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) влажный насыщенный пар
- 2) сухой горячий воздух
- 3) химические пары
- 4) ионизирующее излучение

ПИРАЦЕТАМ

- 1) местный анестетик
- 2) ноотроп
- 3) антисептик
- 4) антибиотик

ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) всегда после каждой выполненной манипуляции
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в неделю

4) 2 раза в день

ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1) в присутствии больного в течение всего периода его инфекционной опасности
- 2) сразу после выделения микроорганизмов из организма больного
- 3) после выздоровления или смерти пациента
- 4) после госпитализации пациента

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА

- 1) асептическая повязка
- 2) консультация врача-онколога
- 3) смазывание ляписным карандашом
- 4) диатермокоагуляция

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) курение
- 2) ОРВИ
- 3) переохлаждение
- 4) гиповитаминоз

ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) сдавление тканей гипсовой повязкой
- 2) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
- 3) пассивное положение пациента в постели
- 4) активное положение пациента в постели

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НА ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ КРОВЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1) активированного частичного тромбопластинового времени
- 2) протромбинового индекса
- 3) времени свертывания крови
- 4) уровня D-димера

ВЫДЕЛЕНИЕ С КАШЛЕМ МОКРОТЫ, ОКРАШЕННОЙ КРОВЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 50 МЛ В СУТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- 1) отека легких
- 2) разрыва плевры
- 3) легочного кровотечения
- 4) кровохарканья

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ПРИ КОТОРОМ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ СКАПЛИВАЕТСЯ ВОЗДУХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гидроторакс
- 2) пневмоторакс
- 3) гемоторакс

4) пиоторакс

ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА КОНЕЧНОСТЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ

- 1) наличие пульса ниже места наложения
- 2) цвет кожи конечности
- 3) температуру конечности
- 4) артериальное давление пострадавшего

ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ячменем
- 2) халазионом
- 3) блефаритом
- 4) конъюнктивитом

ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инфаркт миокарда
- 2) нарушение мозгового кровообращения
- 3) острое желудочное кровотечение
- 4) отравление ядами

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ

- 1) не реже одного раза в полгода
- 2) не реже одного раза в год
- 3) не реже одного раза в два года
- 4) ежемесячно

МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ _____ ДАВЛЕНИЯ

- 1) артериального
- 2) внутриглазного
- 3) венозного
- 4) капиллярного

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ МЕСТАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) слизистые оболочки
- 2) межпальцевые складки кистей
- 3) лицо и шея
- 4) ладони и подошвы

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) солнечные ванны

- 2) обливания холодной водой
- 3) воздушные ванны
- 4) контрастные души

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТСУТСТВУЕТ _____ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

- 1) гемотрансфузионный
- 2) половой
- 3) вертикальный
- 4) пищевой

ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) phytotherapia
- 2) electrotherapia
- 3) hirudotherapia
- 4) hydrotherapia

ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ ПАЦИЕНТ

- 1) беспокоен во время приступа, не находит себе места, мечется
- 2) лежит на правом боку с приведенными к животу ногами
- 3) лежит на спине с согнутыми и разведенными в стороны ногами
- 4) лежит на левом боку с согнутыми ногами в коленных суставах

КЛАПАНЫ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНЫ СКЛАДКАМИ

- 1) эндокарда
- 2) миокарда
- 3) эпикарда
- 4) перикарда

ПРИЕМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наложение стерильной салфетки
- 2) наложение давящей повязки
- 3) дренирование раны марлевым тампоном
- 4) удаление из раны нежизнеспособных тканей

НОРАДРЕНАЛИН ВВОДИТСЯ

- 1) внутримышечно
- 2) любыми инъекционными способами
- 3) подкожно
- 4) внутривенно капельно

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИГЛ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) А
- 2) Б

- 3) Г
- 4) В

ОПЕРАЦИЯ СОЗДАНИЯ НАРУЖНОГО СВИЩА ЖЕЛУДКА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- 1) gastrotomia
- 2) gastrostomia
- 3) gastroscopia
- 4) gastrectomia

КОНЦЕНТРАТ ТРОМБОЦИТОВ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ _____ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

- 1) +2 +6
- 2) +5 +20
- 3) не выше -25
- 4) +20 +24

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1) ставят азопирамовую пробу
- 2) используют термовременные индикаторы
- 3) используют биотесты
- 4) делают смывы с различных поверхностей

ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ

- 1) ограничить прием жидкости и соли
- 2) ограничить прием белков и жиров
- 3) увеличить прием жидкости и соли
- 4) увеличить прием белков и жиров

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 160°C – 120 минут
- 2) 1,1 атм – 120°C – 45 минут
- 3) 180°C – 60 минут
- 4) 2 атм – 132°C – 20 минут

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИХ

- 1) радиоизотопной диагностики
- 2) бактериологическая
- 3) клиническая
- 4) иммунологическая

ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ожидаемая продолжительность жизни населения

- 2) средняя продолжительность жизни
- 3) уровень детской смертности
- 4) трудовой потенциал населения

ЦЕЛЮ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) определение группы диспансерного наблюдения
- 2) углубленная диагностика здоровья
- 3) профилактическое консультирование
- 4) осуществление лечебных мероприятий

ГИПЕРЕМИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) синюшность
- 2) бледность
- 3) желтушность
- 4) покраснение

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ФЗ-323 ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМЕЕТ ПРАВО ЛИЦО С ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩЕЕ

- 1) свидетельство о квалификационной категории
- 2) диплом, сертификат и лицензию
- 3) только диплом специалиста
- 4) диплом и свидетельство об аккредитации специалиста

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА

- 1) Д
- 2) Б
- 3) Г
- 4) В

СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К

- 1) гипертрофии органов
- 2) повышению трудоспособности
- 3) усилению функций организма
- 4) снижению функций организма

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прекратить воздействие термического агента
- 2) нанести на ожог жирный крем
- 3) промыть рану проточной водой
- 4) наложить асептическую (стерильную) повязку

НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОГО

СОГРЕВАНИЯ ОБМОРОЖЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЕТ (°С)

- 1) 21–23
- 2) 18-20
- 3) 28–30
- 4) 24–26

В ЛЕЧЕНИИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ С ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) рибофлавин
- 2) тиамин
- 3) цианокобаламин
- 4) пиридоксин

В ПОЛОЖЕНИИ «ФАУЛЕРА» ПАЦИЕНТ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЛЕЖА НА

- 1) спине с приподнятым изголовьем на 45°-60°
- 2) спине с приподнятыми ногами на 30°
- 3) боку
- 4) животу

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

- 1) запивать апельсиновым соком
- 2) запивать небольшим количеством воды
- 3) после еды
- 4) не размельчать перед употреблением

ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО

- 1) обеспечить полный физический покой
- 2) обеспечить оптимальный двигательный режим
- 3) увеличить физическую нагрузку
- 4) создать гипоаллергенный быт

ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) психологическим тренингом
- 2) консультированием
- 3) реабилитацией
- 4) индивидуальной беседой

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- 1) краснухи
- 2) дифтерии
- 3) ветряной оспы
- 4) кори

ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- 1) утром на ногах
- 2) утром на лице
- 3) вечером на ногах
- 4) вечером на лице

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ФОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обязательное дублирование всех записей на бумажном носителе
- 2) хронологическая последовательность записей и отсутствие исправлений
- 3) достоверность, полнота и своевременность внесения сведений
- 4) использование только общепринятых медицинских сокращений

ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бета-гемолитический стрептококк группы А
- 2) золотистый стафилококк
- 3) вирус краснухи
- 4) риккетсия

К СУБЪЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) положение в пространстве
- 2) наличие жалоб
- 3) определение сознания
- 4) исследование пульса

УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

- 1) Дитерихса
- 2) Илизарова
- 3) Боброва
- 4) Кузнецова

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ РАСПОЛАГАЮТ ОТ СТенок КАМЕРЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА ____ СМ

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) воздушной эмболии
- 2) аллергической реакции
- 3) некрозу окружающей ткани
- 4) абсцессу

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) простота в применении и возможность применения в любых условиях
- 2) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
- 3) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
- 4) большая точность дозировки

РАСТВОР АТРОПИНА СУЛЬФАТА 0,1% ОТНОСИТСЯ К

- 1) ганглиоблокаторам
- 2) М-холиноблокаторам
- 3) альфа-адреномиметикам
- 4) ингибиторам ацетилхолинэстеразы

ПРИ НАЛИЧИИ РАНЫ С ПУЗЫРЯЩЕЙСЯ КРОВЬЮ В ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО НАЛОЖИТЬ _____ ПОВЯЗКУ

- 1) давящую
- 2) окклюзионную
- 3) влажную асептическую
- 4) сухую асептическую

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ

- 1) создания комфортных условий
- 2) профилактики травматизма
- 3) создания уюта
- 4) улучшения передвижения

ГИАЛИНОЗ – ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ _____ ДИСТРОФИИ

- 1) белковой
- 2) жировой
- 3) углеводной
- 4) минеральной

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ

- 1) на титульном листе медицинской карты стационарного больного
- 2) в температурном листе
- 3) на экстренном извещении
- 4) в листе назначения

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пол
- 2) возраст
- 3) инвазивная лечебно-диагностическая процедура
- 4) антропометрические показатели

ПОСЛЕ РАЗРЯДА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- 1) оценивают глубину вдохов
- 2) ждут реакции на проведенную терапию
- 3) приступают к компрессиям грудной клетки
- 4) определяют частоту пульса

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ

- 1) мочу
- 2) кал
- 3) желчь
- 4) кровь

ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рвота пищей, съеденной накануне
- 2) изжога
- 3) рвота в виде кофейной гущи
- 4) отрыжка

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- 2) низкое артериальное давление
- 3) брадикардия или тахикардия
- 4) холодный пот и резкая слабость

ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- 1) вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)
- 2) соответствует состоянию покоя
- 3) умеренно повышает частоту сердечных сокращений
- 4) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

К НИТРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) нитроглицерин
- 2) ивабрадин
- 3) триметазидин
- 4) верапамил

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА НАЧИНАЮТ С _____ ВАНН

- 1) водных
- 2) солнечных
- 3) соляных
- 4) воздушных

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В В ЗАКРЫТЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ЕМКОСТЯХ, ПОМЕЩЕННЫЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ХРАНЯТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ БЕЗ

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 48
- 2) 24
- 3) 96
- 4) 72

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ КОЖИ РУК КРОВЬЮ НЕОБХОДИМО

- 1) дважды обработать руки антисептиком, затем вымыть руки
- 2) вымыть руки водой с мылом, дважды обработать 70% спиртом или спиртосодержащим антисептиком
- 3) вымыть руки водой с мылом
- 4) дважды обработать руки формальдегидом

ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ

- 1) ограничить прием белков и жиров
- 2) увеличить прием белков и жиров
- 3) увеличить прием жидкости и соли
- 4) ограничить прием жидкости и соли

ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ _____ МОКРОТА

- 1) обильная гнойная
- 2) умеренная слизистая
- 3) незначительная «ржавого» цвета
- 4) скудная стекловидная

15 БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ КОМЫ СООТВЕТСТВУЮТ

- 1) сопору
- 2) коме
- 3) оглушению
- 4) ясному сознанию

ПРИ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПАЦИЕНТУ

- 1) не разрешается поворачиваться в постели
- 2) не ограничивается двигательная активность
- 3) можно вставать, ходить до туалета
- 4) можно поворачиваться в постели, не покидая ее

ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕГО РАСТВОРА АЗОПИРАМА ПРОВЕРЯЮТ НАНЕСЕНИЕМ 2-3 КАПЕЛЬ РАСТВОРА НА

- 1) кровавое пятно
- 2) стерильный ватный шарик
- 3) инструмент
- 4) жирное пятно

ПРИ ВОЗДУШНОМ МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ

- 1) металла, термостойкого стекла и силиконовой термостойкой резины
- 2) текстильных материалов и термостойкого стекла
- 3) металла и термостойкого стекла
- 4) текстильных материалов и силиконовой резины

ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И БЕЛЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ИС-160
- 2) ИС-132
- 3) ИС-180
- 4) ИС-120

ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

- 1) надрывный кашель, попытка говорить
- 2) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
- 3) невозможность говорить, кашлять, дышать
- 4) шумное дыхание, кашель

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КУШЕТОК И СТОЛОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

- 1) 0,2% сульфохлорантина
- 2) 1% хлорамина
- 3) 3% раствор перекиси водорода
- 4) 1% самаровки

ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) хозяйственных сумок
- 2) одноразовых пакетов
- 3) бумажных мешков
- 4) картонных коробок

ПАРЕНХИМА ПОЧКИ СОСТОИТ ИЗ _____ СЛОЕВ

- 1) коркового и мозгового
- 2) центрального и периферического
- 3) стволового и мозгового
- 4) проксимального и дистального

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ

- 1) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
- 2) энергетическая
- 3) растворение витаминов А, К, Е
- 4) пластическая

ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохранение здоровья
- 2) повышение информированности населения о мерах профилактики
- 3) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- 4) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) гемоглобин, цветовой показатель
- 2) гормоны Т3, Т4, ТТГ
- 3) инсулин, глюкагон
- 4) лейкоциты, СОЭ

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) занятия физической культурой
- 2) ожирение
- 3) рациональное питание
- 4) неотягощенная наследственность

ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИГРАЕТ

- 1) контроль провоцирующих факторов
- 2) борьба с гиподинамией
- 3) усиленное питание
- 4) вакцинация против гриппа

НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

- 1) проведение дыхательной гимнастики
- 2) применение отхаркивающих средств
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) применение антибиотиков

ГОЛОВУ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ ПОВОРАЧИВАЕТ(ЮТ)

- 1) трапецевидная мышца
- 2) грудино-ключично-сосцевидная мышца
- 3) лестничные мышцы
- 4) ременные мышцы головы и шеи

НАЧАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ

-
- 1) узлы
 - 2) протоки
 - 3) капилляры
 - 4) стволы

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

- 1) текущие и генеральные уборки 1 раз в 7 дней
- 2) предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения
- 3) промывку изделий под проточной водой до дезинфекции
- 4) дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции

АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

- 1) лидокаин
- 2) метамизол-натрий (анальгин)
- 3) диклофенак
- 4) трамадол

ОРГАН СЛУХА НАХОДИТСЯ В _____ КОСТИ ЧЕРЕПА

- 1) височной
- 2) клиновидной
- 3) решетчатой
- 4) затылочной

ТИПИЧНЫМИ ЖАЛОБАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) головная боль, мелькание мушек перед глазами
- 2) одышка, сердцебиение, отеки
- 3) брадикардия, головокружения, обмороки
- 4) олигурия, тошнота, отсутствие аппетита

ПОКАЗАТЕЛЕМ В АНАЛИЗЕ КРОВИ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокий уровень гемоглобина
- 2) высокий уровень триглицеридов
- 3) высокий уровень холестерина
- 4) низкий уровень гемоглобина

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) 3 месяца
- 3) полгода
- 4) 2 года

ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образовательный стандарт
- 2) профессиональный стандарт
- 3) национальная рамка квалификаций

4) отраслевая рамка квалификаций

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область
- 2) отвести в ближайшую поликлинику
- 3) провести промывание желудка
- 4) обезболить

К АЛИМЕНТАРНЫМ ГЕРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) овощи и фрукты
- 2) макаронные изделия
- 3) мясо и рыба
- 4) хлебобулочные изделия

ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖЕН _____ КЛАПАН СЕРДЦА

- 1) митральный
- 2) пульмональный
- 3) аортальный
- 4) трехстворчатый

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- 1) лежа на спине
- 2) полусидя
- 3) лежа на спине, плечеголовной конец приподнят
- 4) лежа на боку неповрежденной стороны

МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНО

- 1) пирамидами
- 2) сегментами
- 3) долями
- 4) столбами

ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ АДРЕНАЛИНА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) набрать в шприц 10 мл препарата
- 2) развести 1 мл адреналина на 9 мл физиологического раствора
- 3) набрать в шприц 0,5 мл препарата
- 4) развести 0,1 мл адреналина в 9 мл физиологического раствора

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ОБРАЗУЮТ

- 1) головка плечевой кости и суставная впадина лопатки
- 2) плечевая кость и ключица
- 3) лопатка и ключица
- 4) плечевая и локтевая кости

МОКРОТА «РЖАВОГО» ЦВЕТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) рак легкого
- 2) экссудативный плеврит
- 3) бронхоэктатическая болезнь
- 4) крупозная пневмония

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВОЗМОЖНЫ

- 1) тошнота, рвота
- 2) тахикардия, экзофтальм
- 3) снижение температуры и артериального давления
- 4) желтуха, «сосудистые звездочки»

В КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА СИНТЕЗИРУЕТСЯ ВИТАМИН

- 1) D
- 2) A
- 3) C
- 4) E

К ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ), ОТНОСИТСЯ РЕЖИМ

- 1) свободный
- 2) тренирующий
- 3) щадяще-тренирующий
- 4) щадящий

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ПИТАНИЕ

- 1) распределенное по времени принятия пищи
- 2) с определенным соотношением питательных веществ
- 3) с учетом потребностей организма
- 4) набором определенных продуктов

ПРИ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ОТ ПАЦИЕНТА ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ

- 1) \"сладковатый\"
- 2) аммиака
- 3) ацетона
- 4) \"кислый\"

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) спастические запоры
- 2) подготовка к операции
- 3) атонические запоры
- 4) кишечное кровотечение

ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К _____ ГРУППЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

- 1) III
- 2) IV
- 3) II
- 4) I

ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ НАПРАВЛЕНО НА

- 1) повышение защитных сил организма
- 2) уничтожение возбудителя болезни
- 3) местные патологические проявления
- 4) устранение отдельных симптомов

ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО НАЛОЖИТЬ _____ ПОВЯЗКУ

- 1) колосовидную
- 2) спиралевидную
- 3) окклюзионную
- 4) крестовидную

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- 1) бессонницы
- 2) рвоты и поноса
- 3) тошноты и рвоты
- 4) гипотонии

ОБЯЗАННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) осуществление наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях
- 2) формирование здорового образа жизни
- 3) проведение инвазивных процедур по назначению врача
- 4) разработка индивидуальных планов лечения

ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 90
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 30

АППАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проходной автоклав
- 2) дезинфекционная камера
- 3) сушильный шкаф
- 4) сухожаровой шкаф

СЫПНОЙ ТИФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) полиаденопатией

- 2) постепенным началом болезни
- 3) наличием гепатолиенального синдрома
- 4) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней

ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ

- 1) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- 2) медицинская карта стационарного больного
- 3) статистическая карта выбывшего из стационара
- 4) журнал учёта инфекционных больных

ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) проведение мероприятий личной гигиены
- 2) рациональное питание пациента
- 3) безопасность пациента
- 4) сохранение социальных контактов

ПО ОХВАТУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ _____ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

- 1) массовые и групповые
- 2) активные и пассивные
- 3) цикловые и эпизодические
- 4) односторонние и двухсторонние

«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В

- 1) управление здравоохранения
- 2) территориальный орган Роспотребнадзора
- 3) дезинфекционную станцию
- 4) районную бактериологическую лабораторию

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР МИКРОБОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОВОДИТСЯ _____ МЕТОДОМ

- 1) биологическим
- 2) микроскопическим
- 3) серологическим
- 4) бактериологическим

ДИЕТА ПАЦИЕНТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) исключение экстрактивных, острых и пряных блюд
- 2) ограничение соли и жидкости
- 3) ограничение углеводной пищи и обильное питье
- 4) исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

ПРОЦЕСС ВНУТРИСОСУДИСТОГО РАСПАДА ЭРИТРОЦИТОВ И ВЫХОДА ИЗ НИХ ГЕМОГЛОБИНА В ПЛАЗМУ КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) агглютинацией
- 2) гемокоагуляцией
- 3) гемостазом
- 4) гемолизом

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ ВОЗМОЖНА

- 1) ершом
- 2) ватно-марлевым тампоном
- 3) пластиковой щеткой
- 4) щеткой

ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) острая ревматическая лихорадка
- 2) инфекционный миокардит
- 3) гипертрофическая кардиомиопатия
- 4) инфекционный эндокардит

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В СТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ КОРОБКУ УКЛАДЫВАЮТ

- 1) плотно, с чередованием слоев
- 2) плотно, горизонтально
- 3) рыхло, в несколько слоев без уплотнения
- 4) рыхло, вертикально

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ БРОНХОСКОПИИ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ЗАПРЕТ ПАЦИЕНТУ НА ПРИЕМ ВОДЫ И ПИЩИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

- 1) 90
- 2) 30
- 3) 180
- 4) 120

НАЛИЧИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО В БОЛЬНИЦАХ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ _____ КОЕК

- 1) 200
- 2) 50
- 3) 100
- 4) 150

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ -ЦИТОЗ (CYTOSIS) В КЛИНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ОЗНАЧАЕТ

- 1) замещение
- 2) понижение
- 3) повышение
- 4) отсутствие

**ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В
_____ ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) клиническую
- 2) биохимическую
- 3) вирусологическую
- 4) бактериологическую

ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- 1) нельзя вводить анальгетик
- 2) необходимо ввести анальгетик
- 3) можно дать спазмолитическое средство
- 4) приложить к животу грелку

**ПАЦИЕНТУ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ БЕЗ ПРИЗНАКОВ УДУШЬЯ ПРИДАЮТ
ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) сидя, с упором на колени
- 2) устойчивое боковое
- 3) лёжа на спине с приподнятым головным концом
- 4) лёжа на спине с приподнятыми ногами

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) рыбу
- 2) мясо
- 3) гречневую кашу
- 4) овощи

ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ БОЛИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- 1) поясничной области, иррадиируют в половые органы, внутреннюю поверхность бедра
- 2) эпигастрии, носят опоясывающий характер
- 3) эпигастрии в начале заболевания, затем опускаются в правую подвздошную область
- 4) правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, лопатку, надключичную область

ЦИАНОЗ ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТУЛОВИЩА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) геморрагическом инсульте
- 2) гипертоническом кризе
- 3) инфаркте миокарда
- 4) тромбозу легочной артерии

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- 1) выявление вируса
- 2) предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний

- 3) организацию занятий
- 4) общение с пациентом

ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

- 1) венозного
- 2) капиллярного
- 3) артериального
- 4) внутриглазного

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) метеоризм
- 2) запор
- 3) непроходимость кишечника
- 4) операция

ПРОГРАММИРУЕМАЯ, ГЕНЕТИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГИБЕЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЕТОК, ПРОТЕКАЮЩАЯ БЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) лизисом
- 2) некрозом
- 3) апоптозом
- 4) малигнизацией

КАЖДЫЙ ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В ЧС ОКАЗЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

- 1) в указанном месте, в установленные сроки и в определенном объеме
- 2) в очаге ЧС
- 3) на втором этапе эвакуации
- 4) в полном объёме на всех этапах

ПЕРМЕТРИН ПРИМЕНЯЮТ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ

- 1) аллергии на йод
- 2) энтеробиоза
- 3) бешенства
- 4) педикулеза

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) ежедневно
- 2) при каждом включении
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 1 раз в неделю

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

- 1) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
- 2) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи

- 3) получение медицинской помощи минимального объема
- 4) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЕТСЯ ТАКОЙ ВНЕШНИЙ ПРИЗНАК, КАК

- 1) диффузный цианоз губ и ногтевых фаланг
- 2) пальцы в виде «барабанных палочек»
- 3) поперечная исчерченность ногтей
- 4) бочкообразная форма грудной клетки

ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) индекс Альговера
- 2) шкала Глазго
- 3) шкала Ватерлоу
- 4) индекс Франка

СМЕНА БАЗЫ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КАЛОПРИЕМНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в 3 дня
- 3) по мере необходимости
- 4) 1 раз в 7–10 дней

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ КЕТГУТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атравматичность
- 2) эластичность
- 3) биосовместимость
- 4) реактогенность

ТЕРРЕНКУРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ходьба перед зеркалом
- 2) прогулки по ровной местности
- 3) ходьба по трафарету
- 4) лечение дозированным восхождением

ЕСЛИ НА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ ЕСТЬ РЖАВЧИНА, ТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ _____ ОКРАШИВАНИЕ

- 1) бурое
- 2) синее
- 3) зеленое
- 4) черное

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ

- 1) -scopía

- 2) -tomia
- 3) -gramma
- 4) -metria

ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

- 1) бронхоэктатической болезни
- 2) раке легкого
- 3) очаговой пневмонии
- 4) сухом плеврите

ВИДОМ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) циркулярная у-образная гипсовая повязка
- 2) косыночная повязка
- 3) фиксация руки к туловищу без опоры
- 4) эластический бинт без жёсткой фиксации

В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- 1) «В»
- 2) «В-20»
- 3) «А»
- 4) «Р»

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ВИВАРИЕВ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) Д
- 2) Б
- 3) В
- 4) Г

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ

- 1) пульса
- 2) частоты дыхания
- 3) артериального давления
- 4) диуреза

ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) применение технологий уничтожения возбудителей
- 2) использование дезинфицирующих средств
- 3) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
- 4) сокращение числа инвазивных процедур

ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

- 1) кабинете участковой медицинской сестры
- 2) специально отведенном шкафу
- 3) холодильнике при температуре от +2°C до +8°C
- 4) сейфе

РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ВОЗМОЖНО В СЛУЧАЕ

- 1) некоторых генетических дефектов у одного из супругов
- 2) опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
- 3) по просьбе близких родственников
- 4) по просьбе руководителя

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- 1) вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет
- 2) вакцинация в 3–7 дней, ревакцинация в 7 и 14 лет
- 3) вакцинация в 3, 4, 5 и 6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев
- 4) вакцинация в 1-й день, 1 и 6 месяцев

КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА

- 1) создание удобного положения пациента в постели, вызов врача
- 2) введение обезболивающего препарата
- 3) применение ванночки с раствором перманганата калия
- 4) измерение температуры

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА

- 1) воздушно-капельный
- 2) фекально-оральный
- 3) трансмиссивный
- 4) половой

ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 96% спиртом
- 2) 3% раствором перекиси водорода
- 3) 70% спиртом
- 4) 6% раствором перекиси водорода

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- 1) для предупреждения распространения инфекции
- 2) после выздоровления пациента
- 3) в присутствии больного
- 4) при выявлении инфекции

ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- 2) приступ удушья
- 3) дыхание с затрудненным вдохом
- 4) дыхание с затрудненным выдохом

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) растирание пораженного участка подручными средствами
- 2) горячее питье, растирание пораженного участка
- 3) горячее питье, полуспиртовый компресс
- 4) горячее питье, термоизоляционная повязка

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В

- 1) повышении свёртываемости крови
- 2) уменьшении боли
- 3) снижении свёртываемости крови
- 4) повышении артериального давления

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- 3) статистическую карту выбывшего из стационара
- 4) журнал учета амбулаторных больных

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКИ ЧЕРЕЗ ____ ДНЕЙ

- 1) 20-22
- 2) 12-14
- 3) 7-10
- 4) 16-18

ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- 2) система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы
- 3) устранение факторов риска возникновения заболевания
- 4) максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА ВЛ НАПРАВЛЯЕТСЯ В _____ ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) клиническую
- 2) бактериологическую
- 3) вирусологическую

4) биохимическую

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ

- 1) заведующий отделением
- 2) медицинская сестра палатная (постовая)
- 3) старшая медицинская сестра отделения
- 4) процедурная медицинская сестра

ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ДОКОРМА ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) каши
- 2) кисломолочные смеси
- 3) адаптированные молочные смеси
- 4) соки

УВЕЛИЧЕНИЕ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ ТКАНИ ИЛИ ОРГАНА ЗА СЧЕТ УСИЛЕННОГО ПРИТОКА АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) ишемии
- 2) тромбоза
- 3) венозной гиперемии
- 4) артериальной гиперемии

ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение частоты сердечных сокращений
- 2) повышение работоспособности организма
- 3) повышение тонуса и эластичности мышц
- 4) снижение силы и выносливости мышц

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СУШКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1) 85
- 2) 65
- 3) 75
- 4) 95

МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) активное и пассивное курение
- 2) проживание в местности с хвойным лесом
- 3) гиподинамия
- 4) повышенная физическая активность

ПРИ РАЗВИТИИ ГЕМОТОРАКСА БОЛЬНОМУ ПРИДАЮТ

- 1) позу лёжа на боку
- 2) позу с опущенным головным концом

- 3) положение с приподнятым ножным концом
- 4) полусидячее положение

В ПОЗВОНОЧНОМ СТОЛБЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА РАЗЛИЧАЮТ _____ ОТДЕЛОВ(А)

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

ПРЕПАРАТОМ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) полиглюкин
- 2) венофундин 6%
- 3) гелоплазма баланс
- 4) альбумин 10%

ВНЕПЕЧЕНОЧНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) узловая эритема
- 2) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»
- 3) лакированный язык
- 4) сосудистые звездочки

СПОСОБНОСТЬ ГЛАЗА К ЯСНОМУ ВИДЕНИЮ РАЗНОУДАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) рефракцией
- 2) остротой зрения
- 3) адаптацией
- 4) аккомодацией

ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ ПРИМЕНЯЮТ 10% РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ В ОБЪЕМЕ ___ МЛ

- 1) 10-20
- 2) 100-200
- 3) 800-1000
- 4) 200-400

ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) небулайзер
- 2) мешок Амбу
- 3) кислородная лицевая маска
- 4) носовая канюля

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атеросклероз сосудов головного мозга

- 2) психо-эмоциональное перенапряжение
- 3) нерациональное питание
- 4) избыточный вес

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ РАЗОБЩЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ограничением
- 2) обсервацией
- 3) карантином
- 4) медицинским наблюдением

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ранитидин
- 2) омепразол
- 3) альмагель
- 4) фамотидин

В ПОЛОЖЕНИИ ФАУЛЕРА ПАЦИЕНТ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в промежуточном положении между лежа на животе и на боку
- 2) лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами
- 3) лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- 4) лежа на боку с приведенными к груди ногами

УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) главная медицинская сестра
- 2) старшая медицинская сестра
- 3) главный врач
- 4) заместитель главного врача по лечебному делу

ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЖИЗНИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) в неотложной форме
- 2) в экстренной форме
- 3) в виде само- и взаимопомощи
- 4) в порядке очереди

ДЛЯ ЛИХОРАДКИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ

- 1) обильного потоотделения
- 2) сонливости
- 3) слабости
- 4) чувства жара

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ГЕПАРИН ВВОДЯТ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ

- 1) плеча
- 2) живота
- 3) ягодицы
- 4) предплечья

СЕРДЕЧНАЯ ВЫРЕЗКА (INCISURA CARDIACA) — ЭТО АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА

- 1) переднем крае правого легкого
- 2) переднем крае левого легкого
- 3) диафрагмальной поверхности левого лёгкого
- 4) диафрагмальной поверхности правого лёгкого

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА НАКЛАДЫВАЮТ _____ ПОВЯЗКУ

- 1) спиралевидную
- 2) колосовидную
- 3) восьмиобразную
- 4) возвращающуюся

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗЛИЯНИЯ ИЛИ КРОВОТЕЧЕНИЯ СЛУЖИТ

- 1) -rrhagia
- 2) -rrhoea
- 3) -rrhexis
- 4) -rrhaphia

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, ПОПАВШИХ В РАНУ ИЛИ ОРГАНИЗМ ПАЦИЕНТА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дезинфекцией
- 2) стерилизацией
- 3) асептикой
- 4) антисептикой

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПАЦИЕНТУ В СОЗНАНИИ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) не предупреждать пациента о манипуляции
- 2) вызвать дежурного врача
- 3) получить согласие лечащего врача
- 4) получить согласие пациента на проведение манипуляции

ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ, КОТОРЫХ БЕСПОКОИТ ИЗЖОГА ИЛИ РЕГУРГИТАЦИЯ В ЛЕЖАЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, СЛЕДУЕТ

- 1) поднять изголовье кровати
- 2) поднять ножной конец кровати

- 3) придать пациенту положение лежа на левом боку
- 4) придать пациенту положение лежа на правом боку

ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

- 1) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания
- 2) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных
- 3) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина
- 4) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОХВАТЫВАЕТ

- 1) первые 24-48 часов после операции
- 2) первые 2-3 часа после операции
- 3) время до снятия швов
- 4) весь период до выписки из стационара

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обязательное лечение выявленного заболевания
- 2) определение и разъяснение риска рождения ребенка с наследственной патологией
- 3) оформление инвалидности
- 4) проведение всех видов пренатальной диагностики

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» ПРИ ЧС ПОДАЕТСЯ

- 1) СМС по телефону
- 2) в сети Интернет
- 3) светом прожекторов, красной ракетой
- 4) сиреной, по радио, гудками общественного транспорта

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗ ОТ

- 1) применения медикаментозной терапии
- 2) вакцинации против гриппа
- 3) легкоусвояемой и высококалорийной пищи
- 4) курения и профилактики инфекционных болезней легких

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО С ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ -ЭКТОМИЯ (ЕСТОМИА) ОЗНАЧАЕТ

- 1) разрезание
- 2) внедрение

- 3) удаление
- 4) введение

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

- 1) на 3-7 сутки после рождения
- 2) в 3 месяца
- 3) в 12 месяцев
- 4) в первые 12 ч после рождения

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРУКТУР ТЕЛА БЛИЖЕ К СРЕДИННОЙ ПЛОСКОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) верхнее
- 2) переднее
- 3) медиальное
- 4) дистальное

ОБРАЗОВАНИЕ НА КОНЕЧНОСТИ, ЛЕЖАЩЕЕ ДАЛЬШЕ ОТ ТУЛОВИЩА, РАСПОЛОЖЕНО

- 1) медиально
- 2) латерально
- 3) проксимально
- 4) дистально

ЛИХОРАДКА, ПРИ КОТОРОЙ СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДОСТИГАЮТ 3–4°C, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гектической
- 2) постоянной
- 3) ремиттирующей
- 4) извращённой

СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лечебная физкультура
- 2) смена постельного белья
- 3) утренний туалет
- 4) смена положения тела каждые два часа

ПРИЧИНОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хроническая кровопотеря
- 2) недостаток внутреннего фактора Касла
- 3) хромосомные аномалии
- 4) гемолиз эритроцитов

ДЛЯ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) морфий
- 2) омнопон

- 3) промедол
- 4) фентанил

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик
- 2) приподнять голову, поддерживая шею
- 3) запрокинуть голову, приподняв подбородок
- 4) дыхательные пути открыть с помощью шпателя

ПРЕПАРАТЫ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ СПОСОБНЫ К

- 1) быстрому выведению из организма
- 2) кумуляции в организме
- 3) избирательному воздействию на почки
- 4) неизбирательному воздействию на миокард

СТАРТОВЫМИ АНТИБИОТИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) пенициллины
- 2) тетрациклины
- 3) аминогликозиды
- 4) хлорамфениколы

СДАВЛЕННЫЙ «ПЕТУШИНЫЙ» КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) ларингоспазме
- 2) бронхиальной астме
- 3) бронхите
- 4) фарингите

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГЛАЗ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) старческая катаракта
- 2) дакриоцистит
- 3) отслоение сетчатки
- 4) конъюнктивит

ПОД ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИНЯТО ПОНИМАТЬ МЕСТА

- 1) резервации и сохранения микроорганизмов
- 2) обитания, развития и размножения микроорганизмов
- 3) передачи и распространения микроорганизмов
- 4) проникновения и внедрения микроорганизмов

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- 1) А

- 2) Б
- 3) В
- 4) Г

ПРОТИРАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЛАЖНОЙ ВЕТОШЬЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ _____ МЕТОДЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- 1) комбинированном
- 2) физическом
- 3) механическом
- 4) химическом

МЕРОПРИЯТИЕМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЯ МЕТЕОРИЗМА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) постановка масляной клизмы
- 2) применение грелки
- 3) постановка сифонной клизмы
- 4) введение газоотводной трубки

ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ГЕПАТИТЕ А

- 1) желтушный
- 2) цианотичный
- 3) гиперемированный
- 4) бледный

НЕКРОЗ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАПОЛНЕННОЙ ГНОЕМ ПОЛОСТИ, ОГРАНИЧЕННОЙ КАПСУЛОЙ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ЛЕГКОГО

- 1) туберкулезе
- 2) гангрене
- 3) раке
- 4) абсцессе

ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК (АППЕНДИКС) ОТХОДИТ ОТ _____ КИШКИ

- 1) подвздошной
- 2) тощей
- 3) ободочной
- 4) слепой

ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) ОТНОСИТСЯ К

- 1) наркотическим анальгетикам
- 2) психостимуляторам
- 3) аналептикам
- 4) ненаркотическим анальгетикам

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА, ПРИЧИН НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ, ОБЪЕМА ПРОТЕКАНИЙ, НЕОБХОДИМО

- 1) учитывать водный баланс
- 2) обучить пациента самоуходу
- 3) вести дневник мочеиспускания
- 4) вести учёт суточного диуреза

ЦЕЛЮ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) микрофлоры мочи
- 2) функционального состояния почек
- 3) количества форменных элементов осадка мочи
- 4) суточного диуреза

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗИНФЕКЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА _____ КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) II
- 2) III
- 3) I
- 4) IV

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 96
- 2) 24
- 3) 72
- 4) 48

ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1) слабость
- 2) одышка
- 3) перемежающаяся хромота
- 4) отеки

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) наблюдение до поступления в стационар
- 2) выполнение хирургического вмешательства
- 3) подготовку больного к хирургическому вмешательству
- 4) проведение анестезиологического пособия

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КЛИЗМ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

- 1) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- 2) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- 3) двукратного протирания с интервалом 15 минут
- 4) камерной дезинфекции

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ СЛУХА В ВИДЕ

- 1) улучшения восприятия речи в шумной обстановке
- 2) повышенной слышимости низких тонов
- 3) повышенной чувствительности к шуму
- 4) утраты способности слышать высокочастотные звуки

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИГЛ ПОМЕЩАЮТ В МЯГКУЮ УПАКОВКУ (ПАКЕТЫ) _____ ЦВЕТА

- 1) белого
- 2) красного
- 3) черного
- 4) желтого

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОБМОРОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) наложить согревающую повязку на обмороженный участок
- 2) интенсивно растирать обмороженные участки руками
- 3) переместить пострадавшего в тёплое помещение
- 4) опустить конечности в горячую воду

ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) внутримышечным введением викасола
- 2) пузырем со льдом на живот
- 3) введением анальгетиков
- 4) внутривенным введением хлористого кальция

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- 1) проведением рекламы специализированных видов питания
- 2) проведением обязательной иммунопрофилактики
- 3) созданием условий для занятий физической культурой и спортом
- 4) информированием о достижениях в области лечения заболеваний

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) недостаток белка в крови
- 2) недостаточное поступление холестерина с продуктами питания
- 3) нарушение холестеринового обмена
- 4) избыток холестерина

К ОСЛОЖНЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ АСЕПТИКИ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) воздушные эмболии
- 2) постинъекционные инфильтраты
- 3) жировые эмболии
- 4) аллергические реакции

МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ – ЭТО

- 1) эпидемия
- 2) пандемия
- 3) спорадические заболевания
- 4) эндемия

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- 1) медицинские организации
- 2) работодателя
- 3) инженера по технике безопасности
- 4) инженера по охране труда

НЕКРОЗОМ ТКАНЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ишемия
- 2) инфаркт
- 3) пролежень
- 4) секвестр

ВЕДУЩИМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) водный
- 2) воздушно-пылевой
- 3) воздушно-капельный
- 4) трансмиссивный

ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО: УЛОЖИТЬ

- 1) приподняв головной конец
- 2) приподняв ножной конец
- 3) и дать горячее питье
- 4) и поставить горчичник на затылок

К ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ _____ МЕТОД

- 1) воздушный
- 2) инфракрасный
- 3) паровой
- 4) газовый

К ОСНОВНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) общий анализ крови
- 2) липидный спектр крови
- 3) уровень сахара крови
- 4) общий анализ мочи

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

- 1) постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации
- 2) Министерство здравоохранения
- 3) медицинские университеты
- 4) ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ _____ ДНЕЙ

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 15
- 4) 45

МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В

- 1) раствор гипохлорида кальция
- 2) раствор перекиси водорода
- 3) моющий раствор
- 4) дезинфицирующий раствор

К СНОТВОРНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) пирарцетам
- 2) нитразепам
- 3) ибупрофен
- 4) налоксон

СООТНОШЕНИЕ РАСТВОРА АЗОПИРАМА И 3% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3:1
- 2) 1:2
- 3) 1:1
- 4) 1:3

К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) креатинин, мочевины
- 2) альбумины, глобулины
- 3) билирубин, холестерин
- 4) глюкоза, липопротеиды

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В СОБИРАЮТСЯ В МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) _____ ЦВЕТА

- 1) черного
- 2) желтого
- 3) красного
- 4) белого

МАЛЕНЬКИЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ СВЯЗЫВАЮТ ПОЛОСКАМИ МАРЛИ ПО _____ ШТУК

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 30

ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) единый талон амбулаторного пациента
- 2) карта здоровья
- 3) экстренное извещение
- 4) медицинская карта стационарного больного

ПРИ РАНАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) подкожной клетчатки
- 2) сосудисто-нервного пучка
- 3) внутренних органов
- 4) кожных покровов и слизистых оболочек

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ЖЕЛЕЗИСТОГО ЭПИТЕЛИЯ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) лимфома
- 2) аденома
- 3) фиброма
- 4) липома

ЭЛЕМЕНТОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ РВОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) применение пузыря со льдом на эпигастральную область
- 2) промывание желудка
- 3) обработка полости рта
- 4) обильное щелочное питье

ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хорошее питание
- 2) перенос легких тяжестей
- 3) ношение узкой, тесной обуви
- 4) занятие спортом

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТСЯ В

- 1) ванной комнате
- 2) бельевой
- 3) палате терапевтического отделения
- 4) специальном помещении с вытяжкой

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ХОДЬБА В УМЕРЕННОМ ИЛИ БЫСТРОМ ТЕМПЕ

- 1) масса тела более 90 кг
- 2) индекс массы тела 30 кг/м^2 и более
- 3) индекс массы тела $25 - 29,9 \text{ кг/м}^2$
- 4) масса тела более 60 кг

ВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) позы
- 2) речи
- 3) жестов
- 4) взгляда

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА

- 1) консультация врача-онколога
- 2) криодеструкция
- 3) диатермокоагуляция
- 4) обработка кожи 10% настойкой йода

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ

- 1) при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
- 2) полного физического, духовного и социального благополучия
- 3) его активной трудоспособности
- 4) активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений

ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ – ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ

- 1) повышения работоспособности
- 2) снижения общего холестерина в крови
- 3) авитаминоза
- 4) отеков

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ

- 1) о прогнозе и исходе болезни
- 2) о диагнозе и лечении
- 3) вся, содержащаяся в медицинском документе гражданина
- 4) об обращении и заболевании

ГОЛОВНОЙ МОЗГ КРОВΟΣНАБЖАЮТ _____ АРТЕРИИ

- 1) лицевые
- 2) наружные сонные
- 3) внутренние сонные
- 4) подключичные

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) определения достижения половой зрелости
- 2) раннего выявления опухолей
- 3) выявления аномалий развития
- 4) сравнения с нормальными размерами

СЫПЬ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ НА

- 1) лице, шее
- 2) ягодицах, спине
- 3) кисти, предплечье
- 4) туловище, животе

К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ

- 1) листками плевры
- 2) легким и перикардом
- 3) париетальным и висцеральным листками плевры
- 4) плеврой и перикардом

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) горизонтальное – на спине
- 2) на спине с приподнятым головным концом
- 3) на спине с опущенным головным концом
- 4) на левом боку

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ МОЧИ

- 1) общий
- 2) по Зимницкому
- 3) бактериологический
- 4) по Нечипоренко

К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА, ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- 1) низкая физическая активность
- 2) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира
- 3) артериальная гипертензия без коррекции лекарственными препаратами
- 4) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др.)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) давящая повязка
- 2) закрутка
- 3) компресс
- 4) холод к ране

УЧАЩЕННАЯ ДЕФЕКАЦИЯ (СВЫШЕ 3 РАЗ В СУТКИ), ПРИ КОТОРОЙ КАЛ ИМЕЕТ ЖИДКУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) диареей
- 2) дизурией
- 3) копростазом
- 4) диализом

ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ХАРАКТЕРНО

- 1) повышение эластичности и массы
- 2) снижение эластичности и глубокие структурные изменения
- 3) ускоренная регенерация после нагрузки
- 4) увеличение количества мышечных волокон

В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПАЦИЕНТАМ ЧАСТО РЕКОМЕНДУЮТ НАСТОИ ИЗ

- 1) коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки
- 2) плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела
- 3) листьев толокнянки (медвежьих ушек), листьев брусники, травы хвоща полевого
- 4) корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника

ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРНА

- 1) гипергликемия
- 2) гиперхолестеринемия
- 3) гиперпротеинемия
- 4) гипербилирубинемия

ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ

- 1) тошноту
- 2) отрыжку
- 3) изжогу
- 4) метеоризм

ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) немедленно после прибытия на место происшествия
- 2) после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших
- 3) при выявлении пострадавших в значительном количестве
- 4) в случае неэффективности мероприятий первой помощи

К АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМУ ВЕЩЕСТВУ (АХОВ) НЕЙРОТРОПНОГО

ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ОТНОСИТСЯ

- 1) карбофос
- 2) аммиак
- 3) хлор
- 4) угарный газ

ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ ПОЗВОНОЧНИКА НУЖНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

- 1) в любом удобном для пострадавшего положении
- 2) сидя с опорой на спину
- 3) строго в положении лёжа на жёстких носилках или щите
- 4) полусидя с наклоном вперёд

УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стерилизацией
- 2) дезинсекцией
- 3) дезинфекцией
- 4) дератизацией

ПАЦИЕНТАМ С ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

- 1) раствора натрия хлорида 0,9% внутривенно
- 2) инсулина подкожно
- 3) глюкагона внутримышечно
- 4) сладких растворов перорально

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЮТ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) журнал учета инфекционных больных
- 2) медицинская карта стационарного больного
- 3) журнал учета приема больных и отказов о госпитализации
- 4) статистическая карта выбывшего из стационара

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТНОСЯТСЯ

- 1) выдвигание нижней челюсти
- 2) определение наличия дыхания и проверка пульса на магистральных артериях
- 3) сердечно-лёгочная реанимация
- 4) запрокидывание головы с подъемом подбородка

СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) ежедневно медицинской сестрой ночной смены
- 2) старшей медицинской сестрой

- 3) заведующим отделением
- 4) процедурной медицинской сестрой

ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) перелом ключицы
- 2) перелом ребер
- 3) перелом позвоночника
- 4) повреждение трахеи

ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) цистостомия
- 2) паранефральная блокада
- 3) переливание крови
- 4) гемодиализ

ДВУХКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТУ ПРОВОДЯТ

- 1) подряд одно за другим
- 2) с интервалами 1-2 минуты
- 3) с интервалами не менее 10 минут
- 4) с интервалами не менее 5 минут

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В

- 1) маршрутную карту
- 2) карту учета диспансеризации
- 3) учетную форму № 25/у-04
- 4) учетную форму N 030-ПО/у-17

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) применение жаропонижающих препаратов разных форм
- 2) использование грелки к ногам, горячий чай
- 3) холодный компресс, тёплые ножные ванны
- 4) холодную примочку, тёплое питьё

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ГАЛАКТОЗЕМИИ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) повышение иммунитета
- 2) удаление органа, в котором накапливается токсин
- 3) ускоренное выведение токсических продуктов обмена из организма
- 4) устранение внешних дефектов

СПОРООБРАЗУЮЩИЕ ПАЛОЧКОВИДНЫЕ БАКТЕРИИ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) стафилококками
- 2) бациллами

- 3) спирохетами
- 4) вибрионами

СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ В

- 1) стеклянных шкафах
- 2) доступных местах
- 3) отдельных помещениях
- 4) холодильниках

ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

- 1) бронхиальной астме
- 2) экссудативном плеврите
- 3) бронхоэктатической болезни
- 4) крупозной пневмонии

СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ КЕТГУТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ионизирующее излучение
- 2) автоклавирование
- 3) кипячение
- 4) использование первомура

МИКОБАКТЕРИИ – ЭТО ВОЗБУДИТЕЛИ

- 1) столбняка
- 2) сифилиса
- 3) туберкулёза
- 4) ботулизма

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) электронная микроскопия
- 2) световая микроскопия
- 3) культивирование на питательных средах
- 4) культивирование в анаэроостате

ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

- 1) в зависимости от расположения сосуда
- 2) всей длины иглы
- 3) двух третей иглы
- 4) среза иглы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ

- 1) социальной профилактики
- 2) организации специализированной медицинской помощи
- 3) вторичной профилактики
- 4) первичной профилактики

ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 15 ММ И СЕЧЕНИЕМ 0,4 ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ _____ ИНЪЕКЦИИ

- 1) подкожной
- 2) внутривенной
- 3) внутримышечной
- 4) интратрахеальной

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА СОГЛАСНО ФЗ-323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» ОСНОВЫВАЕТСЯ НА МЕТОДАХ

- 1) лечения
- 2) оздоровления
- 3) диагностики
- 4) профилактики

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ _____ НЕДЕЛЬ

- 1) 2-3
- 2) 7-9
- 3) 4-5
- 4) 6-8

НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

- 1) помощь пациентам в самообслуживании
- 2) инъекции антибактериальных препаратов
- 3) смена дренажей
- 4) назначение пациенту рациональной диеты

ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) рабочие поверхности, медицинское оборудование, в том числе для наркоза
- 2) использованная ветошь, не прошедшая дезинфекцию
- 3) использованные инструменты до проведения дезинфекции
- 4) перевязочный материал после манипуляции

ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- 1) пальцы кисти на больной стороне - лопатка здоровой стороны
- 2) кисть на больной стороне - лопатка больной стороны
- 3) лучезапястный сустав на больной стороне - лопатка больной стороны
- 4) лучезапястный сустав больной стороны - плечевой сустав больной стороны

ПАЦИЕНТАМ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ НАЗНАЧАЮТ В КАЧЕСТВЕ АНТИАГРЕГАНТНОГО СРЕДСТВА

- 1) фраксипарин
- 2) ксарелто
- 3) гепарин
- 4) ацетилсалициловую кислоту

ФАКТОРОМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЧИТАЕТСЯ

- 1) длительная лактация
- 2) хронический стресс и утомляемость
- 3) травма и операция на молочной железе
- 4) ношение плотного, синтетического белья

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

- 1) легочное кровотечение
- 2) печеночная кома
- 3) остеопороз
- 4) потеря зрения

ОСНОВНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- 1) приступ удушья с затрудненным выдохом
- 2) кашель с выделением пенистой мокроты
- 3) одышка смешанного характера
- 4) инспираторная одышка

НАЗАЛЬНЫЕ КАПЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНСТИЛЛЯЦИИ В

- 1) конъюнктивальный мешок
- 2) наружный слуховой проход
- 3) полость рта
- 4) полость носа

НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

- 1) закаливание
- 2) нормализация массы тела
- 3) адекватное питание
- 4) устранение гиподинамии

ИНДЕКС ШОКА АЛЬГОВЕРА ПОЛУЧАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ

- 1) пульса на диастолическое давление
- 2) систолического давления на частоту дыхания
- 3) пульса на частоту дыхания
- 4) пульса на систолическое давление

ДИКАИН ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ _____ АНЕСТЕЗИИ

- 1) спинномозговой

- 2) поверхностной
- 3) инфильтрационной
- 4) проводниковой

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИКРООРГАНИЗМЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- 1) механическому
- 2) комбинированному
- 3) химическому
- 4) физическому

ФУНКЦИЕЙ СУРФАКТАНТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) создание отрицательного давления на выдохе
- 2) препятствие спадению альвеол на выдохе
- 3) сужение бронхиол
- 4) поддержание сухости внутренней поверхности альвеол

ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пиелонефрит в стадии ремиссии
- 2) наличие артериальной гипертензии I стадии
- 3) эрозия шейки матки
- 4) возраст старше 30 лет

СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю и при загрязнении
- 3) ежедневно и при загрязнении
- 4) 1 раз в два дня

СТЕРИЛИЗАЦИЯ БЕЛЬЯ И ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРОВОДИТСЯ В

- 1) сухожаровой шкафу
- 2) автоклаве
- 3) стерилизаторе
- 4) термостате

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) острое респираторное вирусное заболевание
- 2) сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение
- 3) наличие насморка без температуры
- 4) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе

ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) определить наличие дыхания, обеспечить проходимость дыхательных путей

- 2) вызвать «скорую помощь»
- 3) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- 4) начать проведение сердечно-легочной реанимации

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ (МИН)

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 20

ВОЗБУДИТЕЛИ СЕПСИСА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

- 1) простейшие
- 2) грибки
- 3) бактерии
- 4) вирус

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА

- 1) увеличивается
- 2) не меняется
- 3) уменьшается
- 4) растёт

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВЫВИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) интенсивное растирание области сустава
- 2) прикладывание горячего компресса
- 3) попытка вправления вывиха на месте
- 4) иммобилизация повреждённого сустава, не меняя его положения

ПРИЗНАКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИСЧЕЗАЮТ НА _____ СУТКИ

- 1) 12-15
- 2) 7-10
- 3) 20-23
- 4) 15-19

ПЕРЕНОС ТОКОМ КРОВИ ЧАСТИЦ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В НОРМЕ, И ЗАКУПОРКА ИМИ СОСУДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эмболией
- 2) тромбозом
- 3) ишемией
- 4) инфарктом

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ

- 1) эхокардиографию
- 2) измерение артериального давления
- 3) электрокардиографию
- 4) определение холестерина липопротеидов

ВНУТРИКОЖНО ВВОДИТСЯ

- 1) клофелин
- 2) туберкулин
- 3) кордиамин
- 4) ампициллин

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ОБМОРОКЕ

- 1) горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- 2) горизонтальное, без подушки
- 3) сидя с опущенными ногами
- 4) горизонтальное, с приподнятым головным концом

ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) избыток пролактина
- 2) снижение функции щитовидной железы
- 3) снижение выработки тестостерона
- 4) снижение выработки эстрогена

ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

- 1) подкожно
- 2) внутривенно
- 3) перорально
- 4) внутримышечно

ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комар
- 2) постельный клещ
- 3) платяная вошь
- 4) травяной клещ

ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- 1) оптических устройств
- 2) термолабильных материалов
- 3) хирургических инструментов
- 4) эндоскопического оборудования

ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ РАЗВИВАЕТСЯ _____ ШОК

- 1) кардиогенный
- 2) травматический
- 3) гемотрансфузионный

4) анафилактический

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний
- 2) устранение стойкой нетрудоспособности
- 3) лечебный процесс
- 4) сокращение временной нетрудоспособности

ОСОБЕННОСТЬ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) подагры
- 2) желчнокаменной болезни
- 3) мочекаменной болезни
- 4) сахарного диабета

В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ ОБРАЗУЕТСЯ ГОРМОН

- 1) окситоцин
- 2) эстрадиол
- 3) прогестерон
- 4) инсулин

ГЛАВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА МЕНДЕЛЬСОНА (АСПИРАЦИОННЫЙ ПНЕВМОНИТ, РЕГУРГИТАЦИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение «периода голодания» перед плановой операцией
- 2) премедикация атропином
- 3) использование закиси азота
- 4) быстрая индукция

ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) ибупрофен
- 2) метамизол натрия
- 3) парацетамол
- 4) ацетилсалициловую кислоту

ДНЕВНИК В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО (ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ) Ф 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) старшая медицинская сестра
- 2) заведующий отделением
- 3) постовая медицинская сестра
- 4) лечащий врач

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дезинфекцией
- 2) стерилизацией

- 3) демеркуризацией
- 4) дезинсекцией

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экспираторная одышка
- 2) однократная рвота
- 3) выраженная слабость
- 4) сжимающая, давящая боль

ПИКФЛОУМЕТРИЯ ПРОВОДИТСЯ ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ

- 1) бронхиальная астма
- 2) туберкулез
- 3) внебольничная пневмония
- 4) острый ларингит

МЕТОД ТОЛСТОЙ КАПЛИ И ТОНКОГО МАЗКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

- 1) риккетсий
- 2) вирусов
- 3) плазмодиев
- 4) спирохет

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

- 1) Апгар
- 2) Петрусса
- 3) Баллард
- 4) Цельсия

К ВИДАМ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН ОТНОСИТСЯ

- 1) закрытое заживление
- 2) первичное натяжение
- 3) пролиферация
- 4) повторное натяжение

АНТИКОАГУЛЯНТОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) клопидогрел
- 2) алтеплаза
- 3) гепарин
- 4) протамина сульфат

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ НА ГЛЮКОЗУ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ

- 1) стерильный контейнер 0,2 л
- 2) 8 ёмкостей по 0,2 л
- 3) ёмкости не менее 2 л и 0,25 л
- 4) одноразовый контейнер с широким горлом 0,1 л

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ПОДЛЕЖАТ

- 1) термометры
- 2) мочеприемники
- 3) гинекологические зеркала
- 4) подкладные судна

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) механически и химически щадящее питание
- 2) разгрузочные дни
- 3) ограничение животных жиров
- 4) повышенное количество белка

ТОЧКОЙ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) передний край жевательной мышцы
- 2) область угла нижней челюсти
- 3) поперечный отросток VI шейного позвонка
- 4) область козелка ушной раковины

ТЕХНИКОЙ КОММУНИКАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ МНЕНИЯ СОБЕСЕДНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контраргументация
- 2) аргументация
- 3) обратная связь
- 4) активное слушание

БИОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

- 1) наследственных болезней обмена веществ
- 2) хромосомных аномалий
- 3) мультифакториальных заболеваний
- 4) болезней с наследственной предрасположенностью

В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ПРОВОДИТСЯ _____ УБОРКА

- 1) текущая
- 2) заключительная
- 3) предварительная
- 4) генеральная

ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯЗВЫ В КАРДИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА БОЛЬ ВОЗНИКАЕТ _____ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ

- 1) сразу
- 2) через 120-180 минут

- 3) через 30-60 минут
- 4) через 70-100 минут

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВИВОЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, НЕСЕТ

- 1) главный врач медицинской организации
- 2) медицинский работник, осуществляющий иммунизацию
- 3) заведующий отделением
- 4) старшая медицинская сестра отделения (кабинета)

ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ В КОЛИЧЕСТВЕ (В ЛИТРАХ)

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 0,5

ПРИ ДИФFUЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) бактериологическую
- 2) цитологическую
- 3) клиническую
- 4) биохимическую

МЕНОПАУЗА НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 40-43
- 2) 45-47
- 3) 50-53
- 4) 55-57

ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- 1) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- 2) на боку, руки согнуты в локтевых суставах
- 3) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- 4) промежуточное положение, между положением лёжа на боку и лёжа на животе

В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)

- 1) 32
- 2) 40
- 3) 18
- 4) 24

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ В ОЧАГЕ КОРИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) влажная уборка, проветривание помещения

- 2) двукратное бактериологическое обследование контактных
- 3) очаговая дезинфекция
- 4) заключительная дезинфекция

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

- 1) использование антибактериальных препаратов
- 2) дезинфекционные мероприятия
- 3) изоляция больного
- 4) иммунизация

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОП) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- 1) обеспечения качества и единообразия медицинских манипуляций
- 2) сокращения рабочего времени персонала
- 3) ведения финансовой отчетности
- 4) определения должностных окладов

ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

- 1) 10-го дня после рождения до конца первого года жизни
- 2) 7-го дня после рождения до конца первого года жизни
- 3) 29-го дня после рождения до конца первого года жизни
- 4) рождения до конца первого года жизни

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ ПРИНИМАЮТ

- 1) на ночь
- 2) до еды
- 3) после еды
- 4) на тощак

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) лактация
- 2) овуляция
- 3) саливация
- 4) пролиферация

К ОСЛОЖНЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЪЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) аллергические реакции
- 2) жировые эмболии
- 3) воздушные эмболии
- 4) постинъекционные инфильтраты и абсцессы

ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) утки, гуси
- 2) собаки, лисы, кошки, волки

- 3) полевые мыши
- 4) иксодовые клещи

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДЯТ

- 1) перед выездом в рейс
- 2) школьникам, студентам
- 3) при поступлении на работу или учебу
- 4) для раннего выявления ряда заболеваний

НАЛИЧИЕ РЖАВЧИНЫ ПРИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ _____ ОКРАШИВАНИЕМ

- 1) фиолетовым
- 2) сине-зеленым
- 3) бурым
- 4) розовым

ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1) левотироксин
- 2) радиоактивный йод
- 3) мерказолил
- 4) адреналин

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОРЯДКА И ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) злоупотребление служебным положением
- 2) нарушение правил борьбы с эпидемиями
- 3) взяточничество
- 4) клевета, оскорбление

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ УДУШЬЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЛЕЖИТ

- 1) бронхоспазм, отек слизистой бронхов, гиперсекреции слизи
- 2) легочная гипертензия, повышенная воздушность легких
- 3) аллергический отек гортани, снижение эластичности альвеол
- 4) воспалительная инфильтрация бронхов, мелкие ателектазы

ФАКТОРОМ, УСУГУБЛЯЮЩИМ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) регулярное употребление овощей и фруктов
- 2) дефицит жидкости и отсутствие растительной пищи в рационе
- 3) дробное питание
- 4) частые физические нагрузки

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ОДНОЙ ИЗ РУК БОЛЬНОМУ НАДЕВАЮТ РУБАШКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ

- 1) сначала больная рука, потом здоровая

- 2) сначала здоровая рука, потом больная
- 3) сначала через голову, потом руки в рукава одновременно
- 4) сначала обе руки в рукава, потом надевают через голову

КАЛОПРИЕМНИК СЛЕДУЕТ ОПОРОЖНЯТЬ

- 1) по заполнении каловыми массами и газами на $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{3}$ объема
- 2) по заполнении каловыми массами и газами на $\frac{3}{4}$ объема
- 3) 1 раз в сутки
- 4) на ночь, перед сном

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гнойным
- 2) геморрагическим
- 3) катаральным
- 4) серозным

ПЕРЕДОЗИРОВКА КОДЕИНСОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОПАСНА

- 1) гипергликемией
- 2) гиперсекрецией бронхов
- 3) угнетением дыхания
- 4) гипертензией

В РОССИИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛИЧНОЙ ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЕ ВЛЕЧЕТ _____ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) дисциплинарную
- 2) материальную
- 3) уголовную
- 4) административную

ИСТИННЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ РЕБРА, ЕСЛИ ОНИ

- 1) соединяются с грудиной непосредственно
- 2) не достигают грудины
- 3) соединяются только с позвонками
- 4) лежат в мягких тканях

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) многоплодная беременность
- 2) бесплодие
- 3) нарушение менструального цикла
- 4) неправильное положение матки

ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ (ИГЛЫ, ПЕРЬЯ) СОБИРАЕТСЯ В

- 1) многоразовую емкость с плотно прилегающей крышкой
- 2) одноразовый непрокальваемый контейнер с плотно прилегающей крышкой

- 3) картонную коробку желтого цвета
- 4) одноразовый пакет желтого цвета

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОСВОБОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНО СДАВЛЕННУЮ КОНЕЧНОСТЬ, НЕОБХОДИМО НАЛОЖИТЬ

- 1) асептическую повязку
- 2) повязку эластичным бинтом
- 3) давящую повязку
- 4) жгут

СКОПЛЕНИЕ СВЕРНУВШЕЙСЯ КРОВИ В ТКАНЯХ С НАРУШЕНИЕМ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) петехией
- 2) кровоподтеком
- 3) гематомой
- 4) геморрагическим пропитыванием

КРИТЕРИЕМ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ _____ В МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ

- 1) папулы
- 2) покраснения
- 3) болезненности
- 4) следа от укола

ТЕМПЕРАТУРА В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕЖИМА РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА С ВАКЦИНАМИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

- 1) дважды в день
- 2) только утром
- 3) один раз в неделю
- 4) только при закладке новой партии вакцин

К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЮТ

- 1) гиподинамия
- 2) стресс
- 3) курение
- 4) очаги хронической инфекции в носоглотке

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

- 1) анемии
- 2) пороков сердца
- 3) хронической обструктивной болезни легких
- 4) инфаркта миокарда

ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ НАЗНАЧАЮТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) подавления кашлевого рефлекса
- 2) улучшения эвакуации мокроты
- 3) повышения вентиляции легких
- 4) снятия бронхоспазма

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

- 1) оздоровление населения
- 2) санитарно-просветительная работа
- 3) профилактика заболеваний
- 4) воспитательная работа

ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КИСЛОТОЙ НЕОБХОДИМО

- 1) сразу наложить сухую повязку
- 2) обработать кожу спиртовым раствором
- 3) обильно промыть поражённый участок проточной водой не менее 15 минут
- 4) нанести нейтрализующий щелочной раствор

СИСТЕМА, СПОСОБНАЯ ОТЛИЧАТЬ СВОИ БЕЛКИ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ И СВЯЗЫВАТЬ ИХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ретикулоэндотелиальной
- 2) иммунной
- 3) нервной
- 4) лимфатической

ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РЕЗАННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) края неровные, вокруг кровоизлияние
- 2) края неровные, зияет
- 3) большая глубина, точечное входное отверстие
- 4) края ровные, зияет

ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ РТ. СТ.

- 1) 20 – 40
- 2) 60 – 80
- 3) 140 – 160
- 4) 100 – 120

ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) низкий уровень ожидания от будущего
- 2) предпочтение мнения сверстников
- 3) отсутствие мониторинга со стороны родителей
- 4) взаимопонимание между членами семьи

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хилак форте
- 2) аллохол
- 3) магния сульфат
- 4) лоперамид

АНАЛИЗ РОДОСЛОВНОЙ СЕМЬИ ОСНОВАН НА _____ МЕТОДЕ

- 1) цитогенетическом
- 2) близнецовом
- 3) генеалогическом
- 4) популяционно-статистическом

РИСК ПАГУБНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) клинического анализа крови и мочи
- 2) медицинского осмотра
- 3) биохимического анализа крови
- 4) опроса (анкетирование)

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ

- 1) 70% спиртом
- 2) 3% перекисью водорода
- 3) 1% р-ром хлорамина
- 4) 1-2% р-ром протаргола

СБОР МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА А ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ

- 1) красного и черного цвета
- 2) любого цвета
- 3) желтого и красного цвета
- 4) любого цвета, за исключением желтого и красного

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЛЕЧЕНИЕМ

- 1) патогенетическим
- 2) этиотропным
- 3) паллиативным
- 4) симптоматическим

МЕСТНЫЙ СИМПТОМ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ

- 1) подергивание мышц
- 2) инфильтрация с цианотичным оттенком кожи
- 3) разлитое покраснение кожи
- 4) гиперемия кожи с четкими границами

РАЗВИТИЮ ЗАПОРА СПОСОБСТВУЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- 1) сырых и вареных овощей и фруктов
- 2) хлебных изделий из муки грубого помола
- 3) растительной клетчатки
- 4) малого количества жидкости

НАЛИЧИЕ В ЭКССУДАТЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ ВОСПАЛЕНИЯ

- 1) геморрагического
- 2) катарального
- 3) серозного
- 4) гнойного

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) налоксон
- 2) атропин
- 3) ацетилцистеин
- 4) унитиол

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) симптом Белоглазова
- 2) отсутствие реакции на свет
- 3) расширение зрачков
- 4) сужение зрачков

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШОКОВОГО ИНДЕКСА ПРИМЕНЯЕТСЯ ФОРМУЛА

- 1) АД диаст./АД сист.
- 2) АД сист. - АД диаст.
- 3) АД сист. /частота сердечных сокращений
- 4) частота сердечных сокращений/АД сист.

ФАКТОРОМ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дорсопатия
- 2) дизурия
- 3) гипергликемия
- 4) дислексия

ПРЕФИКС "ЭКЗО-" (ЕХО-), ОЗНАЧАЕТ

- 1) сквозь
- 2) внутреннее
- 3) наружное
- 4) между

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА _____ ГРУПП

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 13
- 4) 7

В РОССИИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО _____ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ

- 1) легкомыслию
- 2) недосмотру
- 3) неадекватности
- 4) корысти

ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСУШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (°С)

- 1) 35
- 2) 60
- 3) 85
- 4) 100

К РАННИМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) тромбоэмболия легочной артерии
- 2) нагноение раны
- 3) кровотечение
- 4) тромбоз глубоких вен

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- 1) дезинсекции
- 2) дезинфекции
- 3) стерилизации
- 4) дератизации

В ОЧАГЕ КОРИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- 1) бактериологическое обследование контактных
- 2) дезинфекцию игрушек
- 3) проветривание и влажную уборку помещения
- 4) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

ТЕРАТОГЕНЫ – ЭТО ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ

- 1) мутации в половых клетках родителей
- 2) врожденные пороки развития
- 3) старение организма
- 4) онкологическое заболевание у взрослых

К ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

- 1) ртутьсодержащие предметы
- 2) пищевые отходы инфекционных отделений
- 3) лекарственные препараты, не подлежащие использованию
- 4) живые вакцины, непригодные к использованию

ЦЕЛЬЮ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) предупреждение появления отеков
- 2) выведение из кишечника токсических веществ
- 3) проведение рентгенологического исследования брюшной полости
- 4) подготовка к родам

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ ____ СМ

- 1) 2-4
- 2) 10-12
- 3) 40
- 4) 20

СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТСЯ МНОГОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С

- 1) раневой поверхностью
- 2) кожей пациента
- 3) руками персонала
- 4) оборудованием

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ РАЗРЕШЕНО СУШИТЬ

- 1) протираaniem ветошью
- 2) в термостате
- 3) на открытом воздухе
- 4) сухим горячим воздухом

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

- 1) полиартрита
- 2) пяточной шпоры
- 3) гангрены
- 4) подагры

ПУЛЬС ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ НА _____ АРТЕРИЯХ

- 1) височной и подмышечной
- 2) подколенной и паховой
- 3) локтевой и бедренной
- 4) лучевой и сонной

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЕТСЯ МОЧА

- 1) из средней порции одного мочеиспускания
- 2) из первого полного мочеиспускания после сна
- 3) в течение трёх часов
- 4) за сутки

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СОЗНАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) введением ротового воздуховода
- 2) приданием устойчивого бокового положения
- 3) изолированным выдвиганием нижней челюсти без запрокидывания головы
- 4) запрокидыванием головы и выдвиганием вперед нижней челюсти

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЛИЦАМИ

- 1) с высшим профессиональным образованием по специальности
- 2) принимаемыми на временную и постоянную работу
- 3) назначенным главным врачом медицинской организации
- 4) со стажем работы в такой же должности более 25 лет

К ГУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) плечевая, бедренная, локтевая
- 2) позвонки, грудина, кости запястья
- 3) лопатки, ключицы, кости предплюсны
- 4) кости черепа, ребра, тазовые кости

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) зябкость
- 2) парестезии
- 3) гангрена
- 4) кожный зуд

ПРИ АВАРИЙНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ГЛАЗА НЕОБХОДИМО

- 1) промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин и обратиться к офтальмологу
- 2) промыть небольшим количеством антисептика и наложить повязку
- 3) закапать альбуцидом и обратиться к дежурной медицинской сестре
- 4) заложить мазь с антибиотиком за веко и обратиться к хирургу

ТЕКУЩУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ

- 1) два раза в неделю
- 2) еженедельно
- 3) ежедневно

4) через день

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

- 1) больным гриппом в первые дни болезни
- 2) здоровым лицам в предэпидемический период
- 3) лицам, выезжающим за границу в жаркие страны
- 4) переболевшим гриппом для закрепления иммунитета

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- 1) хирурга
- 2) терапевта
- 3) ортопеда
- 4) невролога

ПРОБОЙ НА НАЛИЧИЕ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) азопирамовая
- 2) фенолфталеиновая
- 3) с суданом-3
- 4) с суданом-4

ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БОЛЬНОМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ В ДОЗЕ

- 1) 250 мг проглотить целиком
- 2) 250 мг разжевать
- 3) 100 мг проглотить целиком
- 4) 100 мг разжевать

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ В ДВОЙНОЙ МЯГКОЙ УПАКОВКЕ СОСТАВЛЯЕТ (В СУТКАХ)

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 5

ПРИНЦИПОМ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБЛЮДЕН ПРИ ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) конфиденциальность и защита персональных данных пациентов
- 2) приоритет бумажной документации над электронными записями
- 3) обязательное дублирование каждой записи на бумажном носителе
- 4) свободный доступ к редактированию записей медицинскими сестрами

ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) авитаминоза
- 2) онкологических заболеваний
- 3) ожирения

4) аллергических реакций

ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ

- 1) обмена железа
- 2) фосфорно-кальциевого обмена
- 3) углеводного обмена
- 4) жирового обмена

НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- 1) повязка с синтомициновой эмульсией
- 2) повязка с раствором бикарбоната натрия
- 3) повязка с фурациллином
- 4) сухая стерильная повязка

ОДНОРАЗОВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАСКИ ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА

- 1) Б
- 2) А
- 3) Г
- 4) В

АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – ЭТО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИСТУПОВ

- 1) стенокардии
- 2) хронической ангины
- 3) хронической дыхательной недостаточности
- 4) острой сердечной недостаточности

СЕСАМОВИДНАЯ КОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В СУХОЖИЛИИ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) надколенником
- 2) таранной
- 3) ладьевидной
- 4) кубовидной

ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) II
- 2) I
- 3) IIIб
- 4) IIIа

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНИПУЛЯЦИЙ ПУТЕМ

- 1) проведения процедуры при отсутствии других пациентов в кабинете или

обеспечения конфиденциальности

- 2) обсуждения диагноза пациента с коллегами в присутствии других пациентов
- 3) ответа на вопросы посторонних лиц о состоянии здоровья пациента
- 4) размещения медицинской документации на виду в открытом доступе

ИЛЕОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЦ

- 1) желудка
- 2) почки
- 3) толстого кишечника
- 4) тонкого кишечника

ЦЕЛЮ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) количества съеденной смеси из бутылочки за 1 кормление
- 2) количества высосанного молока из груди за 1 кормление
- 3) общего количества молока у матери
- 4) суточного количества пищи

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЕСНИЧАТОГО ЭПИТЕЛИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ МОКРОТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) противокашлевым
- 2) отхаркивающим
- 3) антисекреторным
- 4) бронхолитическим

КРИТЕРИЕМ, КОТОРЫЙ ОТСУТСТВУЕТ В ШКАЛЕ АПГАР, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вес новорожденного
- 2) частота сердцебиений
- 3) тонус мышц
- 4) частота дыхания

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ПАЦИЕНТА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

- 1) ввести мочегонные средства
- 2) приложить теплую грелку к мочевому пузырю или промежности
- 3) провести инфузионную терапию
- 4) вызвать уролога для наложения цистостомы

ЦЕНТР ДЫХАНИЯ НАХОДИТСЯ В

- 1) продолговатом мозге
- 2) промежуточном мозге
- 3) мозжечке
- 4) среднем мозге

ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) принимать антибиотики
- 2) обильное витаминизированное питье
- 3) снижать температуру ниже 38°C
- 4) обеззараживать испражнения

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ ИЛИ ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ДИАГНОЗЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) грелки
- 2) очистительных клизм
- 3) холода на живот
- 4) внутривенных капельных вливаний

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

- 1) бронхографию
- 2) флюорографию
- 3) рентгенографию органов грудной клетки
- 4) спирометрию

ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

- 1) кишечные ленты
- 2) гаустры
- 3) сальниковые отростки
- 4) брыжейку

ПРЕВЫШЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) олигурией
- 2) полиурией
- 3) анурией
- 4) никтурией

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ

- 1) второй халат
- 2) маски
- 3) противочумные костюмы
- 4) халаты, застегивающиеся сзади

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ИЛИ ДИСТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -oma
- 2) -lysis
- 3) -itis
- 4) -osis

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКАНИЕ РТА

- 1) спиртом
- 2) кипяченой водой
- 3) раствором гидрокарбоната натрия
- 4) раствором фурацилина

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ I СТЕПЕНИ НЕОБХОДИМО

- 1) переодеть в сухую одежду
- 2) обезболить
- 3) наложить мазевую повязку
- 4) наложить повязку с фурациллином

К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ (НЕКОРРЕГИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) нерациональное питание
- 2) курение табака
- 3) возраст
- 4) гиподинамия

ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) медицинская сестра смотрового кабинета
- 2) врач приемного отделения
- 3) медицинская сестра приемного отделения
- 4) персонал санпропускника

ОБ ОГЛУШЕННОСТИ СОЗНАНИЯ ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СУММА БАЛЛОВ

- 1) 13-14
- 2) 15-16
- 3) 9-12
- 4) менее 8

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

- 1) 1 месяца
- 2) 2 месяцев
- 3) 6 месяцев
- 4) 2 недель

ПЕРВЫЙ ПРИКОРМ ВВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ С _____ ДО _____ МЕСЯЦЕВ

- 1) 9; 12
- 2) 6; 8
- 3) 4; 6
- 4) 2; 4

ВИРУС КРАСНУХИ ОПАСЕН ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СВЯЗИ С

- 1) поражением почек
- 2) развитием врожденных пороков у плода
- 3) развитием пневмонии
- 4) появлением аллергической реакции

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С

- 1) ограничением жирных и соленых блюд
- 2) повышенным количеством белка
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) пониженным количеством белка

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКАНИЕ РТА

- 1) раствором гидрокарбоната натрия
- 2) дистиллированной водой
- 3) кипяченой водой
- 4) раствором фурацилина

ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) затруднение выдоха
- 2) затруднение вдоха
- 3) поверхностное дыхание
- 4) шумный вдох

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) удерживать равновесие
- 2) предотвращать у себя травмы позвоночника
- 3) исключать дискомфорт
- 4) предупреждать пролежни у пациента

ПРИ ОКРАСКЕ ПО МЕТОДУ ГРАМА ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ ОКРАШИВАЮТСЯ В _____ ЦВЕТ

- 1) красный
- 2) синий
- 3) зеленый
- 4) желтый

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕОБХОДИМЫ

- 1) спирометр, пульсоксиметр
- 2) термометр, пикфлоуметр
- 3) тонометр, глюкометр
- 4) весы, ростометр, сантиметровая лента

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

- 1) повторный
- 2) вводный
- 3) первичный
- 4) внеплановый

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

- 1) первичная аккредитация специалистов
- 2) первичная специализированная аккредитация специалистов
- 3) периодическая аккредитация специалистов
- 4) аттестация

ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) сидя с наклоном головы вперёд
- 2) на животе с повернутой в сторону головой
- 3) строго на спине с запрокинутой головой
- 4) устойчивое боковое

ПРИ РАНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ЭМБОЛИЯ

- 1) тканевая
- 2) газовая
- 3) воздушная
- 4) жировая

У ПОСТРАДАВШЕГО ЕСТЬ ШАНС ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА В ТЕЧЕНИЕ

- 1) двух часов
- 2) первого часа
- 3) первых суток
- 4) трех часов

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- 1) наложением жгута
- 2) наложением давящей асептической повязки
- 3) прижиганием раны
- 4) максимальным сгибанием конечности в суставе

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

- 1) уложить пострадавшего на спинальный щит, голову и шею не фиксировать
- 2) наложить жесткий шейный воротник и уложить пострадавшего на спинальный щит с фиксацией головы
- 3) уложить пострадавшего на носилки в положение на боку с подушкой под головой

4) наложить тугую круговую повязку из эластичного бинта на шею для ограничения движений

ДЛЯ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ _____ КАТЕТЕР

- 1) внешний
- 2) уретральный постоянный
- 3) периферический
- 4) туннельный

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ

- 1) очистки
- 2) приема
- 3) комплектации
- 4) упаковки

НА ОЖОГОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- 1) повязка с йодом или зелёной
- 2) липкий пластырь без подкладки
- 3) повязка с жирной мазью
- 4) асептическая сухая повязка

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ревматический эндокардит
- 2) вирусный миокардит
- 3) порок сердца
- 4) атеросклероз коронарных артерий

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) менингит
- 2) назофарингит
- 3) менингококцемия
- 4) менингококковое носительство

ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ

- 1) гранулематозного воспаления
- 2) контактного дерматита
- 3) сенной лихорадки (поллиноза)
- 4) гемолитической анемии

У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СНИЖАЕТСЯ

- 1) слух, зрение
- 2) болевая чувствительность

- 3) абстрактность мышления
- 4) целостность восприятия

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение температуры тела до 38°C
- 2) местное повышение температуры
- 3) гиперемия на месте инъекции
- 4) анафилактический шок

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) массы тела
- 2) температуры
- 3) пульса
- 4) артериального давления

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) на сроке до 12 недель
- 2) до 22 недель
- 3) на сроке до 6 недель
- 4) независимо от срока беременности

СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА

- 1) нарушение функции
- 2) пружинящая фиксация
- 3) гиперемия
- 4) боль

ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ, КОТОРУЮ ЗАПОЛНЯЕТ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эпикризом
- 2) анамнезом жизни
- 3) паспортной
- 4) направлением на обследование

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРАДРЕНАЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллапс
- 2) гипертонический криз
- 3) бронхоспазм
- 4) гипергликемия

ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ ЧЕРЕЗ _____ НЕДЕЛИ (НЕДЕЛЬ)

- 1) 4-5

- 2) 1-2
- 3) 6-8
- 4) 3-4

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ (МИН)

- 1) 20
- 2) 60
- 3) 15
- 4) 30

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫДЕЛЕНА _____ ЗОНЫ

- 1) грязная, чистая, стерильная
- 2) дезинфекционная, стерилизационная
- 3) дезинфекционная, предстерилизационная, стерилизационная
- 4) приемная, упаковочная, стерилизационная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ _____ ПРОФИЛАКТИКИ

- 1) социальной
- 2) первичной
- 3) адаптивной
- 4) третичной

НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) агония
- 2) преагония
- 3) клиническая смерть
- 4) биологическая смерть

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- 2) люди из групп риска
- 3) пациенты с факторами риска заболеваний
- 4) пациенты с хроническими формами заболеваний

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НЕСЕТ МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕД

- 1) пациентом, родственниками и коллегами
- 2) семьей и коллективом медицинской организации
- 3) пациентом и коллективом медицинской организации
- 4) пациентом, коллегами и обществом

НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ

ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) внутривенное введение жидкости
- 2) обильное питье
- 3) оксигенотерапия
- 4) дача антибиотиков

СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ И ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15 : 2
- 2) 30 : 2
- 3) 30 : 1
- 4) 5 : 1

АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- 1) приёма препаратов интерферона
- 2) перенесенного инфекционного заболевания
- 3) введения иммуноглобулина
- 4) вакцинации

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКЛАДЫВАТЬ АРТЕРИАЛЬНЫЙ ЖГУТ В

- 1) средней трети плеча
- 2) нижней трети плеча
- 3) верхней трети бедра
- 4) средней трети бедра

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЮ

- 1) разрыва путей передачи возбудителей
- 2) формирования иммунитета путем выработки антител
- 3) уничтожения возбудителей заболеваний
- 4) обезвреживания источника инфекции

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) до 22 недель
- 2) на сроке до 6 недель
- 3) на сроке до 12 недель
- 4) независимо от срока беременности

ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО

- 1) 400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)
- 2) до 1 л цельных молочных продуктов
- 3) 500 г мясных субпродуктов
- 4) 200 г жирного мяса

ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯШАЯ ИЗ КЛЕТОК ПАУТИННОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО

МОЗГА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) менингиома
- 2) лимфома
- 3) фиброаденома
- 4) меланома

ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ПРИ ХОЛЕЦИСТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сужение общего желчного протока
- 2) сдавление протока увеличенной головкой поджелудочной железы
- 3) спазм сфинктера Одди
- 4) закупорка камнем общего желчного протока

ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН

- 1) адреналин
- 2) инсулин
- 3) тироксин
- 4) эстрадиол

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реагентом
- 2) катализатором
- 3) сорбентом
- 4) антидотом

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ СПОСОБ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

- 1) внутримышечно
- 2) подкожно
- 3) внутривенно
- 4) внутрикожно

ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СРОКИ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ АМПУЛИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Приказ Минздрава России от 29.04.2025 № 260н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения»
- 2) приказ главного врача медицинской организации «О назначении ответственных лиц за хранение и учет лекарственных средств»
- 3) журнал предметно-количественного учета лекарственных средств
- 4) стандартная операционная процедура «Порядок размещения лекарственных средств в процедурном кабинете»

ГИПОТЕНЗИВНЫМ СРЕДСТВОМ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эналаприл

- 2) метопролол
- 3) лозартан
- 4) нитроглицерин

ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ МАРКЕРОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тропонин
- 2) холестерин
- 3) С-реактивный белок
- 4) лейкоциты

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- 1) 300 дней
- 2) 220 дней
- 3) 280 дней
- 4) 240 дней

ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уклонение от работы с инфицированными пациентами
- 2) ежегодное обследование
- 3) оценка факторов риска в своей работе
- 4) обследование всех пациентов

ПРИЗНАКОМ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие пульса на сонной артерии
- 2) отсутствие сознания
- 3) узкие зрачки
- 4) судороги

НАИЛУЧШИМ ИСТОЧНИКОМ ВИТАМИНА В12 ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) говяжья или свиная печень
- 2) телятина, баранина
- 3) зеленые овощи
- 4) красная или белая фасоль

СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) акроцианоза
- 2) иктеричности
- 3) диффузного цианоза
- 4) гиперемии

МОЧУ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

- 1) 3
- 2) 1

- 3) 6
- 4) 5

К НЕМОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) возраст
- 2) артериальная гипертония
- 3) низкая физическая активность
- 4) стресс

ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНЫ ПОЧЕЧНЫЕ

- 1) лоханки
- 2) чашечки
- 3) канальцы
- 4) клубочки

НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАЗДАЧУ ПИЩИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ СОГЛАСНО ДИЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) палатная медсестра
- 2) буфетчица
- 3) лечащий врач
- 4) старшая медсестра отделения

АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- 1) лихорадке
- 2) бактериальной инфекции
- 3) вирусной инфекции
- 4) кашле

БАКТЕРИИ ОБЛАДАЮТ _____ ТИПАМИ ДЫХАНИЯ

- 1) окислительным и восстановительным
- 2) химическим и физическим
- 3) аэробным и анаэробным
- 4) химическим и биологическим

ВИДАМИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) экстренная, плановая, неотложная
- 2) амбулаторная, стационарная, на дому
- 3) скорая, неотложная
- 4) доврачебная, врачебная, специализированная

ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

- 1) 10 – 15 см на 1 час
- 2) 25 – 30 см на всю ночь
- 3) 7 – 8 см на 2 часа

4) 20 – 30 см на 1 час

"РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) сухом плеврите
- 2) бронхиальной астме
- 3) крупозной пневмонии
- 4) остром бронхите

ПРИ РИСКЕ АЛЛЕРГИИ НА ЛАТЕКС НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ ИЗ

- 1) полиэтилена
- 2) натурального латекса
- 3) нитрила
- 4) нержавеющей стали

СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) опекун
- 2) лечащий врач
- 3) главный врач
- 4) прокурор

ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) аритмичный пульс
- 2) напряжение пульса
- 3) разница между систолическим и диастолическим давлением
- 4) сумма систолического и диастолического давления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) при уходе за инфекционными больными
- 2) в период эпидемиологического неблагополучия
- 3) в присутствии пациентов с иммунодефицитами
- 4) при проведении инвазивных процедур

ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТОЙ ЗМЕИ НЕОБХОДИМО

- 1) иммобилизовать поражённую конечность, обеспечить физический и психологический покой
- 2) наложить жгут выше места укуса для прекращения венозного и лимфатического оттока
- 3) попытаться удалить яд путём отсасывания из ранки в течение первых 10-15 минут
- 4) прижечь место укуса раскалённым металлом или концентрированным раствором марганцовки

МЕСТО НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ

ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ ИЗ-ЗА АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трахея
- 2) гортань
- 3) левый главный бронх
- 4) правый главный бронх

РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРIT ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ

- 1) 9 месяцев
- 2) 12 месяцев
- 3) 1 год 9 месяцев
- 4) 1 год 6 месяцев

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА

- 1) лоперамид
- 2) аллохол
- 3) линекс
- 4) магния сульфат

ПАЦИЕНТЫ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНСУЛЬТ, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У ВРАЧА

- 1) нейрохирурга
- 2) невролога в поликлинике по месту жительства
- 3) физиотерапевта
- 4) участкового терапевта

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН _____ ДЕЙСТВИЯ

- 1) короткого
- 2) среднего
- 3) длительного
- 4) сверхдлительного

СУТОЧНАЯ НОРМА ВОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

- 1) 0,5 л
- 2) 1,5-2 л
- 3) 400 г
- 4) 100 г

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

- 1) только при террористических актах
- 2) несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях
- 3) только при травмах

4) развлекательных мероприятиях

ИЗБЫТОК СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА В ДЕТСТВЕ ПРИВОДИТ К

- 1) карликовости
- 2) бронзовой болезни
- 3) гигантизму
- 4) кретинизму

СБОР ОТХОДОВ В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) более 8 часов
- 2) рабочего дня
- 3) не более 3 часов
- 4) рабочей смены

ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО

- 1) уложить пострадавшего на спину, повернуть голову набок
- 2) усадить пострадавшего, голову держать ровно
- 3) запрокинуть голову пострадавшего назад
- 4) наклонить голову пострадавшего вперёд, прижать крыло носа к перегородке

В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЕМ

- 1) перца и помидоров
- 2) растительного масла
- 3) углеводов
- 4) поваренной соли

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА - ЭТО

- 1) Histologia
- 2) Cytologia
- 3) Embryologia
- 4) Anatomia topographica

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ ОН ОБРАТИЛСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ – НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гражданин
- 2) пациент
- 3) старый человек
- 4) больной человек

ПРЕФИКС "ГИПО-" (НУРО-) В ТЕРМИНЕ ОЗНАЧАЕТ

- 1) отсутствие
- 2) повышение
- 3) понижение
- 4) недостаток

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

- 1) первичной медико-санитарной помощи
- 2) специализированной медицинской помощи
- 3) социального обслуживания
- 4) паллиативной помощи

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ ПАЦИЕНТА ЛЕЖА НА

- 1) левом боку с поджатыми к животу ногами и согнутой головой
- 2) боку с вытянутыми ногами и запрокинутой головой
- 3) спине с приподнятыми ногами
- 4) животе

ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА ДИСФАГИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) кормление пациента через назогастральный зонд
- 2) обучение родственников кормлению пациента с ложки
- 3) полоскание полости рта антисептическими растворами
- 4) постановку очистительной клизмы

ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НА НАЛИЧИЕ СКРЫТОЙ КРОВИ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ ПРОБА

- 1) азопирамовая
- 2) бензидиновая
- 3) фенолфталеиновая
- 4) бензойная

У ПАЦИЕНТА С АТОПИЧЕСКОЙ АСТМОЙ ПРИСТУП УДУШЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН

- 1) обильным приемом пищи
- 2) контактом с шерстью животных
- 3) физической нагрузкой
- 4) выходом на холодный воздух

ВИРУСЫ КРАСНУХИ И ГЕРПЕСА ОПАСНЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ В СВЯЗИ С

- 1) поражением почек и печени, развитием почечной недостаточности
- 2) повреждением плода, развитием врожденных пороков
- 3) развитием пневмонии и бронхита, дыхательной недостаточностью
- 4) сенсбилизацией организма, высоким риском аллергических реакций

АНУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) много мочи
- 2) отсутствие мочи
- 3) преобладание ночного диуреза над дневным
- 4) нормальное количество мочи

ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ А (ЯДОВИТЫЕ) И Б (СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ) ХРАНЯТСЯ

- 1) в специальных металлических шкафах или сейфах
- 2) среди средств для наружного применения
- 3) среди средств для внутреннего применения
- 4) в холодильнике

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ПРИ СОРТИРОВКЕ ПОРАЖЕННЫХ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ

- 1) нуждающиеся в изоляции и нуждающиеся в санитарной обработке
- 2) нуждающихся в неотложной помощи
- 3) нуждающихся в эвакуации
- 4) не нуждающиеся в медицинской помощи и эвакуации

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) влажная уборка помещений
- 2) ношение лицевых масок
- 3) вакцинация
- 4) кварцевание помещений

ОСНОВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЕЙ, РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ ГРУДНУЮ И БРЮШНУЮ ПОЛОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) большая грудная мышца
- 2) диафрагма
- 3) прямая мышца живота
- 4) грудино-ключично-сосцевидная мышца

РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА ПРИГОДЕН В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 12 часов
- 2) 1 суток
- 3) 1–2 часов
- 4) 30 минут

ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ожирение
- 2) возраст
- 3) пол
- 4) наследственность

ВОДОРАСТВОРИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВИТАМИН

- 1) Д
- 2) Е
- 3) А
- 4) С

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В

- 1) многоразовые емкости черного цвета
- 2) маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)
- 3) твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)
- 4) одноразовую твердую упаковку белого цвета

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) по окончании первого трудового дня
- 2) по распоряжению руководителя медицинской организации
- 3) после прохождения работником испытательного срока
- 4) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей

ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА С БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головокружение при резкой смене положения
- 2) боли в грудной клетке после сна
- 3) кашель с гнойной мокротой в утренние часы
- 4) приступы удушья с затруднённым выдохом

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ В ЛЕЧЕНИИ РАН ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЮЮ

- 1) улучшения кровообращения
- 2) образования нежного тонкого рубца
- 3) обезболивания
- 4) лизиса некротических тканей

КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТЬ У МИКОБАКТЕРИЙ СВЯЗАНА С НАЛИЧИЕМ В КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКЕ

- 1) нуклеиновых кислот
- 2) жировосковых веществ
- 3) углеводов
- 4) белков

ЦЕНТРЫ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ В

- 1) среднем мозге
- 2) коре больших полушарий
- 3) продолговатом мозге
- 4) промежуточном мозге

ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАММАХ)

- 1) не менее 400

- 2) до 100
- 3) 150-200
- 4) 250-300

ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

- 1) грызунов
- 2) патогенных микроорганизмов
- 3) членистоногих
- 4) насекомых

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДИАГНОСТИРУЕМЫМ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- 1) толстой кишки
- 2) щитовидной железы
- 3) шейки матки
- 4) молочной железы

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в 3 дня
- 2) 1 раз в 7 дней
- 3) 1 раз в 2 дня
- 4) ежедневно

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИОИДНЫМИ НАРКОТИКАМИ (ГЕРОИН, МОРФИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атропин
- 2) ацизол
- 3) флумазенил
- 4) налоксон

РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

- 1) переворачиваться с живота на спину
- 2) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
- 3) ползать
- 4) самостоятельно садиться

ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ ЗОНД

- 1) эндоскопический
- 2) тонкий
- 3) толстый
- 4) дуоденальный

В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ (кг/м²)

- 1) 25,0 - 29,9
- 2) 18,5 - 24,9
- 3) 16,0 - 18,5
- 4) 30,0 - 34,9

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ _____ КЛАСС ОПАСНОСТИ

- 1) III
- 2) I
- 3) II
- 4) IV

УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1) 3% раствором перекиси водорода
- 2) антисептическим раствором
- 3) стерильным глицерином
- 4) 70% этиловым спиртом

ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- 1) кардиогенного шока
- 2) гипертонического криза
- 3) обморока
- 4) коллапса

РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) усилению лактации
- 2) профилактике рахита
- 3) быстрому росту ребенка
- 4) профилактике мастита

ПРИНЦИП «РАННЕГО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ», ПРИМЕНЯЕМЫЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ СКРИНИНГЕ, ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) отложить терапию на более поздний срок
- 2) заменить необходимость диспансеризации
- 3) вылечить болезнь полностью без последствий в юношеском возрасте
- 4) предотвратить необратимые повреждения до появления симптомов

ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОРМИТЬ

- 1) 6 раз в сутки
- 2) 8 раз в сутки
- 3) 7 раз в сутки
- 4) по требованию ребенка

ТЕРМИН "ПРОТЕИНУРИЯ" ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ В МОЧЕ

- 1) лейкоцитов
- 2) белка
- 3) глюкозы
- 4) эритроцитов

КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, СОСТАВЛЯЕТ ___ ЛИТРОВ(А)

- 1) 3-4
- 2) 10-12
- 3) 7-8
- 4) 5-6

СРОКИ СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ

- 1) метода стерилизации
- 2) упаковки
- 3) наличия фильтра в биксе
- 4) индикаторов стерильности

ДОСТОВЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нерегулярный сердечный ритм
- 2) высокий зубец R
- 3) отсутствие зубца P
- 4) стойкий подъем сегмента ST

ПАЦИЕНТУ С ОТЕКАМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА РЕКОМЕНДОВАНО

- 1) ограничить прием белков и жиров
- 2) увеличить прием белков и жиров
- 3) увеличить прием жидкости и соли
- 4) ограничить прием жидкости и соли

ВАКЦИНА БЦЖ (БЦЖ-М) ВВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ

- 1) на 10-14 день жизни
- 2) в 2 месяца
- 3) в первые 24 часа жизни
- 4) на 3-7 день жизни

СПОНТАННЫЕ МУТАЦИИ ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) преднамеренного воздействия человека
- 2) ошибок репликации ДНК
- 3) приема лекарственных препаратов
- 4) воздействия ультрафиолетовых лучей

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУЧНОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОБРАБАТЫВАЕМОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОГРУЖАЮТ В МОЮЩИЙ РАСТВОР НА _____ МИНУТ

- 1) 20

- 2) 15
- 3) 60
- 4) 30

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

- 1) только открытого типа
- 2) щелевидного типа
- 3) только закрытого типа
- 4) открытого, закрытого, комбинированного типов

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО С ОЖГОВЫМ ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) на животе для разгрузки обожженной поверхности спины
- 2) сидя (полусидя) с опущенными ногами для улучшения вентиляции легких
- 3) лежа на носилках, с приподнятым ножным концом и обязательным согреванием
- 4) на здоровом боку для профилактики аспирации

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) возбудителей заболевания
- 2) пути передачи возбудителей
- 3) здоровое население, имеющее риск инфицирования
- 4) источник инфекции

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В АВТОКЛАВЕ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДУ

- 1) паровому
- 2) воздушному
- 3) химическому
- 4) газовому

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наследственность
- 2) инфекция
- 3) перегревание
- 4) переохлаждение

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА СНЯТИЕ СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дротаверин (но-шпа)
- 2) панкреатин (фестал)
- 3) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
- 4) адеметионин (гептрал)

ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- 1) утром на лице
- 2) утром на ногах
- 3) днем на руках
- 4) вечером на лице

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ

- 1) быть вежливой
- 2) быть приветливой
- 3) разъяснять в доступной форме значение, смысл и необходимость обследований
- 4) обсуждать диагноз, план лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате

СТЕПЕНЬ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1) шкале Глазго
- 2) шкале Апгар
- 3) индексу Альговера
- 4) суммарному сердечно-сосудистому риску

ГАЗОТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА, ТАК КАК

- 1) заканчивается её стерильность
- 2) утомительно для пациента
- 3) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
- 4) прекращается лечебный эффект

ОБЪЕМ РАСТВОРА, ОДНОМОМЕНТНО ВВОДИМОГО ПОДКОЖНО, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (В МЛ)

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 10
- 4) 5

ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) увеличением вместимости мочевого пузыря
- 2) снижением почечного кровотока
- 3) более редким мочеиспусканием
- 4) повышением тонуса мочеточников

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ _____ ПРОФИЛАКТИКИ

- 1) первичной
- 2) вторичной
- 3) популяционной
- 4) социальной

ПРИ РАНЕНИИ С НАЛИЧИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В РАНЕ НЕОБХОДИМО

- 1) удалить инородное тело и приложить холод к месту ранения
- 2) извлечь инородное тело, после чего туго забинтовать рану
- 3) зафиксировать инородное тело валиками и давящей повязкой, не извлекая его
- 4) извлечь инородное тело и обработать рану антисептиком

ТЕРМОСТАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- 1) культивирования бактерий
- 2) стерилизации лабораторной посуды
- 3) стерилизации питательных сред
- 4) стимуляции спорообразования бактерий

К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) спермицидов
- 2) внутриматочной спирали
- 3) презерватива
- 4) календарного метода

ФАКТОРОМ, СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЮЩИМ РИСК ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сухой кожный покров в месте контакта
- 2) наличие резиновой обуви на пострадавшем
- 3) кратковременное воздействие тока низкого напряжения
- 4) прохождение тока через область сердца и головного мозга

L-ФОРМЫ БАКТЕРИЙ

- 1) предназначены для сохранения вида
- 2) имеют наружную мембрану
- 3) не патогенны для человека
- 4) утратили клеточную стенку, но сохранили способность к размножению

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) продромальным периодом
- 2) инкубационным периодом
- 3) исходом
- 4) периодом клинических проявлений

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15-20 минут
- 2) 10-15 минут
- 3) не более 5 минут
- 4) 1-2 минуты

ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эпифиз на хрящевой стадии развития
- 2) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз
- 3) суставной хрящ эпифиза
- 4) хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом

ПОКРОВНОЙ НАЗЫВАЮТ _____ ТКАНЬ

- 1) эпителиальную
- 2) мышечную
- 3) соединительную
- 4) нервную

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 6-8 недель
- 2) месяц
- 3) 2 недели
- 4) 1-2 дня

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ КУПАТЬ

- 1) утром и вечером
- 2) 2 раза в неделю
- 3) 1 раз в день
- 4) ежедневно

УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1) антисептическим раствором
- 2) стерильным глицерином
- 3) 70° этиловым спиртом
- 4) 3% раствором перекиси водорода

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

- 1) весь медицинский персонал
- 2) лица любой профессии перед трудоустройством
- 3) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
- 4) доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей

ПРОВЕТРИВАНИЕ В ПАЛАТАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ (В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) В СУТКИ НЕ МЕНЕЕ _____ РАЗ

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 2-3
- 4) 5-6

К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ

- 1) соблюдение режима сна и питания

- 2) наблюдения у врача травматолога
- 3) употребление продуктов, богатых углеводами
- 4) адекватную физическую активность

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нормализация массы тела
- 2) стабилизация водно-электролитного состава крови
- 3) обеспечение организма питательными веществами
- 4) поступление необходимого количества витаминов и микроэлементов

КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) гиперемия лица, ускоренный рост волос
- 2) бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса
- 3) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов
- 4) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь

ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) длительной потери сознания
- 2) снижения рефлексов
- 3) отсутствия реакций на внешние раздражители
- 4) кратковременной потери сознания

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

- 1) снижению устойчивости внимания
- 2) улучшению восприятия информации
- 3) улучшению запоминания информации
- 4) повышению сосредоточения внимания

ОТХОЖДЕНИЕ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ПРОИСХОДИТ ПРИ

- 1) дебюте крупозной пневмонии
- 2) прогрессировании рака легкого
- 3) прорыве абсцесса лёгкого в бронх
- 4) окончании приступа бронхиальной астмы

МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) центральной нервной системы
- 2) состояния молочных желез
- 3) внутренних органов грудной клетки
- 4) внутренних органов брюшной полости

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА

- 1) введение эуфиллина внутривенно
- 2) проведение отвлекающих процедур
- 3) оксигенотерапии
- 4) введение антибиотиков

УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ

- 1) вида используемых антисептиков
- 2) наличия перчаток
- 3) степени загрязнения
- 4) характера медицинской манипуляции

К УСТНЫМ МЕТОДАМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) статья, радиопередача
- 2) муляжи, фотографии
- 3) памятка, листовка
- 4) лекция, беседа

ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЭМИИ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ (ММОЛЬ/Л)

- 1) 4,5
- 2) 5,0
- 3) 3,5
- 4) 4,0

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) эналаприл, атенолол
- 2) дигоксин, дифенгидрамин (димедрол)
- 3) лантозид (целанид), корвалол
- 4) атропин, калия и магния аспарагинат (аспаркам)

ВСЕМ ЛИЦАМ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ ПОКАЗАНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ АЭРОБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ _____ МИНУТ В НЕДЕЛЮ

- 1) 150
- 2) 100
- 3) 120
- 4) 130

В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДЯТ ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА

- 1) эстрогенов
- 2) прогестерона
- 3) пролактина
- 4) тестостерона

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С КАНАЛАМИ И ПОЛОСТЯМИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) погружение в дезинфицирующее средство
- 2) протирание спиртовым раствором
- 3) механическая очистка
- 4) ультразвуковая очистка

ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

- 1) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований
- 2) факторы, способствующие развитию заболеваний
- 3) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов
- 4) случайные ошибки в исследованиях

ПРИЗНАКОМ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восстановление самостоятельного дыхания
- 2) появление пульса на сонной артерии
- 3) подъем грудной клетки на вдохе
- 4) сужение зрачков

ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) потребление 300 г фруктов в день
- 2) снижение потребления насыщенных жиров
- 3) потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц
- 4) потребление более 5 г соли

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ –ЭТО ПЕРИОД

- 1) полового созревания
- 2) наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка
- 3) полового покоя
- 4) угасания детородной функции

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАРАНТИНА В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

- 1) 7
- 2) 21
- 3) 17
- 4) 10

ЛЮБОЕ ПОДОЗРЕНИЕ НА ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ

- 1) немедленного начала лечения аспирином и нитроглицерином
- 2) оценки риска повторного инфаркта через неделю
- 3) экстренной госпитализации

4) отсрочки диагностики и наблюдения пациента дома

КУШЕТКУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА, НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ МЕТОДОМ

- 1) в конце смены
- 2) дважды в течение смены
- 3) протиранием с интервалом 5 минут после каждого пациента
- 4) двукратного протирания после каждого пациента

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ В

- 1) физиотерапевтическом кабинете
- 2) прививочном кабинете
- 3) перевязочном кабинете
- 4) процедурном кабинете

К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) антропометрическое измерение
- 2) перепись населения
- 3) обращаемость за медицинской помощью
- 4) перепись больных

ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТСЯ

- 1) танатология
- 2) геронтофармакология
- 3) гериатрия
- 4) геронтология

У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ В МИНУТУ

- 1) 16 – 20
- 2) 12 – 16
- 3) 40 – 45
- 4) 30 – 35

ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головокружение
- 2) кашель
- 3) лихорадка
- 4) боль в грудной клетке

СТРУКТУРА ПОТЕРЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЯХ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ДОВОЛЬНО БЫСТРО ДОПОЛНЯЕТСЯ

- 1) сердечно-сосудистыми заболеваниями
- 2) инфекционной заболеваемостью
- 3) заболеваниями кожи и подкожной клетчатки

4) поражением лёгких

ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНОЙ СТАДИИ АСКАРИДОЗА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОБНАРУЖЕНИИ

- 1) личинок в фекалиях
- 2) яиц гельминтов в фекалиях
- 3) гельминтов на перианальных складках
- 4) личинок в мокроте

УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинская карта амбулаторного больного
- 2) экстренное извещение об инфекции, отравлении или реакции на прививку
- 3) статистический талон уточнения диагноза
- 4) медицинская карта стационарного больного

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) 10% раствор хлористого кальция
- 2) 5% раствор глюкозы
- 3) 0,9% раствор натрия хлорида
- 4) 2% раствор новокаина

МЫШЦА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОЙ МЫШЦЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пронатором
- 2) синергистом
- 3) антагонистом
- 4) фиксатором

ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК В ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ (ММОЛЬ/Л)

- 1) 5,0
- 2) 4,5
- 3) 5,5
- 4) 6,1

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) микрофлоры мочи
- 2) суточной глюкозурии
- 3) количества форменных элементов осадка мочи
- 4) функционального состояния почек

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПАРИЕТАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЖЕЛУДКА НАЗНАЧАЮТ

- 1) кларитромицин
- 2) ацидин-пепсин

- 3) амоксициллин
- 4) омепразол

РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

- 1) наполнению артерии кровью
- 2) интервалу между пульсовыми волнами
- 3) числу пульсовых волн за минуту
- 4) силе прижатия артерии до исчезновения пульса

СРЕДИ ПРИЧИН СМЕРТИ ПРИ КАТАСТРОФАХ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАХОДИТСЯ

- 1) травматический шок
- 2) травма, не совместимая с жизнью
- 3) психотравма
- 4) острая кровопотеря

К НЕМОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) повышенное артериальное давление
- 2) отягощенный семейный анамнез
- 3) курение
- 4) нерациональное питание

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЯХ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) назначение строгой диеты на период от 2 до 6 недель
- 2) только паллиативный уход с целью минимизировать боль и страдания
- 3) удаление лишней хромосомы из клеток с помощью технологии редактирования генов
- 4) стимуляцию развития, обучение, лечение сопутствующих пороков

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОСРОЧЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) немедленно изъять из обращения и передать на утилизацию по установленным правилам
- 2) переместить в карантинную зону и дождаться прихода старшей медицинской сестры для совместного решения
- 3) промаркировать «просрочено» и продолжать хранить в общем шкафу до момента списания
- 4) самостоятельно списать и выбросить в контейнер для бытовых отходов

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В

- 1) поликлинике
- 2) каждом отделении
- 3) приемном отделении
- 4) каждом кабинете

СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) до начала сердечно-легочной реанимации после определения состояния
- 2) после вдоха и начала компрессий
- 3) при отсутствии реакции на сердечно-легочную реанимацию
- 4) после 5 минут от начала сердечно-легочной реанимации

ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

- 1) хирургическое
- 2) реанимационное
- 3) интенсивной терапии и реанимации
- 4) травматологическое или нейрохирургическое

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПУЛЬСА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЕГО СИММЕТРИЧНОСТЬ НА ОБЕИХ РУКАХ, _____, ЧАСТОТУ, НАПОЛНЕНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ

- 1) характер
- 2) глубину
- 3) ритм
- 4) тип

ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) нестерильных перчаток после обработки их спиртосодержащим антисептиком
- 2) нестерильных перчаток
- 3) стерильных перчаток после обработки их спиртосодержащим антисептиком
- 4) стерильных перчаток

ОТДЕЛОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ _____ КИШКА

- 1) подвздошная
- 2) ободочная
- 3) двенадцатиперстная
- 4) тощая

ДЛЯ СБОРА МОКРОТЫ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) стерильным контейнером
- 2) чашкой Петри
- 3) сухим чистым контейнером
- 4) индивидуальной плевательницей

ПРИ ПАРОВОМ МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионнонестойких металлов

- 2) изделия из металла, стекла, текстильных материалов, резины, латекса, полимерных материалов
- 3) нити хирургические шелковые, эндоскопы и инструменты к ним
- 4) инструменты к гибким эндоскопам, изделия из резин, металлические инструменты с замковыми частями, вращающиеся стоматологические инструменты

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слабость
- 2) головная боль
- 3) боль в области сердца
- 4) снижение аппетита

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О

- 1) диагностике заболеваний
- 2) лечении
- 3) факторах риска
- 4) симптомах

В СКЕЛЕТЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО _____ КОСТЕЙ

- 1) 206
- 2) 300
- 3) 150
- 4) 250

В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ЖЁЛЧНАЯ КОЛИКА РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) сразу после приема непривычно большого объема пищи после длительного ограничения
- 2) через 1–1,5 ч после употребления жирной, жареной пищи
- 3) у пациента натошак и проходит после приема пищи
- 4) через полчаса-час после еды с употреблением кофе

НАКАПЛИВАЮЩАЯСЯ В ОЧАГЕ ВОСПАЛЕНИЯ ЖИДКОСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) отечной жидкостью
- 2) плазмой
- 3) транссудатом
- 4) экссудатом

ШПРИЦ – РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

- 1) вакцины
- 2) инсулина
- 3) глюкозы
- 4) гепарина

СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) синхондрозом
- 2) симфизом
- 3) синдесмозом
- 4) синостозом

ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ __ Л

- 1) 18-20
- 2) 1-1,5
- 3) 10-12
- 4) 5-6

РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вид носового кровотечения
- 2) затекание содержимого ротоглотки в трахею
- 3) затекание жидкого желудочного содержимого по пищеводу в полость ротоглотки
- 4) гиперсаливация

БЕРЕМЕННОЙ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) Тренделенбурга
- 2) лёжа на левом боку
- 3) сидя
- 4) Фаулера

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРОВОДИТСЯ

- 1) после обработки рук влажными салфетками
- 2) после мытья рук хозяйственным мылом
- 3) с помощью воды и мыла или с помощью спиртосодержащего антисептика
- 4) при наличии видимых загрязнений рук

В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- 1) введение контактным иммуноглобулина
- 2) бактериологическое обследование контактных
- 3) активную иммунизацию контактных
- 4) разобщение контактных и наблюдение за ними

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение парентеральных вмешательств
- 2) непосредственный уход за пациентами
- 3) контроль выполнения врачебных назначений
- 4) организация выписки, учета, хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий

ПРИ ЛЮБОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- 1) постельного белья
- 2) одежды больного
- 3) выделений больного
- 4) посуды больного

"ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ" ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) через день
- 2) ежедневно утром
- 3) ежедневно утром и вечером
- 4) ежедневно вечером

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушением координации
- 2) тремором кистей
- 3) параличами конечностей
- 4) умственной деградацией

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) сальбутамол
- 2) пропранолол
- 3) метопролол
- 4) бисопролол

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- 1) стерилизации
- 2) дезинфекции
- 3) дератизации
- 4) дезинсекции

ДЛЯ ФАЗЫ КОМПЕНСАЦИИ ШОКА ХАРАКТЕРНА

- 1) тахикардия
- 2) гипотензия
- 3) брадикардия
- 4) уремия

В ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ВХОДЯТ

- 1) кружка Эсмарха, соединительная трубка, зажим, наконечник, вазелин, вода 1-1,5 литра
- 2) газоотводная трубка, грушевидный баллон, вода 2-3 литра
- 3) шприц Жане, тонкий катетер, вода 1,5-2 литра
- 4) 2 толстых желудочных зонда, воронка, вода 4-5 литров

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

- 1) 120°C 40 мин
- 2) 100°C 40 мин

- 3) 100°C 60 мин
- 4) 180°C 60 мин

КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- 1) большей эластичностью
- 2) большим содержанием минеральных веществ
- 3) большей плотностью
- 4) большей ломкостью

ОТХОДЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫЕ МОКРОТОЙ ПАЦИЕНТОВ, ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) А
- 2) Г
- 3) В
- 4) Б

ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) «Лист временной нетрудоспособности»
- 2) «Направление на лабораторные исследования»
- 3) «Медицинская карта»
- 4) «Талон амбулаторного пациента»

К ПАТОГЕННЫМ СТРЕПТОКОККАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) пневмококки
- 2) сальмонеллы
- 3) микрококки
- 4) шигеллы

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) удаление из раны сгустков крови и инородных тел
- 2) наложение на рану вторичных швов
- 3) промывание раны
- 4) иссечение краев, дна и стенок раны

ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЛЕЖАТ

- 1) незагрязнённые изделия, которые не использовались
- 2) объекты, которые могут служить факторами передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
- 3) стерильные инструменты, хранящиеся в не вскрытых крафт-пакетах
- 4) простерилизованные перевязочные материалы

ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ

- 1) промежуточное между положением лежа на животе и на боку
- 2) лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°-60°
- 3) лежа на боку с приведенными к груди ногами
- 4) лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕСТРИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРОВЕРКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 1) работоспособности приборов учета энергоресурсов
- 2) комфортных условий пребывания пациентов
- 3) режима посещения родственниками пациента
- 4) инфекционной безопасности персонала и пациента

ПИКФЛОУМЕТРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) максимальную длительность вдоха
- 2) максимальную скорость выдоха
- 3) остаточный объем легких
- 4) жизненную емкость легких

ВАЛОКОРДИН

- 1) антибиотик
- 2) антисептик
- 3) местный анестетик
- 4) седативное средство

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ «СТЕНОЗ» В ТЕРМИНЕ "АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ" (STENOSIS) ОБОЗНАЧАЕТ

- 1) расширение
- 2) сужение
- 3) удаление
- 4) искусственное отверстие наружу

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- 1) участвует в аттестации медицинских работников
- 2) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
- 3) контролирует качество оказания медицинской помощи
- 4) участвует в лицензировании медицинских организаций

КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высеv золотистого стафилококка и бактерии группы кишечной палочки
- 2) видимая чистота и блеск инструментария
- 3) присутствие высева санитарно-показательных микроорганизмов в смывах с поверхностей и каналов изделий
- 4) отсутствие высева санитарно-показательных микроорганизмов в смывах с поверхностей и каналов изделий

2,4% РАСТВОР ЭУФИЛЛИНА ВВОДИТСЯ

- 1) подкожно
- 2) внутривенно
- 3) внутрикожно
- 4) внутримышечно

ЗА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ И РАВНОВЕСИЕ ОТВЕЧАЕТ

- 1) промежуточный мозг
- 2) продолговатый мозг
- 3) мозжечок
- 4) средний мозг

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ОТРАВЛЕНИЕМ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ (ДО ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕБНОЙ БРИГАДЫ), НЕОБХОДИМО

- 1) уложить, придав возвышенное положение, и дать солевое слабительное
- 2) усадить и дать выпить взвесь активированного угля
- 3) уложить на спину и вызвать рвоту
- 4) повернуть на бок, очистить ротоглотку, при возможности — промыть желудок через зонд

ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИК МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

- 1) аргументация
- 2) контраргументация
- 3) ориентировка в собеседнике
- 4) активное слушание

К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

- 1) отеки
- 2) асцит
- 3) головная боль
- 4) лихорадка

ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (МИНУТЫ)

- 1) 1-2
- 2) 10-15
- 3) 15-20
- 4) 20-25

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) 1 раз в неделю
- 2) ежедневно
- 3) ежемесячно
- 4) 1 раз в месяц

ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

НЕОБХОДИМО

- 1) ввести дицинон, аминокaproновую кислоту
- 2) дать пузырь со льдом
- 3) ввести спазмолитики
- 4) оказать помощь при рвоте

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- 1) моющие средства
- 2) пищевые красители
- 3) шерсть животных
- 4) лекарственные препараты

ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) лежа на боку
- 2) горизонтальное с приподнятыми ногами
- 3) сидя, с упором на руки
- 4) горизонтальное

ОТКРЫТЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЛОМ КОСТИ С

- 1) обширной гематомой поврежденного сегмента конечности
- 2) образованием обширных пузырей над областью перелома
- 3) раной поверхностных тканей, сообщающейся с областью перелома
- 4) раной мягких тканей, не сообщающейся с областью перелома

ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ

- 1) подкожно
- 2) внутривенно
- 3) внутримышечно
- 4) внутрикожно

ВЕДУЩИМ КРИТЕРИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инвалидность
- 2) демографические показатели
- 3) заболеваемость населения
- 4) физическое воспитание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

- 1) формирования умений
- 2) формирования навыков
- 3) удовлетворения потребности в здоровом образе жизни
- 4) формирования общественного мнения

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ИЛИ ВЕЛИЧИН, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -metria
- 2) -scopia
- 3) -graphia
- 4) -stasis

МЕТОД ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ

- 1) плавный затяжной выдох через трубочку в стакан с водой
- 2) надувание шаров
- 3) резкий крик
- 4) прерывистое дыхание

К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ

- 1) жажда, кожный зуд
- 2) отёки, боли в пояснице
- 3) снижение памяти, запоры
- 4) сухой кашель, одышка

ПРИ ЛЮБОЙ АНЕМИИ В КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) появление бластных клеток
- 2) лейкоцитоз, ускорение СОЭ
- 3) снижение уровня гемоглобина
- 4) повышение уровня гемоглобина

ЛЮДИ, ПОГИБШИЕ ИЛИ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС СОСТАВЛЯЮТ _____ ПОТЕРИ

- 1) безвозвратные
- 2) санитарные
- 3) ситуационно-обусловленные
- 4) общие

ПРИ ТРАВМАХ КОСТЕЙ ТАЗА ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ПОЛОЖЕНИИ

- 1) лежа на щите на животе
- 2) лежа на щите с приподнятыми ногами
- 3) лягушки
- 4) сидя с наклоном головы вперед

МОНИТОРИРОВАНИЕ ПУЛЬСА, ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, САТУРАЦИИ У ПАЦИЕНТА С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) непрерывно
- 2) 1 раз в полчаса
- 3) 1 раз в час
- 4) 2 раза в сутки

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) запах алкоголя в выдыхаемом воздухе
- 2) судорожный синдром
- 3) сниженный тургор кожи
- 4) запах ацетона в выдыхаемом воздухе

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО

- 1) прикладывать холод в области желудка
- 2) вызывать рвоту и промывать желудок ресторанным способом
- 3) давать пить воду и любые другие жидкости
- 4) промывать желудок зондовым способом

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ

- 1) портал госуслуг
- 2) участкового врача
- 3) страховую компанию
- 4) регистратуру

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КРОВОПОТЕРЯ В РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ _____% ОТ МАССЫ ТЕЛА

- 1) 1,5
- 2) 0,3
- 3) 0,1
- 4) 0,5

УДАЛЕНИЕ МАТКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) gastrectomia
- 2) strumectomy
- 3) hysterectomy
- 4) cystectomy

К МИКРОАНГИОПАТИЯМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОТНОСЯТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) сосудов головного мозга
- 2) коронарных артерий
- 3) сосудов сетчатки глаза
- 4) артерий нижних конечностей

ФОРМА УЧЕТА ПРИЕМА ПАЦИЕНТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ИМЕЕТ №

- 1) 066/у
- 2) 025/у
- 3) 001/у
- 4) 007/у

В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

- 1) держать дистанцию
- 2) соблюдать субординацию
- 3) идти на конфронтацию
- 4) демонстрировать свое превосходство

МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- 1) проведения непрямого массажа сердца
- 2) сбора отходов класса Б
- 3) сбора отходов класса А
- 4) проведения искусственной вентиляции легких

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дуоденоскопией
- 2) ректороманоскопией
- 3) гастроскопией
- 4) эзофагоскопией

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО

- 1) пытаться влить в ротовую полость сладкий раствор
- 2) вводить внутривенно струйно 40% раствор глюкозы
- 3) вводить внутримышечно раствор глюкагона
- 4) контролировать уровень глюкозы крови экспресс-методом

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТА УКЛАДЫВАЮТ НА

- 1) спину
- 2) живот
- 3) правый бок
- 4) левый бок

ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ИМЕЮТ ЦВЕТ

- 1) желтый
- 2) черный
- 3) красный
- 4) белый

К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ

- 1) старше 80 лет
- 2) старше 100 лет
- 3) 75-90 лет
- 4) старше 90 лет

В ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ВХОДИТ

- 1) профилактика пролежней
- 2) выполнение инъекций

- 3) проведение смены постельного и нательного белья
- 4) постановка капельницы

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) патронаж к ребенку до 1 года жизни
- 2) анкетирование родителей
- 3) чтение лекций
- 4) беседы с родителями

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) развитие бронхиальной обструкции
- 2) скопление жидкости в плевральной полости
- 3) снижение сердечного выброса
- 4) нарушение газообмена в альвеолах

МАРЛЕВЫЕ ШАРИКИ СКЛАДЫВАЮТ В ПОДГОТОВЛЕННУЮ УПАКОВКУ ПО _____ ШТУК

- 1) 10
- 2) 30
- 3) 50
- 4) 20

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приступы удушья
- 2) кашель с вязкой трудноотделяемой мокротой
- 3) сухой, непродуктивный кашель
- 4) гиперсекреция мокроты

СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА СОСТАВЛЯЕТ (Л)

- 1) менее 0,5
- 2) 1,5- 2
- 3) более 2
- 4) 0,5-1,0

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ СОСТОЯНИЕМ, ТРЕБУЮЩИМ НЕМЕДЛЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ КНИКОТОМИИ ИЛИ ТРАХЕОСТОМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пневмоторакс
- 2) обструкция верхних дыхательных путей
- 3) гипервентиляционный синдром
- 4) интоксикация

ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ "ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ

ПИТАНИЕ (№ 1-84)"

- 1) перед каждым приемом пищи
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в день

КОНТАКТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- 1) дыхательные пути
- 2) кровеносную систему
- 3) желудочно-кишечный тракт
- 4) кожу

СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- 1) 1 раз в неделю и при загрязнении
- 2) 2 раза в неделю и при загрязнении
- 3) 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- 4) ежедневно и при загрязнении

ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ _____ ИММУНИТЕТ

- 1) активный естественный
- 2) активный врожденный стойкий иммунитет
- 3) пассивный искусственный
- 4) активный искусственный

БЯЗЕВУЮ УКЛАДКУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ _____ МЕТОДОМ

- 1) химическим
- 2) механическим
- 3) воздушным
- 4) паровым

РЕЖИМОМ, ПРИ КОТОРОМ БОЛЬНОМУ МОЖНО ВСТАВАТЬ С КРОВАТИ, ХОДИТЬ ДО ТУАЛЕТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) постельный
- 2) полупостельный
- 3) общий
- 4) строго постельный

ЦЕЛЮ ОЧАГОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обеззараживания поверхностей
- 2) удаления загрязнений, дезинфекция контактных поверхностей
- 3) предотвращение распространения инфекций среди персонала и пациентов
- 4) предупреждение распространения возбудителей инфекций от больных

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ПАЦИЕНТА РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

- 1) Гражданским кодексом Российской Федерации (в части возмещения вреда здоровью)
- 2) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан» (№323-ФЗ)
- 3) Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (№ 326-ФЗ)
- 4) Конституцией Российской Федерации

АД <120/80 ММ РТ.СТ. ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высоким нормальным
- 2) показателем артериальной гипертензии
- 3) нормальным
- 4) оптимальным

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ОЖОГОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ДО 10% ПЛОЩАДИ) ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ СОСТАВЛЯЕТ _____ МИНУТ

- 1) 20–30
- 2) 30–40
- 3) 5–10
- 4) 15–20

СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ

- 1) терапевтическом
- 2) кардиологическом
- 3) инфекционном
- 4) операционном

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) заполнены в произвольной форме
- 2) подписаны постовой медсестрой
- 3) заверены печатью и подписью руководителя медицинской организации
- 4) подписаны заведующим отделением

ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ

- 1) после разведения водой в соотношении 1:10
- 2) без предварительного обеззараживания, при условии ее оснащения системой обеззараживания сточных вод
- 3) после обеззараживания химическим методом
- 4) после обеззараживания физическим методом

ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ, ЕСЛИ ОНА ДИАГНОСТИРОВАНА У ПАЦИЕНТА В ПЕРВЫЕ _____ ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР

- 1) 72

- 2) 96
- 3) 56
- 4) 48

ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ООБРАБОТКИ РАНЫ СКАЛЬПЕЛЬ ПОДАЕТСЯ ХИРУРГУ ЗА

- 1) лезвие рукояткой к хирургу
- 2) рукоятку лезвием к хирургу
- 3) шейку лезвием вниз, тупым концом вверх
- 4) шейку лезвием вверх, тупым концом к ладони

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЁЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) раствор фурацилина
- 2) раствор хлоргексидина
- 3) лосьон «Ниттифор»
- 4) порошок гидрокарбоната натрия

ОДЫШКА ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) спазмом гладкой мускулатуры бронхов
- 2) пневмофиброзом
- 3) эмфиземой легких
- 4) застойным полнокровием в легких

ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нерациональное питание
- 2) гиподинамия
- 3) наследственная предрасположенность
- 4) интенсивные физические нагрузки

В НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ МОЖНО ХРАНИТЬ

- 1) согласно сроку годности на упаковке
- 2) до 3 лет
- 3) до 1 года
- 4) бессрочно

НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) внутримышечное введение ампициллина
- 2) уход при рвоте
- 3) парентеральное введение солевых растворов
- 4) проведение витаминотерапии

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТВОДИТСЯ

- 1) графа
- 2) лист
- 3) тетрадь
- 4) строка

ПЕДИКУЛЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) высококонтагиозная дерматофития кожи, волос и ногтей
- 2) паразитарное заразное заболевание, причиной которого служат кровососущие насекомые
- 3) хронический вирусный дерматоз, характеризующийся поражением кожи лица в виде эритемы
- 4) заболевание, вызываемое патогенными грибами, поражающими кожу и ее придатки

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ЭФФЕКТИВНО ВВЕДЕНИЕ

- 1) эналаприлата
- 2) метамизола-натрия (анальгина)
- 3) декстрозы (глюкозы)
- 4) дигоксина

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1) месяц
- 2) неделю
- 3) полгода
- 4) 3 месяца

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ревматический эндокардит
- 2) ревматический миокардит
- 3) порок сердца
- 4) атеросклероз коронарных артерий

НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

- 1) наружное кровотечение
- 2) обморок
- 3) закрытый перелом
- 4) вывих

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО

- 1) соблюдать постельный режим в течение суток
- 2) вести активный образ жизни
- 3) соблюдать постельный режим в течение 2-3 часов

4) соблюдать постельный режим в течение 30 минут

К БОЛЕЗНЯМ, ПЕРЕДАЮЩМСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) перитонит, аднексит
- 2) трихомониаз, гонорея
- 3) бартолинит, вульвит
- 4) эндометрит, кольпит

В СОСТАВ КРЕСТЦА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВХОДЯТ _____ СРОСШИХСЯ ПОЗВОНКОВ(А)

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- 1) на спине
- 2) в области кистей и стоп
- 3) на передней поверхности груди и живота
- 4) в области губ, щек, гортани

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 1 раз в неделю
- 4) ежедневно

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

- 1) межпальцевые складки кистей
- 2) слизистые оболочки
- 3) ладони и подошвы
- 4) лицо и шея

ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стероидный диабет
- 2) стероидная язва
- 3) лунообразное лицо
- 4) кандидоз полости рта

ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (°С)

- 1) 45-50
- 2) 15-20
- 3) 38-40

4) 25-30

УРЕЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МЕНЬШЕ 60 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стенокардией
- 2) тахикардией
- 3) брадикардией
- 4) аритмией

К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- 1) соблюдение личной гигиены
- 2) выявление бактерионосителей
- 3) санитарно-просветительскую работу
- 4) употребление доброкачественной воды

БАКТЕРИИ - ЭТО

- 1) микроорганизмы, имеющие ядерную оболочку
- 2) мельчайшие, не видимые в световом микроскопе, частицы
- 3) микроорганизмы, относящиеся к эукариотам
- 4) микроорганизмы, не имеющие оформленного ядра

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сублингвальный
- 2) внутримышечный
- 3) ингаляционный
- 4) пероральный

К МЕТОДАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ _____ МЕТОД

- 1) экспериментальный
- 2) репродуктивный
- 3) описательный
- 4) сравнительный

ЭТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гуманность и милосердие
- 2) всесторонний уход за пациентом
- 3) восстановление здоровья пациента
- 4) предупреждение заболеваний

К ОСНОВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТ

- 1) игру в шахматы

- 2) лечебную физкультуру и терренкур
- 3) игру в шашки
- 4) развитие мелкой моторики

ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ТУРГОР КОЖИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) слегка надавив на кожу
- 2) по специальным лабораторным показателям
- 3) прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
- 4) собрав кожу в складку

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАКЛАДЫВАЮТ _____ ПОВЯЗКУ

- 1) возвращающуюся
- 2) крестообразную
- 3) восьмиобразную
- 4) пращевидную

В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ В РОДДОМЕ РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПРИВИВКУ ОТ

- 1) гепатита В
- 2) туберкулеза
- 3) дифтерии
- 4) полиомиелита

ГЛУБИНУ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ: РОСТ - _____ (СМ)

- 1) 50
- 2) 1/2 роста
- 3) 80
- 4) 100

ПОСТРАДАВШЕМУ С ЗАКРЫТЫМ ПЕРЕЛОМОМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) самостоятельное вправление отломков
- 2) интенсивный массаж вокруг места перелома
- 3) нанесение согревающей мази
- 4) иммобилизация повреждённой конечности

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ

- 1) до врачебного осмотра
- 2) после врачебного осмотра
- 3) после регистрации пациента
- 4) до регистрации пациента

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ

- 1) только в упаковочных материалах
- 2) в сушильном шкафу
- 3) без упаковки
- 4) в упаковочных материалах и без упаковки

ПАКЕТЫ И КОНТЕЙНЕРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, ИМЕЮТ _____ ЦВЕТ

- 1) желтый
- 2) красный
- 3) чёрный
- 4) белый

ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

- 1) на 2-е сутки
- 2) в первый час
- 3) через неделю
- 4) через 3-е суток

К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия
- 2) УЗИ, бронхоскопия
- 3) холецистография, ирригоскопия, гастроскопия
- 4) бронхография, томография, флюорография

ПО СКОРОСТИ РЕЧИ МОЖНО СУДИТЬ О

- 1) знании предмета разговора
- 2) степени усталости
- 3) когнитивных способностях
- 4) темпераменте человека

НЕВЕРБАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) мимики и жестов, позы, взгляда
- 2) речи
- 3) письма
- 4) интонации общения между двумя или более людьми

МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ультрафиолетовое облучение
- 2) использование формалина
- 3) кипячение
- 4) влажная уборка помещений

К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА, ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- 1) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др.)
- 2) низкая физическая активность
- 3) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира
- 4) артериальная гипертензия

В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 1 раз в неделю

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСЕТ

- 1) министерство здравоохранения субъекта РФ
- 2) лечащий врач
- 3) медицинская организация
- 4) заведующий отделением

ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) при выявлении нарушений технологии выполнения процедур
- 2) постоянно в течение всей профессиональной жизни
- 3) по потребности, определяемой самой медицинской сестрой
- 4) по мере необходимости, определяемой руководством

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ АТОНИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С)

- 1) 25-30
- 2) 38-42
- 3) 5-10
- 4) 15-20

МУТАГЕНЕЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС

- 1) исправления повреждений ДНК
- 2) возникновения мутаций под действием мутагенных факторов
- 3) естественного отбора мутаций
- 4) фенотипического приспособления к среде

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ГРЕЛКЕ СОСТАВЛЯЕТ (°С)

- 1) 20-30
- 2) 60-70
- 3) 80-90
- 4) 40-50

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) УЗИ органов брюшной полости
- 2) консультация врача-хирурга
- 3) флюорография легких
- 4) маммография

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОБНОЙ ДОЗЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ МИНУТ(Ы)

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

ПРИЗНАКАМИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) расхождение краев раны
- 2) побледнение краев
- 3) гиперемия, отек, усиление боли
- 4) промокание повязки серозной жидкостью

ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) кожей
- 2) толстым кишечником
- 3) легкими
- 4) почками

К КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЯМ ПРОТИВОШОКОВОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) гемодез
- 2) желатиноль
- 3) интралипид
- 4) трисамин

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ _____ ДИАБЕТА

- 1) фосфатного
- 2) несахарного
- 3) сахарного
- 4) почечного

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- 1) только по эпидемическим показаниям
- 2) вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет
- 3) вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет

4) первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев

СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ НИЗКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) от ≥ 5 до 10
- 2) равному или больше 10
- 3) от ≥ 1 до 5
- 4) менее 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ УХОДА ЗА ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТАМИ

- 1) не допускается
- 2) допускается в экстренных случаях
- 3) не допускается только при инфекционных заболеваниях
- 4) допускается при отсутствии запаса перчаток

ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ЭТО

- 1) лимфаденопатия
- 2) гидраденит
- 3) лимфаденит
- 4) лимфангит

ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВРАЧ

- 1) по решению руководителя медицинской организации
- 2) по решению врачебной комиссии медицинской организации
- 3) по выбору пациента
- 4) принимающий участие в медицинском обследовании и лечении

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) микоплазма
- 2) стафилококк
- 3) вирус
- 4) пневмококк

ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) горизонтальное
- 2) с приподнятым ножным концом
- 3) сидя с упором на руки
- 4) на боку

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0°C-37,9°C НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пиретическая
- 2) гиперпиретическая

- 3) фебрильная
- 4) субфебрильная

ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

- 1) рост 65 см
- 2) закрытый большой родничок
- 3) окружность головы 40 см
- 4) масса тела 8,0 кг

В ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЯХ У ЧЕЛОВЕКА ПРОТЕКАЕТ _____ КРОВЬ

- 1) венозная
- 2) артериальная
- 3) смешанная
- 4) полуартериальная

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШЕГО ДОЛЖНА

- 1) проверить наличие роговичного рефлекса
- 2) поднести к носу ватку, смоченную раствором аммиака
- 3) проверить реакцию зрачков на свет и оценить ширину зрачков
- 4) осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи и громко спросить: \ "Что с вами? Вам нужна помощь? \ "

ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

- 1) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований
- 2) факторы, способствующие развитию заболеваний
- 3) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов
- 4) случайные ошибки в исследованиях

ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) подростки
- 2) дети
- 3) женщины
- 4) здоровые

К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) гипергликемическое состояние
- 2) анафилактический шок
- 3) гипогликемическое состояние
- 4) гипертермический синдром

СВОЙСТВОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ

УНИЧТОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бактериостатическое
- 2) вирулицидное
- 3) бактерицидное
- 4) фунгицидное

К ХИМИЧЕСКИМ МУТАГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) вирусы гриппа
- 2) ароматические углеводороды
- 3) ультрафиолетовые лучи
- 4) электрические токи

РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ

- 1) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
- 2) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
- 3) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
- 4) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бессонница
- 2) чувство жара
- 3) раздражительность
- 4) сонливость

ДОКОРМ НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ _____ ВСКАРМЛИВАНИИ

- 1) естественном
- 2) любом
- 3) искусственном
- 4) смешанном

ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПРИМЕНЯТЬ

- 1) подкожно
- 2) внутривенно
- 3) внутримышечно
- 4) внутрь, запивая кислым фруктовым соком

СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ УНИЧТОЖЕНИЕ

- 1) патогенной микрофлоры
- 2) вредных насекомых
- 3) грызунов
- 4) микроорганизмов и их спор

ТАКТИКА РАННЕЙ АКТИВИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

СПОСОБСТВУЕТ

- 1) ускорению заживления раны
- 2) профилактике тромбэмболических осложнений
- 3) улучшению мочевыделения
- 4) профилактике нагноения раны

ЭЛЕМЕНТОМ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проветривание палат по графику
- 2) соблюдение тишины в отделении
- 3) психологическая подготовка к операции
- 4) организация досуга пациентов

ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ

- 1) венозных сосудов
- 2) фаланг пальцев
- 3) костного мозга и кости
- 4) коленного сустава

РАННЕМУ АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) массовое флюорографическое обследование
- 2) рентгеноскопия легких
- 3) массовый осмотр населения
- 4) компьютерная томография органов грудной клетки

ПОНЯТИЕ «КУМУЛЯЦИЯ» ОБОЗНАЧАЕТ

- 1) привыкание
- 2) накопление
- 3) повышенная чувствительность
- 4) зависимость

ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ

- 1) перевязочный материал
- 2) текстиль
- 3) эндоскопы
- 4) металлические инструменты

ПРИЧИНА КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН - НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

- 1) D
- 2) C
- 3) B
- 4) A

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ГУБЫ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) keratoplastica

- 2) coloplastica
- 3) cheiloplastica
- 4) gnathoplastica

СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
- 2) медицинское страхование граждан
- 3) государственное управление здравоохранением
- 4) муниципальное управление здравоохранением

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- 1) ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- 2) эхокардиографию
- 3) рентгенографию органов грудной клетки
- 4) фиброгастроскопию

ПРИЗНАКОМ НАРАСТАНИЯ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА С ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ

- 1) гиперемии
- 2) желтушности
- 3) бледности
- 4) цианоза

СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (ГРАДУСОВ)

- 1) 38
- 2) 40
- 3) 34
- 4) 28

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) Г
- 2) Д
- 3) В
- 4) Б

АНУРИЯ - ЭТО

- 1) преобладание ночного диуреза над дневным
- 2) болезненное мочеиспускание
- 3) отсутствие мочи в мочевом пузыре
- 4) увеличение суточного диуреза

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- 1) в школе
- 2) с первого года жизни ребёнка
- 3) до рождения ребёнка
- 4) в детском саду

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

- 1) кишечная палочка
- 2) микобактерии
- 3) кандидозная инфекция
- 4) бета-гемолитический стрептококк группы А

ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ _____ СЫПЬ

- 1) узелковая
- 2) везикулярная
- 3) геморрагическая
- 4) пустулезная

ПОБОЧНЫМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) олигурия
- 2) остеопороз
- 3) снижение артериального давления
- 4) затруднение дыхания

У ПАЦИЕНТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА

- 1) добутамина
- 2) фенилэфрина (мезатона)
- 3) эналаприла
- 4) дигоксина

ДЛЯ РЕЗАННОЙ РАНЫ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) зияние, ровные края
- 2) большая глубина, точечное входное отверстие
- 3) кровоизлияние вокруг, неровные края
- 4) зияние, размозжение краев

ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хроническая инфекция
- 2) солнечная радиация
- 3) генетическая предрасположенность
- 4) действие химических канцерогенов

ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА КАЛ ОКРАШИВАЕТСЯ В _____ ЦВЕТ

- 1) черный
- 2) зеленый
- 3) желтый
- 4) белый

РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ _____ ПЕРЧАТКИ

- 1) латексные
- 2) кольчужные
- 3) виниловые
- 4) нитриловые

СОЦИАЛЬНЫМ АСПЕКТОМ ПРОФИЛАКТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение амниоцентеза
- 2) санитарно-просветительская работа среди населения о факторах риска
- 3) кариотипирование
- 4) назначение генной терапии

ПРИ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ

- 1) хронический стресс
- 2) стаж работы
- 3) уровень образования
- 4) потребление алкоголя, питание

У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- 1) возбуждение
- 2) повышение артериального давления
- 3) головная боль
- 4) резкое снижение артериального давления

ИНСТРУМЕНТОМ, РАЗЪЕДИНЯЮЩИМ ТКАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) цапка бельевая
- 2) корнцанг
- 3) скальпель
- 4) зажим Бильрот

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ВЫРАБАТЫВАЕТ

- 1) альдостерон
- 2) гидрокортизон
- 3) тироксин
- 4) тестостерон

УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПУТЕМ

- 1) захоронения на территории больницы
- 2) вывоза на городскую свалку бытового мусора
- 3) сжигания в печах или захоронения на специализированных полигонах
- 4) складирования на хозяйственном дворе больницы

К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) дренирование раны
- 2) промывание раны антисептиком
- 3) первичная хирургическая обработка раны
- 4) удаление некротических тканей из раны

ПРИ ПОСТАНОВКЕ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЗОНД ВВОДЯТ В КИШЕЧНИК НА ГЛУБИНУ ___ СМ

- 1) 40-60
- 2) 5-10
- 3) 30-40
- 4) 10-15

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЛЮБОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- 1) не обязательно
- 2) зависит от конкретного случая
- 3) желательно
- 4) обязательно в письменном виде

ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТА

- 1) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
- 2) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
- 3) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом
- 4) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВДОХА (ВРЕМЯ ОДНОГО ВДОХА) ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (В СЕКУНДАХ)

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 7
- 4) 5

ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ _____ РАЗ(А) В ГОД

- 1) 4
- 2) 6

- 3) 1
- 4) 2

ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТ ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ

- 1) внутривенно
- 2) перорально
- 3) энтерально
- 4) ректально

К ПАТОГЕННЫМ ПАЛОЧКОВИДНЫМ БАКТЕРИЯМ, ВОЗБУДИТЕЛЯМ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) микобактерии
- 2) сальмонеллы
- 3) гонококки
- 4) стафилококки

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лактобактерии
- 2) бруцеллы
- 3) сальмонеллы
- 4) шигеллы

ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) раннее выявление заболеваний, их лечение, укрепление адаптационных возможностей организма
- 2) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
- 3) организация и проведение курсов профилактического лечения
- 4) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ _____ ЭМБОЛИЯ

- 1) бактериальная
- 2) воздушная
- 3) жировая
- 4) тканевая

ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ КОМЫ

- 1) уремической
- 2) мозговой
- 3) гипогликемической
- 4) гипергликемической

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА

- 1) обеззараживания

- 2) деконтаминации
- 3) дезинфекции
- 4) предстерилизационной очистки

ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ _____ ПУТЬ

- 1) пероральный
- 2) сублингвальный
- 3) внутримышечный
- 4) ингаляционный

ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОНИ

- 1) репродуцируются в живых клетках
- 2) имеют клеточное строение
- 3) имеют собственный обмен веществ
- 4) имеют полипептидную капсулу

ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 1) нарастание цианоза кожи, расширение зрачка
- 2) появление кашля, пульса на сонной артерии
- 3) улучшение цвета кожных покровов, сужение зрачка
- 4) восстановление сознания

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

- 1) инъекционный
- 2) ручку
- 3) тубик
- 4) Жане

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ НА

- 1) животе
- 2) спине с опущенным головным концом
- 3) боку
- 4) спине с опущенным ножным концом

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

- 1) ручку
- 2) тубик
- 3) Жане
- 4) инъекционный

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

- 1) заботу работодателя о каждом работнике
- 2) координацию усилий всех служб отрасли
- 3) личную ответственность индивидуума
- 4) ответственность семьи за здоровье каждого ее члена

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ ГЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ЧАСТО ОСНОВАНА НА

- 1) специальной диете, ограничивающей поступление неперерабатываемого субстрата
- 2) массивной антибиотикотерапии
- 3) облучении ультрафиолетовым излучением
- 4) отказе от вакцинации согласно национальному календарю прививок

МУКОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НАЗНАЧАЮТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) снижения вязкости мокроты
- 2) подавления кашлевого рефлекса
- 3) устранения бронхоспазма
- 4) борьбы с инфекционным агентом

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реабилитацией
- 2) лечением
- 3) диагностикой
- 4) профилактикой

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА СТРУКТУРНО ПРЕДСТАВЛЕНА

- 1) гинекологическим стационаром
- 2) неонатальным центром
- 3) родильным домом
- 4) женской консультацией

СПОСОБОМ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переливание крови
- 2) наложение сосудистого шва
- 3) наложение кровоостанавливающего жгута
- 4) перевязка сосуда

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
- 2) установка инсулиновой помпы

- 3) пребывание в дневном стационаре
- 4) работа школы для пациентов с сахарным диабетом

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ НУЖНО ПРИГОТОВИТЬ

- 1) стерильную банку
- 2) стерильную пробирку
- 3) сухую банку
- 4) 8 сухих банок

СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) разновидность деменции
- 2) аутоиммунное хроническое заболевание
- 3) острое инфекционное заболевание пожилого возраста
- 4) синдром, характеризующийся снижением физиологического резерва организма

ПОСЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) нуждаемость в санаторно-курортном лечении
- 2) профессиональная пригодность
- 3) группа инвалидности
- 4) группа здоровья

К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ

- 1) головная боль, снижение артериального давления
- 2) лихорадка, нарушение слуха
- 3) одышка, лёгочное кровотечение
- 4) повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА С КЛЕОВОЙ ПОВЯЗКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) деформация тканей
- 2) раздражение кожи
- 3) болевой синдром
- 4) выпадение волос

КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фуросемид
- 2) урегит
- 3) гипотиазид
- 4) спиронолактон

ПЕНОГАСИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) валидол, нитроглицерин
- 2) морфин, омнопон
- 3) антифомсилан, этиловый спирт
- 4) гипотиазид, фуросемид

В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) направить на УВЧ и сообщить хирургу
- 2) отменить последующие инъекции
- 3) обработать инфильтрат 5% раствором йода
- 4) довести до сведения врача

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ, РЕГУЛИРУЮТСЯ В

- 1) Программе развития здравоохранения
- 2) ФЗ «О кооперации»
- 3) Трудовом Кодексе РФ
- 4) ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Конституцией РФ

КОНТРОЛЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

- 1) селезенки
- 2) желудочно-кишечного тракта
- 3) печени
- 4) почек

ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ТКАНЯХ-

- 1) флегмона
- 2) атерома
- 3) гематома
- 4) абсцесс

ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НА _____ ДЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

- 1) 16-25
- 2) 3-5
- 3) 7-10
- 4) 11-15

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СОЗНАНИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕИЗВЕСТНЫМ ЯДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прием молока
- 2) вызов скорой помощи
- 3) прием сорбента
- 4) вызов рвоты

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) извлечения финансовой выгоды

- 2) медицинских показаний
- 3) свободного, осознанного и информированного согласия пациента
- 4) требования родственников

В ПЕРВОЙ СТАДИИ ЛИХОРАДКИ НЕОБХОДИМО

- 1) напоить больного горячим чаем, тепло укрыть
- 2) раскрыть больного, обтереть холодной водой
- 3) положить на лоб холодный компресс
- 4) поставить холодный компресс на крупные сосуды

ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) фертильным периодом
- 2) пубертатным периодом
- 3) юношеским периодом
- 4) пренатальным периодом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) употребление в пищу овощей
- 2) ежедневный приём контрастного душа
- 3) периодическая физическая активность
- 4) использование БАДов

ПРИ УКУСЕ НАСЕКОМОГО (ПЧЕЛЫ, ОСЫ) НЕОБХОДИМО

- 1) смазать место укуса растительным маслом или жирным кремом для снятия зуда
- 2) приложить тёплый компресс для снятия отёка и улучшения кровообращения в месте укуса
- 3) выдавить или вытащить жало пальцами, чтобы быстро удалить источник яда
- 4) удалить жало, приложить холодный компресс, обработать антисептиком

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- 1) наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации
- 2) наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела
- 3) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- 4) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) индивидуальная и групповая
- 2) только групповая

- 3) индивидуальная и популяционная
- 4) индивидуальная, групповая, популяционная

РАНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

- 1) повреждены мышцы и кости
- 2) в ней находится инородное тело
- 3) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
- 4) повреждены только кожа и подкожная клетчатка

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) эластичную компрессию
- 2) функциональный покой
- 3) обильное питье
- 4) физиотерапию

МЕНСТРУАЦИЯ - ЭТО

- 1) прикрепление плодного яйца к стенке матки
- 2) слияние ядер плодных клеток
- 3) выход яйцеклетки
- 4) кровяные выделения из половых путей женщины

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТУ ИЗМЕРЯЮТ

- 1) на руке, наиболее доступной медицинскому работнику
- 2) всегда на левой руке
- 3) на той руке, где артериальное давление выше
- 4) на той руке, где артериальное давление ниже

В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ

- 1) растительные жиры
- 2) сахар
- 3) поваренную соль
- 4) специи

ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА _____ МОКРОТА

- 1) слизистая
- 2) стекловидная
- 3) ржавая
- 4) розовая пеннистая

ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трупное окоченение
- 2) снижение температуры тела
- 3) трупные пятна

4) симптом кошачьего глаза

СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1) кисломолочных продуктов
- 2) овощей и фруктов
- 3) хлебобулочных изделий
- 4) рыбы и морепродуктов

СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

- 1) введение антибиотиков
- 2) обучение пациента принципам рационального питания
- 3) обеспечение приема жидкости
- 4) обеспечение гигиены кожи

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) экстрасистолия
- 2) аритмия
- 3) тахикардия
- 4) брадикардия

ПРИ АВИАЦИОННЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАТАСТРОФАХ ПРЕОБЛАДАЮТ

- 1) механические и ожоговые травмы
- 2) сочетанные и комбинированные поражения
- 3) психотравмы
- 4) поражения лёгких

ПРИЗНАКОМ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сужение зрачков
- 2) урежение пульса
- 3) экскурсия грудной клетки
- 4) появление пульса

ЦИАНОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) желтушность
- 2) синюшность
- 3) бледность
- 4) покраснение

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ И ИХ РАСТВОРАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) немедленная дезактивация отходов цитостатиков в месте их образования
- 2) использование средств индивидуальной защиты
- 3) заключение договора со специализированной организацией

4) хранение отходов до передачи специализированной организации без дезактивации

АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) отсутствием запаха
- 2) отсутствием фиксирующего действия на белки
- 3) высокой токсичностью
- 4) узким спектром действия

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) введение воздуховода
- 2) положение пострадавшего на пружинящем основании
- 3) наличие двух спасателей
- 4) положение пострадавшего на жестком основании

Герметизация одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов класса Б в местах их образования осуществляется после заполнения пакета на

- 1) 3/4
- 2) 2/3
- 3) 1/2
- 4) 1/3

Органом-мишенью для адренокортикотропного гормона (АКТГ) является

- 1) поджелудочная железа
- 2) яичники
- 3) щитовидная железа
- 4) кора надпочечников

Запись о проведении кварцевания процедурного кабинета делается

- 1) 1 раз в неделю
- 2) в конце рабочей смены
- 3) после каждого кварцевания
- 4) перед началом рабочей смены

При наличии кашля с мокротой пациента необходимо обеспечить

- 1) чашкой Петри
- 2) стерильным контейнером
- 3) индивидуальной плевательницей
- 4) сухим чистым контейнером

Гематурия, гипертонический и отечный синдромы у детей характерны для

- 1) гломерулонефрита

- 2) цистита
- 3) пиелонефрита
- 4) нефроптоза

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) повышение общей сопротивляемости организма
- 2) мытье рук
- 3) введение вакцин
- 4) проветривание помещений

СТРУКТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЙ ФАГОЦИТОЗУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) жгутик
- 2) спора
- 3) капсула
- 4) клеточная стенка

ИНФРАКРАСНЫЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ

- 1) металла
- 2) резины
- 3) стекла
- 4) полимеров

К МЕРОПРИЯТИЯМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) прием стакана жидкости
- 2) опорожнение мочевого пузыря
- 3) гигиеническая ванна
- 4) чистка зубов

ПРИЧИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ ПРИ ЖЁЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) избыточная концентрация желчи
- 2) избыточная секреция желчи
- 3) сниженная концентрация желчи
- 4) сниженная секреция желчи

КОДЕИН ОТНОСИТСЯ К

- 1) местным анестетикам
- 2) ненаркотическим анальгетикам
- 3) ноотропам
- 4) противокашлевым средствам

В КОМПЕТЕНЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ ВХОДИТ

- 1) наложение асептической повязки
- 2) применение грелки
- 3) обезболивание места ушиба
- 4) наложение давящей повязки, местно холод

ТРОМБОФЛЕБИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ _____ ИНЪЕКЦИИ

- 1) подкожной
- 2) внутривенной
- 3) внутримышечной
- 4) накожной

ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ СЧИТАЕТСЯ

- 1) использование спермицидов
- 2) продолжающаяся лактация
- 3) прием комбинированных оральных контрацептивов
- 4) прерванный половой акт

ПЕРИОДОМ НАИБОЛЬШЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭМБРИОНА К ТЕРАТОГЕНАМ ЯВЛЯЕТСЯ _____ НЕДЕЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- 1) 25-27
- 2) 12-14
- 3) 1-2
- 4) 3-8

ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) склередема
- 2) тризм
- 3) стридор
- 4) лануго

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

- 1) гепарина
- 2) адреналина
- 3) каптоприла
- 4) преднизолона

УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) дератизация
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) дезинсекция

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) сахарный диабет, ожирение
- 2) гипохолестеринемия, гепатоз
- 3) пониженная масса тела, гипотония
- 4) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

- 1) липопротеидов высокой плотности
- 2) липопротеидов низкой плотности
- 3) билирубина
- 4) креатинина

ПРИЗНАКОМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фосфатурия
- 2) пиурия
- 3) бактериурия
- 4) глюкозурия

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) соблюдение медицинской сестрой этико-деонтологических норм поведения
- 2) организация свиданий с родственниками в любое время дня
- 3) соблюдение индивидуального для каждого пациента распорядка дня
- 4) поддержание чистоты в помещениях

ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДИФТЕРИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) антитоксическая сыворотка
- 2) дифтерийный анатоксин
- 3) иммуноглобулин
- 4) АКДС вакцина

ШИРИНА БИНТА ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПОВЯЗКИ НА ГОЛОВУ СОСТАВЛЯЕТ (СМ)

- 1) 10-12
- 2) 5-7
- 3) 13-16
- 4) 8-10

РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гидроперикард
- 2) увеличение живота
- 3) гидроторакс
- 4) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТА СТАВИТСЯ ОТМЕТКА

- 1) в листе назначений
- 2) в температурном листе
- 3) на титульном листе медицинской карты стационарного больного

4) на экстренном извещении

**РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ -
ФУНКЦИЯ СЕМЬИ**

- 1) рекреативная
- 2) репродуктивная
- 3) хозяйственно-экономическая
- 4) воспитательная

**КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ _____
МЕТОДА**

- 1) бактериологического
- 2) технического
- 3) визуального
- 4) механического

**С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
ПРОВОДИТСЯ**

- 1) работа в эпидемическом очаге
- 2) флюорографическое обследование прикрепленного контингента населения
- 3) организация и проведение вакцинации на участке
- 4) организация и проведение школ здоровья

ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА НЕОБХОДИМО

- 1) ввести иглу параллельно поверхности кожи
- 2) принять пищу через час после инъекции
- 3) не дожидаться полного испарения спирта
- 4) постоянно менять места инъекций

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 40 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРОХОДИТЬ**

- 1) каждые два года
- 2) по рекомендации врача
- 3) раз в три месяца
- 4) ежегодно

**К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА**

- 1) устранение причин и условий возникновения заболеваний
- 2) организацию производства
- 3) охрану труда работодателем
- 4) систему средств массовой информации

**МУТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПЕРЕСТРОЙКАМИ ХРОМОСОМ
(ДЕЛЕЦИИ, ИНВЕРСИИ, ТРАНСЛОКАЦИИ), НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) цитоплазматическими
- 2) генными
- 3) хромосомными
- 4) геномными

ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- 1) увеличении грудных желез в периоде полового созревания
- 2) формировании вкусовых ощущений
- 3) снижении порога болевой чувствительности
- 4) формировании вторичных половых признаков

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ОСТЕОАРТРОЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) первого пястно-запястного сустава
- 2) грудного отдела позвоночника
- 3) дистальных и проксимальных межфаланговых суставов
- 4) тазобедренных и коленных суставов

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) солнечный удар
- 2) злокачественная гипертермия
- 3) тепловое истощение
- 4) тепловой удар

ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРИ

- 1) вырабатывается напряженный стойкий
- 2) сохраняется в течение 5-10 лет
- 3) зависит от тяжести течения кори
- 4) сохраняется только при отсутствии контакта с новым больным

НА ГИГИЕНИЧЕСКОМ УРОВНЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ РУК

- 1) при бытовом загрязнении рук
- 2) после посещения туалета
- 3) перед и после приема пищи
- 4) перед проведением инъекций

К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ

- 1) с хронической патологией в стадии компенсации
- 2) здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции
- 3) из группы риска без признаков заболевания
- 4) здоровые, а также сотягощенным биологическим анамнезом

САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) механический
- 2) химический
- 3) бактериологический
- 4) физический

ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

- 1) проведения диагностических мероприятий
- 2) облегчения самочувствия
- 3) проведения гигиенических мероприятий
- 4) физиологического сна

ПРИ ГЕМОТРАНСФУЗИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) уровень глюкозы
- 2) гематокрит
- 3) группа крови
- 4) СОЭ

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) ацетилцистеин (ацц)
- 2) карбоцистеин (флуифорт)
- 3) амброксол (лазолван)
- 4) преноксдиазин (либексин)

ВОЗМОЖНЫМ МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) липодистрофия
- 2) некроз
- 3) тромбофлебит
- 4) инфильтрат

ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) тяжести состояния пациента
- 2) наличия боли в грудной клетке
- 3) степени одышки
- 4) расположения очага в легких

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ С ПОМОЩЬЮ _____ ПОВЯЗКИ

- 1) пращевидной
- 2) черепашьей
- 3) Т-образной
- 4) колосовидной

ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПАЦИЕНТУ

- 1) промыть желудок

- 2) поставить масляную клизму
- 3) положить грелку на живот
- 4) положить пузырь со льдом на живот

К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО

- 1) считать каждого пациента потенциально инфицированным
- 2) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций
- 3) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
- 4) проведения обязательных медицинских осмотров

В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧАЮТ _____ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ ВЛАГАЛИЩНОЙ ФЛОРЫ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 3

СОВОКУПНОСТЬЮ ЗНАНИЙ О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) этиология
- 2) патогенез
- 3) саногенез
- 4) нозология

ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В НАБЛЮДАЕТСЯ У ВРАЧА

- 1) гастроэнтеролога
- 2) педиатра
- 3) инфекциониста
- 4) терапевта

СВОЙСТВОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бактериостатическое
- 2) бактерицидное
- 3) вирулицидное
- 4) фунгицидное

ЗАДЕРЖКОЙ СТУЛА НАЗЫВАЮТ ЕГО ОТСУТСТВИЕ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ

- 1) 12
- 2) 36
- 3) 48
- 4) 24

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УБОРКИ В ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ (КРОМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ) ПРОВОДЯТ ОДИН РАЗ В ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

- 1) 14
- 2) 40
- 3) 7
- 4) 30

ПРИ ПЕРВИЧНОМ (НЕ БОЛЕЕ 2-Х МИНУТ) ОСМОТРЕ ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) состояния, угрожающие жизни
- 2) время с момента травмы
- 3) подсчитать пульс, частоту дыхания
- 4) наличие сознания и признаков жизни у пострадавшего

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в 2 дня
- 2) 1 раз в 7 дней
- 3) не менее 1 раз в день
- 4) не менее 2 раз в день

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) атенолол
- 2) нифедипин
- 3) унитиол
- 4) пропранолон

ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС – КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В РАБОЧИЙ РАСТВОР

- 1) в любое время
- 2) до начала использования
- 3) по окончании использования
- 4) в процессе использования

СОВОКУПНОСТЬ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ЭТО

- 1) деонтология
- 2) сестринский процесс
- 3) медицинская этика
- 4) сестринское дело

ВОСПАЛЕНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) колит
- 2) энтерит
- 3) дуоденит

4) проктит

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ

- 1) спирометрия
- 2) тонометрия
- 3) барометрия
- 4) анемометрия

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ В СЛУЧАЕ

- 1) осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ
- 2) осмотра работника всеми врачами-специалистами
- 3) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований
- 4) при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРНОЙ ПРОБКИ ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА НЕОБХОДИМО

- 1) провести хирургическую операцию на ухе
- 2) провести промывание наружного слухового прохода с использованием шприца Жане
- 3) извлечь серную пробку с помощью специального крючка
- 4) провести продувание наружного слухового прохода воздухом

ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) острой печеночной недостаточности
- 2) отравлении угарным газом
- 3) острой массивной кровопотере
- 4) острой почечной недостаточности

ПОСТНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – ЭТО ДИАГНОСТИКА

- 1) после рождения ребенка (на любом этапе жизни)
- 2) до имплантации эмбриона при ЭКО
- 3) во время родов
- 4) только в пожилом возрасте

ПЕРВЫМ ДЕЙСТВИЕМ МЕДСЕСТРЫ ПО ПЛАНУ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ БУДЕТ

- 1) обучение пациента самоуходу в домашних условиях
- 2) наблюдение за состоянием кожных покровов
- 3) подготовка постели к приему пациента
- 4) термометрия

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

- 1) неподвижность пациента
- 2) питьевой режим
- 3) правильное питание
- 4) смена положения тела

**ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ _____
% НОВОКАИН**

- 1) 1
- 2) 0,5
- 3) 5
- 4) 2

**В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА, УКАЗЫВАЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ О**

- 1) массе тела
- 2) группе крови
- 3) прохождении диспансеризации
- 4) семейном положении

ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА

- 1) резиновое судно
- 2) резиновый катетер
- 3) мочеприемник, абсорбирующее белье
- 4) грушевидный баллон

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) грибковая инфекция
- 2) бета-гемолитический стрептококк
- 3) микобактерии
- 4) кишечная палочка

ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) дорсопатия
- 2) дизурия
- 3) дислипидемия
- 4) анемия

К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ОТНОСЯТ

- 1) курение
- 2) гиперхолестеринемию
- 3) артериальную гипертензию
- 4) пол

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ НА ГРУППЫ, ИСХОДЯ ИЗ НУЖДАЕМОСТИ В

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ И ОДНОРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ЛЕЧЕБНЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЭВАКУАЦИОННЫХ) В КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) медицинской эвакуацией
- 2) медицинской сортировкой
- 3) оказанием медицинской помощи
- 4) транспортировкой

СМЕНА ЛЕЙКОПЛАСТЫРНОЙ ПОВЯЗКИ, ФИКСИРУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- 1) 3 раза в день
- 2) ежечасно
- 3) еженедельно
- 4) по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки

СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ В ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, УХУДШАЮЩИМ ГАЗООБМЕН У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение количества альвеол и эластичности лёгочной ткани
- 2) увеличение площади альвеолярной поверхности
- 3) увеличение притока крови к лёгким
- 4) повышение концентрации кислорода в альвеолах

ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ СЧИТАЕТСЯ

- 1) гормонотерапия
- 2) инфицирование вирусом папилломы человека
- 3) частая смена половых партнеров
- 4) раннее начало половой жизни

М К ПРЕКРАЩЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) расширение зрачков
- 2) отсутствие признаков эффективного кровообращения
- 3) появление признаков биологической смерти
- 4) отсутствие самостоятельного дыхания

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- 1) внутривенное введение раствора сульфата магния
- 2) придание вертикального положения тела
- 3) введение назогастрального зонда
- 4) горизонтальное положение с приподнятым ножным концом

КАРМАННЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С

- 1) ринитом
- 2) отитом
- 3) гайморитом

4) бронхиальной астмой

ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ ____ В МИНУТУ

- 1) 61 — 80
- 2) 40 — 60
- 3) 81 — 100
- 4) 20 — 39

К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) парацетамол
- 2) протамина сульфат
- 3) дроперидол
- 4) умифеновир (арбидол)

КРУЖКУ ЭСМАРХА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ _____ КЛИЗМЫ

- 1) сифонной
- 2) очистительной
- 3) масляной
- 4) лекарственной

МЕЛЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ

- 1) язвы 12-перстной кишки
- 2) вен пищевода
- 3) вен прямой кишки
- 4) мочевого пузыря

РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО (ГРАДУСОВ)

- 1) 49
- 2) 24
- 3) 40
- 4) 37

ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖЕТ СТАТЬ

- 1) наличие гипертонической болезни
- 2) острая хирургическая патология
- 3) острое инфекционное заболевание у ребенка
- 4) близкородственный брак супругов

ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дыхание с затрудненным вдохом
- 2) дыхание с затрудненным выдохом
- 3) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- 4) удушье

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) флюорографией
- 2) маммографией
- 3) дуктографией
- 4) биопсией молочной железы

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР И МАНИПУЛЯЦИЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ РУК

- 1) после всех процедур
- 2) после нескольких процедур
- 3) перед началом и после окончания процедуры
- 4) перед процедурой

ХОЛОД НА МЕСТО ТРАВМЫ ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА НАКЛАДЫВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ____ СУТОК

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

СРЕДИ ПРИЧИН ВТОРИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЛИДИРУЕТ ПАТОЛОГИЯ

- 1) почек
- 2) щитовидной железы
- 3) надпочечников
- 4) гипофиза

ВЕЛИЧИНА ШОКОВОГО ИНДЕКСА ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) 0,1
- 2) 0,7
- 3) 1,0
- 4) 0,3

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 2 атм – 132°C – 20 минут
- 2) 1,1 атм – 120°C – 45 минут
- 3) 160°C – 120 минут
- 4) 180°C – 60 минут

САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) физический
- 2) химический

- 3) биологический
- 4) бактериологический

ПРИ ПОСТАНОВКЕ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ЗАПРЕЩЕНО УЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ, ЕСЛИ ОКРАШИВАНИЕ НАСТУПИЛО

- 1) сразу после постановки
- 2) позже одной минуты
- 3) через 30 секунд
- 4) через 20 секунд

К МОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) возраст
- 2) отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям
- 3) мужской пол
- 4) сахарный диабет

МЕХАНИЗМОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) реактивность
- 2) профилактика
- 3) этиология
- 4) патогенез

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «ГИПЕРГЛИКЕМИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК _____ И БОЛЕЕ (ММОЛЬ/Л)

- 1) 5
- 2) 6,1
- 3) 5,5
- 4) 5,8

ПРИ ВИДОВОЙ УКЛАДКЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ КОРОБКУ УКЛАДЫВАЮТ

- 1) ножницы, металлические шпатели
- 2) шовный материал, иглодержатели
- 3) пинцеты, зонды
- 4) перевязочный материал

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- 1) шейки матки
- 2) прямой кишки
- 3) тела матки
- 4) молочной железы

К СЕРДЕЧНЫМ ГЛИКОЗИДАМ ОТНОСЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) из группы блокаторы калиевых каналов

- 2) нитроглицерина короткого и пролонгированного действия
- 3) растительного происхождения, которые избирательно повышают силу сердечных сокращений
- 4) из группы блокаторы кальциевых каналов

ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ

- 1) на складе при комнатной температуре
- 2) в холодильнике
- 3) в термостате
- 4) в барокамере

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КАЖДЫЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 24
- 4) 12

ВТОРЫМ СЛОЕМ ВЛАЖНОГО СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) влажная салфетка из нескольких слоёв марли
- 2) вата
- 3) водонепроницаемая бумага
- 4) укрепляющий бинт

МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ДИСКИ СОСТОЯТ ИЗ _____ ТКАНИ

- 1) жировой
- 2) хрящевой
- 3) костной
- 4) железистой

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН) ОТНОСИТСЯ К

- 1) противоглистным средствам
- 2) гормональным препаратам
- 3) гипотензивным средствам
- 4) ненаркотическим анальгетикам

НЕДОСТАТОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СУТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ МЕНЕЕ _____ ГРАММОВ

- 1) 200
- 2) 400
- 3) 800
- 4) 600

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) снижением эластичности

- 2) увеличением тургора
- 3) повышением влажности
- 4) снижением пигментации

НАИБОЛЬШИЕ ПО РАЗМЕРУ ТЕЛА ПОЗВОНКА ИМЕЕТ _____ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

- 1) грудной
- 2) крестцовый
- 3) шейный
- 4) поясничный

ОСТАНОВКА КРОВотоКА В СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА С АГРЕГАЦИЕЙ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) кровотечением
- 2) ишемией
- 3) стазом
- 4) тромбозом

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

- 1) станцию переливания крови
- 2) Минздрав России
- 3) службу МЧС
- 4) отделение полиции

РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) патологической подвижностью
- 2) крепитацией
- 3) зиянием краев
- 4) флюктуацией

ПРАВООЕ ПРЕДСЕРДИЕ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА _____ КЛАПАН

- 1) трикуспидальный
- 2) карманный
- 3) митральный
- 4) полулунный

КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВЫГЛЯДЯТ

- 1) гиперемированными
- 2) бледными
- 3) цианотичными
- 4) желтушными

К ГРЯЗНОЙ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

- 1) комплектации
- 2) упаковки
- 3) очистки
- 4) загрузки

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

- 1) врачу-неврологу
- 2) врачу-оториноларингологу
- 3) врачу-офтальмологу
- 4) врачу-проктологу

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

- 1) приема мясной пищи
- 2) занятий физкультурой
- 3) чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей
- 4) беременности

ПРАВО ГРАЖДАН РФ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ

- 1) Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 2) Трудовым Кодексом РФ
- 3) Гражданским кодексом РФ
- 4) Программой развития здравоохранения

ПРИ ГЕМОТРАНСФУЗИИ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА ПРОВОДИТСЯ ____ РАЗ (А)

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТОТА ПУЛЬСА СОСТАВЛЯЕТ ____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1) 55 – 60
- 2) 100 – 120
- 3) 85 – 90
- 4) 60 – 80

ЧАСТОТА КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ _____ В МИНУТУ

- 1) 40-50
- 2) 100-120
- 3) 20-30
- 4) 130-150

ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСТДИПЛОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

- 1) ординатура, аспирантура
- 2) повышение квалификации, профессиональная переподготовка
- 3) высшее образование (бакалавриат)
- 4) докторантура

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПАЦИЕНТА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) фамилия врача, подпись заведующего отделением
- 2) ФИО пациента, паспортные данные, адрес проживания
- 3) полис обязательного медицинского страхования
- 4) дата обращения, диагноз заболевания

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) анурией
- 2) дизурией
- 3) диурезом
- 4) ишурией

ГЕПАРИН ВВОДИТСЯ

- 1) подкожно, внутривенно
- 2) внутрикочно, накожно
- 3) внутривенно, внутриартериально
- 4) перорально, ректально

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) газоотводную трубку, грушевидный баллон с наконечником, воду 500 мл
- 2) грушевидный баллон, судно, вазелиновое масло
- 3) кружку Эсмарха, вазелин, судно, воду 1-1,5 л
- 4) 2 толстых зонда, воронку, вазелин, воду 10-15 л

ПРИ ИСТИННОМ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) горизонтальном положении с приподнятым головным концом
- 2) горизонтальном положении с приподнятым ножным концом
- 3) положении на правом боку
- 4) положении ортопноэ

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) оксигенация крови
- 2) профилактика гипотермии
- 3) восстановление спонтанного сердцебиения
- 4) поддержание кровообращения и дыхания до восстановления спонтанной сердечной деятельности

ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) АДС – М
- 2) туберкулин
- 3) АКДС
- 4) БЦЖ

ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИФфуЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МЕНЯЕТСЯ В СТОРОНУ

- 1) увеличения образования йода
- 2) уменьшения выработки тиреоидных гормонов
- 3) увеличения выработки тиреотропного гормона
- 4) увеличения выработки тиреоидных гормонов

ГЛАВНЫМИ СОКРАТИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) нейрофибриллы
- 2) эластические волокна
- 3) тонофибриллы
- 4) миофибриллы

ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ ПАЦИЕНТУ

- 1) 1 сухую банку
- 2) 8 сухих банок
- 3) 2 стерильных банки
- 4) 1 сухую пробирку

БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- 1) повышается
- 2) снижается
- 3) отсутствует
- 4) не изменяется

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОГРАФИИ ЖЕЛУДКА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) за 3 дня до исследования исключить железосодержащие продукты
- 2) вечером и утром очистительная клизма
- 3) вечером легкий ужин, утром голодание
- 4) утром сифонная клизма

МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О

- 1) ограничении двигательной активности
- 2) наблюдении у эндокринолога
- 3) приеме таблетированных витаминов

4) рациональном питании населения

ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) сидя с наклоном головы вперед
- 2) лежа на боку с согнутыми в коленях ногами
- 3) сидя с упором на руки
- 4) лежа с приподнятыми ногами

ПОСЕВЫ С РУК ПЕРСОНАЛА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА БЕРУТСЯ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 1 раз в день
- 4) 2 раза в день

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ, ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ПОСЛЕ ЦИТОСТАТИКОВ НЕОБХОДИМО

- 1) собрать в емкость и отправить в мусоросборник
- 2) собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отправить на сжигание
- 3) выбросить в мусорный бак
- 4) залить дезинфектантом

К ОДНОМУ ИЗ СИМПТОМОВ ТРИХОМОНИАЗА У ЖЕНЩИН ОТНОСЯТ _____ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

- 1) гнойные
- 2) пенистые с неприятным запахом
- 3) кровянистые
- 4) творожистые

ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1) 1 раз в 7 дней
- 2) каждый час
- 3) каждые 12 часов
- 4) ежедневно

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ

- 1) тонометр
- 2) сантиметровая лента
- 3) ростомер
- 4) весы

АНТРОПОГЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ СВЯЗАН ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С

- 1) генетической предрасположенностью
- 2) действием естественных радионуклидов в почве

- 3) загрязнением окружающей среды промышленными отходами
- 4) космическим излучением

ПРИЗНАКОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛОРДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) чрезмерный изгиб позвоночника назад
- 2) чрезмерный изгиб позвоночника вперед
- 3) искривление позвоночника вправо
- 4) искривление позвоночника влево

ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- 2) появление отеков
- 3) недержание мочи
- 4) острая задержка мочи более 6-ти часов в послеоперационном периоде

ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) определение основных биохимических показателей крови
- 2) выявление проблем пациента
- 3) мониторинг жизненно важных функций
- 4) выполнение мероприятий гигиенического ухода

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- 1) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)
- 2) медицинская карта стационарного больного ф003/у
- 3) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
- 4) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

КОЛИЧЕСТВО КАПЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ГЛАЗА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 4-6
- 2) 1-2
- 3) 8-10
- 4) 6-8

ПАТОГЕНЕЗОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) причина возникновения
- 2) механизм развития
- 3) метод диагностики
- 4) исход заболевания

ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) количество выдохов за 1 минуту
- 2) количество вдохов за 1 минуту
- 3) чередование вдоха и выдоха

4) количество циклов вдох-выдох за 1 минуту

ВЛАЖНОСТЬ КОЖИ, СОСТОЯНИЕ ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ОЦЕНИВАЮТ МЕТОДОМ

- 1) пальпации
- 2) перкуссии
- 3) аускультации
- 4) антропометрии

МЕТОДОМ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) осциллометрия
- 2) флоуметрия
- 3) пикфлоуметрия
- 4) пульсоксиметрия

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОСМОТРУ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПРИМЕНЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реабилитацией
- 2) профилактикой
- 3) диспансеризацией
- 4) диагностикой

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОХОДИТ В

- 1) процедурных кабинетов
- 2) дезинфекционно-моечных отделениях
- 3) лечебных отделениях или централизованном стерилизационном отделении
- 4) операционных блоках

К ДОКУМЕНТАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ЖУРНАЛ

- 1) учета времени работы автоклава
- 2) учета поступления больных
- 3) учета температуры холодильника
- 4) приема и выдачи инструментария, материалов

ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ _____ ПЕРИОДОМ

- 1) фертильным
- 2) пубертатным
- 3) юношеским
- 4) пренатальным

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ГЕМОТРАНСФУЗИИ - ПЕРЕЛИВАТЬ КРОВЬ

- 1) при любой минимальной необходимости

- 2) по настойчивому желанию пациента
- 3) в максимально возможном объеме
- 4) по жизненным показаниям

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рвота
- 2) учащенное мочеиспускание
- 3) боль
- 4) страх перед операцией

ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

- 1) удаление бытового загрязнения
- 2) обеспечение кратковременной стерильности
- 3) профилактика профессионального заражения
- 4) создание продолжительной стерильности

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНА БЫТЬ (°C)

- 1) 18-19
- 2) 22-24
- 3) 27-29
- 4) 25-26

ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАСТВОР АЗОПИРАМА ХРАНИТСЯ _____ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) микроэлементы
- 2) растительную клетчатку
- 3) витамины группы В
- 4) углеводы

НЕСТЕРИЛЬНАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) помещения приема, разборки и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
- 2) приемное помещение, моечную, упаковочную, вспомогательные помещения
- 3) помещения приема и дезинфекции изделий медицинского назначения
- 4) помещения приема, разборки и санпропускник для персонала

К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) измерение давления
- 2) выявление проблем пациента
- 3) анамнез заболевания
- 4) анамнез жизни

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ -СКЛЕРОЗ (SCLEROSIS) УКАЗЫВАЕТ НА _____ ТКАНИ

- 1) некроз
- 2) размягчение
- 3) уплотнение
- 4) замещение

ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ НАЗНАЧАЕТСЯ _____ РЕЖИМ

- 1) строгий постельный
- 2) постельный
- 3) общий
- 4) полупостельный

ВЫПАДЕНИЕ ПЕТЕЛЬ КИШОК, ИСТЕЧЕНИЕ ИЗ РАНЫ ЖЕЛЧИ, МОЧИ, ВЫДЕЛЕНИЕ КАЛА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- 1) проникающей раны живота
- 2) непроникающей раны живота
- 3) закрытой травмы живота
- 4) касательной раны брюшной стенки

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТОВ ОСМАТРИВАЮТ НА НАЛИЧИЕ

- 1) энтеробиоза
- 2) папилломатоза
- 3) фурункулеза
- 4) педикулеза

АВИТАМИНОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) состояние, при котором полностью истощены витаминные ресурсы организма
- 2) резкое, но не полное снижение запасов витаминов в организме
- 3) повышенный уровень витаминов
- 4) нормальный уровень витаминов

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ ОБРАЗУЮТ

- 1) вертлужная впадина тазовой кости и головка бедренной кости
- 2) крестец и подвздошные кости
- 3) лобковый симфиз и седалищные кости
- 4) бедренная и большеберцовая кости

ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В АВТОКЛАВЕ ПРИ

КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) физические параметры (давление, время)
- 2) биологические индикаторы
- 3) термохимические индикаторы
- 4) максимальные термометры

ПРИЧИНОЙ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение ограничений в питании
- 2) передозировка инсулина
- 3) пропуск инъекций инсулина
- 4) самостоятельная отмена лекарств

ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ВВОДЯТ НА _____ СМ

- 1) 15-20
- 2) 5-10
- 3) 20-30
- 4) 30-40

ИСТОЧНИКОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ Ω -6 И Ω -3, УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ ОБМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сливочное масло
- 2) растительное масло
- 3) сметана повышенной жирности
- 4) свиное сало

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА (ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) С МЕДИЦИНСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОФОРМЛЕННЫМИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) только путем устного информирования
- 2) путем предоставления копии на бумажном носителе
- 3) по решению суда
- 4) через публичный доступ в интернете

САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МИКРООРГАНИЗМ ВОЗДУХА

- 1) протей
- 2) золотистый стафилококк
- 3) энтерококк
- 4) кишечная палочка

КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) отрыжка тухлым, рвота
- 2) боль в правом подреберье, горечь во рту
- 3) асцит, сосудистые звездочки
- 4) рвота «кофейной гущей», мелена

ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ

- 1) частота пульса
- 2) частота дыхания
- 3) возраст
- 4) уровень глюкозы

ПРИ СБОРЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) снимать ручную иглу со шприца после его использования
- 2) использовать твердую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария
- 3) устанавливать одноразовые емкости для сбора медицинских отходов на расстоянии более 1 метра от нагревательных приборов.
- 4) использовать средства индивидуальной защиты

ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) цетрин
- 2) хлоропирамин (супрастин)
- 3) глюкоза
- 4) эпинефрин

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- 1) фенобарбитал
- 2) морфин
- 3) раствор аммиака
- 4) налоксон

СТРОГИЙ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЗАПРЕТ

- 1) любых активных движений, включая повороты
- 2) приема пищи в постели сидя
- 3) перемещения по палате
- 4) посещения туалета за пределами палаты

В РЕЗУЛЬТАТЕ КРИТИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ У БОЛЬНОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1) ишемический инсульт
- 2) острая сосудистая недостаточность
- 3) обморок
- 4) острая левожелудочковая недостаточность

ФЕНТАНИЛ ОТНОСИТСЯ К

- 1) ненаркотическим анальгетикам

- 2) психостимуляторам
- 3) наркотическим анальгетикам
- 4) аналептикам

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

- 1) диагноз болезни пациента
- 2) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни
- 3) количество препарата
- 4) путь введения препарата

НЕОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ ЧЕЛОВЕКУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ В НЕЙ - ЭТО

- 1) злоупотребление служебным положением
- 2) должностной подлог
- 3) преступление
- 4) взяточничество

ПОД «ХОЛОДНОЙ» СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ СТЕРИЛИЗАЦИЮ

- 1) замораживанием
- 2) кипячением
- 3) ультрафиолетовым излучением
- 4) растворами химических веществ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в день
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 2 раза в месяц

ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА (ТЯГА К МЕЛУ, ЗАПАХУ ПОБЕЛКИ) ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) фолиевой кислоты
- 2) железа
- 3) витамина B12
- 4) витамина C

АНТИТЕЛАМИ ПЕРВИЧНОГО ОТВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА

- 1) M
- 2) G
- 3) A
- 4) E

ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) некрозом
- 2) лизисом
- 3) гемолизом
- 4) апоптозом

КАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА

- 1) копрологическое исследование
- 2) бактериологическое исследование
- 3) простейшие
- 4) яйца гельминтов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ ДИЕТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

- 1) избыточное содержание углеводов
- 2) повышенное количество белка
- 3) ограничение соли и сахара
- 4) механическое и химическое щажение

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ЦИТОСТАТИКА НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ

- 1) промыть спиртом
- 2) протереть влажной одноразовой салфеткой
- 3) промыть струей воды и зарегистрировать аварию
- 4) промыть перманганатом калия

ПЕРВИЧНАЯ МОЧА ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) реабсорбции
- 2) фильтрации
- 3) концентрации
- 4) секреции

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
- 2) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности
- 3) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов
- 4) устранение психогенного компонента родовой боли

ПНЕВМОТОРАКСОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) иммобилизация грудной клетки
- 2) открытое ранение живота
- 3) скопление воздуха в плевральной полости
- 4) затрудненное дыхание

НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ТКАНЯХ ПРИ НЕДОСТАТКЕ В

ОРГАНИЗМЕ ГОРМОНА

- 1) поджелудочной железы
- 2) паращитовидных желез
- 3) надпочечников
- 4) тимуса

ТИПИЧНЫМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) астматический
- 2) ангинозный
- 3) безболевой
- 4) абдоминальный

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) проведение вакцинации против гриппа
- 2) своевременное лечение бронхитов
- 3) применение иммуностимуляторов
- 4) осуществление закаливающих процедур

ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО) КОНЪЮНКТИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аллергия
- 2) травма
- 3) гиповитаминоз
- 4) инфекция

СВОЙСТВОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УНИЧТОЖЕНИЕ ГРИБОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фунгицидное
- 2) бактерицидное
- 3) вирулицидное
- 4) бактериостатическое

НА ЯРЛЫКАХ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК ПРИ ВСКРЫТИИ УКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) должность
- 2) отделение
- 3) фамилия
- 4) время

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В ПИЩЕ _____ ГРАММ В СУТКИ

- 1) ≤ 3
- 2) ≤ 2
- 3) ≤ 7
- 4) ≤ 5

ПРОЛАКТИН СИНТЕЗИРУЕТСЯ В

- 1) эпифизе
- 2) щитовидной железе
- 3) нейрогипофизе
- 4) аденогипофизе

У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ____ (В МИН)

- 1) 120
- 2) 80
- 3) 100
- 4) 60

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) лежа на спине
- 2) лежа на здоровом боку
- 3) сидя
- 4) лежа на больном боку

ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В МОКРОТЕ ПРИСУТСТВУЮТ

- 1) пневмококки
- 2) базофилы
- 3) микобактерии
- 4) атипичные клетки

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО

- 1) приемом жирной пищи
- 2) острой респираторной вирусной инфекцией
- 3) приемом углеводов
- 4) переохлаждение

ПЕРЕЛИВАНИЕ НЕСОВМЕСТИМОЙ КРОВИ ПРИВОДИТ К _____ ШОКУ

- 1) гемолитическому
- 2) геморрагическому
- 3) гиповолемическому
- 4) инфекционно-токсическому

В ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ВХОДИТ

- 1) иссечение краев раны
- 2) обеспечение физического метода охлаждения
- 3) помещение пациента в общую палату
- 4) организация индивидуального медицинского поста

ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (КГ/М²)

- 1) 36
- 2) 18
- 3) 25
- 4) 41

ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К

- 1) заболеваниям поджелудочной железы
- 2) повышению риска заболеваний надпочечников
- 3) повышению риска заболеваний щитовидной железы
- 4) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

СРАЗУ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ТОКА НЕОБХОДИМО

- 1) дать тёплое питьё при сохранённом сознании и глотательном рефлексе
- 2) оценить наличие дыхания и пульса, при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию
- 3) уложить в положение на боку и ждать приезда бригады скорой медицинской помощи
- 4) наложить асептическую повязку на ожоги

РВОТА «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) панкреатита
- 2) желудочного кровотечения
- 3) острой кишечной инфекции
- 4) холецистита

ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В

- 1) стоматологии
- 2) хирургии
- 3) гинекологии
- 4) акушерстве

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

- 1) уложить пострадавшего на спину
- 2) уложить пострадавшего на левый бок
- 3) дать обезболивающее
- 4) обеспечить неподвижность пострадавшего

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

- 1) уложить на левый бок
- 2) обезболить
- 3) вызвать скорую помощь, положение пострадавшего не менять
- 4) уложить на спину

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение температуры кожи
- 2) боль при пальпации
- 3) втянутый сосок
- 4) крепитация

БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эналаприл
- 2) лозартан
- 3) метопролол
- 4) верапамил

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ОТНОСЯТСЯ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА

- 1) Г
- 2) В
- 3) Б
- 4) А

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) снижению приспособительных и компенсаторных реакций
- 2) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- 3) поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне
- 4) уменьшению потребности в пище

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ АБСОЛЮТНАЯ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИНСУЛИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сахарный диабет
- 2) несахарный диабет
- 3) гипертиреоз
- 4) подагра

В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- 1) введение контактным иммуноглобулина
- 2) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
- 3) ежедневный осмотр слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных
- 4) бактериологическое обследование контактных

ШПРИЦ ЖАНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- 1) подкожных инъекций
- 2) промывания полостей
- 3) внутривенных инъекций
- 4) внутримышечных инъекций

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К
_____ ПРОФИЛАКТИКЕ**

- 1) медицинской
- 2) третичной
- 3) вторичной
- 4) первичной

НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ

- 1) ладонью, сжатой в кулак
- 2) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях
- 3) основанием ладони, не сгибая рук в локтях
- 4) запястьями, умеренно согнув руки в локтях

**НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) порок сердца
- 2) атеросклероз
- 3) пиелонефрит
- 4) панкреатит

ПРОТОК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ В

- 1) мягком небе
- 2) подъязычном сосочке
- 3) преддверие рта
- 4) носослезном канале

**РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ирригоскопией
- 2) экскреторной урографией
- 3) хромоцистоскопией
- 4) томографией

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ
СТЕНОКАРДИИ, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ**

- 1) мезатон внутривенно
- 2) кордиамин внутрь
- 3) нитроглицерин под язык
- 4) папаверин внутримышечно

**К ДОКУМЕНТАМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
ОТНОСЯТСЯ**

- 1) Постановление Правительства Российской Федерации
- 2) Указ Президента Российской Федерации

- 3) Санитарные правила и нормы
- 4) клинические рекомендации

АВТОКЛАВИРОВАНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) плазменная стерилизация
- 2) стерилизация горячим воздухом
- 3) дезинфекция химическими веществами
- 4) стерилизация паром под давлением

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- 1) один раз в месяц
- 2) два раза в неделю
- 3) один раз в неделю
- 4) один раз в две недели

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ __ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 30
- 3) 60
- 4) 5

К ИСКУССТВЕННОМУ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- 1) артифициальный
- 2) воздушно-капельный
- 3) контактно-бытовой
- 4) воздушно-пылевой

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ _____ ОКРАШИВАНИЕ

- 1) желто-оранжевое
- 2) черное
- 3) сине-зеленое
- 4) розовое

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) влажного обертывания
- 2) грелки
- 3) пузыря со льдом
- 4) холодного компресса

ПЕРВИЧНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лихенизация

- 2) пустула
- 3) рубец
- 4) трещина

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ

- 1) выполнение скелетного вытяжения
- 2) иммобилизация конечности транспортной шиной
- 3) использование шины Белера
- 4) выполнение репозиции отломков

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- 1) два года
- 2) четыре года
- 3) три года
- 4) год

ПРИ ПОПАДАНИИ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ, СТЕРИЛЯНТОВ И ДРУГИХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА КОЖУ (В ГЛАЗА, РОТ) НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО И ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ ИХ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ

- 1) марганцевокислого калия
- 2) спирта
- 3) холодной воды
- 4) борной кислоты

К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ

- 1) статистическая карта выбывшего из стационара
- 2) направление на лечение в стационарных условиях
- 3) медицинская карта стационарного больного
- 4) медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях

ФАКТИЧЕСКАЯ МАССА ТЕЛА СЧИТАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В ДИАПАЗОНЕ

- 1) 20-24,9
- 2) 18-19,9
- 3) 25-29,9
- 4) >30

СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ СУТОК

- 1) 1
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

**ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ**

- 1) от 10 до 17 лет включительно
- 2) до 14 лет включительно
- 3) в любом возрасте
- 4) от 3 лет до 17 лет включительно

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ РЕАКЦИИ НЕОБХОДИМО

- 1) дать пациенту выпить стакан воды и продолжить инфузию
- 2) увеличить скорость переливания
- 3) немедленно остановить переливание
- 4) продолжить переливание с изменением скорости введения

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) в течение трех рабочих дней
- 2) по желанию пациента в выходные дни
- 3) в течение одного рабочего дня
- 4) только при наличии направления с работы

ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ ПРОВОДЯТ

- 1) педагогические работники и работники правоохранительных органов
- 2) работники правоохранительных органов
- 3) медицинские работники и работники правоохранительных органов
- 4) медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов

К ПРАВИЛАМ ХРАНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ ОТНОСИТСЯ ИХ ХРАНЕНИЕ В

- 1) сухой чистой емкости
- 2) дистиллированной воде
- 3) 3% растворе перекиси водорода
- 4) 0,5% растворе Сайдекса

**ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
(%)**

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 3

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) противорецидивной терапии
- 2) санаторно-курортном лечении

- 3) санации очагов инфекции
- 4) диспансерном наблюдении

ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) катетеризация мочевого пузыря
- 2) катетеризация центральной вены
- 3) проведение биологической пробы
- 4) определение группы крови

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ОРГАНЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 8

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ _____ ПРОБЫ

- 1) озоновой
- 2) ортотолуидиновой
- 3) азопирамовой
- 4) бензидиновой

БАКТЕРИИ, ИМЕЮЩИЕ ФОРМУ ЗАПЯТОЙ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) вибрионами
- 2) хламидиями
- 3) псевдомонадами
- 4) шигеллами

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) ограничить употребление рафинированных углеводов
- 2) усилить питание
- 3) ограничить употребление соли и жидкости
- 4) ограничить употребление животных жиров

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ

- 1) ручным способом
- 2) промыванием проточной водой
- 3) ополаскиванием
- 4) погружением в моющий раствор

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наложение асептических повязок с лекарственными растворами
- 2) закапывание глазных капель или закладывание мазей за веко
- 3) пункции
- 4) инъекции

В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- 1) угасает
- 2) полностью развита
- 3) активно развивается
- 4) находится в состоянии покоя

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 72
- 2) 8
- 3) 24
- 4) 48

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У ВРАЧА- _____ В ПОЛИКЛИНИКЕ

- 1) онколога
- 2) хирурга
- 3) эндокринолога
- 4) невролога

СКРИНИНГ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОВОДИТСЯ У ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 40 ДО 75 ЛЕТ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В _____ ГОДА (ЛЕТ)

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 2

ПОКАЗАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беседа с пациентом
- 2) работа с воздушным стерилизатором
- 3) контакт с кровью
- 4) работа с паровым стерилизатором

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ОБЯЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

- 1) ухаживать за больными
- 2) делать добро, говорить правду, не причинять вреда
- 3) проходить стажировку
- 4) повышать квалификацию

К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) грудина
- 2) ребро
- 3) пяточная
- 4) лучевая

МЕТОД ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) снижения парциального давления
- 2) определения диффузионной способности легких
- 3) купирования удушья
- 4) оценки степени бронхиальной обструкции

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _____ МИНУТ

- 1) 120
- 2) 20
- 3) 60
- 4) 90

ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ, КАК ПРАВИЛО, ЧЕРЕЗ

- 1) 1-2 месяца
- 2) 1-2 дня
- 3) 2-3 недели
- 4) 3-4 дня

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний
- 2) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения
- 3) выявление и лечение рецидивов заболеваний
- 4) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии

БОРЬБУ С ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ С

- 1) введения в рацион питания овощей и фруктов
- 2) приема солевых слабительных
- 3) постановки очистительных клизм
- 4) приема растительных слабительных

К ФИЗИЧЕСКИМ МУТАГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) ионизирующее излучение (гамма-лучи, рентгеновские лучи)
- 2) соли тяжелых металлов (свинец, ртуть)
- 3) алкалоиды растений
- 4) некоторые лекарственные препараты

ВНУТРИМЫШЕЧНО ЗАПРЕЩЕНО ВВОДИТЬ _____ РАСТВОРЫ

- 1) апирогенные
- 2) масляные
- 3) стерильные
- 4) гипертонические

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 ЧАСТЬ _____ РАСТВОРОМ

- 1) гипертоническим
- 2) физиологическим
- 3) изотоническим
- 4) дезинфицирующим

ВЫСТУП НА ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТАЗА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) седалищной остью
- 2) лобковым бугорком
- 3) подвздошным гребнем
- 4) верхней передней подвздошной остью

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА С СПО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

- 1) «Управление сестринской деятельностью»
- 2) «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология»
- 3) «Терапия», «Хирургия»
- 4) «Лечебное дело», «Акушерское дело»

ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) местные ванночки с раствором перманганата калия
- 2) ультрафиолетовое облучение пораженного участка кожи
- 3) компресс с преднизолоновой мазью
- 4) тепловые процедуры

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ _____ СУТОК

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1) промыванием проточной водой
- 2) механизированным способом
- 3) ополаскиванием

4) погружением в моющий раствор

ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ШИНЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- 1) вправление костных отломков
- 2) обработка раны йодом или спиртом
- 3) остановка кровотечения
- 4) накладывание окклюзионной повязки

К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) контроль за профессиональной деятельностью
- 2) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение
- 3) пары химических веществ и лекарственных препаратов
- 4) вирусы и микроорганизмы

ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА КПЕРЕДИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- 1) крестцово-копчиково кифоза
- 2) грудного кифоза
- 3) грудного сколиоза
- 4) шейного лордоза

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

- 1) следить за соблюдением строгого постельного режима
- 2) запретить курение
- 3) предложить средство, купирующее кашель
- 4) проводить дыхательную гимнастику, массаж

ОДНОРАЗОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ _____ ЧАСА (ЧАСОВ)

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 6

ЛИЧНАЯ ОДЕЖДА БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЛИЦ, ПОРАЖЕННЫХ ПЕДИКУЛЕЗОМ,

- 1) подвергается камерной дезинфекции
- 2) подвергается замачиванию в дезинфекционном растворе
- 3) передается родственникам
- 4) сжигается

ПРОВОЦИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беременность
- 2) пропуск своевременного введения инсулина
- 3) передозировка инсулина
- 4) отмена сахароснижающих препаратов

ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) флутиказон
- 2) де-нол
- 3) линекс
- 4) гевискон

ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕКОМЕНДОВАНО СОХРАНЯТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ _____ ШАГОВ В СУТКИ

- 1) 8000
- 2) 10000
- 3) 5000
- 4) 6000

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ НА ГЛУБИНУ (В СМ)

- 1) 6-8
- 2) 2-4
- 3) 10-12
- 4) 14-16

РАСТВОРЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

- 1) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 2) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 3) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 4) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

В ОСНОВЕ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕЖИТ

- 1) тканевая гипоксия
- 2) газовая эмболия
- 3) жировая эмболия
- 4) тромбоемболия

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) снижение артериального давления
- 2) анемию
- 3) желудочно-кишечные кровотечения
- 4) одышку

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) вторичный диабет на фоне панкреатита
- 2) диабет I типа
- 3) диабет II типа
- 4) гестационный диабет

БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ - ОСНОВНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК

- 1) отравлении угарным газом
- 2) острой почечной недостаточности
- 3) острой массивной кровопотери
- 4) острой печеночной недостаточности

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТСЯ НА _____ ДЕНЬ ЖИЗНИ

- 1) 4-6
- 2) 3-7
- 3) 8-9
- 4) 7-8

УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА И ВЫРАЖЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нормализация и контроль массы тела
- 2) полное исключение поваренной соли
- 3) ограничение жидкости до 0,5 л в сутки
- 4) отказ от курения

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С ИНТЕРВАЛОМ _____ ДНЕЙ

- 1) 15
- 2) 45
- 3) 60
- 4) 30

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) индекс курящего человека
- 2) тест Фагерстрема
- 3) тест Хорна
- 4) тип курительного поведения

В НАЧАЛЕ ОПРОСА ПАЦИЕНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- 1) объяснить цель беседы
- 2) представиться
- 3) спросить о жалобах пациента
- 4) уточнить имя пациента

НИКТУРИЯ — ЭТО

- 1) болезненное мочеиспускание
- 2) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
- 3) преобладание ночного диуреза над дневным
- 4) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл

АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) укрепление мускулатуры тела
- 2) перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- 3) уменьшение потребности в пище
- 4) снижение приспособительных и компенсаторных реакций

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО

- 1) наблюдение и лечение на дому
- 2) сообщить врачу
- 3) ввести гомологичный гаммаглобулин
- 4) подать экстренное извещение в службу эпиднадзора

ПУЗЫРЁК, В КОТОРОМ РАСТЁТ И СОЗРЕВАЕТ ЯЙЦЕКЛЕТКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) везикулой
- 2) макулой
- 3) фолликулом
- 4) альвеолой

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) резкое повышение артериального давления
- 2) отсутствие сознания
- 3) отсутствие сознания, пульсации на сонной артерии, дыхания
- 4) резкое падение артериального давления

В ПЕРИОДЕ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНЫЕ ПОДЛЕЖАТ

- 1) госпитализации
- 2) изоляции
- 3) наблюдению
- 4) вакцинации

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ ДНЕЙ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 2

МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинская реабилитация
- 2) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику заболеваний
- 3) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний
- 4) диагностика и лечение заболеваний

К ИЗВИТЫМ ФОРМАМ БАКТЕРИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) микобактерии
- 2) спирохеты
- 3) бациллы
- 4) диплококки

К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА СТАРШЕ _____ ЛЕТ

- 1) 18
- 2) 16
- 3) 20
- 4) 25

ИНСТРУКТАЖ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ

- 1) старшая медицинская сестра
- 2) заведующий отделением
- 3) главный врач
- 4) ответственный по охране труда

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хроническое заболевание желудка
- 2) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
- 3) стадия реконвалесценции вирусного гепатита В
- 4) компенсированный сахарный диабет

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1,1 атм. - 120°C - 45 мин
- 2) 2 атм. - 132°C - 20 мин
- 3) 180°C - 60 мин
- 4) 160°C - 150 мин

МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бедро
- 2) внутренняя поверхность предплечья
- 3) подлопаточная область

4) передняя брюшная стенка

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В _____ ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) бактериологическую
- 2) клиническую
- 3) цитостатическую
- 4) иммунологическую

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ У ПАЦИЕНТА В СОЗНАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выраженный кашель
- 2) неспособность кашлять, говорить, дышать
- 3) появление цианоза носогубного треугольника
- 4) экспираторная одышка

ПО НАЛИЧИЮ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ РАЗЛИЧАЮТ _____ РАНЫ

- 1) укушенные
- 2) рваные
- 3) гнойные
- 4) неосложненные

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ _____ МАССАЖ

- 1) вибрационный
- 2) общий
- 3) локальный
- 4) восстанавливающий

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие кровоподтёка
- 2) пружинящая фиксация
- 3) патологическая подвижность
- 4) крепитация

К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ ВЕДЁТ НЕДОСТАТОК ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ГОРМОНА

- 1) инсулина
- 2) глюкагона
- 3) норадреналина
- 4) кортизола

СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) от ≥ 1 до 5
- 2) равной или более 10

- 3) менее 1
- 4) от ≥ 5 до 10

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДИЕТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ

- 1) низкоуглеводная
- 2) низкокалорийная
- 3) гипохлоридная
- 4) гипоаллергенная

ФЕНОМЕН ФЕНОКОПИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ НЕНАСЛЕДСТВЕННОЙ _____ ИЗМЕНЧИВОСТИ

- 1) модификационной
- 2) комбинативной
- 3) коррелятивной
- 4) мутационной

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- 1) болезнях с наследственной предрасположенностью
- 2) избытке токсического метаболита
- 3) недостатке определенного белка или фермента
- 4) хромосомных аномалиях

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ожог кисти 1 степени
- 2) синдром длительного сдавления
- 3) хронический цистит
- 4) хронический гломерулонефрит

ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕОБРАТИМЫМ ЗАМЕЩЕНИЕМ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ФИБРОЗНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) стеатоз
- 2) цирроз
- 3) фиброз
- 4) некроз

ГИДРАДЕНИТ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В (НА)

- 1) паховой складке
- 2) подмышечной впадине
- 3) лице
- 4) шее

СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) в письменной форме
- 2) в форме гражданско-правового договора

- 3) в нотариальной форме
- 4) только в присутствии адвоката

ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У РЕБЕНКА ЕГО НЕОБХОДИМО

- 1) уложить на бок
- 2) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом
- 3) усадить, запрокинув голову назад
- 4) усадить, слегка наклонив голову вниз

ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ КЛЮЧИЦЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) колосовидную повязку
- 2) повязку Дезо
- 3) шину Крамера
- 4) гипсовую лонгету

ЗАПИСИ В «ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ» ВЕДЕТ

- 1) лечащий врач
- 2) постовая медицинская сестра
- 3) процедурная медицинская сестра
- 4) старшая медицинская сестра

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К

- 1) противоглистным средствам
- 2) гормональным препаратам
- 3) противовоспалительным препаратам
- 4) гипотензивным средствам

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР ПРОИСХОДИТ ПРИ

- 1) стерилизации
- 2) дезинфекции
- 3) дезинсекции
- 4) дератизации

СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) подавления овуляции
- 2) сгущения цервикальной слизи
- 3) уничтожения сперматозоидов
- 4) снижения двигательной активности сперматозоидов

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ _____ ГРАДУСОВ

- 1) 132
- 2) 100
- 3) 120

4) 110

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОШЕДШИЕ СТЕРИЛИЗАЦИЮ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБКАХ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В

- 1) операционных залах
- 2) приемных отделениях
- 3) процедурных кабинетах
- 4) смотровых кабинетах

СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО

- 1) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- 2) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения
- 3) уничтожение патогенных микробов
- 4) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ВЕДЕТСЯ ДЛЯ

- 1) привлечения к ответственности
- 2) информирования общественности
- 3) статистики несчастных случаев
- 4) анализа причин инцидентов и их предотвращения

ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМ

- 1) астмопент ингаляционно
- 2) лидокаин внутривенно
- 3) димедрол подкожно
- 4) нитроглицерин под язык

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С

- 1) 18 лет
- 2) момента рождения
- 3) периода полового созревания
- 4) 7 лет

НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В

- 1) строении мышц
- 2) строении трубчатых костей
- 3) строении таза
- 4) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, оценивающим

качество ведения сестринской документации

2) главной медицинской сестрой медицинской организации, осуществляющей выборочный контроль качества сестринской помощи в отделениях

3) старшей медицинской сестрой структурного подразделения, которая осуществляет текущий контроль качества сестринской помощи

4) врачебной комиссией, проводящей экспертизу качества сестринской помощи при летальных исходах и осложнениях

ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

1) ухудшение восприятия звуков

2) нарушение зрения

3) неразборчивость речи

4) нарушение равновесия, походки

ПРИМЕРОМ Х-СЦЕПЛЕННОГО РЕЦЕССИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1) фенилкетонурия

2) муковисцидоз

3) синдром Марфана

4) гемофилия А

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧАЕТ

1) уровень ферментов в крови

2) особенности рисунка кожных гребешков ладоней и стоп

3) структуру ДНК клетки

4) хромосомный набор клетки

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПРОВОДИТСЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕ РЕЖЕ _____ РАЗ(А) _____

1) 1 в полгода

2) 1 в год

3) 5 в год

4) 3 в год

ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

1) педагоги, воспитатели

2) любой близкий родственник

3) один из родителей ребенка или законный представитель

4) только мама ребенка

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ЭТО

1) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца

2) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа

3) исследование сердца при помощи ультразвука

4) графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА

- 1) не разрешается
- 2) разрешается по согласованию с главврачом
- 3) разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности
- 4) разрешается по усмотрению медсестры

ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- 1) гипертонической болезни
- 2) стенокардии
- 3) инфаркта миокарда
- 4) недостаточности кровообращения

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, УТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) Комитетом по госсанэпиднадзору
- 2) Правительством Российской Федерации
- 3) Росздравнадзором
- 4) Федеральным судом

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) гастродуоденоскопию
- 2) нейросонографию
- 3) спирометрию
- 4) электрокардиографию

ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТКОВ

- 1) крови
- 2) лекарственных средств
- 3) масляных растворов
- 4) моющего раствора

ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НЕОБХОДИМО ЗАФИКСИРОВАТЬ

- 1) предполагаемый объем кровопотери
- 2) результаты пальпации пульса ниже места наложения жгута
- 3) точное время наложения жгута
- 4) величину систолического артериального давления

НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА - ПОСОВЕТОВАТЬ

- 1) исследовать мочу на содержание сахара
- 2) резкое ограничение жидкости
- 3) применение средств гигиенического ухода

4) резкое ограничение соли

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инокуляция
- 2) вдыхание
- 3) проглатывание
- 4) имплантация

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОККОВ В ВИДЕ ГРОЗДЕЙ ВИНОГРАДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) микрококков
- 2) сарцин
- 3) стафилококков
- 4) диплококков

МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наследственность
- 2) артериальная гипертензия
- 3) стресс
- 4) ожирение

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УТВЕРЖДАЮТСЯ

- 1) Указом Президента Российской Федерации
- 2) приказом главного врача соответствующего медицинского учреждения
- 3) постановлением Правительства Российской Федерации
- 4) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ

- 1) антисептическим раствором
- 2) 5% раствором перманганата калия
- 3) 0,5% раствором хлорамина
- 4) раствором йода

МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) изоляцию больного
- 2) запрет въезда на неблагополучную территорию
- 3) закрытие государственных границ
- 4) введение особых правил пересечения государственных границ

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) карту выбывшего из стационара
- 2) бланки направлений на лабораторные исследования
- 3) паспортную часть истории болезни и карты выбывшего из стационара

4) карту стационарного больного

ДЕКОНТАМИНАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕСС

- 1) уничтожения всех микроорганизмов, включая бактериальные споры
- 2) уничтожения или удаления микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты
- 3) удаления с поверхности инородных тел
- 4) уменьшающий количество патогенных микроорганизмов, кроме бактериальных спор

НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОМ УДАРЕ

- 1) введение кордиамина
- 2) уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье
- 3) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
- 4) перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХОЛОДОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ СЛЕДУЕТ ОБЕРНУТЬ

- 1) вощёной бумагой
- 2) однослойной марлей
- 3) полотенцем
- 4) впитывающей пелёнкой

ПРОВОЦИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пропуск приема инсулина
- 2) передозировка инсулина
- 3) длительная физическая нагрузка
- 4) пропуск пищи

ПОСЛЕДСТВИЕМ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бесплодие
- 2) цистит
- 3) миома матки
- 4) эндометриоз

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ В ОЧАГЕ ГРИППА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания
- 2) очаговая дезинфекция
- 3) бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации
- 4) влажная уборка и проветривание помещения

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- 1) при наличии источника инфекции (пациента с выявленной инфекцией, связанной

с оказанием медицинской помощи)

- 2) после выписки, смерти или перевода больного в другое отделение или стационар с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды
- 3) еженедельно дезинфицирующими средствами по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов
- 4) с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях медицинской организаций

ОДНОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ ЖЕЛЧИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) активация пепсиногена
- 2) активация трипсина
- 3) денатурация белков
- 4) эмульгирование жиров

СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ ВЫСОКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) от ≥ 1 до 5
- 2) от ≥ 5 до 10
- 3) равной или более 10
- 4) менее 1

ПЕРЕД НАКРЫТИЕМ СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБРАБАТЫВАЕТ РУКИ

- 1) антисептиком
- 2) мылом
- 3) хирургическим способом
- 4) гигиеническим способом

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 _____ РАСТВОРОМ

- 1) дезинфицирующим
- 2) изотоническим
- 3) гипертоническим
- 4) физиологическим

ВСЕ ВИДЫ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ АГРЕГАТНОМ СОСТОЯНИИ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАМИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- 1) Г
- 2) Д
- 3) В
- 4) Б

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ВЗДУТИИ ЖИВОТА У ПАЦИЕНТА НА

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) информировании врача
- 2) введении газоотводной трубки
- 3) проведении массажа живота
- 4) введении спазмолитика внутримышечно

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТНОСЯТСЯ

- 1) определение наличия сознания
- 2) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания
- 3) запрокидывание головы с подъемом подбородка и выдвижение нижней челюсти
- 4) проверка пульса на магистральных артериях

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ

- 1) бактероиды, клостридии (анаэробная инфекция)
- 2) гонококк, пневмококк, менингококк
- 3) протей, клебсиелла, энтеробактер
- 4) стафилококк, стрептококк, синегнойная и кишечная палочки

ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПРИ КОРИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

- 1) конечностях
- 2) лице
- 3) туловище
- 4) слизистой оболочке щек

В КАЧЕСТВЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ОБОСНОВАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) препаратов из группы нестероидных противовоспалительных препаратов
- 2) ферментативных препаратов
- 3) сорбентов
- 4) препаратов спазмолитического действия

СТЕРИЛЬНАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) предстерилизационную
- 2) помещение для персонала
- 3) зону технического обслуживания
- 4) экспедицию

ОТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТХОДИТ _____ ПАР(А) ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ

- 1) 31
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 10

ПЕРЕЛИВАНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гемотрансфузией
- 2) гемостимуляцией
- 3) гемостазом
- 4) гемолизом

ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реабилитация
- 2) заболеваемость
- 3) болезнь
- 4) предболезнь

ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАНЕ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО

- 1) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны
- 2) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь
- 3) извлечь его из раны
- 4) не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него

СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КОРОБКЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ (В ЧАСАХ)

- 1) 48
- 2) 6
- 3) 72
- 4) 24

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ СОКОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

- 1) снижается
- 2) повышается
- 3) остается неизменной
- 4) становится избирательной

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А

- 1) вертикальный
- 2) аэрогенный
- 3) фекально-оральный
- 4) половой

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ

- 1) патологическая подвижность костных отломков
- 2) деформация сустава
- 3) отечность места повреждения
- 4) гиперемия кожных покровов

ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) курение
- 2) возраст
- 3) гиподинамия
- 4) пол

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПОВ ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРОВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ КЛАССА ЧИСТОТЫ

- 1) Г
- 2) А
- 3) В
- 4) Б

СУММА БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО МЕНЕЕ ВОСЬМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) сопоре
- 2) коме
- 3) ясном сознании
- 4) оглушении

ТИПИЧНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) острая задержка мочи
- 2) сонливость
- 3) запор
- 4) потливость

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ ____ ММ.РТ.СТ

- 1) 70/50
- 2) 90/70
- 3) 100/60
- 4) 80/60

ПАЦИЕНТАМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕКОМЕНДОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ

- 1) жирных сортов мяса
- 2) свежих фруктов и овощей
- 3) количества жидкости
- 4) сладких продуктов

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО ДАТЬ ПОД ЯЗЫК

- 1) капотен
- 2) коринфар
- 3) анаприлин

4) клофелин

К ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ

- 1) муниципальное управление здравоохранением
- 2) медицинское страхование граждан
- 3) соблюдение врачебной тайны
- 4) государственное управление здравоохранением

ЦИСТОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- 1) тонкого кишечника
- 2) желудка
- 3) толстого кишечника
- 4) мочевого пузыря

ОБСЕРВАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) уничтожение грызунов-переносчиков инфекции
- 2) дезинфекция в очаге инфекционного заболевания
- 3) изоляция инфекционных больных в стационаре
- 4) наблюдение за здоровыми лицами, находящимися в зоне карантина

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДЯТ _____ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- 1) профилактическую
- 2) очаговую
- 3) текущую
- 4) заключительную

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРЧИЧНИКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипертонический криз
- 2) гипертермия
- 3) гиперчувствительность
- 4) пиодермия

ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) лихорадка, лимфаденит
- 2) опоясывающие боли, зуд
- 3) узелки, чешуйки, гиперпигментация
- 4) пузырьки, эрозии, корки

ПРИ НАЛОЖЕНИИ КОЖНЫХ ШВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ _____ ПИНЦЕТ

- 1) стоматологический
- 2) анатомический
- 3) хирургический

4) офтальмологический

ЯДЫ, ПОПАВШИЕ В КРОВЬ, ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ

- 1) легкие
- 2) печень
- 3) сердце
- 4) кожу

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ВАКЦИН, НЕПРИГОДНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) сотрудники Роспотребнадзора
- 2) хозяйствующий субъект, осуществляющий производственный контроль
- 3) сторонняя организация, имеющая разрешение (лицензию) на данный вид деятельности
- 4) персонал медицинской организации

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЛАДОНИ РАСПОЛАГАЮТ

- 1) на границе средней и нижней трети грудины
- 2) на верхней трети грудины
- 3) на границе верхней и средней трети грудины
- 4) в пятом межреберном промежутке слева

ПРИ АЭРОЗОЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО

- 1) проводить процедуру перед едой
- 2) полоскать рот водой после ингаляций
- 3) чередовать препараты каждые две недели
- 4) принимать антибактериальные препараты

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гигиеной
- 2) геронтологией
- 3) геологией
- 4) геральдикой

ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- 1) чаще поить пациента
- 2) вводить препараты крови внутривенно
- 3) вводить жаропонижающие препараты
- 4) вводить антибиотики

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ, ЕСЛИ СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (МИН)

- 1) 60

- 2) 30
- 3) 20
- 4) 10

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) страхованием от несчастных случаев
- 2) системой, направленной на защиту прав медицинских работников
- 3) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда
- 4) составной частью государственной системы социального страхования

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДСЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) удерживать равновесие
- 2) предотвращать травмы позвоночника
- 3) снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему
- 4) исключать дискомфорт

МУТАГЕНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) радиоактивные изотопы
- 2) токсины вирусов и бактерий
- 3) пестициды и гербициды
- 4) нитраты и нитриты

ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) предрасполагающие заболевания
- 2) наследственная предрасположенность
- 3) действие химических канцерогенов
- 4) иммунологические дефекты

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА, ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) функциональным
- 2) пассажным
- 3) ортостатическим
- 4) дренажным

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОГРУЖАЮТСЯ В РАСТВОР

- 1) с предварительным высушиванием
- 2) на одну вторую
- 3) полностью
- 4) до отметки на емкости

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СВОЙСТВАМИ

- 1) моющими и дезодорирующими
- 2) только дезинфицирующими
- 3) дезинфицирующими и моющими
- 4) только моющими

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) ангины
- 2) хронического тонзиллита
- 3) краснухи
- 4) ветряной оспы

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ

- 1) коррекции врожденных пороков
- 2) исправления мутации в ДНК
- 3) лечения ферментопатий
- 4) изменения кариотипа

В РОССИИ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ _____ ДО _____ ЛЕТ

- 1) 36 - 40
- 2) 42 - 45
- 3) 17 - 19
- 4) 20 - 35

ПОСЛЕ ПРИСТУПА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ

- 1) гематурия
- 2) бактериурия
- 3) глюкозурия
- 4) лейкоцитурия

ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РАСТВОРА

- 1) сайдекса
- 2) этилового спирта
- 3) хлорамина
- 4) деохлора

ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ

- 1) первичными, профессиональными
- 2) повторными, профилактическими
- 3) вводными, начальными
- 4) вводными, первичными, повторными

**ПАЦИЕНТ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В _____
ОТДЕЛЕНИЕ**

- 1) неврологическое
- 2) хирургическое
- 3) урологическое
- 4) кардиологическое

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) бронхоскопией
- 2) спирометрией
- 3) бронхографией
- 4) флюорографией

**К НЕИММУННЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
КРОВИ ОТНОСЯТ**

- 1) посттрансфузионная пурпура
- 2) перегрузка железом (гемосидероз)
- 3) цитратная интоксикация (гипокальциемия)
- 4) аллоиммунизация к антигенам эритроцитов

**С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ**

- 1) холестерина и его фракций
- 2) гликированного гемоглобина
- 3) креатинина
- 4) общего билирубина

К ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) воздействие ультрафиолетом
- 2) замачивание в воде
- 3) обработка горячим воздухом
- 4) применение растворов реагентов

ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОРОДАВОК ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стрептококк
- 2) вирус папилломы человека
- 3) заболевание пищеварительного тракта
- 4) аллергия организма

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ СРЕДСТВАМИ ГРУППЫ

- 1) спиртов
- 2) гуанидинов
- 3) фенолов
- 4) альдегидов

ПАЦИЕНТАМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ В СОЧЕТАНИИ С УДУШЬЕМ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) сидя
- 2) лёжа
- 3) Тренделенбурга
- 4) Фаулера

ПРИОРИТЕТНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ПАЦИЕНТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) слабость, недомогание, ощутимое сердцебиение
- 2) боль в пояснице, отеки под глазами по утрам, повышение артериального давления
- 3) снижение работоспособности, плохой аппетит, слабость
- 4) повышенная утомляемость, лихорадка, головная боль

В ВИДЕ ЦЕПОЧКИ КОККОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) тетракокки
- 2) микрококки
- 3) стрептококки
- 4) диплококки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) сравнение температуры тела, пульса и артериального давления пациента с планируемыми и ожидаемыми результатами
- 2) соблюдение распорядка дня медицинской сестрой
- 3) сравнение результатов сестринского вмешательства с планируемыми и ожидаемыми результатами
- 4) назначение питания пациента в соответствии с заболеванием

ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- 1) повышение аппетита
- 2) запор
- 3) гипертензию
- 4) снижение уровня гемоглобина

К ЛИНЕЙНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) врачи общей практики, врачи специалисты
- 2) заведующие подразделениями
- 3) главный врач, заведующие отделениями
- 4) руководители функциональных структур

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ МЕСТНО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) 5 % раствор йода
- 2) гемостатическая губка с тромбином

- 3) 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого
- 4) 6 % перекись водорода

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮТ, ПОВОРАЧИВАЯ ЕГО В ПОСТЕЛИ КАК МИНИМУМ _____ РАЗ(А) В СУТКИ

- 1) 5–8
- 2) 8–10
- 3) 1–2
- 4) 3–5

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ ИМЕЮТСЯ В _____ РАНЕ

- 1) ушибленной
- 2) колотой
- 3) резаной
- 4) рубленной

КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- 1) тонкой кишки
- 2) толстой кишки
- 3) мочевого пузыря
- 4) желудка

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА МИКРООРГАНИЗМЫ

- 1) высокая температура
- 2) фенол
- 3) хлорная известь
- 4) спирт

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) превышение власти
- 2) должностной подлог
- 3) оставление в опасности
- 4) халатность

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) прямым
- 2) с наклоном вперед
- 3) с наклоном влево
- 4) с наклоном вправо

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО

УКАЗАТЬ

- 1) диагноз болезни пациента
- 2) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни
- 3) количество препарата
- 4) путь введения препарата

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) государственное управление здравоохранением
- 2) муниципальное управление здравоохранением
- 3) медицинское страхование граждан
- 4) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий

ДО ПЕРЕДАЧИ В АРХИВ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧИВШЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ГОДАХ)

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 25

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ЛИЦ С

- 1) трихинеллёзом
- 2) паронихией
- 3) педикулёзом
- 4) псевдотуберкулёзом

У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- 1) не определяется
- 2) понижено
- 3) повышено
- 4) не изменено

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ

- 1) сифонную клизму вечером
- 2) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 3) постановку газоотводной трубки утром
- 4) масляную клизму утром

«ГРЯЗНАЯ» ЗОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ

- 1) В
- 2) А

- 3) Г
- 4) Б

ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) дистиллированную воду
- 2) 2 % раствор пищевой соды
- 3) 1 % раствор хлорамина
- 4) 5 % раствор поваренной соли

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НАЗНАЧАЮТ

- 1) приём ферментных препаратов и активированного угля
- 2) соблюдение бесшлаковой диеты за 3 дня
- 3) водную нагрузку перед исследованием
- 4) проведение очистительной клизмы

В НОРМЕ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ДОНОШЕННОГО ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ БАЛЛОВ

- 1) 11-12
- 2) 4-5
- 3) 8-10
- 4) 6-7

ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ДОЛЖНА БЫТЬ

- 1) неровной
- 2) мягкой
- 3) жесткой
- 4) наклонной

ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- 1) яичниках
- 2) надпочечниках
- 3) гипофизе
- 4) гипоталамусе

ПЛАНОВУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

- 1) только по санитарно-гигиеническим показаниям
- 2) осуществляют с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций
- 3) систематически с целью снижения микробной обсемененности объектов внутрибольничной среды
- 4) только по эпидемиологическим показаниям

ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стероидный диабет
- 2) артериальная гипертензия
- 3) лунообразное лицо
- 4) кандидоз полости рта

ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) увеличению печени
- 2) артритам
- 3) поражению почек
- 4) мужскому бесплодию

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ОРГАНИЗМА БОЛЬНОГО ПРОВОДИТСЯ _____ МЕТОДОМ

- 1) микроскопическим
- 2) бактериологическим
- 3) серологическим
- 4) биологическим

НАРУШЕНИЕ СУМЕРЕЧНОГО ЗРЕНИЯ «КУРИНАЯ СЛЕПОТА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТКЕ В ПИЩЕ ВИТАМИНА

- 1) С
- 2) А
- 3) Д
- 4) В6

ОСТРОЕ РАЗЛИТОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КЛЕТЧАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) фурункулом
- 2) абсцессом
- 3) флегмоной
- 4) атеромой

ОТХОДЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДМЕТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- 1) Б
- 2) Г
- 3) В
- 4) А

ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) анемия
- 2) дорсопатия
- 3) дизурия

4) гиперхолестеринемия

В КЛЕТКАХ ОБРАЗУЕТСЯ БЕЛОК АМИЛОИД В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) трансформации
- 2) декомпозиции
- 3) инфильтрации
- 4) извращенного синтеза

ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

- 1) 1 час
- 2) 6 часов
- 3) 10-15 минут
- 4) 10-12 часов

МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ

- 1) лечения обострений хронических заболеваний
- 2) профилактических медицинских осмотров
- 3) санитарно-просветительной работы с населением
- 4) экстренной госпитализации пациентов

ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) А
- 2) В
- 3) Д
- 4) Б

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 75 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ - НЕ БОЛЕЕ

- 1) 110 ударов в минуту
- 2) 125 ударов в минуту
- 3) 145 ударов в минуту
- 4) 175 ударов в минуту

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) обезвреживания источника инфекции
- 2) уничтожения возбудителей заболеваний
- 3) разрыва путей передачи возбудителей
- 4) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям

СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

- 1) белковых, жировых и механических загрязнений с медицинских изделий

- 2) микроорганизмов на коже и слизистых пациента
- 3) патогенных микроорганизмов на поверхности медицинских изделий
- 4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на медицинских изделиях

РАСТВОРОМ, ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОЖоговой Поверхности, Является

- 1) раствор перманганата калия высокой концентрации
- 2) раствор перекиси водорода 6 %
- 3) 5% спиртовой раствор йода
- 4) стерильный физиологический раствор (0,9 % NaCl)

Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает использование

- 1) облачных хранилищ данных для обмена документами
- 2) телемедицинских платформ для консультаций
- 3) систем электронного документооборота (СЭД)
- 4) медицинских информационных систем (МИС)

Живая вакцина для профилактики полиомиелита вводится

- 1) внутримышечно
- 2) внутрикожно
- 3) перорально
- 4) подкожно

Структурно-функциональной единицей почки является

- 1) ацинус
- 2) нефрон
- 3) фолликул
- 4) долька

Чаще всего возможно повреждение костей при _____ ране

- 1) резаной
- 2) лоскутной
- 3) рубленной
- 4) колотой

При опрелостях у ребенка рекомендуются ванны с использованием

- 1) морской соли
- 2) отвара коры дуба
- 3) хозяйственного мыла
- 4) крахмала

Специфическая профилактика туберкулеза предполагает проведение

- 1) Диаскин-теста

- 2) рентгенографии
- 3) пробы Манту
- 4) вакцинации и ревакцинации

ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИИ (УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ), НЕОБХОДИМОЙ РАБОТНИКУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАЛОЖЕНА В

- 1) профессиональном стандарте
- 2) приказах главного врача
- 3) номенклатуре должностей
- 4) должностной инструкции

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ПРИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) своевременное назначение специальной диеты
- 2) гормональная заместительная терапия
- 3) хирургическая коррекция
- 4) ферментная заместительная терапия

ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ _____ КОЖИ

- 1) мраморность
- 2) бледность
- 3) цианоз
- 4) покраснение

СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МОЖНО ВВОДИТЬ

- 1) внутриаартериально
- 2) внутрикожно
- 3) внутримышечно
- 4) внутривенно

КОЛЕБАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ 1009-1011 В ПРОБЕ ЗИМНИЦКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) анурии
- 2) гипоизостенурии
- 3) протеинурии
- 4) полиурии

К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- 1) ожирение
- 2) наследственность
- 3) возраст
- 4) пол

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОВОДЯТ _____ МЕТОДОМ

- 1) инфракрасным
- 2) газовым
- 3) паровым
- 4) воздушным

УГОЛ НАКЛОНА ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ТУБЕРКУЛИНОМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 90
- 4) 45

КАЛЬЦИТОНИН СИНТЕЗИРУЕТСЯ В

- 1) щитовидной железе
- 2) гипофизе
- 3) паращитовидных железах
- 4) гипоталамусе

ЗАШИВАНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) gastrorrhaphia
- 2) enterorrhaphia
- 3) enterostomia
- 4) colotomia

ПРОМЫВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЮ

- 1) восстановления баланса мочевого пузыря
- 2) выведения газов
- 3) лечения воспалительного процесса
- 4) извлечения остатков мочи

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прямой массаж сердца
- 2) непрямой массаж сердца
- 3) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- 4) проведение искусственной вентиляции лёгких

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ ВОЗНИКАЕТ

- 1) при переохлаждении
- 2) при голодании
- 3) после еды
- 4) после обильного приема жидкости

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атенолол
- 2) нифедипин
- 3) нитроглицерин
- 4) коргликон

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) узкие зрачки
- 2) отсутствие пульса на сонных артериях
- 3) брадикардия
- 4) агональное дыхание

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ ОТНОСИТСЯ К _____
МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- 1) химическому
- 2) паровому
- 3) воздушному
- 4) газовому

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- 1) профилю заболевания
- 2) составу обратившихся
- 3) возрасту
- 4) половому составу

ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛРА

- 1) промежуточное положение между положением лежа на боку и лежа на животе
- 2) на боку, руки согнуты в локтевых суставах
- 3) полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°-60°
- 4) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25°-30°

**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА
НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать врача
- 2) немедленно извлечь зонд
- 3) начать искусственную вентиляцию легких
- 4) временно прекратить введение зонда

**ЗАБОЛЕВАНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ ЧИСЛА АУТОСОМ, ЯВЛЯЕТСЯ
СИНДРОМ**

- 1) Клайнфельтера
- 2) Дауна
- 3) Мартина-Белл
- 4) Лежена («кошачьего крика»)

ВЕЩЕСТВАМИ ЭКЗОГЕННОГО ИЛИ ЭНДОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ ЛИХОРАДКУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) антигены
- 2) токсины
- 3) антибиотики
- 4) пирогены

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

- 1) ацетилсалициловую кислоту
- 2) конкор
- 3) нитроглицерин
- 4) анаприлин

СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) процесс образования и выделения мочи
- 2) общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
- 3) соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток
- 4) общее количество введенной в организм жидкости за сутки

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отказ от вакцинации гриппа
- 2) курение
- 3) авитаминоз
- 4) длительная искусственная вентиляция легких

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ В СУСТАВЕ СОДЕРЖИТСЯ КРОВЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) кровоподтеком
- 2) гематомой
- 3) гемартрозом
- 4) синовитом

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ _____ ТИПА

- 1) II
- 2) I
- 3) IV
- 4) III

РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) эритроциты
- 2) тромбоциты
- 3) плазма
- 4) лейкоциты

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _____ МИНУТ

- 1) 120
- 2) 60
- 3) 30
- 4) 90

ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ _____ ЦВЕТ

- 1) желтый
- 2) черный
- 3) красный
- 4) зеленый

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) остановке легочного кровотечения
- 2) пункции плевральной полости
- 3) наложение окклюзионной повязки
- 4) наложении ватно-марлевой повязки

КЛЕТЧНАЯ (ТКАНЕВАЯ) ЭМБОЛИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) ранении крупных вен
- 2) шоке
- 3) инфаркте миокарда
- 4) метастазировании опухолей

АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) наличия билирубина, белка
- 2) количества лейкоцитов, эритроцитов
- 3) содержания ацетона, сахара
- 4) объема и относительной плотности каждой порции

ЗАМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНОЙ ТКАНИ МИОКАРДА НА СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) нефросклероз
- 2) атеросклероз
- 3) пневмосклероз
- 4) кардиосклероз

ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА

- 1) полиурия
- 2) дизурия
- 3) гематурия
- 4) никтурия

МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) период стабильной менструальной функции
- 2) последнюю менструацию через 1 год существования стойкой аменореи
- 3) период времени после окончания репродуктивного возраста
- 4) период наступления первой менструации

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- 1) болезней сердечно-сосудистой системы
- 2) злокачественных опухолей кожи
- 3) болезней пищеварения
- 4) болезни выделительной системы

ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

- 1) постельный режим
- 2) строгий постельный режим в течение 2 месяцев
- 3) строгий постельный режим в течение 3-4 недель
- 4) палатный режим

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО

- 1) поставить газоотводную трубку
- 2) сделать очистительную клизму
- 3) сделать гипертоническую клизму
- 4) выполнить промывание желудка

К ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

- 1) биологическая смерть
- 2) остановка сердца
- 3) любое бессознательное состояние
- 4) предагония, агония, клиническая смерть

ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) омфалит
- 2) дерматит
- 3) потница
- 4) гемангиома

ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КРОВЬ

- 1) темно-вишневого цвета, вытекает непрерывной струёй
- 2) алого цвета, бьёт струёй
- 3) темно-вишневого цвета, бьёт струёй
- 4) алого цвета

В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРИМЕНЕНИИ НЕ БОЛЕЕ _____ ЧАСА(ОВ)

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 6

ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- 2) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
- 3) поддержание качества жизни пациентов
- 4) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПРЕДМЕТЫ УХОДА
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ**

- 1) Г
- 2) Б
- 3) А
- 4) В

**ПРИЖИЗНЕННАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) апоптозом
- 2) некрозом
- 3) инфарктом
- 4) аутолизом

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОСЛЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПЕРЕВЯЗОК, УДАЛЯЮТ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) А
- 3) Б
- 4) Д

**ПРИ РАЗВИТИИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ВО ВРЕМЯ ВНУТРИВЕННОЙ
ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА ПРЕКРАТИТЬ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
И**

- 1) сохранить венозный доступ
- 2) извлечь иглу
- 3) наложить жгут выше места инъекции
- 4) положить пузырь со льдом на место инъекции

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ МЕСТОМ ПРИЖАТИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поперечный отросток 6 шейного позвонка

- 2) угол нижней челюсти
- 3) поперечный отросток 4 шейного позвонка
- 4) височная кость

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К СДАЧЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПУТЁМ БЕНЗИДИНОВОЙ ПРОБЫ НЕОБХОДИМО

- 1) исключить из пищи железосодержащие продукты, не чистить зубы щеткой в течение 3-х дней до исследования
- 2) отменить все принимаемые лекарственные препараты за 3 дня
- 3) накануне исследования принять слабительный препарат
- 4) вечером и утром сделать очистительную клизму

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) устранение модифицируемых факторов риска
- 2) санаторно-курортное лечение
- 3) физиотерапевтические процедуры
- 4) лечебную физкультуру

АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА

- 1) белка, глюкозы
- 2) лейкоцитов, эритроцитов
- 3) ацетона, глюкозы
- 4) солей, билирубина

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1) обеззараживают источник инфекции
- 2) уничтожают вегетативные формы микроорганизмов
- 3) удаляют различные загрязнения
- 4) уничтожают вегетативные и споровые формы микроорганизмов

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ПАЦИЕНТУ С ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- 1) начала проведения сердечно-легочной реанимации
- 2) начала действия адреналина в организме
- 3) доставки пациента в стационар
- 4) получения травмы

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ДЕПРЕССИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) эйфория и переоценка собственных возможностей
- 2) повышенное настроение и активность
- 3) сниженное настроение, пессимизм, сосредоточение на болезненном самочувствии

4) гипербулия и ускоренное мышление

ПРИЗНАКОМ ОБМОРОЖЕНИЯ II СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) потеря чувствительности без видимых изменений кожи
- 2) только покраснение кожи через 12–24 часа после согревания
- 3) появление пузырей с геморрагическим содержимым через 12–24 часа после согревания
- 4) почернение тканей через 12–24 часа после согревания

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) тщательной термической обработке пищевых продуктов
- 2) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания
- 3) кормлении грудным молоком
- 4) кормлении кисломолочными смесями

ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) на губах
- 2) в слизистой оболочке щек
- 3) на сосочках языка
- 4) в гортани

РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА И БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ _____

- 1) симпатических
- 2) парасимпатических
- 3) соматических
- 4) глазодвигательных

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

- 1) 15-20 минут
- 2) 3-6 минут
- 3) 30 минут
- 4) 2 часа

СМЫВЫ И ПОСЕВ ВОЗДУХА В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ БЕРУТСЯ

- 1) 1 раз в 2 недели
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 1 раз в неделю

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) потеря сознания
- 2) крапивница

- 3) падение артериального давления
- 4) выраженная боль

РАЗРАСТАНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ, ВЫСТИЛАЮЩЕГО ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ МАТКИ, ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) эндометрит
- 2) эндометриоз
- 3) гипоплазия
- 4) гиперплазия

ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)

- 1) 0-3
- 2) 4-5
- 3) 6-7
- 4) 8-10

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СРЕДСТВУ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ МЕСТНОСТИ ОТНОСИТСЯ

- 1) респиратор
- 2) противочумный костюм
- 3) укрытие
- 4) бомбоубежище

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЧЕПРИЕМНИК ОПОЛАСКИВАЮТ

- 1) холодной водой
- 2) теплой водой
- 3) антисептиком
- 4) дезинфектантом

ПРИЧИНОЙ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) нерациональное питание в период беременности
- 2) резус-конфликт
- 3) внутриутробная инфекция
- 4) анемия у матери

К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ

- 1) мебеверин (дюспаталин)
- 2) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
- 3) дротаверин (но-шпа)
- 4) панкреатин (фестал)

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК СОСТАВЛЯЕТ _____ (В ЧАСАХ)

- 1) 24
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 12

ФОРМА № 004/У - ЭТО

- 1) журнал учета процедур
- 2) медицинское свидетельство о смерти
- 3) листок учета движения больных и коек дневного стационара
- 4) температурный лист

ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ПАЦИЕНТ ИЛИ ЕГО ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДПИСЫВАЕТ ПЕРЕД МЕДИЦИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лист ознакомления с правилами внутреннего распорядка
- 2) выписка из истории болезни
- 3) информированное добровольное согласие
- 4) направление на анализы

ЦЕЛЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лечение заболеваний
- 2) предупреждение рецидивов
- 3) отказ от употребления алкоголя
- 4) предупреждение употребления алкоголя

В МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ СТАРЕНИИ ПРОИСХОДИТ

- 1) рост мышечной массы без изменения жировой
- 2) снижение силы мышц и усиление отложения жира
- 3) уменьшение изменений в мышечной силе
- 4) увеличение силы мышц и снижение жировой массы

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) медикаментозной терапии
- 2) физиотерапевтических методах лечения
- 3) соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни
- 4) механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой

ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) ограничить употребление рафинированных углеводов
- 2) усилить питание
- 3) ограничить употребление жидкости
- 4) ограничить употребление солей

ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- 1) репарации

- 2) склероза
- 3) апоптоза
- 4) воспаления

ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) стерильной пробиркой
- 2) сухой чистой банкой
- 3) сухой пробиркой
- 4) стерильной банкой

ГИПОФИЗ РАСПОЛОЖЕН В УГЛУБЛЕНИИ _____ КОСТИ

- 1) височной
- 2) клиновидной
- 3) решетчатой
- 4) лобной

К ОТХОДАМ КЛАССА Г ОТНОСЯТ

- 1) пищевые отходы инфекционных отделений
- 2) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
- 3) лекарственные средства, не подлежащие использованию
- 4) органические операционные отходы

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) повышении материального благосостояния
- 2) проведении медицинских осмотров
- 3) проведении прививок
- 4) улучшении условий труда и отдыха

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА УТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) руководителем профсоюзного комитета
- 2) заведующим отделением
- 3) старшей медицинской сестрой
- 4) главным врачом медицинской организации

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) сальбутамол
- 2) коделак
- 3) пренюксдиазин (либексин)
- 4) окселадин (тусупрекс)

СИМПТОМАТИКОЙ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ БЫСТРО НАРАСТАЮЩЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усиление перистальтики кишечника, тахикардия

- 2) локальная гиперемия кожи (в области пораженного органа)
- 3) нарастающая бледность, слабость, падение артериального давления
- 4) общее повышение температуры тела до 39–40 °С, бледность

ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕИЗВЕСТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ НЕОБХОДИМО

- 1) немедленно вызвать рвоту
- 2) провести промывание желудка зондовым способом
- 3) дать молоко в качестве универсального антидота
- 4) дать слабительное

ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО

- 1) отрубевидное шелушение
- 2) разлитая гиперемия кожных покровов
- 3) невралгические боли
- 4) зуд в ночное время

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) система из 2-х желудочных толстых зондов
- 2) шприц Жане
- 3) грушевидный баллон с наконечником
- 4) кружка Эсмарха

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ

- 1) соединительная ткань и суставы
- 2) капилляры
- 3) венулы и крупные вены
- 4) аорта и крупные артерии

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ ___ В МИНУТУ

- 1) 28-32
- 2) 10-14
- 3) 16-20
- 4) 22-26

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ

- 1) профессиональных стандартов
- 2) порядков оказания медицинской помощи
- 3) стандартов медицинской помощи
- 4) учебников по сестринскому делу

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 2 раза в год

- 2) 1 раз в 2 года
- 3) 1 раз в год
- 4) 4 раза в год

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫМ ТИПОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приседания со штангой
- 2) занятия на скалодроме
- 3) ходьба
- 4) силовые нагрузки

МАЗИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В ХОЛОДНОМ МЕСТЕ, ХРАНЯТ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ ____ ДО ____ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 12; 18
- 2) 2; 8
- 3) 9; 16
- 4) -4; 0

МОЮЩИЙ РАСТВОР «БИОЛОТ» ПРИ РУЧНОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) трехкратно
- 2) однократно
- 3) восьмикратно
- 4) шестикратно

К ЧАСТИЧНОЙ САНОБРАБОТКЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) мытье головы
- 2) гигиенический душ
- 3) обтирание
- 4) гигиеническая ванна

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) лабораторными
- 2) клиническими
- 3) функциональными
- 4) антропометрическими

ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1) в первые 30 минут
- 2) через 2-3 часа
- 3) через 6 часов
- 4) через 10-12 часов

ПРЕПАРАТОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) панкреатин
- 2) лоперамид
- 3) холензим
- 4) бисакодил

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОТРАЖАЮЩИЙ НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКАХ И ТКАНЯХ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) апоптозом
- 2) гиперплазией
- 3) некрозом
- 4) дистрофией

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- 1) Б
- 2) А
- 3) В
- 4) Г

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) почек
- 2) пищеварительной системы
- 3) эндокринных
- 4) органов дыхания

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ ВИРУСОВ ВЫПОЛНЯЮТ _____ ФУНКЦИЮ

- 1) адсорбционную
- 2) антигенную
- 3) наследственную
- 4) рецепторную

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ В

- 1) Гражданском Кодексе РФ
- 2) Программе развития здравоохранения
- 3) Трудовом Кодексе РФ
- 4) Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

- 1) в 3 месяца
- 2) на 3-7 сутки после рождения
- 3) в первые 12 ч после рождения
- 4) в 12 месяцев

КОНТРОЛЬ, ПРОВОДИМЫЙ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО

ПЕРСОНАЛА, ОТНОСИТСЯ К _____ КОНТРОЛЮ

- 1) плановому
- 2) квартальному
- 3) внешнему
- 4) внутреннему

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ КЛЕТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) сперматогенезом
- 2) овогенезом
- 3) эмбриогенезом
- 4) онтогенезом

К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

- 1) кипячение
- 2) протирание
- 3) проветривание
- 4) вытряхивание

ПРИЗНАКАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) обильное носовое кровотечение, расширение зрачков
- 2) стойкое расширение зрачка на одной стороне, парестезии
- 3) кратковременная потеря сознания, ретроградная амнезия, головная боль
- 4) паралич конечностей, потеря сознания

БРАДИКАРДИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА РЕЖЕ __ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1) 100
- 2) 80
- 3) 60
- 4) 90

УКУШЕННЫЕ РАНЫ ОПАСНЫ

- 1) развитием анаэробной инфекции
- 2) заражением туберкулезом
- 3) заражением бешенством
- 4) возникновением обширного кровотечения

ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

- 1) регулярные профилактические осмотры
- 2) борьбу за чистоту среды обитания
- 3) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
- 4) творчество, как источник положительных эмоций

3 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ КОМЫ ГЛАЗГО СООТВЕТСТВУЮТ

- 1) оглушению

- 2) сопору
- 3) ясному сознанию
- 4) коме

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ (КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ) ЗАПРЕЩЕНО

- 1) укладывать пациента в устойчивое боковое положение при нарушении сознания
- 2) давать пить молоко или яичный белок для «нейтрализации»
- 3) прикладывать холод (пузырь со льдом) к области живота
- 4) вызывать рвоту (механически или «ресторанным» способом) и промывать желудок (в том числе зондовым методом)

ПРАВО ПАЦИЕНТА НА ДОПУСК К НЕМУ АДВОКАТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО

- 1) с разрешения врачебной комиссии
- 2) по решению суда
- 3) с разрешения главного врача
- 4) по желанию пациента

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН

- 1) холодильником
- 2) сейфом
- 3) сухожаровым шкафом
- 4) шкафом для дезинфицирующих растворов

ДЕОНТОЛОГИЯ - ЭТО

- 1) исполнение законодательства
- 2) завоевание социального доверия личности
- 3) совокупность профессиональных правил поведения
- 4) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками

В ГИПОФИЗЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- 1) инсулин
- 2) тиреотропный гормон
- 3) тироксин
- 4) альдостерон

ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНО ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ БЕЗОПАСНОГО

- 1) хранения и транспортировки
- 2) проведения процедур
- 3) обращения
- 4) использования защитной одежды

СОВРЕМЕННЫЙ БЫСТРЫЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ

ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) микроскопия
- 2) общий анализ
- 3) посев на питательную среду
- 4) молекулярно-генетическое исследование

ЗАЩИТНАЯ ПОВЯЗКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

- 1) профилактики вторичного инфицирования
- 2) остановки кровотечения
- 3) постоянного доступа лекарственных веществ
- 4) герметизации раны

В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) 3% р-р перекиси водорода
- 2) 0,05% водный раствор хлоргексидина
- 3) 0,9% раствор натрия хлорида
- 4) 0,02% р-р фурацилина

ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СПОСОБСТВУЕТ

- 1) отхождению мокроты
- 2) снижению лихорадки
- 3) уменьшению одышки
- 4) расширению бронхов

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМО

- 1) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова
- 2) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- 3) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- 4) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи

ОДНИМИ ИЗ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) золотистые стафилококки
- 2) столбнячные палочки
- 3) лактобациллы
- 4) нитрифицирующие бактерии

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ

- 1) обеспечивается медикаментозная терапия инфицированных пациентов
- 2) проводится изоляция инфицированных пациентов
- 3) население оснащено индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки)
- 4) значительная доля населения привита

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ПОДЛЕЖАТ

- 1) кремации или захоронению на кладбищах
- 2) сжиганию
- 3) захоронению на кладбищах
- 4) вывозятся на полигоны

ТЕРМИНОЛЕМЕНТОМ, ОБЗНАЧАЮЩИМ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -metria
- 2) -tomia
- 3) -scopia
- 4) -graphia

ПРИСТУПОМ СИЛЬНОЙ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ С ИРРАДИАЦИЕЙ В ПАХОВУЮ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ _____ КОЛИКА

- 1) почечная
- 2) кишечная
- 3) желчная
- 4) печеночная

ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В _____ ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) иммунологическую
- 2) вирусологическую
- 3) клиническую
- 4) бактериологическую

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСКОЛЬКИМ ПАЦИЕНТАМ МЕДСЕСТРА РУКОВОДСТВУЕТСЯ

- 1) требованиями пациента
- 2) медицинскими показаниями
- 3) социальным статусом
- 4) возрастом пациента

КЛАССИЧЕСКИМИ МЕСТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЬСУ-ГАЛЕНУ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) бледность, похолодание, онемение, парез
- 2) лихорадка, лейкоцитоз, увеличение СОЭ
- 3) краснота, жар, припухлость, боль, нарушение функции
- 4) атрофия, гипертрофия, дистрофия

ШОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) острая сердечно-сосудистая недостаточность
- 2) острая сердечная недостаточность

- 3) острое повышение тонуса периферических сосудов
- 4) острая недостаточность по малому кругу кровообращения

В РОССИИ ОСНОВАНИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие в организации узкоквалифицированных специалистов
- 2) причинение вреда жизни и здоровью при оказании медпомощи
- 3) недостаточная материально-техническая база
- 4) наличие коек определенного профиля

К ВОЗМОЖНОМУ РАННЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) рвота
- 2) острая задержка мочи
- 3) ограничение двигательной активности
- 4) повышение артериального давления

БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У РЕБЕНКА ЗАКРЫВАЕТСЯ К ____ МЕСЯЦУ ЖИЗНИ

- 1) 6-8
- 2) 12-16
- 3) 18-20
- 4) 9-10

ОТВЕРСТИЕ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ПОЛОСТЬ РТА СООБЩАЕТСЯ С ГЛОТКОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) сфинктером
- 2) жомом
- 3) хоаной
- 4) зевом

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ

- 1) гомеопатии
- 2) лекарственной терапии
- 3) природных лечебных ресурсов
- 4) иглокалывания

ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В

- 1) раствор 70% этилового спирта
- 2) моющий раствор
- 3) дезинфицирующий раствор
- 4) раствор 3% перекиси водорода

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

- 1) туберкулез

- 2) бронхиальная астма
- 3) пневмония
- 4) бронхит

ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) адекватная физическая нагрузка
- 2) борьба со стрессом
- 3) соблюдение принципов рационального питания
- 4) борьба с табакокурением

СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ _____ И ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в неделю

ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ В ЯГОДИЦУ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 90
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 30

ВИДЫ ДИСТАНЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

- 1) общественная
- 2) государственная
- 3) виртуальная
- 4) интимная, личная, социальная, публичная

ПАЦИЕНТУ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- 1) терапевта
- 2) хирурга
- 3) оториноларинголога
- 4) офтальмолога

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ ДИЕТА, БОГАТАЯ

- 1) калием
- 2) углеводами
- 3) железом
- 4) йодом

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УЧЕТ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 1) индикаторов
- 2) контрольно-измерительных приборов стерилизатора
- 3) влажности обработанных изделий
- 4) биотестов

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) назначение лечения тяжелых болезней
- 2) диагностика заболеваний на ранних стадиях
- 3) оформление медицинской документации
- 4) оценка эффективности назначенного ранее лечения

СКОПЛЕНИЕ КОЛБОЧЕК В СЕТЧАТКЕ ОБРАЗУЕТ _____ ПЯТНО

- 1) белое
- 2) желтое
- 3) темное
- 4) слепое

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА, ПРИ КОТОРОМ ОН МАЛОПОДВИЖЕН, НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬСЯ, ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ, РУКУ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вынужденным
- 2) тяжелым
- 3) вялым
- 4) пассивным

ЛИДОКАИН

- 1) анальгетик
- 2) анксиолитик
- 3) нейролептик
- 4) местный анестетик

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТА БЕЗ СОЗНАНИЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) открыть дыхательные пути, прижаться ко рту и носу пострадавшего, выслушать дыхание
- 2) положить руку на грудную клетку пациента, чтобы почувствовать дыхание
- 3) воспользоваться зеркальцем для обнаружения дыхания
- 4) выслушать дыхание фонендоскопом

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПИТАНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) ограничение животных жиров
- 2) ограничение растительных белков
- 3) увеличение быстрых углеводов
- 4) увеличение содержания соли

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- 1) высокий уровень ручного труда
- 2) высокая надежность стерилизации
- 3) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах
- 4) большой объем инвестиций

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (МНН) ОЗНАЧАЕТ

- 1) лекарственный препарат, которые впервые зарегистрирован в РФ
- 2) наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, рекомендованное ВОЗ
- 3) лекарственный препарат, предназначенный для лечения редкого заболевания
- 4) наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком

МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ

- 1) легочными венами
- 2) полыми венами
- 3) аортой
- 4) легочным стволом

ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ

- 1) холеры
- 2) ВИЧ-инфекции (СПИДа)
- 3) коклюша
- 4) бешенства

ПОСТРАДАВШИХ С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

- 1) хирургический стационар
- 2) стоматологический стационар
- 3) поликлинику
- 4) травматологический пункт

МАТЕРИАЛОМ, ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПРОВИЗИРОВАННОЙ ШИНЫ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) эластичные бинты без твёрдой основы
- 2) твёрдые предметы (доски, палки, картон)
- 3) проволочные конструкции без изоляции
- 4) мягкая ткань без жёстких элементов

ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В _____ ЦВЕТ

- 1) оранжевый
- 2) синий
- 3) фиолетовый

4) зеленый

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ПОДАЕТСЯ _____ КИСЛОРОД

- 1) насыщенный азотом
- 2) охлажденный
- 3) увлажненный
- 4) дегидрированный

ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) обработка операционного поля непосредственно перед операцией
- 2) гигиеническая ванна в день поступления
- 3) частичная санитарная обработка
- 4) полная санитарная обработка

ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

- 1) эритроциты
- 2) остециты
- 3) тромбоциты
- 4) лейкоциты

СРЕДНЯЯ ОБОЛОЧКА СТЕНКИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эндометрием
- 2) параметрием
- 3) периметрием
- 4) миометрием

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- 1) дифтерии, коклюша, столбняка
- 2) кори, ветряной оспы, краснухи
- 3) гриппа А
- 4) вирусного гепатита В

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- 1) рентгенолога
- 2) гинеколога
- 3) онколога
- 4) маммолога

ПО СПЕКТРУ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ НАПРАВЛЕННЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

- 1) вегетативных форм бактерий
- 2) вирусов
- 3) грибов
- 4) спор бактерий

В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) холестерин
- 2) аскорбиновую кислоту
- 3) каротин
- 4) соли кальция

СЛЕПАЯ КИШКА НАХОДИТСЯ В

- 1) левой подвздошной области
- 2) правой подвздошной области
- 3) левом подреберье
- 4) правом подреберье

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) налоксон
- 2) феназепам
- 3) афобазол
- 4) диазепам

БАКТЕРИИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ В СРЕДЕ БЕЗ КИСЛОРОДА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) облигатными анаэробами
- 2) микроаэрофилами
- 3) факультативными анаэробами
- 4) облигатными аэробами

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- 1) с момента выявления инфекционного заболевания и вплоть до полного устранения источника инфекции
- 2) с целью обеспечения эпидемиологической безопасности, обеззараживания поверхностей и воздуха в помещениях, своевременной утилизации медотходов, профилактики инфекционных заболеваний
- 3) после выписки, смерти или перевода больного в другое отделение или стационар с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды, с которыми он контактировал в процессе пребывания в стационаре
- 4) регулярно с целью обеззараживания предметов и поверхностей в присутствии источника инфекции — больного человека

ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- 1) пневмоторакса
- 2) сердечной астмы
- 3) приступа бронхиальной астмы
- 4) тромбоэмболии легочной артерии

НУКЛЕОКАПСИД ВИРИОНА ИМЕЕТ _____ ТИП СИММЕТРИИ

- 1) кокковидный

- 2) палочковидный
- 3) шаровидный
- 4) кубический

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕМУ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) на боку с согнутыми ногами
- 2) вертикально с опорой на спину
- 3) сидя с наклоном вперед
- 4) лёжа на спине с приподнятым ножным концом

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- 2) прививочный сертификат
- 3) национальный календарь профилактических прививок
- 4) приказ Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н

ДЛЯ БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЛЕВРЫ ХАРАКТЕРНО ИХ УСИЛЕНИЕ

- 1) в положении на больном боку
- 2) на глубоком вдохе
- 3) во время мышечного напряжения
- 4) при задержке дыхания

К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ

- 1) изжога, рвота, шум в ушах
- 2) отрыжка, слабость, метеоризм
- 3) кровохарканье, сердцебиение, одышка
- 4) головная боль, головокружение, пелена перед глазами

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕНЕПУНКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ _____ ПЕРЧАТКИ

- 1) стерильные
- 2) хирургические
- 3) нитриловые
- 4) кольчужные

УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕМОГЛОБИНА В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гемолизом
- 2) гемобластозом
- 3) анемией
- 4) полицитемией

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ - ЭТО

- 1) характер роста на питательных средах
- 2) способность окрашиваться красителями
- 3) биохимическая активность
- 4) антигенный состав

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В НОРМЕ ПРОИСХОДИТ В

- 1) полости матки
- 2) полости маточной трубы
- 3) канале шейки матки
- 4) полости малого таза

ГЕПАРИН МОЖНО ВВОДИТЬ

- 1) внутривенно, внутривенно
- 2) подкожно, внутривенно
- 3) подкожно, эндолумбально
- 4) внутривенно, в полости

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НУЖНО

- 1) попытаться успокоить пострадавшего
- 2) говорить с пострадавшим властно
- 3) продолжить оказание первой помощи
- 4) отойти на безопасное расстояние, позвать на помощь

ВЫГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ ВИДОМ _____ ВЗЫСКАНИЯ

- 1) гражданско-правового
- 2) дисциплинарного
- 3) исполнительного
- 4) административного

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- 1) реабилитационные мероприятия после перенесённых заболеваний
- 2) предотвращение осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями
- 3) своевременное выявление и лечение начальных стадий заболеваний
- 4) выявление факторов риска развития заболеваний и принятие мер по их устранению

ДОНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОЖДЕННЫЙ НА _____ НЕДЕЛЕ

- 1) 37 — 42
- 2) 34 — 36
- 3) 30 — 32
- 4) 43 — 44

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ -ТОМИЯ (ТОМІА) ОЗНАЧАЕТ ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО, СВЯЗАННОЕ С

- 1) сшиванием
- 2) удалением
- 3) разрезанием
- 4) образованием наружного свища

ЭФЕДРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) ингибиторов ацетилхолинэстеразы
- 2) миорелаксантов (курареподобных средств)
- 3) ганглиоблокаторов
- 4) симпатомиметиков

ОБРАБОТКУ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДЯТ

- 1) воздушным обеззараживанием
- 2) Уф-облучением
- 3) автоклавированием
- 4) погружением в дезинфицирующий раствор

ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРЕН _____ ТИП ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) гемодинамический
- 2) рестриктивный
- 3) обструктивный
- 4) центральный

ОТСРОЧЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) локальный отёк мягких тканей
- 2) аллергическая реакция
- 3) аритмия
- 4) повышение артериального давления

СОСТОЯНИЕМ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕМ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) здоровье
- 2) диспансеризация
- 3) профилактика
- 4) ревакцинация

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЫТЬЯ РУК С МЫЛОМ ПЕРЕД НАДЕВАНИЕМ ПЕРЧАТОК СОСТАВЛЯЕТ ____ СЕКУНД

- 1) 20
- 2) 15
- 3) 40

4) 60

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ИМЕЕТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА

- 1) супругу(е) пациента
- 2) близким родственникам пациента, пришедшим за ним
- 3) органам дознания и следствия по запросу при расследовании тяжких преступлений
- 4) представителям правоохранительных органов по их устному запросу

ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ

- 1) в барокамере
- 2) в термостате
- 3) на складе при комнатной температуре
- 4) в холодильнике

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) внезапным появлением очаговой и общемозговой неврологической симптоматики
- 2) медленно прогрессирующей недостаточностью кровоснабжения, приводящее к психическим нарушениям
- 3) возникновением выраженной менингеальной симптоматики
- 4) развитием интоксикационного синдрома

СРОК ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) пять лет с момента последнего обращения пациента в медицинскую организацию
- 2) двадцать пять лет при условии обязательного резервного копирования на бумажный носитель
- 3) не более срока хранения соответствующих медицинских документов на бумажном носителе
- 4) не менее срока хранения соответствующих медицинских документов на бумажном носителе

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПАЦИЕНТА ПРИ КОЛЛАПСЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сидя на стуле
- 2) горизонтальное с приподнятым головным концом кровати
- 3) горизонтальное с приподнятым ножным концом кровати
- 4) полусидя на кушетке

ДЛЯ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НР (HELICOBACTER PYLORI) ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ

- 1) но-шпу (дротаверин), папаверин
- 2) альмагель, ранитидин
- 3) платифиллин, атропин
- 4) омепразол, кларитромицин, амоксициллин

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЛИ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА ПРОВОДЯТ _____ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- 1) профилактическую
- 2) предварительную
- 3) текущую
- 4) заключительную

ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЛАЗ, РЕСНИЦЫ И ВЕКИ ПРОТИРАЮТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

- 1) произвольно
- 2) от внутреннего угла к наружному
- 3) круговыми движениями
- 4) от наружного края к внутреннему

ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ СТАВИТСЯ ПРОБА

- 1) фенолфталеиновая
- 2) с суданом-3
- 3) азопирамовая
- 4) с суданом-4

АНТИДОТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ

- 1) перманганат калия
- 2) атропин
- 3) гидрокарбонат натрия
- 4) этиловый спирт

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЫВА ШВОВ В ПРОЦЕССЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАКЕТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
НА**

- 1) 2/3
- 2) 1/3
- 3) 3/4
- 4) 1/4

**СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЕМ**

- 1) жиров животного и растительного происхождения
- 2) моносахаридов и полисахаридов
- 3) белков животного и растительного происхождения
- 4) белков, жиров, углеводов

**ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ ФИКСАЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ЕЕ ВЫПАДЕНИИ
НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) proctostomia
- 2) proctopexia
- 3) proctostenosis
- 4) proctectomy

ПАТОГЕННЫЕ СПИРОХЕТЫ – ЭТО ВОЗБУДИТЕЛИ

- 1) сальмонеллёза
- 2) тонзиллита
- 3) дизентерии
- 4) сифилиса

НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 2 раз
- 2) 1 раза
- 3) 4 раз
- 4) 3 раз

ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ

- 1) цинга, нарушения зрения
- 2) заболевания нервной системы
- 3) рахит, цинга
- 4) анемия, повышенная кровоточивость

ЗА ЦВЕТНОЕ ЗРЕНИЕ ОТВЕЧАЮТ

- 1) колбочки
- 2) палочки
- 3) биполярные клетки
- 4) ганглиозные клетки

МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, СОЧЕТАЮЩИМ В СЕБЕ ЗАЩИТУ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ И ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) барьерный
- 2) хирургический
- 3) гормональный
- 4) внутриматочный

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- 1) популяционной
- 2) социальной
- 3) первичной
- 4) вторичной

ЭНТЕРАЛЬНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБ _____ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

- 1) внутримышечного
- 2) перорального
- 3) интраспинального
- 4) внутривенного

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ МЕДПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ПРОПИСАН В

- 1) должностной инструкции
- 2) техническом паспорте процедурного кабинета
- 3) журнале учета инструктажей
- 4) плане эвакуации и инструкции по пожарной безопасности

ГЛАВНОЙ СТРУКТУРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СТЕНКИ БРОНХИОЛ, ОТЛИЧАЮЩЕЙ ИХ ОТ БРОНХОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие желез в подслизистой основе
- 2) наличие гиалиновых хрящевых полуколец
- 3) толстый мышечный слой
- 4) полное отсутствие хрящевой ткани

ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) бронхиальной астмы
- 2) отека легких
- 3) легочного кровотечения
- 4) крупозной пневмонии

ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- 1) назначить спазмолитические средства
- 2) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- 3) вызвать мочеиспускание рефлексорно
- 4) ввести мочегонные средства

ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА НА 1-М ГОДУ ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ВЗВЕШИВАТЬ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 2 раза в месяц
- 3) 1 раз в квартал
- 4) 2 раза в квартал

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА

- 1) главной медсестрой
- 2) палатными сестрами отделений
- 3) старшими медицинскими сестрами отделений
- 4) заведующим отделением

РЕКТОРОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- 1) прямой кишки
- 2) тонкой кишки
- 3) двенадцатиперстной кишки

4) желудка

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ

- 1) дегазации и дезинфекции
- 2) санитарной обработки и дегазации
- 3) дезактивации
- 4) дезинфекции

ЖЕЛЕЗА, В КОТОРОЙ СОЗРЕВАЮТ Т-ЛИМФОЦИТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) тимусом
- 2) гипофизом
- 3) надпочечниками
- 4) щитовидной

ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- 1) безопасность окружающей среды
- 2) рациональное питание пациента
- 3) проведение мероприятий личной гигиены
- 4) сохранение социальных контактов

БОЛЬ ПРИ СТЕНОКАРДИИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) на высоте физической нагрузки
- 2) сразу после физической нагрузки
- 3) через несколько минут после прекращения нагрузки
- 4) вечером после нагрузок в течение дня

МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ТРАНСПОРТИРУЮТ В БАЛЛОНАХ _____ ЦВЕТА

- 1) голубого
- 2) красного
- 3) черного
- 4) серого

РИСК ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) опроса (анкетирование)
- 2) биохимического анализа крови
- 3) клинического анализа крови и мочи
- 4) медицинского осмотра

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА _____ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ

- 1) двухпоточная
- 2) однопоточная

- 3) трехпоточная
- 4) четырехпоточная

ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

- 1) снижается
- 2) увеличивается
- 3) остаётся неизменной
- 4) резко возрастает при физической нагрузке

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

- 1) только паспорт
- 2) только полис ОМС
- 3) паспорт и СНИЛС
- 4) медицинскую карту амбулаторного больного

ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ФИКСИРУЕТ ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ТРАВМЫ (УКОЛ, ПОРЕЗ) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) служебная записка старшей медицинской сестре
- 2) журнал учета аварийных ситуаций
- 3) журнал учета процедур
- 4) запись в медицинской карте пациента, которому проводилась манипуляция

ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ФОРМАХ

- 1) текущей и профилактической дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств
- 2) текущей и заключительной дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств
- 3) плановой и по эпидпоказаниям с применением моющих средств
- 4) заключительной и гигиенической дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ _____ ГАРАНТИИ

- 1) жилищные и коммунальные
- 2) организационные и технические
- 3) медицинские и реабилитационные
- 4) экономические, социальные и правовые

ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЧАТОК СЛЕДУЕТ

- 1) вымыть руки без мыла
- 2) тщательно вымыть руки с мылом
- 3) провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком
- 4) провести хирургическую обработку рук

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ

- 1) углеводы
- 2) витамины
- 3) белки
- 4) жиры

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОСЛЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВЯЗОК, УДАЛЯЮТ КАК ОТХОДЫ КЛАССА

- 1) В
- 2) Г
- 3) А
- 4) Б

ПРИЗНАКОМ РАЗВИТИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА У ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперемия лица
- 2) мраморность кожных покровов
- 3) усиление болей за грудиной
- 4) повышение артериального давления

К РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ АБОРТА ОТНОСИТСЯ

- 1) кровотечение
- 2) бесплодие
- 3) истмико-цервикальная недостаточность
- 4) акушерская патология при последующей беременности

К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ПУТИ И ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ) ОТНОСИТСЯ

- 1) заключительная дезинфекция
- 2) иммунопрофилактика
- 3) госпитализация больных
- 4) санитарно-просветительская работа

ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО

- 1) нарушение растяжимости легочной ткани
- 2) нарушение проходимости воздухоносных путей
- 3) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений
- 4) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны

«ЧИСТАЯ» И «СТЕРИЛЬНАЯ» ЗОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ

- 1) А
- 2) Б
- 3) Г

4) В

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

- 1) дезинфекции
- 2) промыванию
- 3) проветриванию
- 4) уничтожению

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) предотвращение рецидивов заболевания
- 2) назначение белковой диеты
- 3) предотвращение осложнений заболевания
- 4) формирование здорового образа жизни

ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) третичная
- 2) вторичная
- 3) первичная
- 4) социальная

ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) при внутривенных инъекциях
- 2) для остановки венозного кровотечения
- 3) для остановки артериального кровотечения
- 4) для остановки капиллярного кровотечения

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНА

- 1) нервами и нервными узлами
- 2) головным и спинным мозгом
- 3) симпатическими и парасимпатическими ганглиями
- 4) рецепторами и эффекторами

ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ, НА КОТОРОМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Федеральный закон \ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации\ " (№ 323-ФЗ)
- 2) Конституция Российской Федерации
- 3) указы Президента Российской Федерации в сфере охраны здоровья
- 4) международные договоры Российской Федерации

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) морфин
- 2) беротек

- 3) клонидин (клофелин)
- 4) папаверин

ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

- 1) хронических заболеваниях дыхательной системы
- 2) острых заболеваниях дыхательной системы
- 3) острых заболеваниях пищеварительной системы
- 4) хронических заболеваниях пищеварительной системы

ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие экскурсии грудной клетки
- 2) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- 3) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии
- 4) расширение зрачков

ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180°C СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ

- 1) 60
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 20

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

- 1) создание вынужденного положения в постели
- 2) применение ингаляторов с бронхолитиками
- 3) применение горчичных обертываний
- 4) проведение щелочно-масляных ингаляций

ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- 1) полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- 2) в промежуточном положении между лежа на боку и лежа на животе
- 3) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 24-30 градусов
- 4) на боку, руки согнуты в локтевых суставах и расположены перед грудью и за спиной

ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ _____ ШОК

- 1) гемотрансфузионный
- 2) кардиогенный
- 3) гиповолемический
- 4) септический

ПЕРЕДАЧА ШИГЕЛЛЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ _____ МЕХАНИЗМОМ

- 1) аэрогенным

- 2) фекально-оральным
- 3) гемоконтактным
- 4) трансмиссивным

ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОБМОРОЖЕНИЯ I СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) покраснение и отёчность кожи после согревания
- 2) образование пузырей с кровянистым содержимым
- 3) омертвление всех слоёв тканей
- 4) синюшность кожи с потерей чувствительности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ

- 1) общении с пациентом
- 2) рукопожатии
- 3) уколе иглой
- 4) попадании биологических жидкостей на одежду

ПРИ ОТКАЗЕ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО

- 1) получить подпись пациента об ознакомлении с возможными последствиями отказа
- 2) задокументировать отказ пациента в медицинской документации
- 3) сообщить о случившемся в правоохранительные органы
- 4) пригласить свидетелей для подтверждения факта отказа

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ОПАСНЫ РАЗВИТИЕМ

- 1) аллергического шока
- 2) геморрагического шока
- 3) перитонита
- 4) гангрены органа

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH МЫЛА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА

- 1) 5,5
- 2) 3,0
- 3) 8,5
- 4) 10,0

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ _____ ПУТЕМ

- 1) воздушно-пылевым
- 2) воздушно-капельным
- 3) парентеральным
- 4) алиментарным

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) раннее выявление патологии среди лиц без симптомов болезни
- 2) определение уровня антител к инфекциям

- 3) подтверждение диагноза заболевания
- 4) исследование иммунитета организма

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ

- 1) старшая медсестра
- 2) заведующий отделением
- 3) медицинская сестра
- 4) процедурная медсестра

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нерациональное питание
- 2) восходящая инфекция мочевых путей
- 3) стрессы
- 4) переохлаждение

ЦЕЛЮЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переливание плазмы
- 2) обезболивание
- 3) переливание эритроцитарной массы
- 4) поддержание водно-электролитного баланса

К СУБЪЕКТИВНЫМ ДАННЫМ О ПАЦИЕНТЕ ОТНОСЯТ

- 1) высыпания на теле
- 2) вынужденное положение
- 3) жалобы на бессонницу
- 4) частоту пульса

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО

- 1) очистить кишечник
- 2) исключить применение препаратов железа и висмута
- 3) проводить профилактику метеоризма
- 4) исключить применение препаратов йода и брома

ФУРУНКУЛЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ ОСТРОЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

- 1) волосяного фолликула, сальной железы и окружающих тканей
- 2) нескольких волосяных фолликулов и сальных желез
- 3) потовой железы
- 4) подкожно-жировой клетчатки без четких границ

ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) реоэнцефалография
- 2) ультразвуковое исследование
- 3) рентгенография

4) эхокардиография

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) общая слабость
- 2) боль в грудной клетке
- 3) сухой кашель
- 4) одышка при физической нагрузке

ДЛЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ХАРАКТЕРНЫ

- 1) падение артериального давления и тахикардия
- 2) хрипы в легких
- 3) тошнота и рвота
- 4) брадикардия, артериальное давление не изменено

ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА СТАВИТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИС

- 1) жировых загрязнений
- 2) лекарственных веществ
- 3) крови
- 4) моющего средства

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезинфекция
- 2) предстерилизационная очистка
- 3) ополаскивание проточной водой
- 4) стерилизация

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) тромбоз
- 2) воспаление
- 3) лихорадка
- 4) дистрофия

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА НАД ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ САНТИМЕТРА(ОВ)

- 1) одного
- 2) двух
- 3) пяти
- 4) десяти

К ВИДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) текущая и заключительная
- 2) плановая и экстренная
- 3) первичная и вторичная
- 4) профилактическая и очаговая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК НА _____ УРОВНЯХ

- 1) гигиеническом и хирургическом
- 2) бытовом и косметическом
- 3) социальном и гигиеническом
- 4) хирургическом и социальном

УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дисвитаминозом
- 2) гипервитаминозом
- 3) гиповитаминозом
- 4) авитаминозом

С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО

- 1) санировать очаги хронической инфекции
- 2) обеспечить рациональную физическую активность
- 3) чаще бывать на солнце
- 4) избегать переохлаждений

КУРЕНИЕ - ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) аденомы надпочечника
- 2) миомы матки
- 3) рака легкого
- 4) фибромы пищевода

ВЫГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЗДУШНОГО СТЕРИЛИЗАТОРА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ____ ГРАДУСОВ

- 1) 85
- 2) 45
- 3) 180
- 4) 160

ПЕРВЫМ СЛОЕМ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) водонепроницаемая бумага
- 2) влажная салфетка из нескольких слоёв марли
- 3) укрепляющий бинт
- 4) толстый слой ваты

ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА ОБЯЗАНА ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПАЛАТ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ)

- 1) каждые 3 часа
- 2) 1 раза
- 3) 2 раз
- 4) 3 раз

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ НЕСЕТ

- 1) заведующий отделением
- 2) старшая медицинская сестра
- 3) дежурный врач
- 4) младший медицинский персонал

ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ЭНТЕРОБИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кишечная непроходимость
- 2) зуд в перианальной области
- 3) влажный кашель
- 4) кишечное кровотечение

ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- 1) отказ от участия в общественной жизни
- 2) злоупотребление алкоголем
- 3) склонность к суициду
- 4) одиночество

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ

- 1) колбасу, бекон
- 2) баранину, индейку
- 3) морскую капусту, мясо кальмаров
- 4) свинину, конину

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ МЫТЬЯ РУК ВОДОЙ НА ГИГИЕНИЧЕСКОМ УРОВНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 3-5 МЛ

- 1) антисептика на основе 96 % этилового спирта
- 2) 3% раствора перекиси водорода
- 3) 5% раствора йода
- 4) антисептика на основе 70% этилового спирта

ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ ЖУРНАЛ

- 1) кварцевания кабинета
- 2) генеральной уборки
- 3) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- 4) контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

ПРИЧИНА КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

- 1) дрожжеподобные грибы
- 2) стафилококк
- 3) кишечная палочка

4) аллергическая реакция

КРАСНАЯ МОЧА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

- 1) эритроцитов
- 2) бактерий
- 3) лейкоцитов
- 4) цилиндров

ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- 1) потере аппетита
- 2) изменению настроения
- 3) истощению
- 4) избыточной массе тела

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИХ ВВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ

- 1) каждого применения
- 2) ежедневно
- 3) еженедельно
- 4) 1 раз в месяц

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- 1) искусственное дыхание «рот в рот»
- 2) непрямой массаж сердца
- 3) введение адреналина
- 4) прием Сафара

ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) вода
- 2) воздух, пыль в помещении
- 3) инъекционные инструменты
- 4) насекомые

ЦЕЛЬЮ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах
- 2) восполнение потребности в белках
- 3) получение необходимых жиров
- 4) обеспечение потребности в углеводах

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОЗБУЖДЕННЫМ ПАЦИЕНТОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) слушать молча, не перебивать замечаниями
- 2) выразить свое неудовольствие

- 3) задавать наводящие вопросы
- 4) выяснить причину возбуждения

ПОД НЕРАЗГЛАШЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПАЦИЕНТЕ ПОНИМАЮТ

- 1) эмпатию
- 2) врачебную тайну
- 3) эгротогению
- 4) соррогению

ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

- 1) 30 и более минут 5 раз в неделю
- 2) 20 минут 1-2 раза в неделю
- 3) 10 минут 3 раза в неделю
- 4) 10 минут 4 раза в день

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ _____ ДЕЙСТВИЕ НА ПЕЧЕНЬ

- 1) ототоксическое
- 2) кардиотоксическое
- 3) гепатотоксическое
- 4) нефротоксическое

ПАРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ КОСТИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

- 1) верхнечелюстные, скуловые, носовые, слезные
- 2) нижнечелюстная, сошник, подъязычная
- 3) решетчатая, клиновидная, височные
- 4) лобная, теменные, затылочная

НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗБУДИТЕЛИ

- 1) холеры
- 2) сальмонеллеза
- 3) дизентерии
- 4) вирусного гепатита В

ПРИ РАЗВИТИИ КРОВОХАРКАНИЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВЫЗЫВАЕТ ВРАЧА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПАЦИЕНТУ

- 1) бронхоальвеолярный лаваж
- 2) грелку на грудную клетку
- 3) возвышенное положение в кровати
- 4) ингаляции бронхолитиков

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ

- 1) внимание, «присутствие», подтверждение понимания

- 2) поддержание активного диалога
- 3) дополнительная аргументация
- 4) активные возражения и контраргументы

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ СЛУХА, ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) контакт глаз, прикосновения, жесты, мимику, личную дистанцию
- 2) громкий голос, общественную дистанцию
- 3) громкий, строгий голос
- 4) социальную дистанцию

МЕТЕОРИЗМ - ЭТО

- 1) задержка стула более чем на 48 часов
- 2) спастические боли в кишечнике
- 3) частый жидкий стул
- 4) патологическое газообразование в кишечнике

ТАРА, КОТОРАЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б

- 1) бумажные мешки синего цвета
- 2) твердая картонная тара
- 3) одноразовые пакеты желтого цвета
- 4) мягкая полимерная тара черного цвета

ВОЗБУДИТЕЛИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОХРАНЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В СУХОМ СОСТОЯНИИ ДО ____ ЛЕТ

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ДОКОРМА РЕБЕНКУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паратрофия у ребенка
- 2) гипогалактия у матери
- 3) дисфагия у ребенка
- 4) мастит у матери

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) антисептиков (жидкого мыла)
- 2) туалетного мыла
- 3) мыла, с повышенным содержанием глицерина
- 4) специальных косметических средств

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПАЦИЕНТАМ

- 1) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- 2) с хроническими формами заболеваний

- 3) с острыми заболеваниями
- 4) из групп риска

ЛЁГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

- 1) повышается при нагрузке
- 2) усиливается
- 3) снижается
- 4) не меняется

«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ

- 1) установлении числа контактных
- 2) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
- 3) подозрении на инфекционное заболевание
- 4) установлении границ эпидемического очага

К ФАКТОРАМ ИСКУССТВЕННОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) руки, контаминированные возбудителем
- 2) продукты питания
- 3) медицинские инструменты и оборудование
- 4) предметы быта и производственной обстановки

ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) количество сахара, ацетона
- 2) плотность и диурез
- 3) наличие уробилина, желчных пигментов
- 4) количество форменных элементов, бактерий

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) ограничение жиров и гиподинамию
- 2) увеличение общего калоража пищи
- 3) медикаментозную терапию без изменения образа жизни
- 4) диету и физическую активность

ПРИЗНАКАМИ, УКАЗЫВАЮЩИМИ НА ТЯЖЁЛУЮ ЭЛЕКТРОТРАВМУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) потеря сознания, отсутствие пульса на магистральных артериях, судороги, остановка дыхания
- 2) наличие «меток тока» в местах входа и выхода, жгучая боль в области контакта
- 3) ощущение «ползания мурашек», мышечная дрожь, испуг, тахикардия
- 4) головокружение, «мелькание мушек» перед глазами, тошнота, шум в ушах

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ

- 1) морского побережья

- 2) в условиях горного климата
- 3) удаленных от дома
- 4) местного значения

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ

- 1) социальная
- 2) специализированная, социальная и санитарная
- 3) первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная
- 4) санитарная, высокотехнологичная

КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) нижней диафрагмальной артерией и нижней подчревной веной
- 2) воротной веной и чревным стволом
- 3) воротной веной и печеночной артерией
- 4) брыжеечной артерией и печеночной артерией

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ _____ КОМА

- 1) гипергликемическая
- 2) уремическая
- 3) гипогликемическая
- 4) кетоацидотическая

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРОВОДИТСЯ _____ МЕТОДОМ

- 1) химическим
- 2) лучевым
- 3) воздушным
- 4) паровым

МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) запрет въезда на неблагополучную территорию
- 2) изоляцию больного
- 3) осмотр прибывших из неблагополучных регионов
- 4) дезинфекцию помещений

РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНА

- 1) при появлении признаков клинической смерти
- 2) при появлении признаков биологической смерти
- 3) только при внезапной смерти молодых пациентов и детей
- 4) только при внезапной смерти у пожилых больных

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- 1) антибиотики
- 2) диуретики
- 3) цитостатики
- 4) муколитики

УПАКОВКИ С МАТЕРИАЛАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ В

- 1) прохладном месте
- 2) освещённом месте
- 3) открытых шкафах
- 4) закрытых шкафах

ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) трихоцефалеза
- 2) описторхоза
- 3) энтеробиоза
- 4) аскаридоза

ПОСЛЕ СОГРЕВАНИЯ ОБМОРОЖЕННЫХ УЧАСТКОВ НЕОБХОДИМО

- 1) обработать кожу спиртом
- 2) наложить теплоизолирующую повязку
- 3) смазать жиром или мазью
- 4) интенсивно растереть шерстяной тканью

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

- 1) исключение из рациона продуктов, содержащих железо
- 2) постановка очистительной клизмы вечером
- 3) прием активированного угля
- 4) постановка очистительной клизмы вечером и утром

В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)

- 1) 24
- 2) 18
- 3) 32
- 4) 40

ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- 1) невролога
- 2) офтальмолога
- 3) хирурга
- 4) терапевта

ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) одышка смешанного характера
- 2) экспираторная одышка
- 3) кашель с выделением пенистой мокроты
- 4) инспираторная одышка

ДЛЯ НЕКРОЗА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА

- 1) боль или чувство сжатия, давления или тяжести за грудиной, длительностью около 5 минут
- 2) боль или чувство сжатия, давления или тяжести за грудиной, длительностью более 20 минут
- 3) колющая боль справа в грудной клетке, длительность около 10 минут
- 4) колющая боль слева в грудной клетке, длительность около 10 минут

В ПЕРВИЧНОЙ МОЧЕ В НОРМЕ СОДЕРЖИТСЯ

- 1) мочевины
- 2) глюкозы
- 3) мочевины
- 4) аммиака

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ

- 1) выраженной тахикардии
- 2) нарушениях сердечной проводимости
- 3) острой сердечной недостаточности
- 4) сердечной недостаточности

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ

- 1) вводятся струйно
- 2) не требуется биологическая проба
- 3) вводятся капельно 50-60 в мин
- 4) требуется постановка биологической пробы

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО _____ ГРАММ

- 1) 15
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 10

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) неосведомленность о методах и средствах контрацепции
- 2) неблагоприятная экологическая ситуация
- 3) широкая доступность информации о половом воспитании
- 4) дефицит контрацептивов

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ БЕЛЬЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) кипячение в дистиллированной воде
- 2) химическая дезинфекция
- 3) УФ-облучение
- 4) озонирование

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОЙТИ

- 1) профессиональную переподготовку
- 2) специализацию
- 3) повышение квалификации
- 4) усовершенствование

РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО

- 1) угнетение жизненных функций
- 2) совокупность неотложных состояний
- 3) разновидность несчастных случаев у детей
- 4) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) врожденный порок сердца
- 2) поллиноз
- 3) пищевая аллергия
- 4) стрептококковая инфекция

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ

- 1) реконвалесцент
- 2) больной человек
- 3) птицы-резервуар вируса
- 4) животные - резервуар вируса

СИМПТОМАМИ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) острое повышение температуры, боль в грудной клетке
- 2) длительный субфебрилитет, кашель более трёх недель
- 3) высокая температура, кашель с обильной мокротой
- 4) приступообразный кашель, затруднённое дыхание

ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ревматизм
- 2) подагра
- 3) сахарный диабет
- 4) атеросклероз

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) прогестерон
- 2) тестостерон
- 3) эстроген

4) кортизол

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения
- 2) людей, которые недавно начали курить
- 3) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
- 4) некурящих людей

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР ПОСТРАДАВШЕГО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ ПАЦИЕНТА СООБЩЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ В

- 1) травмпункт
- 2) отделение полиции
- 3) управление Роспотребнадзора
- 4) управление МЧС

ПОДСЧЕТ ПЛОЩАДИ ОЖОГА У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ

- 1) правилом девяток
- 2) индексом Альговера
- 3) индексом Франка
- 4) методом ладони

ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) шприц-ручка
- 2) вакутейнер
- 3) сосудистый катетер
- 4) игла Дюффо

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

- 1) 120°C, 1,1 атм, 20 минут
- 2) 120°C, 4 атм, 20 минут
- 3) 132°C, 2 атм, 20 минут
- 4) 180°C, 3 атм, 20 минут

РЕЗКАЯ СЛАБОСТЬ, ОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ЛИПКИЙ ПОТ, БЛЕДНОСТЬ, НИТЕВИДНЫЙ ПУЛЬС И СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

- 1) критическом снижении температуры
- 2) быстром и значительном повышении температуры
- 3) литическом снижении высокой температуры
- 4) субфебрилитете

ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- 1) сохранение сведений о пациенте

- 2) выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности
- 3) чёткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей
- 4) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО

- 1) промыть глаз физиологическим раствором или водой однократно, не менее 15 минут
- 2) наложить повязку и обратиться за медицинской помощью
- 3) промыть глаз раствором фурацилина в течение 15 минут и наложить повязку
- 4) использовать мазь для глаз, наложить повязку и обратиться за медицинской помощью

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЖЕЛУДКА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) утром сифонная клизма
- 2) вечером очистительная клизма
- 3) вечером легкий ужин, утром натощак
- 4) вечером и утром очистительная клизма

ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) гипертоническом кризе
- 2) коллапсе
- 3) кардиогенном шоке
- 4) обмороке

ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ИСТОЧНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) сапронозом
- 2) зоонозом
- 3) антропонозом
- 4) антропозоонозом

ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО

- 1) внутривенно
- 2) внутримышечно
- 3) подкожно
- 4) внутрикожно

ПРИ ВЗЯТИИ КРОВИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ЖГУТ УБИРАЮТ

- 1) в любой момент процедуры
- 2) после того как собрали кровь и вынули иглу из вены
- 3) после того как собрали кровь, но до извлечения иглы из вены
- 4) после того как ввели иглу в вену

САНПРОПУСКНИК СЛУЖИТ ДЛЯ

- 1) регистрации пациентов
- 2) приготовления дезинфицирующих растворов
- 3) оказания экстренной помощи
- 4) санитарной обработки пациента

МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) искусственной вентиляции лёгких
- 2) оксигенотерапии
- 3) непрямого массажа сердца
- 4) санации дыхательных путей

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

- 1) 5-6 см
- 2) 2-3 см
- 3) 3-4 см
- 4) 4-5 см

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВЫШЕ НОРМЫ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) апноэ
- 2) тахипноэ
- 3) эупноэ
- 4) брадипноэ

ПРИ МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА С ОТЕКАМИ ПОКАЗАНО

- 1) определение суточного диуреза
- 2) измерение температуры тела
- 3) подсчет частоты дыхания
- 4) измерение артериального давления

ПОЛОВОЙ КРИЗ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) частым мочеиспусканием
- 2) повышением температуры тела
- 3) увеличением грудных желез
- 4) снижением массы тела

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА РЕБЕНКА НА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) агалактия у матери
- 2) самопроизвольное истечение молока
- 3) затруднение выделения молока
- 4) быстрое поступление молока

ДЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРЕН _____ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

- 1) половой
- 2) алиментарный
- 3) воздушно-капельный
- 4) трансмиссивный

БЕЗ УПАКОВКИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ СТЕРИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ _____ МЕТОДОМ

- 1) плазменным
- 2) лучевым
- 3) паровым
- 4) воздушным

ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ БОЛИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- 1) правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, лопатку, надключичную область
- 2) эпигастрии, носят опоясывающий характер
- 3) эпигастрии в начале заболевания, затем опускаются в правую подвздошную область
- 4) поясничной области, иррадиируют в половые органы, внутреннюю поверхность бедра

РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гидроторакс
- 2) асцит
- 3) пастозность
- 4) быстрое увеличение массы тела

НАРКОТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО МОРФИН ОТНОСИТСЯ К СПИСКУ

- 1) II
- 2) A
- 3) Б
- 4) IV

ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ВЫДЕРЖКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) период между циклами генеральных уборок в помещении
- 2) время от момента заражения до появления первых клинических симптомов
- 3) время от начала воздействия дезинфицирующего средства до достижения требуемого уровня обеззараживания
- 4) время нахождения изделия в стерилизаторе при заданной температуре

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА

- 1) 2% раствором соды
- 2) 0,05% раствором калия перманганата

- 3) проточной водой
- 4) 0,02% раствором риванола

ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

- 1) гречневую кашу, помидоры, гранаты
- 2) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
- 3) мясо, рыбу, консервы
- 4) яйца, белый хлеб, сладости

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СПАСАТЕЛЬ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОСТРАДАВШЕМУ

- 1) верхом на пострадавшем (сверху)
- 2) со стороны головы (у изголовья)
- 3) сбоку (на коленях рядом с грудной клеткой)
- 4) со стороны ног (у ступней)

ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ОТДЕЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ ПОДЧИНЕНИИ,

- 1) младшая медсестра по уходу
- 2) палатная (постовая) медсестра
- 3) старшая медицинская сестра
- 4) заведующий отделением

ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) занятие физической культурой
- 2) употребление пищи
- 3) употребление алкоголя
- 4) табакокурение

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) укорочение
- 2) остеопороз
- 3) обызвествление
- 4) размягчение

НАЧАЛЬНЫМ ВИДОМ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ЧС СЧИТАЕТСЯ _____ ПОМОЩЬ

- 1) первая врачебная
- 2) квалифицированная медицинская
- 3) доврачебная
- 4) первая

ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) алкоголизм

- 2) пребывание на солнце
- 3) недосыпание
- 4) нарушение углеводного и липидного обмена

В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) кальция хлорид
- 3) физиологический раствор
- 4) магния сульфат

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ УПРАЖНЕНИЯ

- 1) только пассивные (массаж, механотерапия)
- 2) общеразвивающие для легкой утренней зарядки
- 3) силовые с тяжелыми весами для укрепления мышц
- 4) для гибкости, растяжки, баланса и выносливости

НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА С БАЗОВЫМ УРОВНЕМ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ВКЛЮЧАЯ

- 1) медсестра участковая, патронажная, приёмного отделения, палатная (постовая), перевязочной, процедурной, стерилизационной
- 2) медицинская сестра - анестезист, операционная медицинская сестра, диетическая
- 3) медицинская сестра по косметологии, физиотерапии, реабилитации
- 4) главная медицинская сестра

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) составление индивидуальной диеты
- 2) измерение массы тела
- 3) назначение лечения
- 4) определение степени ожирения

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИЗ КОСТНОЙ ТКАНИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) миома
- 2) липома
- 3) гемангиома
- 4) остеома

ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) крупозной пневмонии
- 2) острым бронхите
- 3) бронхиальной астме
- 4) сухом плеврите

МИКСЕДЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ

- 1) болезни Иценко–Кушинга
- 2) тиреотоксикоза
- 3) гипотиреоза
- 4) несахарного диабета

В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ПАЦИЕНТУ

- 1) дают прохладное витаминизированное питье
- 2) прикладывают холодную примочку
- 3) проводят влажное обертывание
- 4) дают крепкий горячий чай

В 1 МЛ ВОДНОГО РАСТВОРА СОДЕРЖИТСЯ _____ КАПЕЛЬ

- 1) 100
- 2) 38
- 3) 20
- 4) 5

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ПАКЕТА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА

- 1) 1/3
- 2) 2/3
- 3) 1/2
- 4) 3/4

ПРИ ОТСУТСТВИИ У ПОСТРАДАВШЕГО СОЗНАНИЯ И НАЛИЧИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ

- 1) подложить пострадавшему под голову валик из одежды
- 2) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- 3) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего
- 4) повернуть пострадавшего на бок

В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С COVID-19 В СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕПАРАТ

- 1) интерферон альфа
- 2) фавипиравир
- 3) молнупиравир
- 4) нирматрелвир+ритонавир

ВО 2-ОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- 1) холодная примочка, теплые ножные ванны
- 2) холодный компресс, теплое питье
- 3) грелки к ногам, горячий чай

4) жаропонижающие препараты разных форм

СТЕРНАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ ПРИ

- 1) циррозе печени
- 2) экссудативное плеврите
- 3) пневмонии
- 4) лейкозе

ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС МЕНЯЮТ КАЖДЫЕ (В МИН)

- 1) 45-60
- 2) 5-10
- 3) 2-3
- 4) 15-30

HELICOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- 1) бронхоэктатической болезни
- 2) язвенной болезни желудка
- 3) желчекаменной болезни
- 4) гипертонической болезни

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ В БИКС ПОМЕЩАЮТ

- 1) 3 индикатора стерильности
- 2) 2 индикатора стерильности и флакон с метиленовым синим
- 3) флакон борной кислоты с кармином
- 4) 2 индикатора стерильности

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) ношении масок в общественных местах
- 2) применении противовирусных препаратов
- 3) дезинфекции в очаге инфекции
- 4) вакцинации населения

К СПОСОБАМ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) наложение сосудистого шва
- 2) применение гемостатической губки
- 3) наложение давящей повязки
- 4) перевязка сосуда в ране

ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) боль
- 2) аллергия
- 3) кровотечение
- 4) инфекция

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ _____ АНЕМИИ

- 1) гипопластической
- 2) серповидно-клеточной
- 3) гемолитической
- 4) железодефицитной

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБЗОРНОМ ОСМОТРЕ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) только максимальное сгибание конечности в суставе
- 2) наложение асептической повязки
- 3) пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки
- 4) иммобилизацию конечности

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ

- 1) перед переводом из родового блока
- 2) перед выпиской из родильного дома
- 3) на 10 минуте жизни
- 4) на 1-ой и 5-ой минутах жизни

СИМПТОМАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ОЖОГА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) головная боль, тошнота, «мелькание мушек» перед глазами, сонливость
- 2) покраснение и отек кожи лица, шеи, опаленные волосы в носовых ходах
- 3) осиплость голоса вплоть до его отсутствия, приступообразный кашель с мокротой, содержащей копоть, нарастающая одышка
- 4) острая боль в горле и за грудиной, усиливающаяся при глотании и кашле

МЫТЬЕ РУК С МЫЛОМ ПЕРЕД ЕДОЙ ПАЦИЕНТАМ, УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ

- 1) буфетчицы
- 2) палатной или процедурной медсестры
- 3) палатной санитарки
- 4) младшей медсестры по уходу за больными

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ ЖУРНАЛ

- 1) учета санпросвет работы
- 2) перевязок
- 3) отказа от госпитализации
- 4) учета работы бактерицидной лампы

ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПЕРЕЛОМА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАСТЬ

- 1) хирургической шейки
- 2) анатомической шейки
- 3) диафиза
- 4) мышцелка

ДОКУМЕНТОМ, ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинская карта стационарного больного
- 2) паспорт гражданина РФ
- 3) страховой полис ОМС
- 4) медицинская карта амбулаторного больного

ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) морфин
- 2) героин
- 3) панангин
- 4) парацетамол

ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЛЕЖИТ

- 1) незагрязнённое изделие, которым не использовались
- 2) инструмент, хранящийся в не вскрытом крафт-пакете
- 3) воздух в помещениях класса чистоты А, Б и В
- 4) простерилизованный бикс с фильтром

ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прекращения сердечной деятельности
- 2) прекращение дыхания
- 3) появления трупных пятен
- 4) снижения температуры кожи ниже 20°C

МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях
- 2) выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи и эвакуации
- 3) распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»
- 4) распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу

ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) положительное поведение окружающих сверстников
- 2) эмоциональная близость к матери
- 3) позитивные коммуникации в семье
- 4) употребление алкоголя членами семьи

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) до 15-20 минут
- 2) первые 5 минут

- 3) до 8-10 минут
- 4) до 12-15 минут

СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО

- 1) паспортный возраст
- 2) хронологический возраст
- 3) календарный возраст
- 4) биологический возраст

В ЖЕЛУДКЕ РАЗЛИЧАЮТ

- 1) пищеводное сужение
- 2) верхушку
- 3) илеоцекальный угол
- 4) привратник

ПО ШОКОВОМУ ИНДЕКСУ (АЛЬГОВЕР) МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) вид травмы
- 2) степень угнетения сознания
- 3) величину кровопотери и степень шока
- 4) степень угнетения дыхания

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РОГОВИЦЫ ПАЦИЕНТУ В КОМЕ НУЖНО

- 1) накладывать бинокулярную повязку
- 2) проводить инфузионную терапию по назначению врача
- 3) периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
- 4) смазать веки солкосерилом

ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ К

- 1) ожирению
- 2) повышению работоспособности
- 3) повышенной утомляемости
- 4) анорексии

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительная дисфункция кишечника
- 2) поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)
- 3) работа в системе общественного питания
- 4) сдача крови в качестве донора

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) дородовую диагностику состояния плода
- 2) диагностику заболеваний у новорожденных
- 3) обследование родителей после рождения ребенка

4) диспансерное наблюдение младенца

ДЛЯ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПАЦИЕНТУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) на спине
- 2) на животе
- 3) «Симса»
- 4) на боку

ПРИ НАЛИЧИИ ОЖОГОВ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НЕОБХОДИМО

- 1) наложить сухую асептическую повязку, не вскрывая пузыри
- 2) смазать ожоги маслом или кремом
- 3) обработать раны спиртовым раствором
- 4) приложить лёд непосредственно к ожоговой поверхности

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ С АЭРОГЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ НЕОБХОДИМО

- 1) тщательно мыть овощи перед употреблением
- 2) осуществлять борьбу с насекомыми
- 3) строго соблюдать правила антисептики
- 4) проветривать помещение

У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

- 1) гипертония мышц - сгибателей
- 2) гипертония мышц - разгибателей
- 3) гипотония мышц - сгибателей
- 4) нормотония мышц

В ПЕЧЕНИ В ВИДЕ ГЛИКОГЕНА ЗАПАСАЕТСЯ ИЗБЫТОК

- 1) белка
- 2) целлюлозы
- 3) глюкозы
- 4) жира

ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лечение соматических заболеваний
- 2) низкокалорийное питание
- 3) высококалорийное питание
- 4) предупреждение аборт

СКОПЛЕНИЕ ТЕЛ НЕЙРОНОВ ВНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ядром
- 2) нервом
- 3) ганглием (нервным узлом)

4) сплетением

ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ПЕРИОД

- 1) с момента рождения плода до рождения последа
- 2) от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки 8-10 см
- 3) с момента отхождения околоплодных вод
- 4) от раскрытия шейки матки до изгнания плода

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МИОКАРДА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) перикардит
- 2) панкардит
- 3) эндокардит
- 4) миокардит

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) аккредитация специалиста
- 2) сертификация
- 3) лицензирование
- 4) аттестация специалиста

МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ

- 1) утром натощак, в тёплом виде в лабораторию
- 2) дважды, до и после применения антибиотиков
- 3) после тщательного туалета ротовой полости
- 4) трижды, в стерильные ёмкости, в специальном помещении

САМОЙ БОЛЬШОЙ МЫШЦЕЙ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) широчайшая спины
- 2) большая ягодичная
- 3) портняжная
- 4) четырехглавая бедра

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ (%)

- 1) 0,9
- 2) 10
- 3) 1
- 4) 0,1

НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ

- 1) назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры
- 2) проведение инфузионной терапии
- 3) обеспечение дробного питания

4) наблюдение за контактными в течение 30 дней

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) психических заболеваний
- 2) обструктивного бронхита
- 3) сердечно-сосудистых заболеваний
- 4) заболеваний почек

УХУДШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА

- 1) повышения эластичности сосудистой стенки
- 2) расширения всех капилляров
- 3) увеличения скорости кровотока
- 4) снижения эластичности сосудистой стенки

НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ (Г)

- 1) 2500
- 2) 2700
- 3) 2900
- 4) 3000

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 1 раз в квартал

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

- 1) миокардита
- 2) стенокардии
- 3) острой и хронической сердечной недостаточности
- 4) атеросклероза сосудов

ИНФЕКЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) инфекционное заболевание, полученное пациентом в результате проведения медицинской процедуры
- 2) любая инфекция, появившаяся во время пребывания пациента в стационаре
- 3) любое инфекционное заболевание, поражающее сотрудников и (или) пациентов вследствие нахождения в медицинской организации, независимо от сроков появления симптомов
- 4) профессиональное инфекционное заболевание медицинских работников

К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1) выявление наследственной отягощенности
- 2) выявление аномалий развития желчных путей

- 3) коррекцию образа жизни
- 4) коррекцию терапевтического лечения

БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

- 1) полубокс отделения детской инфекционной больницы
- 2) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
- 3) отделение интенсивной терапии соматического стационара
- 4) общую палату стационара специализированной медицинской помощи

ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ АБСОЛЮТНОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМ РИСКЕ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) IIIб
- 2) I
- 3) II
- 4) IIIа

НАЛИЧИЕ КОНКРЕМЕНТОВ В ЧАШЕЧНО-ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЕ ПОЧКИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) нефролитиаз
- 2) холедохолитиаз
- 3) панкреолитиаз
- 4) цистолитиаз

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

- 1) первичная специализированная аккредитация специалистов
- 2) первичная аккредитация специалистов
- 3) периодическая аккредитация специалистов
- 4) аттестация

ПРИЗНАКОМ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышения артериального давления
- 2) гиперемия кожных покровов
- 3) повышение температуры тела
- 4) слабый частый пульс

НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) художественный образ (герой фильма, литературный герой)
- 2) наследственность
- 3) мотивация к сохранению здоровья
- 4) трудовое воспитание

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПЕЧЕНИ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖАТ ДИСТРОФИЧЕСКИЕ И НЕКРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) холангит
- 2) цирроз
- 3) гепатоз
- 4) гепатит

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) 1 раз в день
- 4) 1 раз в неделю

СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ УМЕРЕННЫМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) менее 1
- 2) от ≥ 1 до 5
- 3) равной или более 10
- 4) от ≥ 5 до 10

ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ, МОКРОТА ПАЦИЕНТОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМАМИ 1-2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ), СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- 1) допускается без предварительного обеззараживания, при условии ее оснащения системой обеззараживания сточных вод
- 2) не допускается без предварительного обеззараживания химическим или физическим методами
- 3) не допускается обеззараженные даже химическим или физическим методами
- 4) допускается без предварительного обеззараживания

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ КЛИЗМА

- 1) расслабляет кишечную мускулатуру
- 2) усиливает желудочную секрецию
- 3) вызывает транссудацию жидкости
- 4) обволакивает и размягчает каловые массы

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ПОВЫШАЕТ

- 1) кортизол
- 2) паратгормон
- 3) инсулин
- 4) прогестерон

ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- 1) срочная госпитализация
- 2) направление в поликлинику
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) выполнение физиотерапевтических процедур

ВИРУС КОРИ ПЕРЕДАЕТСЯ _____ ПУТЕМ

- 1) трансмиссивным
- 2) алиментарным
- 3) воздушно-капельным
- 4) контактным

ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- 1) сахарный диабет
- 2) мочекаменную болезнь
- 3) цистит и уретрит
- 4) гломерулонефрит

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) psychosis
- 2) psychologia
- 3) psychotherapia
- 4) psychiatria

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СО СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1) дезинфекции
- 2) стерилизации
- 3) использованию
- 4) обработке

ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА ЖИВОТНЫМ ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

- 1) бешенством
- 2) туберкулезом
- 3) респираторной вирусной инфекцией
- 4) герпесом

К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) тромбоз
- 2) дисбактериоз
- 3) раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
- 4) поражение печени

САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кахексия
- 2) желудочное кровотечение
- 3) кишечная непроходимость
- 4) обезвоживание

УНИЧТОЖЕНИЕ НА(В) ИЗДЕЛИЯХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ

- 1) стерилизации
- 2) дезинфекции
- 3) дезинсекции
- 4) дератизации

ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА ПРОВОДЯТ

- 1) сельхозработникам
- 2) лесникам
- 3) геологам
- 4) ветеринарам

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ _____ ВОДА

- 1) дистиллированная
- 2) кипяченая
- 3) проточная
- 4) дважды дистиллированная

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА НАЛИЧИЕ ПЕРЕЛОМА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) покраснение кожи
- 2) патологическая подвижность в месте повреждения
- 3) локальное повышение температуры
- 4) зуд в области травмы

НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиподинамия
- 2) наследственная предрасположенность
- 3) нерациональное питание
- 4) ожирение

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) муниципальное управление здравоохранением
- 2) функционирование частной системы здравоохранения
- 3) возможность выбора медицинской организации

4) государственное управление здравоохранением

У ВЗРОСЛЫХ К ПЕРВОМУ ЭТАПУ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) контроль показателей кровообращения
- 2) проведение закрытого массажа сердца
- 3) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- 4) проведение искусственной вентиляции легких

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) артериальной гипертензией или гипертонией
- 2) систолическим давлением
- 3) пульсовым давлением
- 4) артериальной гипотензией или гипотонией

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ

- 1) его активной трудоспособности
- 2) при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
- 3) полного физического, духовного и социального благополучия
- 4) активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) углекислый газ
- 2) кислород
- 3) угарный газ
- 4) азот

ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБЫЧНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экстренное извещение
- 2) журнал учета процедур
- 3) тетрадь учета работы процедурной медсестры
- 4) протокол времени несчастного случая

ПИГМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦВЕТ ГЛАЗ, КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ В

- 1) радужке
- 2) ресничном теле
- 3) сетчатке
- 4) фиброзной оболочке

ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ НЕ ДВИГАЕТСЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВО ВРЕМЯ РАССЛАБЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ, ТАК КАК

- 1) этому препятствуют внутренние карманные клапаны вен
- 2) венозная кровь двигается только в нисходящем направлении
- 3) вязкость венозной крови больше, чем артериальной
- 4) давление в брюшной полости при выдохе повышается

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- 1) как разовое мероприятие в помещениях медицинской организации, находящихся в неудовлетворительном состоянии
- 2) с целью предотвращения распространения возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и их переносчиков из соседних отделений (палат)
- 3) систематически с целью снижения микробной обсемененности объектов внутрибольничной среды
- 4) периодически с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях медицинской организаций

КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- 2) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- 3) приступ удушья, ортопноэ
- 4) лихорадка, рвота

РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НАЗЫВАЮТ

- 1) смену дезинфицирующего средства в пределах группы
- 2) замену дезинфицирующего средства на препарат другой группы
- 3) одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп
- 4) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания

РУКУ В СТОРОНУ ОТВОДИТ _____ МЫШЦА

- 1) трапецевидная
- 2) большая грудная
- 3) дельтовидная
- 4) нижняя задняя зубчатая

СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ В ПОЧКАХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение фильтрационной способности
- 2) увеличение размеров почек и повышение канальцевой реабсорбции
- 3) увеличение почечного кровотока
- 4) снижение почечного кровообращения

МЕСТО ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

- 1) средняя треть внутренней поверхности бедра
- 2) верхняя треть задней поверхности бедра
- 3) ниже середины паховой складки
- 4) выше середины паховой складки

ВЕДУЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ГРИППА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лихорадка, катаральные явления
- 2) тошнота, боли в животе

- 3) головная боль, слабость
- 4) тахикардия, одышка

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН

- 1) ферментные препараты
- 2) антисептики
- 3) гипогликемические средства
- 4) кардиопротекторы

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ НЕ МЕНЕЕ _____ МИНУТ

- 1) 60
- 2) 45
- 3) 30
- 4) 15

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH

- 1) 5,5
- 2) 3,0
- 3) 7,0
- 4) 8,5

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКРЫТОГО СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТ _____ ЧАСОВ

- 1) 20
- 2) 18
- 3) 6
- 4) 12

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) крестец
- 2) висок
- 3) грудная клетка
- 4) предплечье

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) билирубин, белок
- 2) лейкоциты, эритроциты
- 3) ацетон, сахар
- 4) количество, относительная плотность мочи

КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ ИМЕЮТ _____ ЦВЕТ

- 1) белый
- 2) серый

- 3) голубой
- 4) черный

ПРИ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- 1) пальцевое удаление инородного тела вслепую
- 2) похлопывание по спине между лопаток
- 3) прием Геймлиха
- 4) надавливание на грудную клетку

К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) прекращение менструального цикла
- 2) увеличение веса
- 3) боль в животе
- 4) снижение аппетита

ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА В ИМЕЮТ ЦВЕТ

- 1) черный
- 2) белый
- 3) желтый
- 4) красный

КОФЕИН ОТНОСЯТ К

- 1) антисептикам
- 2) местным анестетикам
- 3) аналептикам
- 4) антибиотикам

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бронхоспазм
- 2) отек гортани
- 3) инородное тело
- 4) западение языка

ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМ ПРИ КЛЕЩЕВОМ БОРРЕЛИОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) желтуха
- 2) поражение почек
- 3) геморрагическая сыпь
- 4) кольцевидная эритема

СРОК ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ЗАКЛЕЕННЫХ ПАКЕТАХ СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

- 1) 20
- 2) 7

3) 14

4) 30

ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ НЕГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) обязательное кариотипирование всех беременных женщин
- 2) защиту беременной женщины от тератогенов (алкоголь, инфекции, некоторые лекарства)
- 3) ведение здорового образа жизни мужчиной
- 4) анализ ДНК плода у всех беременных женщин

ПЕРЕД ОКАЗАНИЕМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО

- 1) убедиться в собственной безопасности
- 2) получить разрешение на ее оказание у диспетчера экстренных служб
- 3) получить разрешение на ее оказание у пострадавшего
- 4) получить разрешение на ее оказание у родственников пострадавшего

ОСНОВНЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уменьшение выработки соляной кислоты париетальными клетками желудка
- 2) стимулирование перистальтики всех отделов желудочно-кишечного тракта
- 3) стимулирование выработки соляной кислоты париетальными клетками
- 4) устранение спазма гладких мышц кишечника

ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) в кресле-каталке
- 2) на носилках
- 3) передвижением в сопровождении медработника
- 4) самостоятельным передвижением

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТРАВМУ ЖИВОТА С ВНУТРЕННИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) назначение обезболивающих препаратов перорально
- 2) срочная транспортировка в стационар с мониторингом витальных функций
- 3) выполнение очистительной клизмы
- 4) прикладывание грелки к животу

ОБРАЗОВАНИЕ МОЧИ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССОВ

- 1) диффузии, реабсорбции, выделения
- 2) поглощения, реполяризации, секреции
- 3) фильтрации, всасывания, экскреции
- 4) фильтрации, реабсорбции, секреции

БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ _____ ЛУЧИ

- 1) видимые

- 2) ионизирующие
- 3) инфракрасные
- 4) ультрафиолетовые

ДЕЗИНСЕКЦИЯ – ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ

- 1) грызунов
- 2) насекомых
- 3) патогенных микроорганизмов
- 4) вирусов

КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРЕТСЯ

- 1) перед обедом
- 2) после завтрака
- 3) утром натощак
- 4) в любое время суток

РОЛЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) обеспечении взаимосвязи организма и окружающей среды
- 2) удалении вредных веществ из организма
- 3) доставке кислорода в организм
- 4) выделении гормонов в кровь

ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ

- 1) гиперкалиемии
- 2) дистрофии
- 3) гипотензии
- 4) стероидной язвы

ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА О

- 1) здоровье женщины
- 2) старении
- 3) смерти
- 4) профилактике и лечении болезней старческого возраста

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ К

- 1) перечню вредных факторов и условий труда
- 2) формам профессионального роста
- 3) образованию, опыту работы, трудовым функциям, условиям допуска к работе
- 4) особым условиям допуска к профессиональной деятельности

В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ РАСПОЛОЖЕН _____ КЛАПАН

- 1) четырехстворчатый
- 2) трехстворчатый

- 3) двустворчатый
- 4) полулунный

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

- 1) ундинка
- 2) пробирка
- 3) грушевидный баллончик
- 4) шприц Жане

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ В РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ НЕОБХОДИМО

- 1) прополоскать водой, затем 70 % спиртом
- 2) прополоскать 70 % спиртом
- 3) обильно промыть водой
- 4) прополоскать 70 % спиртом, затем водой

ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) наличие уробилина, желчных пигментов
- 2) количество сахара, ацетона
- 3) количество форменных элементов, бактерий
- 4) плотность и диурез

ПРИ НАРУШЕНИИ ЭЛАСТИЧНОСТИ ВОЛОКОН ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1) пневмосклероз и эмфизема
- 2) туберкулез и плеврит
- 3) пневмония и бронхит
- 4) бронхиальная астма и муковисцидоз

УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- 1) специальной комиссией с составлением акта
- 2) старшей медицинской сестрой
- 3) лечащим врачом
- 4) дежурной медицинской сестрой

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕОБХОДИМО

- 1) немедленно приступить к непрямому массажу сердца
- 2) освободить пострадавшего с помощью непроводящего ток предмета
- 3) дать пострадавшему обезболивающее средство
- 4) обработать видимые ожоги антисептиком

НОРМАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 400-550 см
- 2) 120-400 см

- 3) 45-120 см
- 4) 400-750 см

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) рост, вес, окружность талии
- 2) частота дыхания, пульс
- 3) температура тела, артериальное давление
- 4) уровень глюкозы в крови, холестерин

ПОД АНТИСЕПТИКОЙ ПОНИМАЮТ СИСТЕМУ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) предотвращение попадания микробов в рану или организм больного
- 2) уменьшение количества или уничтожение микробов в ране или организме больного
- 3) уничтожение всех микроорганизмов, включая их споры
- 4) уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды

В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) обработать инфильтрат 5% раствором йода
- 2) довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений
- 3) отменить последующие инъекции
- 4) проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию

ФОРМОЙ ОБЩЕЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В ДВЕ СТАДИИ: ЭРЕКТИЛЬНОЙ И ТОРПИДНОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) шок
- 2) коллапс
- 3) кома
- 4) стресс

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА

- 1) главной медсестры
- 2) постовой медсестры
- 3) эпидемиолога
- 4) процедурной медсестры

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пролиферацией
- 2) овуляцией
- 3) лактацией
- 4) саливацией

К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) отеки, головная боль
- 2) боли в области сердца, одышка
- 3) чувство голода, потливость
- 4) одышка, сухой кашель

ГЛУБИНА КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ____ СМ

- 1) 3-4
- 2) 5-6
- 3) 9-10
- 4) 7-8

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ _____ ШОКА

- 1) анафилактического
- 2) кардиогенного
- 3) гиповолемического
- 4) септического

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ _____ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ (%)

- 1) 10
- 2) 0,9
- 3) 2
- 4) 20

ПРИМЕРОМ КОМБИНАТИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) разное сочетание аллелей у детей одних родителей
- 2) появление загара у человека под действием УФ-лучей
- 3) возникновение синдрома Дауна
- 4) развитие мышечной массы при тренировках

КЛАССИЧЕСКИМ ПРИМЕРОМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИЕТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокобелковая диета при муковисцидозе
- 2) диета, богатая пуринами, при подагре
- 3) бессолевая диета при синдроме Дауна
- 4) диета с низким содержанием фенилаланина при фенилкетонурии

ПРИ КРИЗИСЕ (БЫСТРОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ) НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА

- 1) потоотделением
- 2) частотой дыхания
- 3) цветом лица
- 4) артериальным давлением

**ВЫДЕЛЕНИЕ С КАШЛЕМ ПЕНИСТОЙ МОКРОТЫ, УДУШЬЕ, ТАХИПНОЭ ХАРАКТЕРНЫ
ДЛЯ**

- 1) сердечной астмы
- 2) отёка лёгких
- 3) бронхоэктатической болезни
- 4) пневмонии

**МАКСИМАЛЬНОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У
НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 15
- 4) 10

К ТВЕРДЫМ ОТНОСИТСЯ _____ ПОВЯЗКА

- 1) гипсовая
- 2) бинтовая
- 3) клеоловая
- 4) окклюзионная

САМОЙ ДЛИННОЙ МЫШЦЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прямая бедра
- 2) икроножная
- 3) длиннейшая спины
- 4) портняжная

**МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ
ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) _____ ЦВЕТА**

- 1) желтого
- 2) красного
- 3) белого
- 4) черного

**СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ В ОРГАНЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА О ВЫЯВЛЕНИИ
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 6

**ДЛЯ СБОРА ОСТРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ**

- 1) одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры), которые должны иметь плотно прилегающую крышку

- 2) одноразовые прокалываемые емкости (контейнеры), которые должны иметь плотно прилегающую крышку
- 3) одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры), которые не должны иметь плотно прилегающую крышку
- 4) многоразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры), которые должны иметь плотно прилегающую крышку

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) смену
- 3) неделю
- 4) месяц

ИНСУЛИН ХРАНЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (°С)

- 1) +15 - +25
- 2) -1 - +1
- 3) +2 - +8
- 4) -5 - -10

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) иглодержатель
- 2) окончатый зажим (Люэра)
- 3) крючок Фолькмана
- 4) зажим Кохера

В РОССИИ ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ _____ ПОМОЩИ

- 1) паллиативной
- 2) специализированной, в том числе высокотехнологичной
- 3) доступной медико-санитарной
- 4) скорой, в том числе скорой специализированной

НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) судороги конечностей
- 2) угнетение дыхания
- 3) понижение температуры
- 4) эндогенная депрессия

К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- 1) артрит
- 2) повышение артериального давления
- 3) одышка
- 4) кардиогенный шок

"СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ЭТО

- 1) профилактика
- 2) политика
- 3) диспансеризация
- 4) здоровье

ГОРМОНЫ — ЭТО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ

- 1) вырабатываются в экзокринных железах и выводятся через протоки
- 2) вырабатываются в эндокринных железах и действуют через кровь на органы-мишени
- 3) являются конечными продуктами обмена веществ
- 4) синтезируются в толстом кишечнике

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА) РУКИ СПАСАТЕЛЯ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- 1) середине грудины (на уровне 3-го межреберья)
- 2) центре грудной клетке (на границе средней и нижней трети грудины)
- 3) левой половине грудной клетки (область верхушечного толчка)
- 4) верхней трети грудины (на уровне ключиц)

ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА, СТЕКЛА И ТЕКСТИЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

- 1) химический
- 2) газовый
- 3) воздушный
- 4) паровой

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ МИКРООРГАНИЗМОВ

- 1) госпитальных
- 2) условно-патогенных
- 3) грибковых
- 4) патогенных

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ БОЛИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -pexia
- 2) -algia
- 3) -rrhaphia
- 4) -tomia

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖНО ПРОВОДИТЬ НА

СРОКЕ ДО _____ НЕДЕЛЬ

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 16
- 4) 22

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СОСТАВЛЯЕТ _____ СУТОК

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 14
- 4) 7

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ _____ ПРОБЫ

- 1) бензидиновой
- 2) озоновой
- 3) ортотолуидиновой
- 4) азопирамовой

ХАРАКТЕРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОТЕКА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) экспираторная одышка, сухие, «свистящие» хрипы
- 2) частое дыхание, «застойные» мелкопузырчатые хрипы
- 3) осиплость голоса, отек губ
- 4) тахипноэ, стридорозное дыхание

РИФАМПИЦИН ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

- 1) трихомониаза
- 2) туберкулёза
- 3) пиелонефрита
- 4) ревматизма

ПРИ ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАР НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ У ПАЦИЕНТА

- 1) результатов лабораторных и инструментальных исследований
- 2) заключения терапевта о возможности оперативного лечения
- 3) выписки из медицинской карты амбулаторного больного
- 4) направления врача поликлиники

АЛЬТЕРАЦИЯ, ЭКССУДАЦИЯ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

- 1) исходы воспаления
- 2) компоненты воспалительной реакции
- 3) стадии воспаления
- 4) виды экссудата

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- 1) всех медицинских работников
- 2) только средних медицинских работников
- 3) только врачей
- 4) только врача общей практики

В СОСТАВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВХОДЯТ _____ ЗОНЫ (ЗОН)

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ РАЗРЫВА ПОЛОГО ОРГАНА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) разлитая боль тупого характера, положительный симптом поколачивания по пояснице
- 2) бледность, холодный пот, падение артериального давления
- 3) схваткообразная боль, урчание в животе, отхождение газов
- 4) резкая боль в животе, напряжение мышц передней брюшной стенки

К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ

- 1) 65-85
- 2) 75-89
- 3) 45-59
- 4) 60-74

КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) гемоперикарда
- 2) гемоперитонеума
- 3) гемоторакса
- 4) гемартроза

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ДОКУМЕНТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ

- 1) документ сверен с оригиналом
- 2) документ подписан электронной подписью
- 3) электронная подпись проверена
- 4) копия верна

ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ

- 1) кардиальный отдел
- 2) основание
- 3) верхнюю часть

4) нисходящую часть

ДЕСМУРГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛ ХИРУРГИИ, ИЗУЧАЮЩИЙ

- 1) введение с лечебной целью в сосудистое русло большого кровяного донора
- 2) введение лекарственного препарата в зону расположения нерва или нервного ствола
- 3) виды повязок и технику их наложения
- 4) фиксацию конечности для предотвращения дополнительного повреждения костей

ЦЕЛЬЮ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выявление наружного кровотечения
- 2) определение оптимального положения пострадавшего
- 3) оценка общего состояния пострадавшего
- 4) выявление различных травм

ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слабость
- 2) кровохарканье
- 3) боль в грудной клетке
- 4) одышка

ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- 1) эмболию
- 2) инфильтрат
- 3) гематому
- 4) аллергическую реакцию

УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рабочий раствор, приготовленный накануне
- 2) хорошее освещение
- 3) экспозиция 1 минута
- 4) подогрев инструментов

ПАЦИЕНТУ С ШОКОМ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) ортопноэ
- 2) Фаулера
- 3) Симса
- 4) Тренделенбурга

В СОСТОЯНИИ АГОНИИ ДЫХАНИЕ

- 1) отсутствует
- 2) частое поверхностное
- 3) редкое судорожное

4) частое глубокое

ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) артериальная гипертензия
- 2) дизурия
- 3) анемия
- 4) дорсопатия

МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С

- 1) стерильными инструментами
- 2) агрессивными жидкостями
- 3) неповрежденной кожей
- 4) водой

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тяжесть течения
- 2) контагиозность
- 3) переход в хроническую форму
- 4) острое течение

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА В КРЕСЛЕ-КАТАЛКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУК

- 1) на животе
- 2) за пределами подлокотников
- 3) на подлокотниках
- 4) в скрещенном состоянии на груди

В ПОДПАУТИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ

- 1) кровеносные сосуды
- 2) ликвор
- 3) жировая клетчатка и венозное сплетение
- 4) жировая клетчатка

УСТОЙЧИВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТНОСИТСЯ К НАСЛЕДСТВЕННОЙ _____ ИЗМЕНЧИВОСТИ

- 1) модификационной
- 2) мутационной
- 3) фенотипической
- 4) онтогенетической

ЗАДЕРЖКА СТУЛА, СВЯЗАННАЯ С АДАПТАЦИЕЙ К УСЛОВИЯМ СТАЦИОНАРА – ЭТО _____ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА

- 1) психологическая
- 2) физиологическая
- 3) эмоциональная

4) социальная

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) злоупотребление алкоголем
- 2) переохлаждение
- 3) искусственная вентиляция легких
- 4) курение

МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, СОЗДАННЫЕ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ, ХРАНЯТСЯ

- 1) в медицинской информационной системе медицинской организации
- 2) на личном компьютере медицинской сестры
- 3) на флеш-накопителе, принадлежащем сотруднику
- 4) в архиве на дисках без подключения к сети

В ПОДГОТОВКУ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ВХОДИТ

- 1) введение контрастного вещества
- 2) премедикация
- 3) очистительная клизма утром и вечером
- 4) измерение температуры в прямой кишке

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (___ ККАЛ)

- 1) 2000-2300
- 2) 1700-1900
- 3) 3000-3200
- 4) 2800-3000

ИНФОРМИРОВАННЫМ ДОБРОВОЛЬНЫМ СОГЛАСИЕМ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подтверждение согласия медицинского учреждения провести операцию
- 2) согласие родственников пациента на лечение
- 3) осознанное и добровольное решение пациента пройти медицинскую процедуру
- 4) документ, подтверждающий оплату медицинских услуг

ПРИЧИНОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) токсикоз беременных
- 2) внутриутробная инфекция
- 3) резус-конфликт
- 4) незрелость печени

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНА В

- 1) Трудовом Кодексе РФ
- 2) Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ

- 3) Программе развития здравоохранения
- 4) Гражданском Кодексе РФ

МЫШЦЫ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К КОСТИ С ПОМОЩЬЮ

- 1) сухожилий
- 2) хрящей
- 3) мышечных пучков
- 4) нервных волокон

ГИПОКИНЕЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) ограничением подвижности суставов
- 2) ограничением объема и скорости движений
- 3) ограничением подвижности позвоночника
- 4) низкой физической активностью

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТУ МЛАДШЕ 15 ЛЕТ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- 1) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- 2) законным представителем на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- 3) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента
- 4) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) суточный диурез
- 2) водный баланс
- 3) дневной диурез
- 4) анурез

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК УСТАНОВЛИВАЕТСЯ У ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ

- 1) старше 75 лет
- 2) от 42 до 63 лет
- 3) от 21 до 39 лет
- 4) от 65 до 75 лет

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) клиническую
- 2) бактериологическую
- 3) иммунологическую

4) цитологическую

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ НУЖНО

- 1) дать нитроглицерин под язык
- 2) уложить с приподнятым головным концом
- 3) ввести внутривенно эуфиллин
- 4) уложить с приподнятым ножным концом

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПРАКТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТ _____ ЭТАПА (ОВ) РЕАБИЛИТАЦИИ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

ПРИ ПОВЕШЕНИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- 1) зафиксировать шейный отдел позвоночника
- 2) начать искусственную вентиляцию лёгких
- 3) освободить шею от сдавливающей петли
- 4) провести непрямой массаж сердца

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА ЭПИНЕФРИНА, ВВОДИМОГО ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ, СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

- 1) 5
- 2) 0,1
- 3) 0,5
- 4) 1

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- 1) не предупреждать пациента о манипуляции
- 2) вызвать врача
- 3) получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции
- 4) информировать пациента о ходе проведения манипуляции

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ СЛЕДУЕТ СЛЕДИТЬ ЗА

- 1) цветом мочи
- 2) качеством сна
- 3) температурой тела
- 4) частотой пульса

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС ЧЕЛОВЕКА

- 1) увеличивает риск развития гипертонии
- 2) уменьшает риск развития гипертонии
- 3) не влияет на повышение артериального давления
- 4) поддерживает идеальный баланс артериального давления

КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- 1) острого коронарного синдрома
- 2) острой дыхательной недостаточности
- 3) отека мозга
- 4) коллапса

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- 1) в присутствии пациентов в зависимости от типа загрязнения и используемого дезинфицирующего средства
- 2) в присутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты
- 3) в отсутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты
- 4) регулярно в присутствии источника инфекции — больного человека

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ -МАЛЯЦИЯ (MALACIA) ОБОЗНАЧАЕТ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ

- 1) размягчение ткани
- 2) замещение ткани
- 3) камнеобразование
- 4) новообразование

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) бронхолитики, глюкокортикостероиды
- 2) бронхолитики, диуретики
- 3) антибиотики, диуретики
- 4) антибиотики, отхаркивающие

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) анемия
- 2) повышенная кровоточивость
- 3) цинга
- 4) рахит

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ (РАСТВОРИТЕЛЕЙ) РАЗЛИЧАЮТ РАСТВОРЫ

- 1) водные и не водные
- 2) масляные и спиртовые
- 3) растительные и полусинтетические
- 4) окрашенные и неокрашенные

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остановка кровотечения

- 2) профилактика вторичного инфицирования
- 3) герметизация раны
- 4) постоянный доступ лекарственного вещества

ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) травма головы
- 2) внутричерепная гипертензия
- 3) аневризма сосудов головного мозга
- 4) тромбоэмболия

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

- 1) ввести инсулин
- 2) дать выпить отвар шиповника
- 3) ввести дибазол
- 4) дать выпить сладкий чай

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ФОРМЕ №

- 1) 059-у
- 2) 058-у
- 3) 028-у
- 4) 033-у

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ ДЫХАНИЯ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) диспноэ
- 2) тахипноэ
- 3) брадипноэ
- 4) апноэ

ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ НИТРОФУРАНОВОГО РЯДА РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) ограничение молочных продуктов
- 2) прием витамина С
- 3) обильное питье
- 4) прием препарата до еды

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕПРЕРЫВНОМ ПРИЕМЕ НИТРАТОВ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) увеличение чувствительности к лекарственному препарату
- 2) толерантность к лекарственному препарату
- 3) печеночная недостаточность
- 4) почечная недостаточность

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ ПО

- 1) решению суда
- 2) решению лечащего врача
- 3) решению законного представителя
- 4) желанию пациента

ВО ВРЕМЯ НАКРЫТИЯ СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

- 1) деонтологию
- 2) асептику
- 3) независимость
- 4) безопасность

СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- 1) крепитация в области малоберцовой кости
- 2) крепитация большеберцовой кости
- 3) симптом «прилипшей пятки»
- 4) крепитация в области нижней трети бедра

ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) урежение пульса
- 2) увеличение центрального венозного давления
- 3) повышение артериального давления
- 4) снижение диуреза

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

- 1) прием жирной пищи
- 2) избыток фруктов
- 3) переохлаждение
- 4) стресс

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) физическая
- 2) профилактическая
- 3) заключительная
- 4) текущая

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- 1) врачом в соответствии с индивидуальным графиком
- 2) врачом по желанию родителей без медицинских показаний
- 3) врачом после общего осмотра пациента с измерением температуры
- 4) врачом в соответствии с Национальным календарем прививок

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более
- 2) уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более
- 3) повышенный уровень сахара в моче
- 4) повышенный уровень артериального давления

ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА В ОРГАНАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ВЫЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атрофия слизистых оболочек
- 2) усиление секреторной функции
- 3) гипертрофия слизистых оболочек
- 4) увеличение количества ворсинок в кишечнике

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РЕСПИРАТОР СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ

- 1) за наружную поверхность
- 2) за резинки (петли), не касаясь лицевой части
- 3) после обработки антисептиком
- 4) любыми способами

АККОМОДАЦИЯ ГЛАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ

- 1) хрусталика
- 2) стекловидного тела
- 3) роговицы
- 4) водянистой влаги камер

НА ПАКЕТАХ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА УКАЗАТЬ

- 1) дату вскрытия
- 2) название отделения
- 3) дату стерилизации
- 4) название медицинской организации

НА ФОНЕ ОДИНОЧЕСТВА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1) повышенная общительность
- 2) тревожность
- 3) депрессия
- 4) апатия

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

- 1) наблюдать амбулаторно
- 2) срочно госпитализировать
- 3) направить в поликлинику
- 4) ввести анальгетики

ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение носового дыхания

- 2) боль при глотании
- 3) потеря голоса
- 4) снижение слуха

**ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ
(__ ЛЕТ)**

- 1) 25-35
- 2) 25-45
- 3) 30-40
- 4) 20-25

**КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПАЦИЕНТА С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ 1 СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ**

- 1) бледные
- 2) гиперемированы
- 3) нормальной окраски
- 4) цианотичные

**МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

- 1) врачебная амбулатория
- 2) кардиологический центр
- 3) участковая больница
- 4) поликлиника

ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ БОЛИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- 1) эпигастрии, носят опоясывающий характер
- 2) правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, лопатку, надключичную область
- 3) эпигастрии в начале заболевания, затем опускаются в правую подвздошную область
- 4) поясничной области, иррадируют в половые органы, внутреннюю поверхность бедра

АЛЬДОСТЕРОН ОБРАЗУЕТСЯ В

- 1) клубочковой зоне коры надпочечников
- 2) сетчатой зоне коры надпочечников
- 3) пучковой зоне коры надпочечников
- 4) мозговом слое надпочечников

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ
СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В
СЛУЧАЕ**

- 1) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи

- 2) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- 3) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации
- 4) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

АНАЛИЗ МОЧИ НА СУТОЧНУЮ ГЛЮКОЗУРИЮ СОБИРАЕТСЯ В

- 1) течение суток в одну емкость
- 2) стерильную пробирку
- 3) течение 10 часов в одну емкость
- 4) течение суток, в 8 банок, каждые 3 часа

ПОДПИСАНИЕ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) по мере накопления документов
- 2) в течение 3 рабочих дней после создания
- 3) в день создания электронного документа
- 4) в течение недели после создания

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИНГАЛЯЦИОННЫЙ БРОНХОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

- 1) адреналина гидрохлорид
- 2) эуфиллин
- 3) сальбутамол
- 4) атропина сульфат

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

- 1) полупостельный
- 2) палатный
- 3) строгий постельный
- 4) общий

МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) занятие танцами в вечернее время
- 2) прием пищи не менее, чем за 2-3 часа до сна
- 3) отказ от снотворных средств
- 4) посещение фитнес-тренировок вечером

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

- 1) стерильные растворы, предназначенные для введения в организм человека путём инъекций или инфузий
- 2) нестерильные растворы, предназначенные для введения в организм человека

путём инъекций или инфузий

3) стерильные растворы, предназначенные для введения в организм человека через желудочно-кишечный тракт

4) стерильные растворы, предназначенные для нанесения на кожные покровы

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

1) томографии

2) флюорографии

3) рентгеноскопии

4) бронхоскопии

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

1) нарезанную марлю складывают по ширине и длине

2) края нарезанной марли заворачивают внутрь, складывают вдвое по ширине и длине

3) нарезанную марлю складывают по длине и еще раз по длине

4) нарезанную марлю складывают по полам и еще раз по полам

ФОРМОЙ ОБЩЕЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В ТРИ СТАДИИ: ТРЕВОГИ, РЕЗИСТЕНТНОСТИ, ИСТОЩЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) стресс

2) коллапс

3) кома

4) шок

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ, ПОТЛИВОСТЬ, ПОХУДАНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

1) гиперфункции коры надпочечников

2) гипотиреоза

3) гипертиреоза

4) сахарного диабета

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ

1) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

2) большей устойчивости организма к стрессам

3) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

4) уменьшению потребности в пище

ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1) молочный струп на лице

2) творожистые высыпания на слизистой полости рта

3) боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

4) язвочки на слизистой полости рта

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ

- 1) фиолетовое, переходящее в сиреневое
- 2) сине-зеленое
- 3) розовое
- 4) бурое

ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ _____ ПЕРЧАТКИ

- 1) «кольчужные» перчатки
- 2) смотровые нитриловые
- 3) радиозащитные хирургические
- 4) хирургические нитриловые

ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

- 1) длительное бодрствование
- 2) длительный сон
- 3) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления
- 4) мышечная гипотония

ВТОРОЙ ФАЗОЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воспаление
- 2) рубцевание
- 3) дегидратация
- 4) регенерация

СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В МИН)

- 1) 90
- 2) 170
- 3) 140
- 4) 110

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) введение адреналина
- 2) наружный массаж сердца
- 3) прием Сафара
- 4) искусственное дыхание «рот в рот»

МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- 1) инспираторной одышке
- 2) астматическом статусе
- 3) травме позвоночника
- 4) попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути

ПРОЦЕСС, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУР ВЗАМЕН ПОГИБШИХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) регенерацией
- 2) гипертрофией
- 3) атрофией
- 4) метаплазией

ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 60
- 2) 45
- 3) 30
- 4) 90

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ГЕМОФИЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение тромбоцитов
- 2) дефицит факторов свертывания
- 3) недостаток витаминов
- 4) снижение кальция в крови

К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) ацикловир
- 2) дроперидол
- 3) парацетамол
- 4) протамина сульфат

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кожный зуд
- 2) желтуха
- 3) пищеводное кровотечение
- 4) снижение аппетита

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дезинсекция
- 2) стерилизация
- 3) дезинфекция
- 4) дератизация

ПАЦИЕНТАМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ ПОКАЗАНО НЕМЕДЛЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ

- 1) супрастина внутримышечно
- 2) цетрина сублингвально
- 3) амиодарона внутривенно
- 4) эпинефрина внутримышечно

КОРЦАНГ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

- 1) наложения швов
- 2) остановки кровотечения
- 3) подачи перевязочного материала и инструментов
- 4) удержания хирургической иглы

ПАЦИЕНТАМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ УВЕЛИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- 1) мяса, мясных субпродуктов
- 2) молочных продуктов высокой жирности
- 3) сыра, творожных десертов
- 4) рыбы, орехов, овощей

ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) конъюнктивой
- 2) склерой
- 3) роговицей
- 4) радужкой

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- 1) информированием граждан о факторах риска для их здоровья
- 2) проведением обязательной иммунопрофилактики
- 3) информированием о достижениях в области лечения заболеваний
- 4) проведением рекламы специализированных видов питания

ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НАЗЫВАЮТ

- 1) фиксирующим – бинт
- 2) лечебным – салфетка
- 3) изолирующим – компрессная бумага
- 4) согревающим – вата

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

- 1) диагностике IV стадии болезни
- 2) на ранних стадиях
- 3) при отсутствии метастазов
- 4) при наличии кровотечения

В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКОЕ (БИОХИМИЧЕСКОЕ) ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ОТСУТСТВУЕТ ГРАФА

- 1) домашний адрес
- 2) отделение, номер истории болезни
- 3) диагноз
- 4) возраст, пол

ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

- 1) полицию
- 2) прокуратуру
- 3) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения
- 4) руководителя медицинской организации, в которой работает

ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б И В, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА В НИХ НЕ БОЛЕЕ ____ КГ ОТХОДОВ

- 1) 20
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 15

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ

- 1) бронхите
- 2) ревматизме
- 3) холецистите
- 4) гепатите

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- 1) повышается
- 2) незначительно повышается
- 3) не изменяется
- 4) снижается

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

- 1) наложение артериального жгута выше места повреждения
- 2) тампонада раны
- 3) применение гемостатической губки
- 4) наложение давящей повязки

ЗА РАВНОВЕСИЕ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО УША, НАЗЫВАЕМЫЙ

- 1) слуховыми косточками
- 2) улиткой
- 3) преддверием
- 4) барабанной полостью

СРОК ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТОВ СОСТАВЛЯЕТ (ДНИ)

- 1) 1-5
- 2) 100-120
- 3) 50-70
- 4) 10-15

СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) мочевыделительной системы
- 2) органов дыхания
- 3) нервной системы
- 4) эндокринной системы

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ (СТАБИЛЬНОЕ БОКОВОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) судорожный припадок
- 2) подозрение на травму позвоночника
- 3) отсутствие сознания и дыхания
- 4) отсутствие сознания, сохранение дыхания

МЕЛЬЧАЙШЕЙ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ЛЁГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) доля
- 2) долька
- 3) ацинус
- 4) сегмент

ПОЛУЛУННЫЙ КЛАПАН РАСПОЛОЖЕН В

- 1) устье легочной вены
- 2) устье аорты
- 3) левом предсердно-желудочковом отверстии
- 4) правом предсердно-желудочковом отверстии

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- 1) динамометрия, спирометрия
- 2) ЧСС, АД
- 3) вес, рост
- 4) спирометрия, ЭКГ

ГРАЖДАНИН РФ ИМЕЕТ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С (В ГОДАХ)

- 1) 15
- 2) 16
- 3) 18
- 4) 21

К СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) патогенность
- 2) профильность
- 3) комплиментарность
- 4) тропность

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Правительством Российской Федерации
- 2) Федеральным законом
- 3) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- 4) законодательным собранием субъекта Российской Федерации

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОРГАНА ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дистрофией
- 2) гипертрофией
- 3) гиперплазией
- 4) атрофией

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) вечером
- 2) через день
- 3) утром
- 4) утром и вечером

ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НЕОБХОДИМО ЗАФИКСИРОВАТЬ

- 1) только место перелома
- 2) два соседних сустава выше и ниже места перелома
- 3) всю конечность без учёта суставов
- 4) только дистальный сустав

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОИСХОДИТ

- 1) на месте образования отходов
- 2) в специальных помещениях лечебного отделения
- 3) на территории учреждения здравоохранения
- 4) за пределами территории учреждения здравоохранения

ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ

- 1) гнойно-септические инфекции
- 2) инфекции кожных покровов
- 3) кишечные инфекции
- 4) инфекции мочевыводящих путей

ГЛАВНЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МЕДСЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокий уровень жизни
- 2) высокая оплата труда

- 3) развитие здравоохранения
- 4) эффективная организация труда

ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА

- 1) с письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации
- 2) с разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии
- 3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством
- 4) с разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности

ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ _____, ПРИ УСЛОВИИ ЕЕ ОСНАЩЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

- 1) только после обеззараживания химическим методом
- 2) без предварительного обеззараживания
- 3) не допускается ни при каких условиях
- 4) только после обеззараживания физическим методом

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиподинамия
- 2) гиповитаминоз
- 3) гипотония
- 4) переохлаждение

МЕНСТРУАЦИЯ - ЭТО

- 1) слияние ядер половых клеток
- 2) выход яйцеклетки из фолликула
- 3) отторжение функционального слоя эндометрия
- 4) прикрепление плодного яйца к стенке матки

КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- 1) гастрита
- 2) бронхита
- 3) ожирения
- 4) гепатита

В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ ОТДЕЛЫ

- 1) кардиальный, дно, тело, пилорический
- 2) кардиальный, диафрагмальный, головка, дно
- 3) верхний, дно, тело, пилорический
- 4) верхний, нижний, тело, пилорический

ЯЙЦЕКЛЕТКА СОЗРЕВАЕТ В

- 1) фолликуле
- 2) лимфоците
- 3) альвеоле
- 4) эритроците

ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН В НОЧНЫЕ ЧАСЫ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) металлического судна
- 2) съемного мочеприемника
- 3) резинового судна
- 4) памперса

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СИМПТОМ

- 1) «клавиши»
- 2) «прилипшей пятки»
- 3) «переднего выдвигного ящика»
- 4) «каблука»

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- 1) поступления в больницу
- 2) оказания помощи
- 3) получения травмы
- 4) прибытия транспорта

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ _____ ШОК

- 1) гемотрансфузионный
- 2) травматический
- 3) кардиогенный
- 4) анафилактический

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «КУРЕНИЕ ТАБАКА» ЯВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВЫКУРИВАНИЕ БОЛЕЕ _____ СИГАРЕТ(Ы)

- 1) десяти
- 2) пятнадцати
- 3) пяти
- 4) одной

НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кардиоцентез
- 2) биопсия хориона
- 3) амниоцентез
- 4) УЗИ с доплерографией

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ

- 1) с целью предупреждения осложнений, обострений заболеваний
- 2) для определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой работе
- 3) для своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний
- 4) при поступлении на работу или учебу

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) проведение ингаляций
- 2) постановка горчичников на грудную клетку
- 3) лечебная физкультура
- 4) постуральный дренаж

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) колбасы высокой жирности
- 2) цельные молочные продукты
- 3) ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры
- 4) субпродукты

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКАХ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) химический метод дезинфекции
- 2) аэрозольную дезинфекцию
- 3) озонирование
- 4) УФ-облучение

ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ (В Л)

- 1) 0,5
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 1

ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5°C РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) введение жаропонижающих
- 2) физическое охлаждение
- 3) постановка очистительной клизмы
- 4) проведение промывания желудка

КРИТЕРИЕМ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПЕРЕД ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие изменений пульса на лучевой артерии
- 2) отсутствие пульса на лучевой артерии
- 3) бледность кожных покровов ниже жгута
- 4) гиперемия кожи ниже жгута

СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИЩИ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА С 2-Х НЕДЕЛЬ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ _____ МАССЫ ТЕЛА

- 1) 1/8
- 2) 1/6
- 3) 1/5
- 4) 1/7

ГЕРОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ

- 1) биологические, социальные и психологические аспекты старения человека
- 2) закономерности старения высших животных и человека
- 3) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- 4) пути увеличения продолжительности жизни человека

МОДИФИЦИРУЕМЫМ (КОРРЕГИРУЕМЫМ) ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышенная физическая нагрузка
- 2) проживание в местности с хвойным лесом
- 3) активное и пассивное курение
- 4) гиподинамия

В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ СПОСОБОМ

- 1) орошения
- 2) протирания
- 3) орошением с помощью пульверизатора
- 4) протирания с орошением

ЭМБОЛИЯ ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН

- 1) жировая
- 2) тканевая
- 3) газовая
- 4) воздушная

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ I ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рвота
- 2) жажда
- 3) озноб
- 4) чувство жара

К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) гигиеническая обработка кожных покровов
- 2) постановка горчичников
- 3) промывание желудка
- 4) смена постельного и нательного белья

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ НА КРОВЬ, ВСЮ ПАРТИЮ ИЗДЕЛИЙ, ИЗ КОТОРОЙ

ОТБИРАЛИ НА КОНТРОЛЬ, ПОДВЕРГАЮТ

- 1) повторной предстерилизационной очистке
- 2) промыванию водой
- 3) повторной дезинфекции
- 4) промыванию дистиллированной водой

ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остатки плацентарной ткани
- 2) перфорация матки
- 3) кровотечение
- 4) воспаление маточных труб

ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) быстрой ходьбе
- 2) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное
- 3) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное
- 4) длительной ходьбе

В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ _____ РАЗ В СУТКИ

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

ЖЕЛЧЬ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- 1) желчном пузыре
- 2) печени
- 3) тонкой кишке
- 4) поджелудочной железе

ПРИЗНАК АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

- 1) снижение аппетита
- 2) лихорадка
- 3) загрудинная боль
- 4) головная боль

ПАЛАТНАЯ МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№1-84)

- 1) ежедневно
- 2) перед каждым приемом пищи
- 3) 2 раза в день
- 4) 1 раз в неделю

ОСОБЕННОСТЬЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО КАЛОПРИЕМНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) возможность длительного применения без замены
- 2) затруднение приклеивания к коже и снятия
- 3) невозможность применения в первые дни после операции
- 4) наличие прозрачного «окна» для наблюдения за состоянием стомы

ОСНОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ ВОЗДУШНОГО МЕТОДА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАРОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) более длительное время и высокая температура цикла
- 2) невозможность стерилизовать изделия из металла
- 3) значительные энергетические затраты
- 4) невозможность обработки термочувствительных изделий

САПРОФИТЫ – ЭТО БАКТЕРИИ, КОТОРЫЕ ПИТАЮТСЯ

- 1) неорганическими веществами, используя энергию света
- 2) неорганическими остатками отмерших организмов
- 3) живыми клетками и тканями
- 4) органическими остатками отмерших организмов

ХОЛОД НА МЕСТО ТРАВМЫ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ НА ____ МИНУТ

- 1) 35 - 40
- 2) 45 - 50
- 3) 25 - 30
- 4) 15 - 20

В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ В СТАЦИОНАРЕ МЕДСЕСТРА ЗАПИСЫВАЕТ ДАННЫЕ В

- 1) карту сестринского наблюдения
- 2) температурный лист
- 3) лист учета водного баланса
- 4) лист врачебных назначений

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- 1) диареи
- 2) задержки жидкости в организме
- 3) нарушения вкуса
- 4) спазма гладких мышц кишечника

ПАЦИЕНТАМ С ШОКОМ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) тугого бинтования нижних конечностей эластичным бинтом
- 2) приподнятого положения ног (выше уровня сердца)
- 3) постоянной инфузии нефракционированного гепарина
- 4) прерывистой пневматической компрессии нижних конечностей

ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНО В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, НАЧИНАЯ С _____ ЛЕТ

- 1) 45
- 2) 40
- 3) 55
- 4) 50

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

- 1) профессии
- 2) диете
- 3) виду увлечений
- 4) режиму отдыха

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

- 1) реабилитационное
- 2) нейрососудистое
- 3) кардиологическое
- 4) терапевтическое

ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ С МОМЕНТА ПОРАЖЕНИЯ

- 1) 2 часа
- 2) 20-30 минут
- 3) 6 часов
- 4) 3 часа

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ

- 1) старшая медицинская сестра
- 2) постовая медицинская сестра
- 3) медсестра процедурного кабинета
- 4) медсестра приемного отделения

ОСНОВНЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ АНТАЦИДНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нейтрализация соляной кислоты желудочного сока
- 2) уменьшение выработки соляной кислоты париетальными клетками желудка
- 3) стимулирование выработки соляной кислоты париетальными клетками
- 4) устранение спазма гладких мышц кишечника

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ РАБОТЫ ПО

- 1) полному или частичному уничтожению жизнеспособных микроорганизмов всех видов (в том числе в споровой форме)

- 2) уничтожению патогенных микроорганизмов на поверхностях и в воздухе помещений
- 3) обеззараживанию объектов
- 4) полному или частичному уничтожению (удалению) микроорганизмов-возбудителей инфекционных болезней на (в) объектах

В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО

- 1) составить акт о несчастном случае на производстве в установленной форме
- 2) составить протокол о несчастном случае на производстве в произвольной форме
- 3) обратиться к врачу
- 4) обратиться в Управление Роспотребнадзора

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДИАГНОСТИРУЕМЫМ У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- 1) печени
- 2) желудка
- 3) предстательной железы
- 4) легкого

БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ РЕМИССИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕРАПИИ

- 1) гомеопатическими препаратами
- 2) антигистаминными
- 3) бициллином
- 4) витаминами

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- 1) ревматическом миокардите
- 2) вирусном гепатите
- 3) крупозной пневмонии
- 4) сифилисе, туберкулезе

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) организация диспансерного наблюдения детей первого года жизни и подростков
- 2) профилактика заболеваемости, смертности и инвалидности детей, пропаганда здорового образа жизни среди детей и членов их семей
- 3) оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям
- 4) проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди детского населения

ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ МАЛЯРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комар

- 2) больное животное
- 3) больной человек
- 4) кровь больного

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарастающая желтушность кожных покровов
- 2) острая боль в правой подвздошной области
- 3) рвота каловыми массами
- 4) острая боль в эпигастрии

ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ

- 1) некроз
- 2) аллергия
- 3) бронхоспазм
- 4) коллапс

К СПОРООБРАЗУЮЩИМ ПАЛОЧКАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) риккетсии
- 2) вибрионы
- 3) клостридии
- 4) спирохеты

САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пиелонефрит
- 2) пневмония
- 3) миокардит
- 4) холецистит

МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нижняя треть грудины
- 2) верхняя треть грудины
- 3) граница между средней и нижней третями грудины
- 4) средняя треть грудины

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С _____ ЛЕТ

- 1) 35
- 2) 40
- 3) 45
- 4) 39

ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ И ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ВЫРАЖАЕТСЯ

- 1) гипотермией
- 2) лихорадкой
- 3) тепловым ударом
- 4) гипертермией

ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- 1) четыре года
- 2) два года
- 3) три года
- 4) один год

НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ

- 1) ректально
- 2) внутрь
- 3) сублингвально
- 4) подкожно

АМНИОЦЕНТЕЗ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ АНАЛИЗА

- 1) кровь из пуповины
- 2) околоплодные воды с клетками плода
- 3) кровь матери
- 4) ворсины хориона

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ СОСТАВЛЯЕТ (МИНУТЫ)

- 1) 4-6
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) более 20

ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

- 1) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
- 2) большое количество гнойной мокроты
- 3) мокрота в виде «малинового желе»
- 4) «ржавая» мокрота

ВЕЛИЧИНА СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА

- 1) не меняется
- 2) растет
- 3) увеличивается
- 4) снижается

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КЛИМАКСА ЖЕНЩИНАМ НАЗНАЧАЮТ ПРИЕМ

- 1) антидепрессантов

- 2) гормонов
- 3) диуретиков
- 4) анальгетиков

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) антибиотики
- 2) пробиотики
- 3) витамины
- 4) вакцины

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ) ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- 1) не чаще 1 раза в 2 дня
- 2) не реже 1 раза в 7 дней
- 3) ежедневно
- 4) не реже 1 раза в 3 дня

К ПАТОГЕННЫМ БАКТЕРИЯМ, ДЛИТЕЛЬНО СОХРАНЯЮЩИМСЯ В ПОЧВЕ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) сальмонеллы
- 2) шигеллы
- 3) клостридии
- 4) стрептококки

ЦЕЛЬ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 1) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего
- 2) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь
- 3) обеспечение комфорта, уменьшение степени страданий
- 4) обеспечение доступа для наложения повязок

К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТИПАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) частое поверхностное дыхание
- 2) дыхание Куссмауля
- 3) периодическое дыхание Чейна-Стокса
- 4) инспираторная одышка

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- 1) подчинение старшему по должности младшему
- 2) организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению
- 3) сохранение сведений о пациенте
- 4) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности

ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ (ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) учебник по сестринскому делу
- 2) журнал регистрации процедур
- 3) приказ главного врача
- 4) алгоритм сестринской манипуляции

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- 1) ограничить употребление углеводов
- 2) определить уровень базального инсулина
- 3) провести глюкозотолерантный тест
- 4) определить уровень глюкозы в крови натощак

СМЕНА ХАЛАТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) один раз в неделю
- 2) после каждой серии манипуляций
- 3) каждую смену
- 4) один раз в три дня

К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ

- 1) воспаление плевральных листков
- 2) повышение давления в малом круге кровообращения
- 3) спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
- 4) отек гортани

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД, СУТЬ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) очистке крови от токсинов путем плазмафереза
- 2) облучении костного мозга
- 3) трансплантации органа от донора реципиенту
- 4) введении нормальной копии гена в клетки пациента для коррекции их функций

ПРИ УКУСЕ БРОДЯЧЕЙ СОБАКОЙ НЕОБХОДИМО

- 1) обильно промыть рану проточной водой с мылом, наложить асептическую повязку и срочно обратиться за медицинской помощью
- 2) промыть рану водой, обработать перекисью водорода, наложить повязку и обратиться к врачу в ближайшие сутки
- 3) обработать рану спиртом, наложить повязку, обратиться за медицинской помощью в течении 48 часов
- 4) прижечь рану йодом или спиртом и наложить повязку

МЯГКАЯ УПАКОВКА (ОДНОРАЗОВЫЙ ПАКЕТ) ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА

- 1) 1/2
- 2) 3/4
- 3) 2/4
- 4) 2/3

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 12
- 2) 72
- 3) 48
- 4) 24

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) отварные овощи
- 2) молочные продукты
- 3) жирную, жареную пищу
- 4) кашу

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ

- 1) диуретиками
- 2) статинами
- 3) бета-блокаторами
- 4) наркотическими анальгетиками

ВЕДУЩИМИ ФАКТОРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) экологические
- 2) биологические
- 3) социально-экономические
- 4) природно-климатические

ВТОРИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

- 1) возникает после отмены гипотензивной терапии
- 2) развивается на фоне другого (основного) заболевания
- 3) устойчива к гипотензивной терапии
- 4) регистрируется при повторном посещении врача

В ХОДЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ АБСОЛЮТНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ У ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 75-79
- 2) 35-39
- 3) 65-74
- 4) 40-64

ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ

СОПЕРЕЖИВАНИЯ ОБОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН

- 1) экспрессивность
- 2) рационализация
- 3) рефлексия
- 4) эмпатия

ОБЛИГАТНЫЕ АЭРОБЫ – ЭТО БАКТЕРИИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ

- 1) как при наличии кислорода, так и без него
- 2) в присутствии углекислого газа
- 3) в отсутствии кислорода
- 4) при наличии кислорода

ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение мозгового кровообращения с потерей сознания
- 2) коматозное состояние
- 3) биологическая смерть
- 4) почечная и печеночная недостаточность

СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 30:2
- 2) 2:15
- 3) 1:5
- 4) 3:6

У МЛАДЕНЦЕВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- 1) 2 пальцами
- 2) 3 пальцами
- 3) 4 пальцами
- 4) всей кистью

МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) бактериологическую
- 2) клиническую
- 3) вирусологическую
- 4) биохимическую

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) заключения врача
- 2) только информированного добровольного согласия пациента
- 3) направления врача
- 4) информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя

ПОМОЩНИЦЕЙ ПО УХОДУ ДЕЖУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) ОТНОСИТСЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ

- 1) старшая медсестра
- 2) сестра-хозяйка
- 3) санитар и младшая медсестра по уходу за больными
- 4) процедурная медсестра

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ _____ ДНЕЙ

- 1) 250
- 2) 380
- 3) 320
- 4) 280

УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- 1) старшей медсестрой
- 2) специальной комиссией с составлением акта
- 3) дежурной медсестрой
- 4) лечащим врачом

ГРАЖДАНЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО ТРЕБУЮЩИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) I
- 2) IIIa
- 3) IIIб
- 4) II

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) метода стерилизации
- 2) упаковки
- 3) характера манипуляции
- 4) вида изделия медицинского назначения

ОСНОВНЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ ГАСТРОПРОТЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устранение спазма гладких мышц кишечника
- 2) стимулирование аппетита
- 3) стимулирование выработки соляной кислоты париетальными клетками
- 4) защита клеток желудка от агрессивных факторов

ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ИСПАРЕНИЕ В АТМОСФЕРУ,

НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) зоной химического заражения
- 2) очагом химического заражения
- 3) точкой радиационного заражения
- 4) территорией биологического заражения

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ

- 1) определения соответствия медицинской деятельности установленным лицензионным требованиям
- 2) выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата
- 3) установления причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими последствиями для пациента
- 4) сбора статистических данных для формирования отчетов о деятельности медицинской организации

ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1) камфорным спиртом
- 2) 2% раствором перекиси водорода
- 3) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- 4) 5% спиртовым раствором йода

НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАНИМАЮТ ИНФЕКЦИИ

- 1) мочевыводящих путей
- 2) гнойно-септические
- 3) кишечные
- 4) воздушно-капельные

ПРОХОЖДЕНИЕ КЛЕТОК КРОВИ ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КАПИЛЛЯРОВ И ВЕНУЛ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) фильтрацией
- 2) фагоцитозом
- 3) хемотаксисом
- 4) диапедезом

ПРИ ОБЪЕКТИВНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА ОЦЕНИВАЮТ

- 1) факторы риска заболевания
- 2) причины обращения в медицинскую организацию
- 3) нарушение зрения, слуха, памяти
- 4) телосложение, рост, массу тела

АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) патологическая подвижность костных отломков

- 2) отек мягких тканей
- 3) деформация сустава
- 4) деформация мягких тканей

ПОДСЧЕТ ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ НА _____ АРТЕРИИ

- 1) лучевой
- 2) подколенной
- 3) плечевой
- 4) височной

К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ

- 1) дегтярное мыло
- 2) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия
- 3) шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит
- 4) хлорамин

ВСКРЫТИЕ ГОРТАНИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) laryngospasmus
- 2) laryngocele
- 3) laryngoscopia
- 4) laryngotomia

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЕМЕЙСТВА ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ _____ ПАЛОЧКА

- 1) кишечная
- 2) дифтерийная
- 3) туберкулёзная
- 4) столбнячная

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ - ЭТО НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА

- 1) заполняющее трахею и бронхи
- 2) вдыхаемое сверх дыхательного объема
- 3) остающееся в легких после выдоха
- 4) выдыхаемое после самого глубокого вдоха

БЕРЕМЕННОСТЬ В СРЕДНЕМ ДЛИТСЯ _____ ДНЕЙ

- 1) 260
- 2) 280
- 3) 360
- 4) 380

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ КОМПРЕССЕ

- 1) влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт

- 2) влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
- 3) компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт
- 4) вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕ ОРГАНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -osis
- 2) -cele
- 3) spleno-
- 4) -megalia

СПЕЦОДЕЖДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗ _____ ТКАНИ

- 1) любой
- 2) синтетической или шелковой
- 3) хлопчатобумажной
- 4) сатиновой или шерстяной

ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) миллилитр
- 2) ампула
- 3) упаковка
- 4) доза

СИМПТОМ ВЫВИХА

- 1) изменение абсолютной длины конечности
- 2) изменение относительной длины конечности
- 3) крепитация костных отломков
- 4) патологическая подвижность в поврежденном суставе

МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ограничение употребления соли
- 2) употребление продуктов, богатых железом
- 3) употребление продуктов, богатых йодом
- 4) ограничение в пищевом рационе белков

ПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРИ

- 1) ушибе мягких тканей кисти
- 2) колотой ране стопы
- 3) растяжении лучезапястного сустава
- 4) закрытом переломе плеча

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) уход за кожей, промывание желудка

- 2) обработка полости рта, дыхательная гимнастика
- 3) смена нательного белья, проведение оксигенотерапии
- 4) уход за кожей, проведение тюбажа

ХРАНЕНИЕ ТЕРМОМЕТРОВ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) дистиллированной воде
- 2) 3% растворе перекиси водорода
- 3) сухом виде
- 4) 0,5% растворе Сайдекса

ВЫСТУПАЮЩИЙ ОСТИСТЫЙ ОТРОСТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПОЗВОНКОВ, ИМЕЕТ _____ ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК

- 1) VII
- 2) I
- 3) II
- 4) VI

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ

- 1) физический
- 2) химический
- 3) биологический
- 4) бактериологический

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ЖГУТ НАЛОЖЕН ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ

- 1) отсутствует пульс дистальнее жгута
- 2) наблюдается набухание вен
- 3) появляется цианоз кожных покровов
- 4) повышается наполнение пульса

БОЛИ ПРИ ТИПИЧНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ

- 1) появляются в области грудины, возможно, с иррадиацией в левую руку
- 2) локализуются попеременно справа и слева от грудины
- 3) носят локальный, «точечный» характер
- 4) усиливаются при пальпации грудины и (или) грудной клетки по ходу межреберных промежутков

ВНЕЛЕГОЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) острый респираторный дистресс-синдром
- 2) инфекционно-токсический шок
- 3) эмпиема плевры
- 4) дыхательная недостаточность

СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ __ РАЗ(А) В НЕДЕЛЮ И ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- 1) 1

- 2) 2
- 3) 7
- 4) 3

**МАЗИ - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ МЯГКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
_____ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) парентерального
- 2) энтерального
- 3) внутреннего
- 4) наружного

ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ

- 1) с повышенным содержанием белка
- 2) основной вариант стандартной диеты
- 3) с пониженным содержанием белка
- 4) с пониженной калорийностью

ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПЕРЕЛОМА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тело
- 2) шейка
- 3) дистальный эпифиз
- 4) нижний эпифиз

**ПОЯВЛЕНИЕ У ЛИХОРАДЯЩЕГО ПАЦИЕНТА РЕЗКОЙ СЛАБОСТИ, ОБИЛЬНОГО
ХОЛОДНОГО ПОТА, БЛЕДНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, НИТЕВИДНОГО ПУЛЬСА И
СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ**

- 1) литическом снижении высокой температуры
- 2) субфебрилитете
- 3) быстром и значительном повышении температуры
- 4) критическом снижении температуры

**ПРИ ПЛАНОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ**

- 1) приборов, медицинских изделий
- 2) кожных покровов
- 3) поверхностей в помещениях
- 4) всех видов поверхностей внутрибольничной среды

**ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРОВОДИТСЯ В**

- 1) санатории
- 2) реанимационном отделении
- 3) кардиологическом центре
- 4) больнице скорой медицинской помощи

ПРИЗНАННЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) избыточная масса тела и низкая физическая активность
- 2) физический или эмоциональный стресс
- 3) бактерия *Helicobacter pylori*
- 4) употребление в пищу острой, жареной и жирной пищи

ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) менингита
- 2) энцефалита
- 3) остеохондроза
- 4) опухоли головного мозга

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- 1) как разовое мероприятие в помещениях медицинской организации, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии
- 2) с целью предотвращения распространения возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и их переносчиков из соседних отделений (палат)
- 3) с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях медицинской организации организаций
- 4) еженедельно дезинфицирующими средствами по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов

ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

- 1) грубый, "лающий"
- 2) продуктивный, влажный
- 3) сухой, навязчивый
- 4) приступообразный

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ _____ ИНСТРУМЕНТОВ

- 1) дезинфекции
- 2) очистки
- 3) стерилизации
- 4) хранения

РАСТВОРАМИ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) 2% раствор новокаина, 5% раствор глюкозы, вода для инъекций
- 2) 1% раствор новокаина, 10% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 3) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 4) 5% раствор глюкозы, 3% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ОРВИ, переохлаждение
- 2) гиповитаминоз, переутомление

- 3) переохлаждение, переутомление
- 4) стресс, хеликобактерная инфекция

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ БИНТОВОЙ _____ ПОВЯЗКОЙ

- 1) возвращающейся
- 2) колосовидной
- 3) циркулярной
- 4) черепашьей

СМЕШИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

- 1) недопустимо
- 2) допустимо для любых классов отходов
- 3) допустимо для отходов классов Б и В
- 4) допустимо для отходов классов А и Б

ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РЕКОМЕНДУЮТСЯ

- 1) интенсивные аэробные нагрузки 2-3 раза в неделю
- 2) статические и силовые упражнения
- 3) упражнения с резкими движениями и наклонами
- 4) умеренные аэробные нагрузки ежедневно

ЛИХОРАДКА, ПРИ КОТОРОЙ СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 1°C, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) постоянной
- 2) ремиттирующей (послабляющей)
- 3) гектической (истощающей)
- 4) извращённой

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ГРЕЛКЕ ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ТЕЛА (°C)

- 1) 60-65
- 2) 20-30
- 3) 40-45
- 4) 30-35

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАПОЧКУ ПРИ

- 1) общении с пациентами
- 2) работе в любых помещениях медицинской организации
- 3) хирургических вмешательствах
- 4) риске загрязнения волос

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- 1) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

- 2) исследования работы головного мозга
- 3) электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
- 4) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- 1) Б
- 2) Г
- 3) А
- 4) В

В СЕРТИФИКАТЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ: ВИД ПРЕПАРАТА

- 1) цвет вакцинного препарата
- 2) срок годности
- 3) температура хранения
- 4) серия

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) сидя с наклоном туловища вперед
- 2) сидя, рука с манжетой опущена вдоль туловища
- 3) по желанию пациента
- 4) сидя с опорой для руки и спины

ПРЕДПЛЕЧЬЕ СГИБАЕТ

- 1) клювовидно-плечевая мышца
- 2) трехглавая мышца плеча (трицепс)
- 3) двуглавая мышца плеча (бицепс)
- 4) плечевая мышца

ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ВРОЖДЕННЫМ УРОДСТВАМ, ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ

- 1) онкогенное
- 2) мутагенное
- 3) тератогенное
- 4) фетотоксическое

РАЗМЕРЫ ВИРУСОВ ИЗМЕРЯЮТСЯ В

- 1) дециметрах
- 2) дальтонах
- 3) нанометрах
- 4) микрометрах

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ

РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) искусственное дыхание, активизация рефлексов
- 2) прекардиальный удар, согревание
- 3) закрытый массаж и дефибриляция сердца
- 4) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны

ТРАНСПОРТ МОЧИ ИЗ ПОЧЕК В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) мочеиспускательный канал
- 2) мочеточник
- 3) нефрон
- 4) лоханка

ОТЛИЧИЕМ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ ОТ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ТРАХЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стридорозное дыхание
- 2) судорожный кашель
- 3) инспираторная одышка
- 4) осиплость голоса

ТЕКУЩИЕ УБОРКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТСЯ ____ РАЗ(А) В ДЕНЬ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) борьба с болью
- 2) нарушение сна
- 3) невозможность трудиться
- 4) недостаточность общения

АНТИТЕЛА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОТИВОВИРУСНОЙ ЗАЩИТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лизирующими
- 2) агглютинирующими
- 3) нейтрализующими
- 4) преципитирующими

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В _____ ЭТАП(А)

- 1) два
- 2) один
- 3) три
- 4) четыре

НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ (°С)

- 1) 25-30
- 2) 37-38
- 3) 39-40
- 4) 30-35

ПРИЗНАКОМ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) цианоз кожи
- 2) покраснение кожи
- 3) напряжение (тургор) ткани
- 4) бледность кожи

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

- 1) штрафуют
- 2) не допускают к работе
- 3) направляют на принудительное обследование
- 4) увольняют с работы

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

- 1) наклоны туловища
- 2) бег
- 3) приседания
- 4) быструю ходьбу

ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ПРОЦЕДУР ПЕРЕД БУМАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) информационное взаимодействие между медицинскими организациями
- 2) свободный доступ к внесению данных для любого сотрудника отделения
- 3) полный отказ от необходимости ведения любого бумажного документооборота
- 4) менее полного вовлечения граждан в процесс наблюдения за собственным здоровьем

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ (В МЛ)

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ ПРОВОДЯТ НЕ ПОЗДНЕЕ _____ ЧАСОВ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1) 2,5 — 3
- 2) 1,5 — 2
- 3) 6,5 — 7
- 4) 4,5 — 5

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ

- 1) 100 мл
- 2) 10 мл
- 3) суточное количество
- 4) 50 мл

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ БЕЗУДЕРЖНЫМ, АВТОНОМНЫМ РОСТОМ АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) метаплазия
- 2) регенерация
- 3) гиперплазия
- 4) опухоль

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (МАТРАСЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА) ПОДВЕРГАЮТ

- 1) профилактической дезинфекции
- 2) очаговой дезинфекции
- 3) стерилизации
- 4) камерной дезинфекции

К НАГЛЯДНЫМ МЕТОДАМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) викторины
- 2) плакаты
- 3) лекции
- 4) дискуссии

ЗА АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНДИКАТОР ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ КОРОТКОВА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИНИМАЮТ

- 1) два первых последовательных тона
- 2) полное исчезновение тонов
- 3) падение звучности тонов
- 4) присоединение к тонам шуршащего шума

МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) иммунологическую
- 2) вирусологическую
- 3) бактериологическую
- 4) клиническую

УМЕНЬШЕНИЮ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ДО ПРИЕЗДА БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) согревание травмированной области

- 2) прикладывание холода к месту повреждения
- 3) наложение давящей повязки на место перелома
- 4) интенсивное растирание

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ЭТО

- 1) оставление в опасности
- 2) клевета
- 3) злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог
- 4) оскорбление

В КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) -cytosis
- 2) -penia
- 3) -poesis
- 4) -haemia

ДИСХОЛИЯ - ЭТО

- 1) состояние, сопровождающееся изменением состава желчи
- 2) мочекаменная болезнь
- 3) метод диагностики различных заболеваний
- 4) позывы на дефекацию или мочеиспускание

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) введение вакцин и сывороток
- 2) вакцинацию
- 3) использование индивидуальных мер защиты
- 4) введение сывороток

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ СОБИРАЮТСЯ В

- 1) многоразовую твердую упаковку
- 2) многоразовые емкости
- 3) одноразовую твердую упаковку
- 4) одноразовые пакеты

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) проведении бесед по формированию здорового образа жизни
- 2) создании профилактических программ
- 3) лечении заболеваний на ранних стадиях
- 4) предупреждении рецидива заболевания

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ИГКС) НЕОБХОДИМО

- 1) прополоскать рот раствором фурацилина

- 2) после каждой ингаляции полоскать рот чистой водой
- 3) использовать малые дозы ИГКС
- 4) использовать пикфлоуметр

ВИРУС ГЕПАТИТА В - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА

- 1) желудка
- 2) печени
- 3) яичников
- 4) пищевода

С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЕГКИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1) туберкулиновая проба
- 2) лабораторное исследование крови
- 3) флюорографическое обследование
- 4) вакцинация БЦЖ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) употребление достаточного количества сока
- 2) проведение процедуры до еды
- 3) тщательное полоскание рта
- 4) проведение процедуры сразу после еды

ПОКАЗАНИЕМ К ИСКУССТВЕННОМУ КОРМЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бессознательное состояние, переломы челюстей
- 2) непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
- 3) послеоперационный период
- 4) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ

- 1) ультразвуковое исследование
- 2) эндоскопическое исследование
- 3) рентгенологическое исследование
- 4) антропометрию

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА СТОМАМИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО

- 1) обрабатывать кожу вокруг стомы спиртосодержащими антисептиками
- 2) использовать для обработки кожи мыло с увлажнителями и ароматизаторами
- 3) ежедневно промывать стому йодсодержащими растворами
- 4) обеспечить постоянный уход за кожей вокруг стомы

ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПАЦИЕНТА В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА СПИНЕ

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНА ЗОНА

- 1) области предплечья
- 2) височной области
- 3) крестца
- 4) грудной клетки

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изменения частоты дыхательных движений
- 2) социализация
- 3) физическая активность
- 4) эмоциональная неустойчивость

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- 1) терапевта
- 2) эндокринолога
- 3) офтальмолога
- 4) невролога

ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) язвенной болезни
- 2) гастрите
- 3) желчнокаменной болезни
- 4) панкреатите

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РАН ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

- 1) бриллиантовой зелени 2%
- 2) Люголя 5%
- 3) хлоргексидина 0,5%
- 4) фенола 1,4%

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) морфин
- 2) гепарин
- 3) калия и магния аспарагинат (панангин)
- 4) нитроглицерин

ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

- 1) бедренной кости
- 2) плечевой кости
- 3) локтевой кости
- 4) ключицы

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ УХОДА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЗА ПАЦИЕНТОМ С БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НА КОНЕЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) нарушения кровообращения дистальнее повязки
- 2) дефицита самоухода
- 3) нарушения двигательной функции
- 4) намокания повязки

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖАТ

- 1) овощи, фрукты
- 2) рыба, ягоды
- 3) крупы, бобовые
- 4) яйца, икра из рыб

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН

- 1) снижением чувствительности тканей к инсулину
- 2) бактериальной инфекцией
- 3) психоэмоциональными перегрузками
- 4) абсолютным дефицитом инсулина

В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАНЫ ВХОДИТ

- 1) роторасширитель
- 2) пинцет хирургический
- 3) троакар
- 4) пила Джигли

ИЗУЧИТЬ ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР (КАРИОТИП) ЧЕЛОВЕКА, ПОЗВОЛЯЕТ _____ МЕТОД

- 1) генеалогический
- 2) дерматоглифический
- 3) биохимический
- 4) цитогенетический

ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- 1) брадикардию
- 2) сонливость
- 3) гипертензию
- 4) остеопороз

ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) формирование здорового образа жизни
- 2) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам
- 3) обучение распознаванию первых признаков инфекционных и неинфекционных заболеваний

4) выработка динамического стереотипа поведения в выполнении гигиенических мероприятий

РЕЦЕПОРЫ СЛУХА РАСПОЛОЖЕНЫ В (ВО)

- 1) внутреннем ухе (улитке)
- 2) среднем ухе (барабанной полости)
- 3) наружном ухе (слуховом проходе)
- 4) евстахиевой трубе

ПЕРВЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) полиурия
- 2) аритмия
- 3) одышка
- 4) гепатомегалия

АСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) систему мероприятий, направленных на уничтожение инфекции в стационаре
- 2) систему мероприятий, направленных на уничтожение инфекции в ране
- 3) систему мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану или в организм больного
- 4) систему мероприятий, направленных на уничтожение инфекции в организме больного

ГОЛОВНОЙ И СПИННОЙ МОЗГ ПОКРЫВАЮТ _____ ОБОЛОЧКИ

- 1) твердая, паутинная и мягкая
- 2) наружная и внутренняя
- 3) соединительнотканная и эпителиальная
- 4) костная и хрящевая

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ главного врача медицинской организации «Об утверждении стандартных операционных процедур по обработке рук»
- 2) должностная инструкция медицинской сестры процедурного кабинета
- 3) методические указания МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов»
- 4) СанПин 3.3686-21

В СЛУЧАЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛИ ОДНОГО ИЗ ПАРНЫХ ОРГАНОВ (ПОЧКА, НАДПОЧЕЧНИК), В СОХРАНИВШЕМСЯ ОРГАНЕ РАЗВИВАЕТСЯ _____ ГИПЕРТРОФИЯ

- 1) нейрогуморальная
- 2) компенсаторная рабочая
- 3) викарная заместительная
- 4) регенерационная

ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ БЫВАЕТ _____ КАЛ

- 1) дегтеобразный
- 2) «овечий»
- 3) обесцвеченный
- 4) кровавистый

ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ АТРОПИНОМ (БЕЛЕНА, ДУРМАН) ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) двигательное и речевое возбуждение, галлюцинации, повышение температуры тела
- 2) мышечная слабость, потливость, замедление пульса
- 3) сужение зрачков (точечные), брадикардия, слюнотечение
- 4) сухость кожи и слизистых, расширение зрачков, тахикардия

ПОЧЕЧНУЮ КОЛИКУ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

- 1) гиподинамия
- 2) нерегулярное питание
- 3) тряская езда
- 4) сладкая пища

ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПУЛЬС РАЗЛИЧАЮТ

- 1) ритмичный и неритмичный
- 2) скорый и медленный
- 3) твердый и мягкий
- 4) полный и пустой

ВАКЦИНУ БЦЖ (БЦЖ-М) ВВОДЯТ

- 1) подкожно
- 2) орально
- 3) внутримышечно
- 4) внутрикожно

ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С

- 1) радиоактивными отходами
- 2) бытовыми отходами
- 3) токсикологически опасными отходами
- 4) промышленными отходами

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в 2 года
- 2) 1 раз в 3 года
- 3) 2 раза в год

4) 1 раз в 5 лет

ОДНИМ ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ФАКТОРА РИСКА «НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ

- 1) овощей и фруктов более 400 г в сутки
- 2) соли более 5 г в сутки
- 3) рыбы более 2 раз в неделю
- 4) воды более 1,5 литров в сутки

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- 1) Г
- 2) Д
- 3) В
- 4) Б

ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1) утилизации
- 2) использованию
- 3) повторной стерилизации
- 4) обработке

МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ

- 1) выполнении инвазивных манипуляций
- 2) санитарной обработке пациента
- 3) выполнении всех манипуляций
- 4) работе в очаге инфекции

ИНФИЦИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ ПРИ ВЕЗИКУЛОПУСТУЛЕЗЕ У ДЕТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАБАТЫВАТЬ

- 1) настойкой йода
- 2) анилиновыми красителями
- 3) лидокаином
- 4) раствором соды

ГЕМОФИЛИЯ – ЭТО

- 1) инфекционно-аллергическое заболевание
- 2) авитаминоз
- 3) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов
- 4) наследственные нарушения свертывания крови

ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- 1) механическому

- 2) физическому
- 3) комбинированному
- 4) химическому

ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) ветряной оспы
- 2) кори
- 3) стафилококковой инфекции
- 4) менингококковой инфекции

ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА ПРИ ИНОРОДНОМ ТЕЛЕ В ГОРТАНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) серию из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота
- 2) запрокидывание головы и открывание рта
- 3) введение воздуховода
- 4) сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

ПРИЗНАКОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дизурия
- 2) гематурия
- 3) полиурия
- 4) никтурия